



GLI ELEMENTI
TEORICO-PRATICI
DELLE MATEMATICHE PURE
DEL PADRE
ODOARDO GHERLI
DOMENICANO
PROFESSORE DI TEOLOGIA DOGMATICA
NELL' UNIVERSITA' DI MODENA
RESI PUBBLICI
DA DOMENICO POLLERA.
TOMO II.



IN MODENA MDCCLXXI.

PRESSO LA SOCIETA' TIPOGRAFICA.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

AL REVERENDISSIMO PADRE
PAOLO MARIA PACIAUDI

C. R. T.

BIBLIOTECARIO, ED ANTIQUARIO DI S. A. R.
L' INFANTE D. FERDINANDO
DUCA DI PARMA,

STORIOGRAFO DEL SACRO MILITAR ORDINE GEROSOLIMITANO, MEMBRO DELLA
REALE ACCADEMIA DI PARIGI DELLE ISCRIZIONI, E BELLE LETTERE CC. CC. CC.

F. ODOARDO GHERLI
D. D. D.



E singolari virtù, REVERENDISSIMO PADRE, e il raro vostro merito tanto dappertutto celebrato, che ho avuto campo di ammirare, allorchè anni sono l'onore ho partecipato di conoscervi, e trattarvi, hanmi sempre in poi fatta una dolce violenza a cercare occasione di darvi qualche pubblica dimostrazione dell'ossequiosa divozione, e della profonda inalterabil mia stima. Nel pubblicare pertanto il secondo Tomo de' miei Elementi di Matematica ho io a un tempo stesso pensato e ad effettuare questo mio desiderio, e a nobilitare in faccia al Mondo col chiarissimo vostro Nome le deboli mie fatiche, le quali forse miglior certamente incontrar non potevano, che

*l'essere avvalorate dal favore, e dalla protezione d'uno de' primi Letterati d'Europa, quale Voi siete. E bene il mio dire giustifica-
no le tante eccellenti opere da Voi pubblicate in così diverse materie,
nelle quali gareggian del pari, nè si fa qual più debbasi ammirare,
se o la vasta erudizione sacra, e profana, o la soda cognizione nel-
le filosofiche facoltà, o la purezza dello stile latino, o la profonda
intelligenza della lingua greca; onde poi mercè di queste vostre fati-
che distinguendovi fra gli ottimi, tra i più onorevoli applausi riscos-
si da tutta la letteraria Repubblica quella somma riputazione acqui-
stata vi siete, che vi ha reso celebre non nell'Italia sola, ma in
ogni paese al di là dell'Alpi, e de' Mari, ove si coltivano, e in
pregio sono i buoni studj. A Voi perciò, che lo studio della più of-
cura, e difficile antichità fatto avete familiare vostra occupazione,
debitori si riconoscono con immortal vostra gloria gli eruditi della
spiegazione de' più pregevoli, e intatti monumenti: E quanto non
si dolgono, che le escavazioni de' resti di Veleja abbian sempre pro-
dotti monumenti tronchi, e mancanti? Benchè non diffidano, che sia-
te per renderne pubbliche le vostre osservazioni, che saranno sempre
interessanti. Qual meraviglia adunque, che questi vostri talenti vi
abbiano poi aperta ampia strada a meritare insieme colla stima, e
coll'amicizia degli uomini per dottrina più rinomati in Europa, che
vi riguardano, e consultano come maestro del vero sapere, illustri, e
ragguardevoli impieghi. Questi talenti vi attirarono l'onorevole ca-*

rica di Storiografo dell' insigne Ordine Gerolimitano: questi vi procurarono, che a gara le prime Accademie cercassero di poterui annoverare tra il loro ceto, fra le quali quella di Parigi delle Iscrizioni, e belle lettere di non usate distinzioni volle ricolmarvi. Mercè di questi chiamato foste dal sempre glorioso D. FILIPPO a Parma per lo stabilimento della pubblica Real Biblioteca; e questo augusto monumento della munificenza de' Reali Sovrani FILIPPO, e FERDINANDO da Voi ideato, condotto, e perfezionato in poco più di quattro anni fu conoscere abbastanza nella copia, e nella scelta de' libri impressi, e manoscritti, che l' ammirazione formano de' più dotti viaggiatori, l' alta vostra cognizione nella Bibliografia, la vostra attività, il vostro gusto squisitissimo, e il più giusto elogio somministra del vostro incontrastabil valore. Quindi a gran ragione allorchè il Reale Infante D. FERDINANDO sempre vegliante alla vera felicità de' fortunati suoi sudditi, animato da quel genio sublime per gli ottimi studj, ne quali è stato educato con saggia, e provvida disposizione il magnanimo cuore, e l' insancibil mente rivolse allo risorgimento d' una fiorente Unìversità, a Voi ben tosto le mire direbbe, e tutto il grande affar ne commise. E come poi non giubilò la comune aspettazione nel vedere, mercè la sagace vostra direzione, la grande idea felicemente eseguita, e perfezionata? I più sinceri encomj riscuotono l' ordine, la disciplina, il regolamento delle Regie Scuole per opera vostra stabilito, e sopra tutto l' erezione de' tre Tea-

tri di Fisica sperimentale, di Anatomia, e di Chimica a Voi dovuta con tanto decoro dell' Università, e vantaggio dello Stato. Giacchè adunque degli studj il protettor siete, e il promotore, non isdegnate, che col vostro nome illustrata comparire ardisca un' Opera, che se non in riguardo alla facchezza del talento di chi ve.l' offre, in riguardo certamente alla materia, che vi si tratta, viene ad essere non indegna di Voi. Voi pertanto colla solita vostra umanità accoglietela, e l' Autor suo col favore, e colla protezion vostra graziosamente riguardate.

IL CALCOLO
DELLE QUANTITÀ
INDETERMINATE.

P R E F A Z I O N E.

Della parte più interessante fra le Matematiche comincio a trattare in questo secondo Tomo. Tale è il Calcolo delle quantità indeterminate, la di cui eccellenza, e sublimità accoppiata a un sommo vantaggio ha avvalorato, e stimolato i primi ingegni da in circa due secoli in quà a promoverne con ogni premura, e impegno i fortunati progressi. E ben meritamente è egli stato, ed è tuttavia lo scopo delle più profonde meditazioni, e delle principali ricerche, avvegnachè il fondamento sia, e la guida alle più importanti, e strepitose scoperte. Quantunque poi appressò noi incontrastabile sia l'Epo- ca pur ora sussata, non è però da negarsi avere per lo meno i più insigni Matema- tici antichi Euclide, Teone, Pappo, Archimede, Apollonio da lungi veduto il lu- me, e seguite le tracce di questa sorprendente scienza, il di cui spirito vedesi di tratto in tratto nell' Opere loro maestrevolmente brillare. Il primo, e solo fra i Greci, che fu di questa materia assai scritto è stato Diofanto Alessandrino autor posteriore alla nascita di Gesù Cristo giusta il comune consenso, che tredici libri compose circa il modo di risolvere i problemi semideterminati riguardanti i numeri quadrati, e cubi, de' quali i sei primi ritrovati furono, e pubblicati nel 1575, per opera di Guglielmo Xilandro. Avanti per altro l'edizione di questi sei libri trattata fu l'Algebra fino alle equazioni quadratiche da F. Luca Paciolo Minore Conventua- le da Borgo S. Sepolcro, il di cui libro intitolato *Somma d'Arithmetica, e Geometria* fu stampato a Venezia nell'anno 1494. La promossero in seguito verso la metà del decimo sesto secolo Nicolò Tartaglia, Girolamo Cardano, e Scipione Ferro, il quale ritrovò la risoluzione delle equazioni cubiche pubblicata poscia dal Cardano unitamente a quella delle equazioni quadrato-quadrate inventata da Lodovico de' Ferrari. Era ciò non pertanto in allora l'Algebra nascente tuttavia, e bambina, e a parlar con rigore altro propriamente non era, che una regola d'Arithmetica, poichè non altrimenti, che coi numeri esprimevansi le quantità cognite. Ma non molto tardò ad acquistarsi quella faccia di generalità, che con indicibile utilità so- pra l'antica ora gode. Era questa gloria riservata al tanto celebre Francesco Vieta onor della Francia, di mezzo al cui seno spuntò su la fine del decimo sesto secolo. Con sostituire ai numeri le lettere dell'Alfabeto per disegnare non meno le quantità incognite, che le cognite, sollevò dal grado di schiavitù, e dipendenza l'Algebra insegnata dal Tartaglia, e dal Bombelli: nè qui si arrestò quasi limitata la sagace industria, e lo spirito inventore del gran Geometra. Immaginò egli quasi tutte le trasformazioni coi loro usi; insegnò come dalle radici, allorchè sono tutte positive, si formino le equazioni; introdusse il paragone d'una equazione indeter- minata con una data a fine di scoprirne le radici, onde poi facil cosa gli fu pas- sare alla generale risoluzione delle equazioni di terzo, e quarto grado; e finalmen- te a imitazione dell'estrazione delle radici la risoluzione ecumenica proposte delle equazioni numeriche. Ben è vero però, che non prese a considerare le radici ne- gative, e immaginarie, che il Bombelli aveva introdotte nel calcolo, lo che fece in seguito Tommaso Harriot, e di poi con maggiore estensione l'immortale Carte- sio, fra le cui mani videasi d'improvviso l'Algebra quasi nascere, e più ampio do- minio

minio acquistando prender nuovo assai più interessante aspetto. Per quanto spetta all'Algebra pura, introdusse esso l'uso degli esponenti, e però i fondamenti gettò del loro-calcolo: oltre le radici reali tanto positive, che negative, rāvvisò, e distinse le impossibili, che colle reali il numero riempiono delle dimensioni delle equazioni: la maniera scoprì di determinar il numero delle radici positive, e negative nelle equazioni aventi tutte le radici reali, e sì felicemente propose il metodo degli indeterminati, che meritò d'esserne comunemente riguardato come l'inventore. Tutto però un tale, e tanto edificio non potevasi così tosto inalzare, e a perfezione condurre, nè dato era a pochi di formare una scienza, la quale un ammirabile sforzo contrassegnando dell'umano intendimento, tanto su gli altri tutti s'inalza, e signoreggia: per lo che non è meraviglia, se a quanti sono venuti in poi è tuttavia restato un vasto campo, a cui o perfezionando i metodi già trovati, o inventandone nuovi, le sempre feconde loro idee vantaggiosamente estendere. Fra questi special menzione, e somma lode esige l'incomparabil Filosofo, e Matematico Isaac Nevvton, cui siano debitori de' metodi più sublimi nel calcolo, de' quali tratterò a suo luogo, e per ora mi contenterò d'indicare la sua formola generale per l'elevazione d'una quantità a qualsivoglia potestà, e per l'estrazione di qualunque radice; il metodo d'indagare il numero delle radici immaginarie nelle equazioni; e la maniera di fissare i limiti alle radici reali, al che pensò egli a fine di giungere alla cognizione delle radici nelle equazioni superiori al quarto grado, oltre le quali non si estendevano le ritrovate risoluzioni. Questa risoluzione delle equazioni superiori quanto importante al compimento, e alla perfezione di questo studio, altrettanto trovai fra dense tenebre avvolta, a rischiare le quali contribuì in parte il Nevvton, coll'accennato metodo, ma non già in tutto, che perciò vi hanno di poi i loro sforzi impiegati i Signori Claitaut, Mayer, Euleto, e Bezout. I loro metodi sono degni di quelli grand'uomini, ma come all'esito corrispondano lo vedremo allorchè ne dovremo fare parola. Sovverchiamente mi estenderei se volessi nominatamente encomiare chiunque o in una, o in un'altra parte ha in seguito l'Algebra arricchita. Celebri sono e i nomi, e le scoperte de' gran Geometri, che tutt'ora le fatiche, e gli studi loro consacrano in un così utile, e profittevol lavoro. Ne ho io in gran parte approfittato per questo secondo Tomo, in cui ho avuto in vista di trattarne la materia (siccome mi sono prefisso di fare rispetto alle altre parti, che devono seguire) con quella estensione, e precisione, che a tutta ragione esigono il pregio dell'opera, l'esattezza di chi vuole scrivere, e il diritto di quelli, pe' quali si scrive, onde costretti non si trovino d'andar cercando altrove ciò, che qui poteva, e doveva esser trattato. La mira pertanto di dare un compiuto trattato d'Algebra pura ha resa non mediocre la mole del libro, quantunque abbia procurato di unire alla possibile chiarezza la maggiore brevità: Ma l'abbondanza delle materie non mi ha permesso altrimenti; nè io no giudicò bene di regolarli su la condotta comunemente tenuta dagli scrittori di libri elementari, i quali per non spaventare a prima faccia colla grossezza del libro gli studiosi amano di omettere molte anche importantissime cose a solo oggetto di preferir la brevità, mentre questo non volere spaventar molti, che per altro dalla sola velleità son condotti, è piuttosto un non voler servir quelli, che vogliono veramente imparare, e per quali unicamente devesi scrivere. Mi sono fatto carico di esporre le cose con tutta chiarezza, a fine di facilitare a chiunque questo studio così indispensabile, e necessario a chi vuol mover passo, e avanzarsi nelle matematiche. Veramente anzi che la sostanza, egli è piuttosto il nome d'Algebra, e l'este-

e l'esteriore apparato delle operazioni ciò, che sgomenta i principianti, e glie ne fa parer difficile l'acquisto, del che per rimanerne convinto basta riflettere, che tutta questa scienza si appoggia, e si aggira su le prime operazioni del calcolo, che altro in realtà non sono, che operazioni Aritmetiche, nelle quali in luogo de' numeri si usano le lettere dell'Alfabeto. Per inoltrarsi con ispeditezza, e franchezza basta intendere, e rendersene familiare il linguaggio, quale agevolmente si acquista con uno studio ordinato, e riflessivo. Di tratto in tratto secondo il bisogno ho applicato a qualche problema le regole esposte a fine di mostrarne la pratica, e facilitarne la intelligenza, non approvando di ammassarne fuori di proposito in copia, come sogliono fare gli scrittori d'Algebra, ben sicuro, che chi si impossesserà delle esposte dottrine, anzi che aver bisogno di mendicare da altri le risoluzioni de' problemi saprà da se con tutta facilità ritrovarle. Per quanto riguarda l'ordine, e le materie in questo Tomo trattate, rimetto i lettori all'indice, che immediatamente segue, poichè parlando egli abbastanza non istimo a proposito, anzi giudico superfluo il farne due: soltanto mi contenterò di soggiugnere, che qui si troveranno molte cose, che negli altri Libri elementari d'Algebra nemmeno si vedono accennate.



INDICE DELLE MATERIE.

C A P O I.

Delle prime Nozioni d'Algebra tanto nelle quantità intere, come nelle fratte, e assimetre.

	Pag.	Num.
ART. I. Delle necessarie nozioni preliminari.	1	1
ART. II. Delle quantità positive, e negative.	2	16
ART. III. Del Calcolo delle quantità incomplete.	3	28
ART. IV. Del Calcolo delle potestà imperfette sì positive, che negative.	16	119
ART. V. Del Calcolo delle quantità radicali monomie.	18	130
ART. VI. Delle quantità monomie immaginarie, e loro calcolo.	23	160
ART. VII. Della Somma, e Sottrazione delle quantità complesse.	26	181
ART. VIII. Della Moltiplicazione, e Divisione delle quantità complesse.	26	193
ART. IX. Modo di trovare tutti i divisori di una data quantità algebrica, e tra due quantità il massimo comun divisore.	31	211
ART. X. Del Calcolo delle frazioni.	31	220
ART. XI. Modo d'inalzare una quantità Algebrica complessa a qualsivoglia potestà tanto determinata, come indeterminata: Della formula Newtoniana, e della maniera di servirsene.	35	237
ART. XII. Dell' Estrazione delle radici.	51	266
ART. XIII. Del Calcolo delle quantità complesse radicali, e immaginarie.	56	282

C A P O II.

Della maniera di usare il Calcolo Algebrico nella soluzione de' Problemi.

ART. I. Del modo di esprimere algebricamente i Problemi, delle equazioni di primo grado, e della loro risoluzione.	63	306
Delle Formole generali per la eliminazione delle incognite dalle equazioni di primo grado aventi più incognite.	71	345
Formole suddette Tavola IV.	91	
ART. II. Della risoluzione delle equazioni di secondo grado.	98	379
Modo di fare sparire i radicali da una data formula.	107	407
Della risoluzione delle equazioni della forma $x^m \pm px^n \pm q = 0$.	108	411
Modo di estrarre la radice quadrata dai binomj radicali quadrati.	110	414
ART. III. Dei Problemi più che determinati, indeterminati, semideterminati, e degli artifizj di Diofanto.	115	421
Osservazioni sulle equazioni finali.	134	453

C A P O III.

Teoria generale delle equazioni, e della loro risoluzione.

ART. I. Della genesi, e delle proprietà a qualsivoglia equazione comuni.	136	459
Modo di rendere omogenei i termini di una equazione	141	489
	142	

	Pag.	Num.
<i>Modo di togliere da una equazione il secondo termine.</i>	143	494
<i>Modo di togliere il terzo termine dalle equazioni.</i>	143	498
ART. II. <i>Modo di distinguere le diverse specie di radici nelle equazioni.</i>	146	499
ART. III. <i>Delle trasformazioni delle equazioni.</i>	155	519
ART. IV. <i>Delle equazioni, che contengono radici uguali, e del modo di ritrovarle.</i>	161	547
ART. V. <i>Modo di ritrovare le formole generali per la eliminazione di una, di due ec. incognite per mezzo di due, di tre ec. equazioni di qualsivoglia grado a due, a tre ec. incognite.</i>	164	558
ART. VI. <i>Della risoluzione delle equazioni di terzo grado.</i>	181	571
<i>Modo di estrarre la radice cuba da un binomio radicale cubo.</i>	194	
ART. VII. <i>Della risoluzione delle equazioni di quarto grado.</i>	197	593
ART. VIII. <i>De' metodi fin' ora trovati per la risoluzione delle equazioni superiori.</i>	204	515
<i>Metodo I. Per mezzo de' divisori semplici, e composti.</i>	205	516
<i>Metodo II. Mediante il supporre una radice dell' equazione di questa forma $x = m + n + p$ ec., in cui il numero delle Lettere m, n ec. dee essere uguale al grado dell' equazione da risolversi diminuito d' una unità.</i>	219	638
<i>Metodo III. Per tutte le equazioni, che ammettono una radice della forma</i> $\sqrt[n]{\frac{1}{2}m} + \sqrt[n]{\frac{1}{2}m^3 + \frac{1}{27}p^3} + \sqrt[n]{\frac{1}{2}m} - \sqrt[n]{\frac{1}{2}m^3 + \frac{1}{27}p^3}$	222	547
<i>Metodo IV. Mediante il ritrovare i limiti, fra i quali cadono le radici dell' equazione.</i>	230	555
<i>Modo di approssimarsi ai veri valori delle radici irrazionali delle equazioni.</i>	235	575
<i>Formola generale per questa approssimazione.</i>	236	576
<i>Metodo V. Mediante il considerare l' equazione da risolversi come il risultato di due equazioni a due incognite, delle quali una è stata eliminata.</i>	239	679
<i>Metodo VI. In cui si suppone, che la radice reale, che ha sempre un' equazione di grado impari espresso da una della forma $p\sqrt[n]{u} + q\sqrt[n]{u^3} + \dots + t\sqrt[n]{u^{n-1}}$.</i>	242	586
ART. IX. <i>Metodo generale, e facile di trovare tutte le radici di qualsivoglia equazione.</i>	248	690
ART. X. <i>Modo di trovare la massima radice positiva, e la massima radice negativa di qualsivoglia equazione.</i>	276	733
ART. XI. <i>Modo di estrarre da un complesso di radicali una qualunque radice.</i>	273	734

C A P O IV.

Delle espressioni Algebriche delle Ragioni, Proporzioni, Progressioni, Logaritmi ec., e loro formole generali.

ART. I. <i>Delle ragioni, proporzioni, e progressioni.</i>	285	746
<i>Modo di trovare tra due quantità un qualsivoglia numero di medj proporzionali geometrici.</i>	292	765
ART. II. <i>Delle espressioni Logaritmiche, e delle equazioni esponenziali.</i>	295	765
ART. III. <i>Delle formole ecumeniche riguardanti i numeri figurati.</i>	301	787
<i>Della somma di qualsivoglia potestà proveniente dai termini della serie naturale.</i>	306	792
ART.		

ART. IV. *Delle formole generali per le combinazioni, e permutazioni.*

Pag. Num.
1312 | 804

C A P O V.

Delle Serie.

ART. I. *Della natura, distinzione, e genesi delle Serie.*

Modo di spezzare una frazione in più frazioni.

314 | 807

ART. II. *delle Frazioni continue.*

329 | 334

ART. III. *Della moltiplicazione, divisione, elevazione a potestà, estrazione di radici nelle serie infinite.*

337 | 354

ART. IV. *Del regresso delle Serie.*

354 | 370

ART. V. *Modo di sommare le Serie.*

370 | 395

Modo di sommare le Serie Algebraiche.

375 | 906

Modo di sommare le Serie Geometriche.

378 | 917

Modo di sommare le Serie Algebraico-Geometriche.

399 | 948

Modo di sommare le Serie che nascono dalla successiva moltiplicazione, e divisione de' termini di Serie Algebraiche.

401 | 954

ART. VI. *Della interpolazione delle Serie.*

422 | 975

435 | 995



CAPO

C A P O I.

DELLE PRIME OPERAZIONI D'ALGEBRA TANTO NELLE
QUANTITA' INTERE, COME NELLE
FRATTE, E ASSIMETRE.

A R T I C O L O I.

Delle necessarie nozioni preliminari.

1.  EF. 1. L'Algebra non è altro, che un'arte di calcolare generalmente qualunque sorte di quantità, mediante l'esprimerla con segni universali, quali sono le lettere dell'Alfabeto, che, essendo per se stesse indeterminate a significare piuttosto una quantità, che un'altra, si possono ad arbitrio usare per denominarne quale più piace.

2. Ed ecco il perchè ho detto, che ella è un'arte di calcolare generalmente, avvegnachè in luogo di servirsi de' numeri, i quali esprimono determinatamente, adoperei le lettere dell'Alfabeto, sotto cui si può intendere qualunque cosa più si voglia. Per lo che qualora faranno proposte alcune quantità da calcolarsi, se ne denominerà ciascuna con una lettera, indi si calcoleranno queste lettere giusta le regole, che esporrò in appresso. Compita poi l'operazione, si sostituiranno in luogo delle lettere i valori, che dalle medesime erano espressi, e in questo modo si avrà ciò, che col calcolo si ricercava. Per Esempio volendo sapere lo spazio, che in 17 minuti di tempo avrà percorso un Corpo, il quale si muove con tre gradi di velocità, colla lettera *a* io disegno i dati tre gradi di velocità, e colla lettera *b* esprimo i 17. minuti; indi calcolo queste due lettere *a, b* nella maniera, che esigono le regole da trattarsi, e fattane l'operazione, rimetto il 3 in vece di *a*, e il 17 in vece di *b*, e in questo modo ritrovo quello che ricercava.

3. Il Calcolo, che si fa colle lettere, è ordinato a rappresentarle nella maniera la più semplice, che sia possibile, il risultato di una, o più operazioni aritmetiche.

4. Nell'Algebra due parti si distinguono: La prima è il metodo di calcolare; la seconda è la maniera di servirsi di questo calcolo nella soluzione de' Problemi.

5. Le quantità dello stesso genere si esprimono colla medesima lettera, e le quantità di diverso genere si esprimono con diverse lettere. Che se di due quantità dello stesso genere, o simili, una sarà doppia, tripla, quadrupla ec. dell'altra, ella si esprimerà bensì colla medesima lettera, con cui si è indicata l'altra, ma a tale lettera si dovrà prefiggere quel numero, secondo cui ella è moltiplice dell'altra: Come se di due quantità la prima sarà quintupla della seconda, e questa si chiami *a*, l'altra si dovrà esprimere per *5a*.

6. Def. 2. Codesti numeri preffissi alle lettere chiamansi i loro coefficienti. L'ufficio pertanto dei coefficienti è di additare quante volte debbasi prendere la quantità da tale lettera disegnata.

7. Corol. Alle lettere pertanto, che non hanno prefisso alcun numero, devesi sempre intendere prefissa l'unità, avvegnachè rappresentino una quantità presa una sola volta.

8. Poichè colle lettere si denotano le quantità; io in avvenire chiamerò quantità le lettere stesse.

9. Def. 3. Quantità incomplessa, o monomia, cioè a dire di un sol termine, e quella, che costa di una sola lettera; o pure di più lettere, che però frammezzate non sono da alcun segno; come a ; cb ; bde . ec.

10. Def. 4. Quantità complessa è quella, che costa di più lettere insieme unite per mezzo de' segni $+$, o $-$; come $a + b$; $a + b d - ce$ ec. Se la quantità complessa costa di due termini, come $b + cd$, dicesi binomia; Se di tre, come $a d - f + g$, dicesi trinomia ec. E generalmente si chiama polinomia. Se poi risulterà da un numero infinito, o sia indefinito di termini, ella si chiamerà infinitinomia, o indefinitinomia.

11. Def. 5. Quantità complessa simile ad un'altra è quella, in cui tutti i termini sono simili rispettivamente ai termini dell'altra. E qui si osservi, che la diversità dei coefficienti numerici non turba la simiglianza, o dissimiglianza di due termini, ma la sola diversità delle lettere, come costa dal num. 5.

12. Qui si richiami la spiegazione de' segni data nel primo Tomo al num. 51. ec. Ai segni così esposti si aggiunga il segno ∞ , che esprime l'infinito, onde $x = \infty$ vuol dire, che la x è infinita, cioè infinitamente grande.

13. Poichè (giusta il num. 3.) i Calcoli algebratici altro non sono, che operazioni aritmetiche indicate, ben si scorge che in Algebra si opera più speditamente, che in Aritmetica; e siccome le lettere, che sono i segni, con cui si calcola, sono generali, così pure generali sono le operazioni, che ne risultano, così che fatta una volta una operazione, ella può servire per infiniti casi consimili mediante la sostituzione d'infiniti diversi valori in luogo delle quantità letterali; laddove in Aritmetica ad ogni caso particolare richiedesi una nuova operazione, a motivo che i numeri sono quantità determinate, cui non si possono sostituire altri numeri senza fare una nuova operazione. In oltre, perchè le lettere non si confondono tra loro come fanno i numeri, in un sol colpo di vista si vede tutta distintamente l'operazione Algebraica.

14. Dall' Aritmetica distingueasi in questo ancora l'Algebra, che non solo è applicabile alla risoluzione, e dimostrazione di qualsivoglia sorte di Problemi, ma di più serve all'invenzione de' Teoremi, a motivo che le sue operazioni generalissime sono, ed invariabili.

15. Questa scienza, che è stato un parto sorprendente dell'umano intendimento, e a cui certamente niun'altra umana invenzione puossi paraggiare, serve a scuoprire con somma facilità, e con maravigliosa prontezza le più altruse, e incognite verità mediante un piccol numero di dati, alle quali artificiosamente conduce con una occulta ordinatissima serie di raziocinj; e con legare le idee a semplicissimi segni solleva gli sforzi della memoria, e dell'immaginazione, che altronde sarebbero stati indispensabili per conservare presenti allo spirito le diverse cognizioni necessarie allo scopo; e colla combinazione di questi segni si convertono in linguaggio sensibile lunghe serie di argomenti, che senza un tale soccorso esigerebbero una attenzione la più seria, e costante, affine di tracciarne il legame. A tutto ciò si aggiunge, lo che è più sorprendente, che sovente in questa scienza si esprimono tante verità in una sola linea, che coll'ordinaria maniera di esporre, e dimostrare richiederebbero un intero volume.

ARTICOLO II.

Delle quantità positive, e negative.

16. **D**EF. Le quantità positive, e negative non sono altro, che quantità, le quali vicendevolmente si oppongono secondo qualche rispetto, e però una secondo il medesimo rispetto, esclude l'altra.

17. Corol. 1. Siccome l'opposizione è vicendevole, però di due quantità opposte sarà arbitrio il prendere quale di loro più si voglia per positiva, o per negativa. Fissata però che ne sia una per positiva, l'altra sarà negativa, nè fu di loro si potrà più arbitrare. Il costume introdotto egli è di prendere per positiva quella, che da se si esibisce la prima alla nostra considerazione.

18. Corol. 2. Poichè le quantità negative non sono tali, se non a motivo dell'opposizione, che dicono alle quantità positive, in quanto che cioè a loro si attacca un'idea contraria all'idea delle quantità positive, quindi è che non si danno, nè si possono dare realmente, e assolutamente quantità negative isolate, e solitarie, mentre prese in questo modo astrattamente niuna idea rappresenterebbero allo spirito, essendo che la quantità negativa non ha la sua esistenza come tale, se non per la opposizione, che involge, alla quantità positiva.

19. Corol. 3. Essendo la sola quantità negativa in istato di opposizione, laddove la quantità positiva è in istato assoluto, però la quantità positiva sussiste solitaria, nè ha bisogno, che di se stessa, per essere chiaramente concepita.

20. Corol. 4. Quindi la differenza, che passa tra le quantità positive, e negative, sussistendo soltanto nel loro stato di opposizione, lo che non muta l'intrinseco costitutivo di quantità, ma soltanto dinota una diversa situazione a loro estrinseca, perciò sono vere quantità reali tanto le positive, come le negative.

21. Ma per determinare in che consista l'opposizione, che si considera fra le quantità positive, e negative, ecco un l'Esempio. Fingasi che un Corriere debba parrire da Modena per andare a Roma: Perchè il viaggio da Modena a Roma si presenta per se stesso naturalmente nella fatta supposizione alla nostra considerazione, perciò lo prendiamo per una quantità positiva, e perchè la strada di Reggio è in una direzione totalmente opposta a quella di Roma, quindi viene ella riguardata per una quantità negativa: Onde è, che se l'anzidetto Corriere avrà fatto una certa porzione di strada verso Roma, si dirà, che egli ha tanto viaggio positivo; ma se in vece d'incamminarsi verso Roma, si sarà incamminato verso Reggio, si dirà, che egli ha altrettanto viaggio negativo, quanta strada avrà fatto.

22. Comunque gli Scrittori d'Algebra si sono intesi di spiegare le quantità positive, e negative con dire, che le prime sono quantità maggiori del zero, o sia del nulla, e le seconde ne sono minori, ma una tale spiegazione è appoggiata a un'idea totalmente falsa, e inconcepibile, avvegnachè niuna cosa esista, nè possa esistere, e conseguentemente non si possa concepire minore del niente, la di cui giusta idea distrugge onninamente qualunque altra idea di cosa a lui minore. Ben è vero, che tanto le quantità positive, come le negative terminano nel zero, che è di amendue il limite comune, ma ciò non nasce dall'essere le quantità positive maggiori del zero, e le negative minori dello stesso zero, ma dall'essere tanto le une, come le altre vere quantità reali, cui conviene il finire nel zero, o da lui cominciare.

23. Le quantità positive, e negative si distinguono nel calcolo mediante i segni $+$, e $-$. Alle positive si presigge il segno $+$, come $+a$ significa, che a è una quantità positiva; alle negative si presigge il segno $-$, onde $-a$ significa, che a è

una quantità negativa. Ordinariamente però alle quantità positive, o siano sole, o siano nel principio di una quantità complessa, non si prefigge alcun segno; onde è, che qualora s' incontra qualche quantità da nessun segno affetta, si dovrà sempre intendere affetta dal segno $+$. Questi segni pertanto $+$, e $-$ denotano lo stato relativo di contrarietà delle quantità, laddove le lettere rappresentano soltanto il loro stato assoluto, in quanto che si considerano puramente come quantità.

24. Poichè le quantità positive, e negative sono in stato di contrarietà, e opposizione, perciò esse vicendevolmente si distruggono: Onde è, che una quantità positiva si può ridurre a niente coll' aggiungervi una quantità negativa eguale, come farebbe $3 - 3 = 0$; ovvero può restare positiva coll' aggiungervi una quantità negativa minore, come $9 - 5 = 4$; o pure può passare ad essere negativa, o per dir meglio se ne avrà un risultato negativo coll' aggiungervi una quantità negativa maggiore, come $2 - 7 = -5$. Acciò la cosa rendasi più evidente la spiego con un Esempio. Supponiamo che Pietro sia in possesso di 80. Ducati, ma che nel tempo stesso sia pure debitore di 80. Ducati. Poichè si considera come quantità positiva il denaro, di cui Pietro è in possesso, quindi è, che i di lui debiti si dovranno confiscare come quantità negativa; e però avendo Pietro 80. Ducati, ma altronde essendo debitore di 80. Ducati, la somma del suo denaro sarà zero, perchè col pagare il suo debito nulla gli rimane. Che se Pietro essendo in possesso di 80. Ducati ne farà debitore solamente di 30., la somma del suo denaro sarà di 50. Ducati poichè $80 - 30 = 50$, cioè, pagato che abbia il suo debito, gli restano 50. Ducati. Se poi Pietro essendo in possesso di 80. Ducati, ne farà debitore di 135. in tal caso la somma del suo denaro sarà $- 55$. Ducati, cioè a dire non solo non gli rimarrà alcun denaro, ma in oltre resterà tuttavia debitore di 55. Ducati dopo avere pagati gli 80., di cui era in possesso.

25. Qualora si parla delle quantità negative, si deve intendere di quelle veramente tali, come farebbe $-a$, o pure $a - b$, in cui b sia maggiore di a , che se b sarà minore di a , la quantità $a - b$ non sarà negativa, ma positiva giusta il num. 24.

26. Sogliono originarsi nel calcolo le quantità negative dalla poco giusta enunciazione de' Problemi, mentre si suppone in una falsa posizione qualche quantità, la quale poi nel progresso del calcolo risulta affetta dal segno $-$, con che il calcolo stesso, che sovente ci scuopre moltissime verità, che non si cercavano, e alle quali nemmeno si pensava, corregge un errore, che nell' Ipotesi fatto si era. Che per altro se il Problema fosse stato giustamente enunciato, quella quantità, che è risultata negativa, farebbe comparsa nel vero suo stato positivo. Ma questo punto sarà rischiarato più abbasso.

27. Hanno preteso alcuni, che tra le quantità positive, e negative non si possa dare ragione geometrica, e che però nè l' una, nè l' altra sussista delle due seguenti proporzioni $1 : -1 :: 1 : -1$, e $1 : -1 :: -1 : 1$, ma in ciò a mio giudizio si scostano molto dal vero; imperocchè (pel num. 454. del Tomo I.) nelle ragioni, e proporzioni si considerano i puri numeri esponenti le quantità non già le quantità stesse, e molto meno i segni $+$, e $-$, ai quali soltanto si attacca (pel num. 33.) la nozione relativa di contrarietà: Di fatto e non si divide, o moltiplica forse 1 per -1 , ovvero -1 per 1? Eppure queste operazioni fare non si possono senza che sia (pel num. 495. del Tomo I.) l' unità al quoziente, come il divisore al dividendo, o pure l' una a un fattore, come l' altro fattore al prodotto.

CAPO I ARTICOLO III

ARTICOLO III.

Del Calcolo delle quantità incomplete.

28. **P**rob. 1. Debbonfi sommare alcune quantità algebrache monomie.
 29. **R**isol. Le quantità date da sommarfi o possono essere dissimili, cioè espresse da differenti lettere, o possono essere simili, cioè espresse dalle stesse lettere; e queste o affette dallo stesso segno, o affette da segni diversi.
 Se le quantità da sommarfi sono dissimili, se ne farà la somma collo scrivere una dopo l'altra coi loro segni senz' altra operazione.

ESEMPIO I.

30. **P**rob. 2. Cercasi se dalla somma di due numeri pari risulti un numero pari, o impari.
 31. **R**isol. Poichè col moltiplicarsi per 2 un qualunque numero, ne risulta sempre un numero pari, però dovendo per Ipotesi esser pari i due numeri da sommarfi, uno si chiami $2a$, e l' altro $2c$, la di cui somma farà $2a + 2c$, la quale essendo divisibile per 2, che moltiplica l' una, e l' altra quantità, ben si vede, che la somma di due numeri pari è un numero pari: E siccome (pel num. 14.) dalle operazioni Algebrache, stante la loro universalità, se ne deducono i Teoremi, quindi dalla precedente operazione nasce il seguente
 32. **T**eorema 1. La somma di più numeri pari è un numero pari.
 33. Se $2c$ in vece di essere positivo fosse stato negativo, cioè $-2c$, la loro somma sarebbe $2a - 2c$
 34. Qualora le quantità da sommarfi saranno simili, e affette dallo stesso segno, la loro somma cadrà solamente sopra i coefficienti, cioè a dire si farà la loro somma con prefiggere a quella quantità simile la somma de' coefficienti, e poi saranno affette da segni diversi, in tal caso dal coefficiente maggiore si levì il coefficiente minore, e al residuo, che dovesi prefiggere alla quantità simile, si dà il segno, da cui era affetto il coefficiente maggiore: Che se queste due quantità avranno coefficiente eguale, dalla loro somma ne risulterà il zero. Per altro a parlare propriamente le quantità negative non si sommano colle positive, che anzi si sottraggono (pel num. 24)

ESEMPIO II.

35. **P**rob. 3. Cercasi quante miglia abbia fatto un Uomo in 3. ore, il quale nella prima ora fece 5. miglia, nella seconda ne fece 3., e nella terza ne fece uno.
 36. **R**isol. Un miglio si dica $= a$, dunque nella prima ora egli fece $5a$, nella seconda ha fatto $3a$, nella terza ha fatto a , la di cui somma $3a$ (pel num. 29.) sarebbe $5a + 3a + a$. Ma perchè questa operazione si può fare d' una maniera più semplice, essendo che la quantità a presa cinque volte più la stessa quantità a presa tre volte più la medesima quantità a è eguale a tale quantità a presa nove volte, però la cercata somma sarà $9a$ (giusta il num. 34), e il viaggio fatto dal detto uomo in 3. ore sarà di 9. miglia.

37. Se

37. Se si fosse cercato il viaggio fatto da un uomo, che dopo avere fatto 15 miglia è ritornato indietro, e ha fatto 7 miglia, con chiamare un miglio $= a$, l'espressione algebrica sarebbe stata $15a - 7a$, cioè $8a$, e però egli avrebbe fatto 8 miglia. Se fosse ritornato indietro per 15 miglia, l'espressione sarebbe stata $15a - 15a = 0$, cioè nulla di viaggio avrebbe fatto.

38. Dovendosi sommare insieme due quantità negative, si uniscono egualmente coi segni, che hanno: Così la somma di $-a$ con $-b$ è $-a - b$; e la somma di $-2b$ con $-b$ è $-3b$.

39. La quantità pertanto negativa aggiunta a una negativa la aumenta nella sua negazione; aggiunta a una positiva la scema nell'essere suo positivo. La quantità positiva aggiunta a una negativa la scema nella sua negazione, e aggiunta a una positiva la aumenta nel suo essere positivo.

40. Questa somma algebrica non è altro, che la maniera d'indicare (pel num. 3.) la corrispondente operazione aritmetica: Onde quando per avere la somma di a con b scrivo $a + b$, non faccio altro, che indicare, che se con a si disegna un numero, e con b un altro, a tenore dell'espressioci da $a + b$, bisognerà sommare insieme questi due numeri, il di cui risultato sarà differente secondo i valori numerici, che si assegneranno ad a , e b .

41. Def. La sottrazione è una operazione, mediante la quale la quantità da sottrarsi si pone in uno stato contrario a quello, che da prima aveva, onde indicarne la differenza dall'altra.

42. E qui bisogna osservare di non confondere il sottrarre col diminuire, mentre col diminuire, la quantità diminuita risulta sempre minore, laddove nel sottrarre, la quantità, da cui si è fatta la sottrazione, molte volte risulta maggiore di quello, che ella era, come or ora vedremo.

43. Prob. 4. Da una quantità incomplessa se ne debba sottrarre un'altra.

44. Risol. Alla quantità, da cui devesi fare la sottrazione, si scriva appresso la quantità da sottrarsi col segno mutato, così che se la quantità da sottrarsi aveva il segno positivo, vi si deve scrivere appresso col segno negativo; se aveva il segno negativo, vi si deve scrivere appresso col segno positivo.

45. Dim. Pel num. 41. la sottrazione è una operazione, in cui la quantità da sottrarsi si colloca in istato contrario a quello, che aveva; ma (pel num. 23.) questo stato di contrarietà viene espresso dai segni $+$, e $-$: Dunque se la quantità da sottrarsi era affetta dal segno $+$ devesi scrivere col segno $-$; e se era affetta dal segno $-$ devesi scrivere col segno $+$. Lo che dovevasi dimostrare.

46. Quando l'una, e l'altra quantità sia simile devesi avvertire di farne la riduzione, quale deve cadere soltanto sopra i coefficienti, con sommare cioè questi coefficienti, quando i loro segni sono simili, o con sottrarne uno dall'altro quando i loro segni sono dissimili (giusta il num. 34.).

E S E M P I O I.

47. Prob. 5. Cercasi se dal sottrarsi un numero pari da un numero pari resti un numero pari, o impari.

48. Risol. Poichè questi due numeri devono essere pari, si chiami $2a$ il numero, che si deve sottrarre e $2a$ il numero, da cui si deve fare la sottrazione (e qui si noti l'artificio, che si usa per esprimere questi due numeri pari con $2a$, $2c$, mentre se si fossero chiamati a , e si avrebbe bensì con queste due lettere potuto rappresentare due numeri, ma non si sarebbero espressi due numeri pari) e l'ope-

razio-

razione farà 24—20. Quindi questa differenza essendo divisibile per 2, ella è un numero pari, onde ne nasce il seguente

49. Teorema 2. La differenza di due numeri pari è un numero pari.

E S E M P I O I I.

50. Prob. 6. Cercasi di quanto Pietro, che è in possesso di 100. scudi, sia più ricco di Paolo, il quale ha di debito 38 scudi.

51. Risol. I 100 scudi di Pietro si chiamino $=a$; il debito di Paolo di 38 scudi si dica $=b$ (pel num. 24.); ma perchè vuolsi sapere di quanto Pietro sia più ricco di Paolo bisogna sottrarre quello, che ha Paolo da ciò, che ha Pietro, cioè $a-b$ da a così $a-b$; e sostituendo in queste due lettere i loro valori numerici, si trova che Pietro è più ricco di Paolo di 138 scudi. Di fatto la ricchezza di Pietro sopra Paolo è ciò, che possiede Pietro più una somma eguale al debito di Paolo.

52. Ed ecco come si verifichi ciò, che ho detto al num. 42., cioè che molte volte dalla sottrazione risulta una differenza maggiore della quantità, da cui la sottrazione si è fatta. Qui poi nasce per se stessa una osservazione da farsi, ed è, che le quantità negative sono tanto minori, quanto da numeri più alti sono espresse, per lo che sarà $-7 < -3$. Di fatto col sottrarsi una quantità da un'altra non si può avere un residuo positivo, se la quantità, da cui si fa la sottrazione, non è maggiore della quantità, che si sottrae: Ma col sottrarre da una quantità negativa una parimente negativa espressa da un numero più alto, che l'altra, ne risulta un residuo positivo; come col sottrarsi -7 da -3 si ha $+4$. Dunque le quantità negative sono tanto minori, quanto da numeri più alti sono espresse.

53. Illesissimamente dovendosi sottrarre $3b$ da $7b$ la differenza sarà $7b-3b=4b$; o pure dovendosi sottrarre $-3b$ da $7b$ la differenza sarà $7b+3b=10b$; o sia dovendosi sottrarre $7b$ da $3b$ la differenza sarà $3b-7b=-4b$. Così pure dovendosi sottrarre $3b$ da $-7b$ la differenza sarà $-7b-3b=-10b$; ovvero dovendosi sottrarre $-3b$ da $-7b$ la differenza sarà $-7b+3b=-4b$; o pure da $-3b$ volendosi sottrarre $-7b$ la differenza sarà $-3b+7b=4b$.

54. Per lo che una quantità negativa sottratta da una negativa la scema nella sua negazione; sottratta da una positiva l'augmenta nell'essere suo positivo. Una quantità positiva sottratta da una negativa l'augmenta nella sua negazione; sottratta da una positiva la scema nell'essere suo positivo.

55. Osserverò qui pure di passaggio quello che ho detto al num. 42., e ciò si applichi a tutte l'altre operazioni algebriche, che questa sottrazione algebrica non è altro, che la maniera d'indicare la corrispondente operazione aritmetica; e però quando per avere la differenza di b da a scrivo $a-b$, non faccio altro, che indicare, che se con a sarà espresso un numero, e con b un altro, a norma di quanto esprime $a-b$, bisognerà sottrarre il numero espresso da b dal numero espresso da a per averne la differenza.

56. Prob. 7. Debba moltiplicare una quantità incomplessa per un'altra pure incomplessa.

57. Risol. Quanto alla moltiplicazione delle quantità esse si scrivano immediatamente una unita all'altra: Quanto poi al segno, che si deve prefiggere al prodotto, si osservi se l'uno, e l'altro dei fattori è affetto dallo stesso segno, o pure da segni contrarij. Se l'uno, e l'altro fattore è affetto dallo stesso segno, o egli sia $+$, o egli sia $-$, al prodotto si deve prefiggere il segno $+$; se poi i due fattori sono affetti da segni contrarij, al prodotto si deve prefiggere il segno $-$.

58. Dim. Pel num. 106. del Tomo I. la moltiplicazione non è altro, che una

replicata addizione, mediante cui tante volte si pone il moltiplicando, quante unità sono nel moltiplicatore; quindi se l'uno e l'altro sarà affetto dal segno $+$, perchè in tal caso il moltiplicando doversi porre tante volte nello stato indicato dal moltiplicatore, cioè nello stato assoluto, quante sono le unità dello stesso moltiplicante, però il prodotto deve essere affetto dal segno $+$: Che se l'uno, e l'altro fattore sarà affetto dal segno $-$, poichè il moltiplicatore è affetto dal segno $-$, doversi porre il moltiplicando tante volte nello stato a lui contrario, quante unità sono nel moltiplicatore, e lo stato contrario a quello del moltiplicando, che è negativo, essendo il positivo, perciò al prodotto si dovrà dare il segno $+$. Per la stessa ragione se il moltiplicando sarà affetto dal segno $+$, e il moltiplicatore dal segno $-$, al prodotto si dovrà prefiggere il segno $-$, perchè stante il segno contrario del moltiplicatore, il moltiplicando doversi porre nello stato opposto, cioè nello stato negativo, poichè egli era positivo. Finalmente se il moltiplicando sarà affetto dal segno $-$, e il moltiplicante dal segno $+$, poichè questo moltiplicatore non importa stato contrario, ma stato assoluto, il moltiplicando doversi porre tante volte nello stato, in cui è, quante unità sono nel moltiplicatore, e siccome lo stato del moltiplicando è negativo, perciò al prodotto si dovrà prefiggere il segno $-$. Lo che si doveva dimostrare.

59. Il modo di scrivere le quantità una unita all'altra per averne il prodotto ha sempre luogo, o le quantità da moltiplicarsi siano diverse, o siano simili, e nel caso che siano simili, il prodotto di due si dice quadrato (pel num. 725. del Tom. I.), il prodotto di tre si dice cubo (pel num. 727. del Tomo I.) ec.

E S E M P I O I.

60. Prob. 8. Cercasi quanto abbia di forza viva un corpo, la di cui massa è 2, e la velocità è 3.

61. Risol. La massa 2 si dica $= a$, la velocità 3 $= b$; poichè la forza viva secondo il Leibnitz si misura dalla massa moltiplicata nel quadrato della velocità, però moltiplicandosi b per b si avrà bb , che è il quadrato della velocità, e quello quadrato moltiplicandosi per la massa a , si avrà abb , che è l'espressione della forza viva cercata. Ora se in abb si rimetteranno i corrispondenti valori, si avrà 18 per la cercata forza viva.

62. Che se si dovrà moltiplicare ab in $-d$ il prodotto sarà $-abd$; e dovendosi moltiplicare $-ac$ in $-bd$ il prodotto sarà $abcd$.

63. Quantunque non sia necessario, è però ben fatto in qualunque termine disporre le lettere secondo l'ordine alfabetico; onde in vece di scrivere $cdab$, si scriverà $abcd$.

64. Qualunque quantità letterale prefissa ad un'altra ha ragione di coefficiente, come del termine $a x$ il coefficiente è a ; per lo che nella quantità abd si può prendere tanto a per coefficiente di bd , come ab per coefficiente di d .

65. Se le quantità letterali avranno coefficienti numerici, questi coefficienti si dovranno moltiplicare fra loro; e però il prodotto di $3e$ in $7d$ sarà $21de$.

66. I prodotti nati dalla moltiplicazione di quantità letterali rappresentano dei piani, dei solidi, e delle potenze più elevate: Così il prodotto ab rappresenta un piano, di cui un lato è espresso dalla lettera a , e l'altro lato dalla lettera b : Parimente abd , rappresenta un solido, di cui la base è espressa per esempio da ab , e l'altezza da d .

67. Ecco pertanto, lo che si vedrà sempre più chiaramente in appresso, come (giusta il num. 13.) le quantità nel calcolo algebrico non si confondono tra loro, come

come fanno le quantità numeriche, mentre moltiplicandosi fra loro due fattori numerici nel prodotto non si distinguono più questi fattori, i quali si distinguono benissimo nel calcolo letterale, poichè moltiplicate fra loro due quantità a , b , tuttavia appaiono nel prodotto ab questi fattori. Ciò poi nasce a motivo, che (come più volte ho detto) le operazioni algebriche non sono, che operazioni Arismetice indicate.

68. Def. 2. Dimensione di un termine non è altro, che quel numero, il quale indica quante lettere concorrono a formare questo termine: Così abc è di tre dimensioni, perchè costa di tre lettere: l'arimente $abcdef$ è di cinque dimensioni. Quel numero poi, che mostra da quante lettere risulta un termine, chiamasi esponente delle dimensioni di quel tal termine.

69. La moltiplicazione si suole rappresentare il più delle volte mediante il segno $\times$, lo che speditissimo per più capi è comodo, come si vedrà a suo luogo.

70. Prob. 9. Debbaasi dividere una quantità incompleta per un'altra pure incompleta.

71. Risol. Se nel dividendo vi saranno le stesse lettere del divisore, dal dividendo si cancellino le lettere del divisore, e ciò che rimarrà sarà il quoziente cercato. Quanto poi al segno, che devesi prefiggere al quoziente, la regola sarà, che se tanto il dividendo, come il divisore sarà affetto dal medesimo segno, o egli sia $+$, o sia $-$, al quoziente devesi prefiggere il segno $+$; se poi il dividendo, e il divisore saranno affetti da segni contrari, al quoziente si dovrà dare il segno $-$.

72. Dim. della prima parte. La divisione è una operazione, la quale risolve ciò, che la moltiplicazione ha composto; ma (pel num. 57.) il prodotto risulta dai due fattori insieme uniti; dunque se per uno de' fattori si dividerà il prodotto, ne risulterà di quoziente l'altro fattore; e però il quoziente non è altro, che il residuo risultante dal levarsi dal dividendo le lettere del divisore. Lo che si doveva in primo luogo dimostrare.

73. Dim. della seconda parte. Pel num. 57. il prodotto di due quantità affette dai medesimi segni deve avere il segno $+$; e il prodotto di due quantità affette da diversi segni deve avere il segno $-$: Ma (pel num. 132. del Tomo I) il dividendo è il prodotto del quoziente nel divisore, per lo che in ogni divisione non altro si cerca per quoziente, che quella quantità, la quale moltiplicata nel divisore produce il dividendo; dunque se il segno del dividendo sarà positivo, il segno del quoziente sarà eguale al segno del divisore; se poi il segno del dividendo sarà negativo, il segno del quoziente sarà contrario al segno del divisore; e però se il dividendo, e il divisore saranno affetti dal medesimo segno, il segno del quoziente dovrà essere positivo, se poi saranno affetti da segni contrari, il segno del quoziente dovrà essere negativo. Lo che si doveva in secondo luogo dimostrare.

E S E M P I O.

74. Prob. 10. Cercasi la larghezza di un Fiume, di cui è data la sezione regolare ab , e l'altezza b .

75. Risol. Poichè la sezione risulta dall'altezza moltiplicata nella larghezza, se colla data altezza b si dividerà la sezione ab , il quoziente darà la cercata larghezza; e siccome tanto nel divisore, come nel dividendo ha luogo la stessa quantità b , però dall'uno, e dall'altro ella si cancelli, onde rimarrà a , che darà il quoziente, o sia la larghezza cercata: Se pertanto la proposta sezione ab soit = 210 passi

Tomo II.

B

fu-

superficiali, e l'altezza $b = 5$ passi, il quoziente trovato a sarebbe $= 42$ passi; e però tale la larghezza, che erasi proposto di trovare.

76. Quantunque sia vero, che nella divisione delle quantità monomie devonfi supprimere le quantità comuni al divisore, e al dividendo, non però devesi inferire, che col dividerli abd per abd , sopprese le lettere simili del divisore, e del dividendo, risultì per quoziente il zero, poichè in tal caso il quoziente è 1, dove tutte le lettere veramente spariscono, come prescrive la regola; ma siccome (pel num. 7.) a qualunque quantità algebrica devesi intendere prefissa l'unità per coefficiente, però le due quantità proposte faranno $1abd$, $1abd$, e dividendosi una per l'altra il quoziente sarà $\frac{1}{1} = 1$. Di fatto il dividere una quantità per un'altra non è altro,

che cercare quante volte una è contenuta nell'altra; ora una quantità è contenuta in se stessa una volta; dunque col dividerli una quantità letterale per un'altra quantità letterale uguale il quoziente sarà l'unità.

77. Se nel divisore, e nel dividendo vi faranno coefficienti, si dividano tra loro questi coefficienti, e cancellate le lettere simili nel divisore, e nel dividendo, alle rimanenti lettere si prefigga il quoziente, che nasce dalla divisione de' coefficienti: Come dividendosi $15abc$ per $5ac$ il quoziente sarà $3bd$.

78. Quando nel divisore, e nel dividendo non sianvi le medesime lettere, in tal caso si esprima la divisione a modo di frazione: Come dovendosi dividere dc per ab , si farà $\frac{dc}{ab}$.

79. Se poi il divisore, e il dividendo avranno qualche lettera simile, si cancellino le lettere comuni, e ciò che rimane si esprima a modo di frazione: Come dovendosi dividere $3adm$ per $2bd$ si farà $\frac{3adm}{2bd} = \frac{3am}{2b}$. E questa operazione, quale non è altro, che la riduzione di una frazione a minimi termini, costa dal num. 227. del Tomo I.

80. Alle volte succederà, che si possano dividere le quantità letterali, e non i coefficienti, come qualora si debba dividere $7a$ per $3a$, ed il quoziente sarà $\frac{7a}{3a} = \frac{7}{3}$; o pure dovendosi dividere $5am$ per $4m$ il quoziente sarà $\frac{5am}{4m} = \frac{5a}{4}$; o succederà che si possano dividere i coefficienti, ma non già le quantità letterali, come dovendosi dividere $8bc$ per $4a$, il quoziente sarà $\frac{8bc}{4a} = \frac{2bc}{a}$.

81. Rispetto poi ai segni dovendosi dividere $-adm$ per $-dm$ il quoziente sarà a ; e dovendosi dividere $-adm$ per dm , o adm per $-dm$ il quoziente sarà $-a$. E poichè il quoziente è sempre negativo ogniquale volta il divisore, e il dividendo hanno segni contrari, però dovendosi dividere $-am$ per n sarà lo stesso tanto a scrivere $-\frac{am}{n}$, che a scrivere $\frac{-am}{n}$, così dovendosi dividere am per $-n$ sarà lo stesso tanto a scrivere $-\frac{am}{n}$, che a scrivere $\frac{-am}{n}$.

82. Alcuni in vece di rappresentare la divisione così $\frac{a}{c}$ si sono serviti di due punti in questo modo $a:c$, o pure hanno scritto $a \div c$.

83. Prob. 11. Debba innalzare ad una qualunque potenza una data quantità incompleta.

84. Ri-

84. Rifol. Poichè per elevare una quantità a una cercata potenza bisogna moltiplicare tale quantità tante volte in se stessa una meno, quante unità contiene la cercata potenza, però essendo proposta una quantità letterale da inalzarsi a qualche potenza, ella si dovrà moltiplicare (giusta il num. 57.) tante volte in se stessa una meno, quante ne indica il grado della potenza: come volendosi inalzare alla quarta potenza la quantità a , si farà $aaaa$: così volendosi inalzare al cubo la quantità ac si farà $aaaaac$.

85. Siccome poi coll' esprimersi i gradi delle potenze mediante la moltiplicazione delle lettere, il loro numero col crescere tali gradi può crescere fino a divenire troppo incomodo, perciò si suole scrivere la radice una sola volta notandoci a destra un po' più alto il numero, o sia esponente (giusta il num. 733. del Tomo I.), il quale indica quante volte questa lettera dovrebbe scriversi, o sia indica il grado della potenza. Per lo che la terza potenza di b sarà b^3 ; la settima potenza di acm sarà $a^7c^7m^7$; la seconda potenza di $8ab$ è $64a^2b^2$.

86. E qui si osservi, che l'esponente appartiene sempre alla sola lettera su cui sta scritto: onde ab^4c non vuol dire la quarta potenza di abc , ma solamente di c : similmente cd^4m esprime il cubo di d moltiplicato in cm .

87. Qualora tutte le lettere di un qualche termine saranno elevate alla stessa potenza, come $a^4c^4e^4$, in tal caso in vece di scrivere sopra ciascuna lettera il suo

esponente, per maggior brevità si farà così ace^3 tirando una linea sopra tutte le lettere, cui si riferisce quel tale esponente, e alla di lei estremità notandovi l'esponente comune. Quanto al segno da prefiggersi alla ritrovata potenza, la di cui radice può essere positiva, o negativa, se l'esponente di tale potenza sarà pari, il di lei segno sarà sempre $+$, perchè il $+$ moltiplicato in $+$, o il $-$ moltiplicato in $-$ per volte pari dà $+$ nel prodotto (pel num. 57.); che se l'esponente sarà impari, e la radice sia positiva, il segno della potenza sarà sempre $+$, perchè per quante volte si moltiplichi il $+$ in $+$ nel prodotto si ha sempre $+$, ma se la radice sarà negativa, negativo pure dovrà essere il segno della potenza, perchè moltiplicandosi in $-$ per volte impari nel prodotto si ha sempre $-$ (per lo stesso num. 57.): onde il quadrato di $-a$ è a^2 , perchè egli nasce da $-a \times -a$; il cubo è $-a^3$, perchè egli nasce da $a^2 \times -a$ ec. Volendo esprimere mediante l'esponente una potenza qualunque di una quantità negativa, bisognerà scrivere questo esponente all'estremità di una linea, che si estenda non solo sopra tale quantità, ma ancora sopra il suo segno negativo, per indicare, che tale quantità negativa si deve inalzare a questa potenza, non già che a questa potenza si deve prefigere il segno negativo: onde per esempio la terza potenza di $-a$ si esprimerà così $-a^3$.

88. La potenza poi, come ho detto al num. 886. del Tomo I., è un nome relativo, che desume la sua denominazione dalla quantità, a cui si riferisce, e però una stessa potenza, secondo che si riferisce a diverse quantità, ottiene diversa denominazione: così a^5 diceasi potenza sesta relativamente ad a ; ma relativamente ad a^3 si dirà, ed è potenza seconda; poichè siccome la quantità a moltiplicata cinque volte in se stessa produce a^5 , così a^3 moltiplicata una volta in se stessa produce a^5 .

89. Qualunque quantità, che non abbia alcun esponente, intendasi sempre avere per esponente l'unità, e però a , b , c , farà lo stesso che a^1 , b^1 , c^1 .

90. Non solamente poi sono quantità dissimili le quantità espresse da diverse lettere (giusta il num. 5.) ma eziandio le quantità espresse dalla stessa lettera, che abbia diversi esponenti, come a , a^2 , a^3 , a^4 sono quantità dissimili, e solamente le

quantità espresse dalla stessa lettera sono simili, quando ella abbia il medesimo esponente: onde simili faranno a^4 , a^5 , o pure b^3 , b^4 ec.

91. Questi esponenti poi sono molto diversi dai coefficienti, poichè i coefficienti dimostrano quante volte una quantità si debba porre per addizione, laddove gli esponenti dimostrano quante volte debbasi ella porre per moltiplicazione: così queste espressioni $2a$, $3a$, $4a$ indicano, che la quantità a si deve prendere due volte, tre volte, quattro volte; ma queste espressioni a^2 , a^3 , a^4 significano, che la quantità a si deve moltiplicare in se stessa una volta, due volte, tre volte.

92. Siccome gli esponenti mostrano quante volte una meno debbasi moltiplicare in se stessa la quantità letterale, cui sono affissi, quindi essi indicano le dimensioni di quella tale quantità, o lettera, quale sarà sempre di tante dimensioni, quante ne mostra l'esponente della sua potenza: e però altra cosa è l'esponente delle dimensioni di una lettera, altra l'esponente delle dimensioni di un termine. L'esponente delle dimensioni di una lettera è, come ho detto, l'esponente della potenza, a cui ella è elevata; l'esponente delle dimensioni di un termine è la somma degli esponenti delle lettere componenti quel termine: come l'esponente delle dimensioni del termine ab^2c^3 è 6, perchè tale è la somma degli esponenti delle lettere a , b , c .

93. Prob. 12. Debba moltiplicare una potenza per un'altra tutte due incomplete.

94. Risol. Se le potenze date da moltiplicarsi faranno espresse con differenti lettere, si scrivano (giusta il num. 57.) una unitamente all'altra lasciando a ciascuna i propri esponenti come stanno. Così dovendosi moltiplicare a^4 per b^3 si farà a^4b^3 . Se poi le potenze da moltiplicarsi faranno espresse dalla stessa lettera, in tal caso a questa lettera si dia per esponente la somma degli esponenti delle potenze da moltiplicarsi: come dovendosi moltiplicare a^4 per a^3 si farà a^7 .

95. Dim. Quanto alla prima parte l'operazione è evidente; quanto alla seconda, che debbasi fare questa moltiplicazione mediante la somma degli esponenti, rendesi ciò chiaro, poichè nell'addotto Esempio essendo $a^4 = aaaa$, e $a^3 = aaaa$, e il prodotto di aaa in $aaaa$ essendo $aaaaaaa$ (pel num. 57.), dunque il prodotto di a^4 in a^3 deve essere a^7 . Lo che si doveva dimostrare.

Qualora agli esponenti numerici si sostituiranno gli esponenti indeterminati, vale a dire le lettere dell'alfabeto, lo che ha luogo nelle espressioni generali (le lettere poi dal costume introdotte presso gli Algebristi sono m , n , r , s , t), se si vorrà moltiplicare a^m per b^r si farà a^mb^r ; e volendosi moltiplicare la potenza di una lettera, come a^m per un'altra potenza della stessa lettera, come a^r , si farà a^{m+r} . E qui si offervi di non confondere la moltiplicazione delle potenze colla loro somma, mentre nella moltiplicazione si sommano gli esponenti, ma per sommare una potenza con un'altra come a^m con a^r si fa $a^m + a^r$, e per sommare a^m con a^m si fa $a^m + a^m = 2a^m$ (pel num. 34.)

96. Prob. 13. Debba dividere una potenza incompleta per un'altra pure incompleta.

97. Risol. Se queste due potenze sono espresse con differenti lettere, se ne faccia la divisione a modo di frazione; come dovendosi dividere b^3 per c^2 si farà $\frac{b^3}{c^2}$. Se poi sono espresse colla stessa lettera se ne farà la divisione con dare a que-

sta lettera per esponente la differenza degli esponenti di queste due potenze. Per lo che se l'esponente del divisore sarà minore dell'esponente del dividendo, l'esponente del quoziente sarà positivo; se gli esponenti del divisore, e del dividendo saranno eguali, l'esponente del quoziente sarà zero, e però il quoziente sarà l'u-

l'unità; se poi l'esponente del divisore sarà maggiore dell'esponente del dividendo, l'esponente del quoziente sarà negativo: quindi questo quoziente, sarà una frazione, che avrà per numeratore l'unità, e per denominatore la stessa potenza presa positiva: come dovendosi dividere a^3 per a^4 il quoziente sarà a^{-1} ; ovvero dovendosi dividere a^4 per a^3 il quoziente sarà $a^1 = 1$; o pure dovendosi dividere a^5 per a^7 il quoziente sarà $a^{-2} = \frac{1}{a^2}$.

98. Dim. Quanto alla prima parte l'operazione non ha bisogno di dimostrazione; quanto alla seconda la regola rendesi evidente dall'osservare, che la divisione è un'operazione contraria alla moltiplicazione; ma la moltiplicazione delle potestà si fa (pel num. 94.) mediante la somma degli esponenti; dunque la divisione devesi fare mediante la sottrazione, che sola si oppone alla somma.

Difatto per dividere a^5 per a^3 si fa $\frac{aaaaa}{aaa}$, che (pel num. 71.) è $aa = a^2$

(pel num. 85.). Parimente il dividere a^4 per a^4 non è altro, che fare $\frac{aaaa}{aaaa} = 1$ (pel num. 76.), ed $1 = 1a^0$, mentre a^0 vuol dire che la quantità a non si deve porre alcuna volta; ma nell'espressione $1a^0$ non ponendoli a alcuna volta sarà $1a^0 = 1$. Finalmente per dividere a^5 per a^7 si fa $\frac{aaaaa}{aaaaaaa}$, che è $= \frac{1}{aa}$ (pei numeri 71., e 76.); dunque perchè col sottrarsi l'esponente di a^7 dall'esponente di a^5 resta a^{-2} (pel num. 44.), sarà $a^{-2} = \frac{1}{aa}$. Lo che si doveva dimostrare.

99. Che se si avesse dovuto dividere a^3b^3 per a^2b^2 , il quoziente sarebbe stato b , cui non basti a prefiggere a^0 , o sia l'unità, che nasce dal dividerli a^3 per a^2 , perchè (pel num. 107. del Tomo I.) col moltiplicarsi qualsivoglia quantità per l'unità ritorna la stessa quantità. Isteissimamente dovendosi dividere a per $\sqrt{a}$ il quoziente è $\sqrt{a}$, perchè esprimendo la divisione di a per $\sqrt{a}$ per mezzo degli esponenti, si ha $a^1 - \frac{1}{2} = a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$. Per la stessa ragione dovendosi dividere $ab - bb$ per $\sqrt{ab} - \sqrt{bb}$ il quoziente sarà $\frac{ab - bb}{\sqrt{ab} - \sqrt{bb}} = \frac{1}{2} = \frac{ab - bb}{2} = \sqrt{ab} - \sqrt{bb}$.

100. Se in luogo degli esponenti numerici si farà uso degli esponenti indeterminati, ogniquale volta si voglia dividere una potenza di una lettera per un'altra, come a^m per a^n si farà $\frac{a^m}{a^n}$; che se la lettera sarà la stessa, come dovendosi dividere a^m per a^n si farà a^{m-n} , nella quale espressione a^{m-n} la quantità a potrà avere per esponente, il zero, o potrà avere un esponente positivo, o un esponente negativo, secondo che nell'esponente indeterminato $m-n$ sarà n eguale, o minore, o maggiore di m . E qui pure si osservi di non confondere la divisione delle potestà colla loro sottrazione, poichè nella divisione si sottraggono bensì gli esponenti, ma per sottrarre una potenza da un'altra, come a^m da a^n si fa $a^m - a^n$, e per sottrarre a^m da a^n si fa $a^m - a^n = 0$.

101. Siccome coll'accrescersi di una unità l'esponente positivo di una potenza vuol significare, che tale potenza si deve moltiplicare una volta per la sua radice, onde $a^{n+1} = a \times a^n = a^1 \times a^n = a^{n+1}$ ec.; così col diminuirsi di una unità l'espo-

L'esponente positivo di una potenza vuol si esprimere, che tale potenza si deve dividere una volta per la sua radice; e però $a^{3-1} = \frac{a^3}{a} = a^2$; $a^{4-1} = \frac{a^4}{a} = a^3$ ec. Dal che si intende, che $a^{-1-1} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$; $a^{4-1} = a^{-3} = \frac{1}{a^3}$ ec. Parimente $a^{-2+1} = a^{-1} = \frac{1}{a}$; $a^{-3+1} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$ ec.

102. Che per Esempio a^{-1} sia $= \frac{1}{a^1}$, si può abbastanza raccogliere dalla natura del segno $-$, da cui è affetto l'esponente della potenza, poichè questo segno $-$ dinotando sempre qualche opposizione, qualora sarà prefisso all'esponente di qualche quantità, egli additerà opposizione di sito rispetto a tale potenza, vale a dire, che le potenze, il di cui esponente è affetto dal segno $-$, devono occupare un sito opposto alle potenze, il di cui esponente è affetto dal segno $+$: Onde essendo $a^m = \frac{a^m}{1}$, farà $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$.

103. Def. 3. Le potenze, il di cui esponente è un numero intero affetto dal segno $+$ si dicono potenze perfette positive: Quelle il di cui esponente è un numero intero affetto dal segno $-$ si chiamano potenze perfette negative.

104. Per mezzo di queste potenze perfette negative si possono rappresentare le quantità intere a modo di frazioni, e le frazioni a modo di quantità intere. Sia per

Esempio proposta la frazione $\frac{a^3}{b^2}$, poichè $\frac{a^3}{b^2} = a^3 \times \frac{1}{b^2}$, ed $\frac{1}{b^2} = b^{-2}$, farà $\frac{a^3}{b^2} = a^3 b^{-2}$ quantità quanto all'espressione intera. Similmente la frazione $\frac{a^7}{b^3 c^4}$ farà $= a^7 b^{-3} c^{-4}$. E vicendevolmente per mezzo di queste potenze perfette negative si possono esprimere le quantità intere a modo di frazioni. Prendo l'Esempio

dalla quantità $a^3 c^2$, poichè $a^3 c^2 = \frac{a^3}{\frac{1}{c^2}}$, cioè è uguale ad a^3 diviso per $\frac{1}{c^2}$, ed essendo $\frac{1}{c^2} = c^{-2}$, farà $\frac{a^3}{\frac{1}{c^2}} = a^3 c^2 = \frac{a^3}{c^{-2}}$; così $a^3 b^3$ si potrà esprimere così $\frac{a^3}{b^{-3}}$, e reciprocamente la quantità $\frac{a^3 d^3}{c^{-2} e^{-1}}$ farà $= a^3 c^2 d^3 e$.

105. Collo stesso metodo si opererà qualora si voglia trasferire qualche cosa di una data frazione dal numeratore nel denominatore, o dal denominatore nel numeratore: Come essendo proposta la frazione $\frac{a^3 b}{c^2 e}$, e si voglia trasferire la let-

tera b dal numeratore nel denominatore, si farà $\frac{a^3}{b^{-1} c^2 e}$; che se si vorrà trasferire e dal denominatore nel numeratore si farà $\frac{a^3 b e^{-1}}{c^2}$ ec.

106. Prob. 14. Debbaſi inalzare una poteſtà propoſta incompleſſa ad un' altra di un dato eſponente.

107. Riſol. Si moltiplichì l'eſponente della poteſtà data nell'eſponente della poteſtà cercata, e il prodotto ſi dia per eſponente alla propoſta quantità: Come dovendoſi elevare a^2 alla terza poteſtà, ſi moltiplichì il ſuo eſponente 2 per 3 eſponente della poteſtà cercata, e ſi avrà $2 \times 3 = 6$, che deveſi dare per eſponente ad a , quale perciò ſarà a^6 : Coſì b^4 inalzato alla poteſtà 2 ſarà b^8 : È generalmente a^m elevato alla poteſtà n ſarà $a^{m \times n}$.

108. La dim. è la ſteſſa di quella data al num. 885. del Tomo I.

109. Prob. 15. Da una propoſta poteſtà monomia ſi debba levare una cercata radice.

110. Riſol. Si divida l'eſponente della poteſtà data per l'eſponente della cercata radice, e il quoziente ſi dia per eſponente alla propoſta quantità letterale: Come dovendoſi eſtrarre la radice quarta da a^{12} , perchè il quoziente, che naſce dal dividerſi il 12 per 4 è 3, la cercata radice ſarà a^3 .

111. Dim. L'eſtrazione delle radici è una operazione contraria all' inalzare a poteſtà; ma (pel num. 107.) l' inalzare una poteſtà ad un' altra ſi fa con moltiplicare l'eſponente di queſta nell'eſponente di quella; dunque per eſtrarre una cercata radice da una propoſta poteſtà biſognerà dividere il ſuo eſponente per l'eſponente di tale radice. Lo che ſi doveva dimoſtrare.

112. Che ſe la data quantità, da cui ſi deve levare una cercata radice, ſarà un prodotto di diverſe lettere, biſognerà eſtrarre da ciaſcuna lettera tale radice: Onde la radice ſeconda di $a^2 b^4 c^8$ ſarà $ab^2 c^4$.

113. A tenore di quanto ſi è detto al num. 57. la ſeconda poteſtà di una quantità, la quarta, la ſeſta, e generalmente tutte le poteſtà di eſponente pari devono eſſere aſſette dal ſegno + comunque la loro radice ſia aſſetta dal ſegno +, o —; laddove le poteſtà di eſponente impari faranno ſempre aſſette da quel ſegno, da cui è aſſetta la loro radice, cioè faranno poſitive ſe la radice è poſitiva, e faranno negative ſe la radice è negativa.

114. Quindi eſſendo ſempre aſſetta dal ſegno + una poteſtà d'eſponente pari, comunque la ſua radice ſia poſitiva, o negativa, ne ſeguono perciò due coſe: La prima che ſe da una quantità ſi dovrà eſtrarre una radice di eſponente pari, cioè a dire la radice ſeconda, quarta, ſeſta ec., tale radice ſi potrà prendere tanto poſitiva, come negativa, poichè tanto da una, come dall' altra riſulta la ſteſſa poteſtà aſſetta dal ſegno +: Per eſprimere poi queſta doppia radice ſi uſa il ſegno $\pm$: Onde la radice quadrata di a^2 ſi ſcriverà coſì $\pm a$: E la radice ſeconda di ab ſi ſcriverà $\pm \sqrt{ab}$: E però le poteſtà d'eſponente pari hanno doppia radice, una poſitiva, l' altra negativa: Come di a^2 la radice ſarà tanto $+ a$, come $- a$. La ſeconda che ſe una poteſtà di eſponente pari ſarà aſſetta dal ſegno — non ſi potrà ſapere da che quantità ella riſulti, cioè a dire non ſi ſaprà quale ſia la ſua radice, perchè tanto ſe foſſe poſitiva, come ſe foſſe negativa, il ſegno preſiſſo ad una ſua poteſtà d'eſponente pari ſarebbe ſempre poſitivo. Di tali poteſtà pertanto le radici ſi chiamano immaginarie, e ſi rappreſentano mediante il vincolo $\sqrt{}$: E però la radice quadrata di — a^2 ſarà immaginaria, e ſi eſprimerà coſì $\sqrt{-a^2}$.

115. Di queſto vincolo $\sqrt{}$ parimente ſi fa uſo quando da una quantità propoſta non ſi può eſtrarre una cercata radice, a motivo che ella non ſia una tale poteſtà perfetta, ſcrivendo ſul vincolo l'eſponente della radice: Come per indicare

la radice cuba di a^3 si farà $\sqrt[3]{a^3}$: E per esprimere la radice quadrata di ab , $\sqrt[2]{ab}$, o sia $\sqrt{ab}$, mentre della radice quadrata si vuole ommettere l'esponente.

116. Ma siccome (pel num. 110.) si ha una cercata radice con dividere l'esponente della quantità data per l'esponente di tale radice, egli è chiaro che siccome (pel num. 89.) ogni quantità, a riserva dell'unità (pel num. 98.), ha alme-

no l'unità per esponente, però sarà $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$; $\sqrt[3]{a^4 b^3} = a^{\frac{4}{3}} b^{\frac{3}{3}}$, nelqual modo si viene a togliere l'uso del vincolo, e i radicali si esprimono a modo di potestà.

117. Def. 4. Le quantità espresse in questo modo $b^{\frac{3}{4}} a^{\frac{5}{4}} c^{\frac{1}{4}}$ si chiamano potestà imperfette positive: Che se hanno questi esponenti affetti dal segno $-$ si dicono potestà imperfette negative, come $a^{-\frac{1}{2}}$.

118. In queste potestà pertanto il numeratore della frazione disegna sempre il grado della potestà, a cui la data quantità si suppone elevata, e il denominatore esprime il grado della radice, che da tale quantità si deve estrarre.

ARTICOLO IV.

Del calcolo delle potestà imperfette sì positive, che negative per mezzo degli esponenti.

119. **Q**uantunque questo calcolo non sia punto diverso da quanto ho detto ai num. 94, 97, 107, 110; pure, perchè ogni minima cosa basta a fare difficoltà, e imbarazzare i principianti, ho giudicato opportuno esporlo brevemente essendo egli d'un uso grandissimo nell'Analisi principalmente negli infiniti.

120. Siccome a^3 è il prodotto (pel num. 94.), che nasce dal moltiplicarsi a^2 per a^{-1} , perchè la somma degli esponenti $2, -1$ è $2-1=1$, così il prodotto, che nasce dal moltiplicarsi $a^{\frac{1}{2}}$ per $a^{\frac{1}{2}}$, è a , perchè la somma degli esponenti $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ è $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{2}{2}=1$: Così a^4 è il prodotto che nasce dal moltiplicarsi $a^{\frac{3}{2}}$ per $a^{\frac{5}{2}}$, perchè la somma di $\frac{3}{2}, \frac{5}{2}$ è $\frac{8}{2}=4$: Come pure $a^{\frac{5}{2}}$ è il prodotto, che nasce dal moltiplicarsi a^2 per $a^{\frac{1}{2}}$, perchè la somma dei due esponenti $2, \frac{1}{2}$ è $2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$.

121. Dovendosi moltiplicare a^{-3} per $a^{\frac{1}{2}}$ il prodotto sarà $a^{-\frac{3}{2}}$, perchè ridotto l'esponente -2 di a^{-3} al denominatore 2 si ha $-\frac{4}{2}$, e la somma dei due espo-

nenti $-\frac{4}{2}$, $\frac{1}{2}$ è $-\frac{4}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$. E poichè il prodotto di a^{-3} in a^{-2} è a^{-5} , essendo che la somma dei loro esponenti $-3, -2$ è $-3-2=-5$; così farà a^{-3} il prodotto di $a^{-\frac{1}{2}}$ in $a^{-\frac{3}{2}}$, perchè la somma degli esponenti $-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$ è $-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=-\frac{4}{2}=-2$.

122. Generalmente il prodotto di a^m in a^{-n} è a^{m-n} ; il prodotto di a^m in $a^{\frac{r}{n}}$ è $a^{m+\frac{r}{n}}$; il prodotto di $a^{\frac{m}{n}}$ in $a^{\frac{r}{n}}$ è $a^{\frac{m+r}{n}}$; il prodotto di $a^{\frac{m}{n}}$ in $a^{-\frac{r}{n}}$ è $a^{\frac{m-r}{n}}$; il prodotto di a^{-m} in a^{-n} è a^{-m-n} ; il prodotto di a^{-m} in $a^{\frac{r}{n}}$ è $a^{-m+\frac{r}{n}}$; il prodotto di $a^{-\frac{m}{n}}$ in $a^{-\frac{r}{n}}$ è $a^{-\frac{m+r}{n}}$; il prodotto di $a^{-\frac{m}{n}}$ in $a^{\frac{r}{n}}$ è $a^{-\frac{m-r}{n}}$.

123. Quanto alla divisione farà a^5 il quoziente, che nasce dal dividerli a^3 per a^{-3} , perchè col sottrarsi l'esponente -3 dall'esponente $+3$ si ha $3+3=6$; così il quoziente che nasce dal dividerli a^{-3} per a^{-3} è a^{-6} ; e il quoziente che risulta dal dividerli a^{-3} per a^3 è a^{-6} . Stessamente farà $a^{\frac{1}{2}}$ il quoziente che nasce dal dividerli a^2 per a^3 , perchè dall'esponente $\frac{1}{2}$ sottraendosi l'esponente 2 si ha $\frac{1}{2}-2=-\frac{3}{2}$; così il quoziente, che nasce dal dividerli $a^{\frac{2}{3}}$ per $a^{\frac{2}{3}}$ è a^3 , perchè sottraendosi dall'esponente $\frac{2}{3}$ l'esponente $\frac{2}{3}$ il residuo è 3 ; e il quoziente che nasce dal dividerli $a^{\frac{3}{2}}$ per $a^{-\frac{1}{2}}$ farà a^6 perchè col sottrarsi $-\frac{1}{2}$ da $\frac{3}{2}$ si ha $\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=\frac{4}{2}=2$.

124. Parimente il quoziente, che nasce dal dividerli a^m per a^{-n} , è a^{m+n} ; il quoziente, che nasce dal dividerli a^{-m} per a^{-n} , è a^{-m+n} , e dal dividerli a^{-m} per $a^{\frac{r}{n}}$, è $a^{-m-\frac{r}{n}}$; il quoziente, che nasce dal dividerli $a^{\frac{m}{n}}$ per $a^{\frac{r}{n}}$, è $a^{\frac{m-r}{n}}$; il quoziente, che nasce dal dividerli $a^{\frac{m}{n}}$ per $a^{-\frac{r}{n}}$, è $a^{\frac{m+r}{n}}$; il quoziente che nasce dal dividerli $a^{-\frac{m}{n}}$ per $a^{-\frac{r}{n}}$, è $a^{-\frac{m-r}{n}}$; il quoziente che nasce dal dividerli $a^{-\frac{m}{n}}$ per $a^{\frac{r}{n}}$, è $a^{-\frac{m+r}{n}}$.

125. Rispetto all'alzare a potenza, siccome della potenza perfetta positiva a il quadrato è a^2 , il cubo a^3 ec., e della potenza perfetta negativa a^{-1} il quadrato è a^{-2} .

a^{-1} il cubo a^{-3} ec., così della potenza imperfetta positiva $a^{\frac{1}{2}}$ il quadrato è $a^{\frac{2}{2}}$ $= a$, il cubo è $a^{\frac{3}{2}}$, e della potenza imperfetta negativa $a^{-\frac{1}{2}}$ il quadrato è $a^{-\frac{2}{2}}$ $= a^{-1}$, il cubo è $a^{-\frac{3}{2}}$ ec.

126. Così pure della potenza perfetta positiva a^m il quadrato è a^{2m} , il cubo a^{3m} ec., e della potenza perfetta negativa a^{-m} il quadrato è a^{-2m} , il cubo a^{-3m} ec., così della potenza imperfetta positiva $a^{\frac{m}{n}}$ il quadrato è $a^{\frac{2m}{n}}$, il cubo $a^{\frac{3m}{n}}$ ec., e della potenza imperfetta negativa $a^{-\frac{m}{n}}$ il quadrato è $a^{-\frac{2m}{n}}$, il cubo $a^{-\frac{3m}{n}}$ ec.

127. Veniamo ora all' estrazione delle radici. Poichè la radice quadrata di a^8 è a^4 , la radice cuba di a^{-6} è a^{-2} , e la radice quinta di a è $a^{\frac{1}{5}}$, la radice seconda di a^{-1} è $a^{-\frac{1}{2}}$; così la radice cuba di $a^{\frac{1}{2}}$ è $a^{\frac{1}{6}}$, la radice quadrata di $a^{-\frac{1}{4}}$ è $a^{-\frac{1}{8}}$ ec.

128. Iteffamente la radice quadrata di a^m è $a^{\frac{m}{2}}$, la radice cuba è $a^{\frac{m}{3}}$, e la radice quarta di a^{-m} è $a^{-\frac{m}{4}}$, la radice sesta è $a^{-\frac{m}{6}}$; così la radice quadrata di $a^{\frac{m}{n}}$ è $a^{\frac{m}{2n}}$, la cuba $a^{\frac{m}{3n}}$, la radice quadrata di $a^{-\frac{m}{n}}$ è $a^{-\frac{m}{2n}}$, la quinta è $a^{-\frac{m}{5n}}$ ec.

129. Devesi poi sempre avere presente, che $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$; ed $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

ARTICOLO V.

Del calcolo delle quantità radicali monomie.

130. **N**ella stessa maniera, che per disegnare il doppio, il triplo, il quadruplo ec. di una quantità razionale, come a , si fa $2a$, $3a$, $4a$ ec., si opera per esprimere il doppio, il triplo ec. di una quantità irrazionale, o sia radicale, come rispetto al radicale $\sqrt{ac}$ si farà $2\sqrt{ac}$, $3\sqrt{ac}$, $4\sqrt{ac}$ ec. Così pure per esprimere una certa parte, come una metà, un terzo, un quarto ec. si farà $\frac{\sqrt{ac}}{2}$, $\frac{\sqrt{ac}}{3}$, $\frac{\sqrt{ac}}{4}$ ec.; o pure per rappresentarne due terzi, quattro quinti si farà $\frac{2\sqrt{ac}}{3}$, $\frac{4\sqrt{ac}}{5}$

$\frac{4\sqrt{ac}}{5}$, o sia $\frac{2}{3}\sqrt{ac}$, $\frac{4}{5}\sqrt{ac}$ ec. Le quantità poi prefisse al vincolo, siano esse numeriche, o letterali; intere, o fratte si chiamano coefficienti degli stessi radicali.

131. Prob. 1. Si debbano ridurre allo stesso esponente due, o più quantità radicali monomie.

132. Rifol. Il modo di operare non è punto diverso da quello, che si è esposto al num. 921. del Tomo I.: Come per ridurre allo stesso esponente le due

quantità radicali $\sqrt[n]{abc}$, $\sqrt[n]{de}$ si farà $\sqrt[n]{a^2b^2c^2}$, $\sqrt[n]{d^2e^2}$. E generalmente per ridurre

allo stesso esponente i due radicali $\sqrt[n]{a^m}$, $\sqrt[n]{c^r}$ si farà $\sqrt[n]{a^{mr}}$, $\sqrt[n]{c^{nr}}$. Volendosi ridurre una proposta quantità radicale ad un altro esponente maggiore, o minore di quello, che ella già ha, niente altro devesi fare, che affiggere al vincolo l'esponente proposto, insi inalzare la quantità, che è sotto al vincolo alla potenza indicata dall'esponente proposto diviso per l'esponente del radicale: Per esempio volen-

dosi ridurre la quantità radicale $bc\sqrt[n]{a}$ all'esponente 2, si farà $bc\sqrt[n]{a^{\frac{2}{n}}}$, lo che è

ben evidente, poichè $bc\sqrt[n]{a} = bc \times a^{\frac{1}{n}}$; ma $bc \times a^{\frac{2}{n}} = bc \times a^{\frac{1}{n}} \times a^{\frac{1}{n}}$, e $bc \times a^{\frac{1}{n}}$

$= bc\sqrt[n]{a}$; dunque $bc\sqrt[n]{a} = bc\sqrt[n]{a^{\frac{2}{n}}}$.

133. Prob. 2. Si debba ridurre una data quantità radicale alla più semplice espressione.

134. Rifol. Allora solamente si potrà ridurre alla più semplice espressione una proposta quantità radicale, quando ella sia il prodotto di due moltiplicatori, uno de' quali sia appunto una potenza dello stesso nome dell'espressa radice, nel qual caso si opera giusta il num. 929. del Tomo I.: Onde il radicale $\sqrt[4]{48a^2bc}$ ridotto alla più semplice espressione è $4a\sqrt[3]{bc}$, perchè $\sqrt[4]{48a^2bc} = \sqrt[4]{16a^2} \times \sqrt[4]{3bc}$, e la

radice quadrata di $16a^2$ è $4a$. Generalmente farà $\sqrt[n]{a^m} \times \sqrt[n]{a^r} = \sqrt[n]{a^{m+r}}$.

135. All'opposto si opererà per ridurre a quantità puramente irrazionale una data quantità parte razionale, e parte irrazionale, o sia a ridurre sotto al vincolo una quantità prefissa al medesimo, bastando (pel num. 934. del Tomo I.) inalarla alla potenza indicata dall'esponente del vincolo, e poi moltiplicarla nella quantità esistente sotto il vincolo; nel qual modo farà $2c\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{4abc^2}$; e generalmente fa-

rà $cd\sqrt[n]{b^r} = \sqrt[n]{b^r c^m d^m}$. Quindi poichè non si altera il valore di una quantità con moltiplicarla, e dividerla nel tempo stesso per una medesima quantità, però volendosi moltiplicare per una quantità ad arbitrio il coefficiente di una quantità radicale, basterà nel tempo stesso dividere la quantità, che è sotto al vincolo per la stessa quantità elevata alla potenza indicata dall'esponente del vincolo. Così volen-

dosi moltiplicare per m il coefficiente di $a\sqrt[n]{b}$, si farà $am\sqrt[n]{\frac{b}{m}}$ essendo $a\sqrt[n]{b} =$

$am\sqrt[n]{\frac{b}{m}} = \frac{am}{m}\sqrt[n]{b}$. Inseparabilmente volendosi moltiplicare per m il coefficiente di $\frac{b}{a}\sqrt[n]{\frac{d}{c}}$

si farà $\frac{bm}{a}\sqrt[n]{\frac{d}{cm}}$. Ciò, che si è detto della moltiplicazione, vale per la legge de' con-

trarj anche per la divisione: così volendosi dividere per m il coefficiente di $a\sqrt[n]{b}$, si farà $\frac{a}{m}\sqrt[n]{bm}$: E volendosi dividere per m il coefficiente di $\frac{b}{a}\sqrt[n]{\frac{d}{c}}$, si farà

$\frac{b}{am}\sqrt[n]{\frac{dm^a}{c}}$. Dallo stesso num. 134. si ricava la maniera di ridurre a quantità intera.

una frazione, che fosse sotto al vincolo, niente altro richiedendosi, che dividere il coefficiente del vincolo pel denominatore della frazione, che è sotto lo stesso vincolo, indi moltiplicare il numeratore pel denominatore elevato alla potestà indicata dall'esponente del vincolo diminuito di una unità. Per esempio dato il radicale

$b\sqrt[n]{\frac{a}{c}}$, e volendosi, che sotto al vincolo vi sia un intero, si farà $\frac{b}{c}\sqrt[n]{ac^{n-1}}$.

Di fatto $b\sqrt[n]{\frac{a}{c}} = b\sqrt[n]{\frac{ac^{n-1}}{c^n}}$; mentre della frazione sotto al vincolo si moltiplica il numeratore, e il denominatore per la stessa quantità c^{n-1} . Quindi tirandosi fuori dal vincolo il denominatore c^n , si avrà $\frac{b}{c}\sqrt[n]{ac^{n-1}} = b\sqrt[n]{\frac{a}{c}}$.

136. Le quantità radicali saranno comunicanti, se ridotte alla più semplice espressione avranno sotto al vincolo la stessa quantità, come $3a\sqrt{c}$, $5b\sqrt{c}$ sono quantità comunicanti.

137. Prob. 3. Si debbano sommare insieme più quantità radicali monomie.

138. Rifol. Le date quantità radicali si scrivano una dopo l'altra co' propri segni, lo che pure si osservi colle quantità razionali se ve ne sono: Come dovendosi sommare $\sqrt{dc}$ con af con $-2a\sqrt{b}$ con $\sqrt{cg}$ si farà $\sqrt{dc} + af - 2a\sqrt{b} + \sqrt{cg}$.

139. Che se le quantità radicali da sommarli avranno sotto al vincolo la stessa quantità, o pure si potranno ridurre ad esser tali mediante la riduzione alla più semplice espressione, in tal caso si sommino le quantità prefisse al vincolo, e tale somma si scriva avanti il vincolo della quantità radicale comune: Come la somma di

$3a\sqrt{b}$ con $5c\sqrt{b}$ con $-d\sqrt{b}$ farà $3a + 5c - d\sqrt{b} = 3a\sqrt{b} + 5c\sqrt{b} - d\sqrt{b}$.

140. Prob. 4. Si debba sottrarre una quantità radicale monomia da un'altra.

141. Rifol. La quantità da sottrarsi si scriva col segno mutato appresso alla quantità, da cui si deve fare la sottrazione: onde per sottrarre $\sqrt{cd}$ da $7b\sqrt{c}$ si farà $7b\sqrt{c} - \sqrt{cd}$, e per sottrarre $-2c\sqrt{a}$ da $5c\sqrt{b}$ si farà $5c\sqrt{b} + 2c\sqrt{a}$.

142. Se le quantità radicali avranno sotto al vincolo la stessa quantità, si faccia la sottrazione de' soli coefficienti, come dovendosi sottrarre $2b\sqrt{a}$ da $4d\sqrt{a}$ si farà $4d - 2b\sqrt{a} = 4d\sqrt{a} - 2b\sqrt{a}$.

143. Prob. 5. Si debbano moltiplicare insieme due quantità radicali monomie.

144. Rifol. Se le proposte quantità radicali non hanno lo stesso esponente vi si riducano (giusta il num. 132.), indi si moltiplichino fra loro (giusta il num. 57.), e a questo prodotto si prefigga il vincolo. Che se vi saranno coefficienti, essi pure si dovranno moltiplicare: come dovendosi moltiplicare $2a\sqrt{c}$ per $5b\sqrt{a}$ si farà $10ab\sqrt{ac}$.

145. Quanto al segno da prefiggersi al prodotto di due quantità radicali si osservi, come ho detto al num. 7., che qualunque quantità si deve intendere moltiplicata nell'unità, per lo che $\sqrt{ab}$ sarà $= 1 \times \sqrt{ab}$, nel qual modo considerando i radicali, si regoli poscia circa i segni giusta il num. 57., onde il prodotto di $\sqrt{a}$ in $-\sqrt{b}$, cioè di $1 \times \sqrt{a}$ in $-1 \times \sqrt{b}$ è $-1 \times \sqrt{ab} = -\sqrt{ab}$; così il prodotto di $-\sqrt{b}$ in $-\sqrt{a}$, cioè di $-1 \times \sqrt{b}$ in $-1 \times \sqrt{a}$ è $+1 \times \sqrt{ab} = \sqrt{ab}$.

146. Dovendosi moltiplicare una quantità razionale con una radicale basterà prefiggere la razionale al vincolo: Così dovendosi moltiplicare cd in $\sqrt{ef}$ si farà $cd\sqrt{ef}$, e per moltiplicare $2a$ in $7b\sqrt{c}$ si farà $14ab\sqrt{c}$.

147. Quando il prodotto di due quantità radicali sia tale, che vi si possa levare la radice indicata dall'esponente del vincolo, ciò si faccia, e tale radice sarà il pro-

dotto cercato: Onde il prodotto di $\sqrt[3]{a^2b}$ in $\sqrt[3]{ab^2}$ è $\sqrt[3]{a^3b^3} = ab$.

148. Se le quantità radicali quadrate da moltiplicarsi saranno eguali basterà prenderne una di loro senza il vincolo, ed ella sarà il prodotto cercato, cui devesi prefiggere il suo segno a norma del num. 57.; Onde il prodotto di $\sqrt{a}$ in $\sqrt{a}$ è a ; e di $\sqrt{a}$ in $-\sqrt{a}$, cioè di $1 \times \sqrt{a}$ in $-1 \times \sqrt{a}$ è $-1 \times a = -a$. Siccome poi (pel num. 114.) le radici d'esponente pari hanno doppio segno, cioè positivo, e negativo così $\sqrt{a}$, però il prodotto di $\sqrt{a}$ in $\sqrt{a}$, o sia di $\pm \sqrt{a}$ in $\pm \sqrt{a}$ sarà $\pm \sqrt{a^2} = \pm a$. Si intende pertanto, che un nume-

ro n di radicali $\sqrt[n]{a}$ insieme moltiplicati dà di prodotto la quantità a : Che però data una quantità qualunque a si potrà ridurre ad un prodotto di quantità radicali,

il di cui numero sarà n , e però si avrà $a = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{a}$ ec., de' quali radicali il numero deve essere n . Per lo che se l'esponente del vincolo sarà n , e il numero delle quantità uguali da moltiplicarsi sarà $n-1$, si avrà il prodotto cercato con togliere il vincolo ad una di loro.

149. Prob. 6. Si debba dividere una quantità radicale monomia per un'altra.

150. Risol. Se le quantità date non hanno lo stesso esponente vi si riducano giusta il num. 132, poscia delle quantità esistenti sotto al vincolo se ne divida l'una per l'altra, lo che pure si faccia rispetto ai coefficienti, se vi sono: Come dovendosi dividere $cb\sqrt{ad}$ per $b\sqrt{a}$ il quoziente sarà $c\sqrt{d}$.

151. Che se o rispetto ai coefficienti, o rispetto ai radicali, o rispetto a tutti due non si potrà fare l'attuale divisione, ella si indichi al solito: Onde il quoziente

di $a\sqrt{b}$ diviso per $a\sqrt{c}$ è $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{c}}$, o sia $\sqrt{\frac{b}{c}}$; così il quoziente di $bd\sqrt{ce}$ diviso per $az\sqrt{ce}$

è $\frac{b}{z} \frac{d}{a}$; ed il quoziente di $a\sqrt{b}$ diviso per $d\sqrt{c}$ è $\frac{a}{d} \sqrt{\frac{b}{c}}$. Il vincolo $\sqrt{\quad}$

indica, che egli si estende al numeratore, e al denominatore.

152. Qualora dal quoziente si possa levare la radice indicata dall'esponente del vincolo, ciò si faccia: Per lo che il quoziente di $\sqrt{ab^2}$ diviso per $\sqrt{a}$ è $\sqrt{b^2} = b$; così

il quoziente di $ab\sqrt[3]{b^2c^2d}$ diviso per $a\sqrt[3]{b^2c^2d}$ è $b\sqrt[3]{c^2d} = bc$; parimente il quoziente di

$\sqrt{ab^2}$ diviso per $\sqrt{ad}$ è $\sqrt{\frac{b^2}{a}}$ = $\frac{b}{a}$; ed il quoziente di $\sqrt{ab^2}$ diviso per $\sqrt{ad}$ è

$\sqrt{\quad}$

$\sqrt[n]{\frac{b^2}{d}} = \frac{b}{\sqrt[n]{d}}$; o pure il quoziente di $\sqrt[n]{abcd}$ diviso per $\sqrt[n]{a^2b}$ è $\sqrt[n]{\frac{cd}{a^2}} = \frac{\sqrt[n]{cd}}{\sqrt[n]{a^2}}$.

153. Dovendosi dividere una quantità razionale per una radicale, o una radicale per una razionale, si inalzi primieramente la quantità razionale alla potenza indicata dall'esponente del vincolo, indi si faccia la divisione, come pur ora si è detto: Per Esempio dovendosi dividere $\sqrt{a^2bc}$ per a si farà $\sqrt{\frac{a^2bc}{a^2}} = \sqrt{bc}$; o pure do-

vendosi dividere b per $\sqrt[3]{a b^2}$ si farà $\sqrt[3]{\frac{b^3}{a b^2}} = \sqrt[3]{\frac{b}{a}}$. Che se la quantità razionale non farà tale, onde inalzata che sia alla potenza indicata dall'esponente del vincolo, si possa fare l'attuale divisione, ella a dirittura si indichi, come volendosi dividere $\sqrt[4]{cd}$ per c si farà $\frac{\sqrt[4]{cd}}{c}$.

154. Nella divisione delle quantità radicali si osservino le solite regole de' segni.

155. Prob. 7. Debba inalzare una data quantità radicale ad una cercata potenza.

156. Rifol. Si moltiplichi in se stessa tante volte la quantità proposta quante lo mostra l'esponente della potenza cercata diminuito di una unità, e a questo prodotto si prefigga il vincolo, che aveva tale quantità; e se il radicale dato avrà coefficiente, si inalzi esso pure alla potenza cercata: Che se dalla ritrovata potenza si potrà estrarre la radice indicata dall'esponente del vincolo, ciò si faccia: Onde la seconda potenza di $b \sqrt[3]{a c}$ farà $b^2 \sqrt[3]{a^2 c^2}$; la quarta potenza di $a \sqrt[4]{ab}$ farà $a^4 \sqrt[4]{a^4 b^4} = a^4 b^4$.

157. Prob. 8. Si debba estrarre una qualunque radice da una quantità radicale monomia.

158. Rifol. Dalla quantità esistente sotto al vincolo si levi al solito la cercata radice se si può, e in oltre si cancelli anche il vincolo ogniquale volta egli sia dello stesso esponente, e quando no si lasci: Nel qual modo la radice quadrata di $\sqrt[3]{a^2 b^2 c^2}$ farà $\sqrt[3]{a b c}$; la radice cuba di $c d^2 \sqrt[4]{b^2}$ è $d \sqrt[3]{c} \sqrt[4]{b}$.

159. Se poi dalla quantità esistente sotto al vincolo non si potrà estrarre la cercata radice, basterà moltiplicare l'esponente del segno radicale nell'esponente della radice cercata; per lo che la radice terza di $\sqrt[4]{ab}$ farà $\sqrt[6]{ab}$; o pure si usi un doppio vincolo così $\sqrt[3]{\sqrt[4]{ab}}$. E però la radice n della quantità $\sqrt[m]{c d^2}$ farà $\sqrt[\frac{mn}{n}]{c d^2} = \sqrt[\frac{m}{n}]{c d^2}$.

ARTICOLO VI.

Delle quantità monomie immaginarie e loro calcolo.

160. **H**O detto al num. 114. che cosa siano le quantità immaginarie, o sia impossibili, che così vengono denominate dall' impossibilità di determinarne la loro radice d' esponente pari, mentre intendere non si fa da quale quantità possa risultare tale potenza negativa, non essendo assegnabile alla sua radice alcun segno, da cui come tale ella possa nascere: Per lo che non sapendosi intendere da quale quantità nascano queste potestà negative d' esponente pari, estrarre perciò non si può la loro radice; e tali quantità immaginarie sono per Esempio $\sqrt{-a^2}$, $\sqrt[4]{-b^4}$, $\sqrt[6]{-c^6}$ ec.

161. Le quantità pertanto immaginarie non possono risultare dal moltiplicarsi un numero di volte impari una quantità in se stessa presa sempre nello stesso stato, ma necessariamente tale prodotto deve risultare da una stessa quantità bensì, ma presa in istati opposti: Per Esempio la quantità immaginaria $\sqrt{-a^2}$ non può risultare nè da a moltiplicato in a , nè da $-a$ moltiplicato in $-a$, ma necessariamente deve risultare da a moltiplicato in $-a$; Così $\sqrt{-a^2}$ deve risultare, o da a moltiplicato in a in $-a$, ovvero da a moltiplicato in $-a$ in $-a$ in $-a$. Siccome poi la medesima quantità non può essere nello stesso tempo in due stati opposti, e la quantità per Esempio $\sqrt{-a^2}$ risulta dalla moltiplicazione della medesima quantità presa in istati opposti, quindi è che della quantità $-a^2$ se ne possono bensì determinare i fattori, ma dalla medesima estrarre non se ne può la radice, la quale dovrebbe essere tutt' insieme positiva, e negativa nel tempo istesso, lo che non può essere.

162. E' pertanto a mio giudizio andato a colpire lungi dal vero chi ha pensato essere nulla la quantità $-a^2$, abbenchè sia chimica questa espressione $\sqrt{-a^2}$, poichè siccome non è nulla la quantità $-ab$ nata dal moltiplicarsi a in $-b$, o $-a$ in b , così non deve essere nulla la quantità $-a^2$ nata dal moltiplicarsi a in $-a$. Di fatto non essere del tutto fittizie le quantità immaginarie rendesi manifesto dall' avere esse le loro proprietà non meno, che le quantità reali, mentre quantunque paragonarle non si possa con le quantità reali, si può però compararle fra loro, e determinarne le loro ragioni.

163. Queste quantità immaginarie sono di molto uso nell'Algebra stante la loro impossibilità già esposta, mentre per mezzo loro ci si rendono manifesti i limiti di ciò, che è possibile, e si appalesa l'intero stato, in cui come tale sussiste fino a divenire impossibile.

164. Siccome le potestà positive d' esponente pari hanno doppia radice (pel num. 114.), una positiva, e l'altra negativa; così pure l'espressione radicale di una potenza negativa d' esponente pari sarà tanto positiva, come negativa, cioè a dire la radice quadrata di $-a^2$ farà tanto $+\sqrt{-a^2}$, come $-\sqrt{-a^2}$, e però le quantità immaginarie si distinguono ancor esse in positive, e negative.

165. Le quantità immaginarie egualmente che le quantità radicali reali possono
ave-

avere i loro coefficienti, i quali si ripongono sotto al vincolo con inalzarli alla potenza indicata dall'esponente del vincolo; indi moltiplicarli nella quantità esistente sotto al vincolo (giusta il num. 135.), nel qual modo farà $3\sqrt{-2} = \sqrt{-18}$, così $a b \sqrt{-a^2} = \sqrt{-a^2 b^2}$. E *vice versa* se la quantità esistente sotto il vincolo ammetterà qualche divisore, da cui levare si possa la radice indicata dall'esponente del vincolo, mediante l'estrazione di tale radice si potrà (giusta il num. 134.) collocare questo divisore fuori del vincolo, e però farà $\sqrt{-20} = 2\sqrt{-5}$, così $\sqrt{-a^2} = a\sqrt{-1}$, nel qual modo si ridurranno le quantità immaginarie alla più semplice espressione.

166. Per sommare, e sottrarre le quantità immaginarie si regoli nella maniera insegnata ai numeri 138, 139, 141, 142.

167. Mediante la somma, e la sottrazione possono svanire le quantità immaginarie, purchè però gli immaginari siano comunicanti, e rispetto alla somma siano affetti da segni contrari, rispetto poi alla sottrazione siano affetti dagli stessi segni: Come sommandosi $a + \sqrt{-b}$ con $-\sqrt{-b}$ la somma è a quantità reale: Così sottraendosi $+\sqrt{-a}$ da $c + \sqrt{-a}$ si ha di residuo c e quantità reale.

168. La moltiplicazione delle quantità immaginarie si fa nel modo detto al num. 144, se non che quanto al segno da prefiggerli al prodotto devesi osservare, che siccome (giusta il num. 7.) ogni quantità devesi intendere moltiplicata nell'unità, però la quantità immaginaria per Esempio $\sqrt{-a}$ sarà lo stesso, che $\sqrt{-1} \times \sqrt{a}$: Onde dovendosi moltiplicare $\sqrt{-a}$ in $\sqrt{-b}$, o sia $\sqrt{-1} \times \sqrt{a}$ in $\sqrt{-1} \times \sqrt{b}$, perchè il prodotto di $\sqrt{a}$ in $\sqrt{b}$ è $\sqrt{ab}$ (pel num. 144.), e il prodotto di $\sqrt{-1}$ in $\sqrt{-1}$ è -1 , essendo che $\sqrt{-1}$ è la radice di -1 , il prodotto di $\sqrt{-a}$ in $\sqrt{-b}$ sarà $-1 \times \sqrt{ab}$; ma il prodotto di $\sqrt{-a}$ in $-\sqrt{-b}$ è $\sqrt{ab}$, perchè i segni prefissi ai vincoli essendo diversi danno (pel num. 57.) il segno $-$ da prefiggerli al prodotto; in oltre il prodotto di $\sqrt{-a}$ in $\sqrt{-b}$ è $-\sqrt{ab}$, come pur ora si è detto, dunque il prodotto cercato deve essere $-1 \times \sqrt{ab} = \sqrt{ab}$.

169. Si vede pertanto, che il prodotto di due quantità immaginarie non è una quantità immaginaria, ma una quantità reale.

170. Per le leggi de' segni da prefiggerli al prodotto date al num. 57. sembra, che il prodotto di $\sqrt{-1}$ in $\sqrt{-1}$ non debba essere -1 , ma $+1$; qui però si consideri, che siccome il prodotto di una quantità moltiplicata in se stessa è il quadrato della stessa quantità; dappoichè questa espressione $\sqrt{-1}$ rappresenta una tal quantità (pel num. 114.), il di cui quadrato è -1 ; e il prodotto di $\sqrt{-1}$ in $\sqrt{-1}$ deve dare il suo quadrato (pel num. 84.), tale prodotto non ha da essere $+1$, ma -1 .

171. Quindi s'intende, che dovendosi moltiplicare una quantità immaginaria d'esponente 2. in se stessa basterà levarci il segno: Onde il prodotto di $\sqrt{-a^2}$ in $\sqrt{-a^2}$ sarà $+1 \times a^2 = a^2$, perchè, come di sopra ho detto, $\sqrt{-a^2} = 1 \times \sqrt{-a^2}$;
ma

ma il prodotto di $\sqrt{-a^2}$ in $-\sqrt{-a^2}$ farà $-1 \times -a^2 = +a^2$, perchè $\sqrt{-a^2} = 1 \times \sqrt{-a^2}$, e $-\sqrt{-a^2} = -1 \times \sqrt{-a^2}$. Essendo più quantità immaginarie da moltiplicarsi, vale ciò, che si è detto al num. 148.

172. Dovendosi moltiplicare una quantità immaginaria con una quantità reale, si osservi se la quantità reale è razionale, o irrazionale: Se è irrazionale si operi giusta il num. 144, osservando le solite regole de' segni; per lo che il prodotto di $-\sqrt{-a}$ in $\sqrt{b}$ farà $-\sqrt{-ab}$: Se poi la quantità reale farà razionale, si inalzi questa quantità razionale alla potenza indicata dall'esponente del vincolo, indi si moltiplichino nella quantità esistente sotto il vincolo; o pure tale quantità razionale si prefigga al vincolo: Come volendosi moltiplicare a per $\sqrt{-b}$ si farà $a\sqrt{-b}$, o pure $\sqrt{-a^2b}$; questi prodotti poi faranno sempre quantità immaginarie.

173. La divisione delle quantità immaginarie si fa giusta il num. 150, se non che rispetto al segno da prefiggerli al quoziente devesi usare la precauzione accennata al num. 168. Come dovendosi dividere $\sqrt{-abd}$ per $\sqrt{-ad}$ si considerino queste due quantità così $\sqrt{-1} \times \sqrt{abd}$, $\sqrt{-1} \times \sqrt{ad}$, da cui nasce il quoziente $+1 \times \sqrt{b} = \sqrt{b}$; e il quoziente che nasce dal dividerli $-\sqrt{-cd}$ per $\sqrt{-c}$ è $-1 \times +1 \times \sqrt{d} = -\sqrt{d}$. Di fatto $\frac{\sqrt{-1} \times \sqrt{abd}}{\sqrt{-1} \times \sqrt{ad}} = \sqrt{b}$, e $\frac{-\sqrt{-1} \times \sqrt{cd}}{\sqrt{-1} \times \sqrt{c}} = -\sqrt{d}$.

— $\sqrt{d}$.

174. E però il quoziente, che nasce dal dividerli una quantità immaginaria per un'altra immaginaria, non è una quantità immaginaria, ma reale.

175. Dovendosi dividere una quantità immaginaria per una quantità reale, se questa quantità reale farà irrazionale, si operi giusta il num. 150. e al quoziente si dia il segno determinato dalla regola del num. 71.: Come dovendosi dividere $-\sqrt{-ab}$ per $\sqrt{a}$, o sia $-\sqrt{-1} \times \sqrt{ab}$ per $\sqrt{a}$ il quoziente farà $-\sqrt{-1} \times \sqrt{b} = -\sqrt{-b}$: Che se la quantità reale farà razionale ella si inalzi alla potenza indicata dall'esponente del vincolo, poscia si operi come pur ora si è detto, osservando la stessa legge de' segni: E però il quoziente, che nasce dal dividerli, $\sqrt{-ac^2d}$ per c sarà $\sqrt{-ad}$.

176. Nell'uno, e nell'altro caso poi il quoziente farà sempre una quantità immaginaria affetta dal segno +, o — secondo che le quantità proposte da dividerli faranno affette dagli stessi, o da' segni contrarj. Non potendosi fare l'attuale divisione si indichi così $\frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{c}}$, e $\frac{\sqrt{-b}}{a}$.

177. Qualora si voglia inalzare una quantità immaginaria ad una qualunque potenza, ella si moltiplichino al solito tante volte in se stessa quante vengono indicate

te dall'esponente della potenza cercata diminuito di una unità, avendo però riguardo (per non fallare ne' segni) di considerare tale quantità immaginaria nella forma espressa al num. 168: Come il quadrato di $b\sqrt{-a}$, che devonsi considerare come $b\sqrt{-1} \times \sqrt{a}$ farà $b^2 \times -1 \times a = -ab^2$ (perchè devonsi inalzare a tale potenza anche i coefficienti); il suo cubo farà $b^3 \times -a\sqrt{-a} = -ab^3\sqrt{-a}$; il quadrato quadrato farà $-ab^2 \times -1 \times a = a^2b^2$ ec.

178. Dal che chiaramente si vede, che delle quantità immaginarie le potestà d'esponente impari sono quantità similmente immaginarie, ma le potestà d'esponente pari sono quantità reali, le quali sono affette (non considerando la combinazione col segno prefisso al vincolo) dal segno $-$, se la metà dell'esponente è un numero impari, e pel contrario sono affette dal segno $+$ se tale metà è un numero pari.

179. Per estrarre una cercata radice da una quantità immaginaria incompleta si riducano primieramente sotto al vincolo (pel num. 165.) i coefficienti se vi sono, indi si operi giusta il num. 158, nel qual modo la radice quadrata di $b\sqrt{-a^2} = \sqrt{-a^2b^2}$ farà $\sqrt{-ab}$; se attualmente non si può fare questa estrazione, si regoli giusta il num. 159: Onde la radice cuba di $cd\sqrt{-a} = \sqrt{-ac^2d^2}$ farà $\sqrt[6]{-ac^2d^2}$. Quando nell'estrarre da una proposta quantità immaginaria una cercata radice mediante la divisione degli esponenti ne risulterà una tal radicale, che abbia per esponente un numero impari, in questo caso la ritrovata radice non farà una quantità immaginaria, ma una quantità reale: Come la radice quadrata di $\sqrt[6]{-b}$ farà $\sqrt[2]{-1} \times \sqrt[3]{b} = -\sqrt[3]{b}$; e la radice quarta di $\sqrt[20]{-b}$ farà $-\sqrt[5]{b}$.

180. Se si vorranno esprimere le quantità immaginarie a modo di potestà imperfette bisognerà scrivere l'esponente fratto all'estremità di una linea, la quale si estenda non solo a tale quantità, ma ancora al suo segno negativo: Onde per es-

primere la quantità $\sqrt{-a^2}$ a modo di potestà imperfetta si farà $-\overline{a^2}^{\frac{1}{2}}$, poichè se si fosse fatto $-\overline{a^2}^{\frac{1}{2}} = -a^{\frac{1}{2}}$ avrebbe potuto nascere dubbio se questa espressione indicasse $-a$, o la radice quadrata di $-a^2$.

ARTICOLO VII.

Della somma, e sottrazione delle quantità complesse.

181. **P** Rob. 1. Si debba sommare una data quantità complessa con un'altra.

182. Risol. Si scrivano una dopo l'altra queste quantità coi proprj loro segni, come si è fatto al num. 29. nelle quantità incomplete.

ESEM-

E S E M P I O.

183. Prob. 2. Cercasi se la somma, che risulta da due numeri impari; o da uno pari, e l'altro impari, sia numero pari, o impari.

184. Risol. Quanto al primo caso uno de' due numeri impari si dica $2a+1$, e l'altro si chiami $2b+1$. Quanto al secondo caso il numero pari si denomini $2a$, e l'impari si dica $2b+1$. E qui si noti l'espressione generale del numero impari, mentre con moltiplicarsi un qualunque numero per 2 ne risulta un numero pari, e se a questo numero pari generalmente espresso con $2a$ si aggiunga una unità, si avrà $2a+1$ necessariamente numero impari, e generalmente espresso. Si faccia pertanto la somma così.

	Primo caso		Secondo caso
	$2a+1$		$2a$
	$2b+1$		$2b+1$
Somma	$2a+2b+2$	Somma	$2a+2b+1$

Nel primo caso pertanto la somma essendo tutta moltiplicata per 2, è un numero pari, e nel secondo caso è un numero impari, perchè il prodotto per 2 è accresciuto di una unità: Onde ne nasce il seguente

185. Teorema 1. La somma di due numeri impari è un numero pari, e la somma di un numero pari con un impari è un numero impari.

186. Qualora alcuni termini delle sommate quantità complessive saranno simili, se ne faccia la riduzione giusta il num. 34. E per facilitare quella riduzione si scrivano i termini simili delle quantità da sommarli uno sotto l'altro, poscia si faccia la somma al solito: Come dovendosi sommare le quattro quantità A, B, C, D, si farà

$$\begin{array}{r}
 A. -3a^2b^3 + 4cd^4 + ef \\
 B. -2a^2b^3 + 3bc + 2gh \\
 C. \quad \quad + cd^4 - 7bc + 4gh \\
 D. \quad 8a^2b^3 - 5cd^4 + bc - adc \\
 \hline
 \text{Somma} \quad \quad 3a^2b^3 \quad -3bc + ef + 6gh - adc.
 \end{array}$$

187. Prob. 3. Da una data quantità complessiva se ne debba sottrarre un'altra.

188. Risol. Si scrivano una dopo l'altra queste quantità mutando i segni a tutti i termini della quantità da sottrarsi, come si è fatto al num. 44. nelle quantità incomplete.

E S E M P I O.

189. Prob. 4. Cercasi se la differenza, che passa tra due numeri impari, o uno pari, e l'altro impari, sia numero pari, o impari.

190. Risol. Quanto al primo caso uno de' numeri impari si dica $2a+1$, e l'altro si dica $2b+1$. Quanto al secondo caso il numero pari si chiami $2a$, e l'impari si denomini $2b+1$; poscia si faccia la sottrazione così.

D 2

Pri-

Primo caso	Secondo caso
$2a + 1$	$2a$
$2b + 1$	$2b + 1$
Residuo $2a - 2b$	Residuo $2a - 2b - 1$

Poichè adunque il residuo nel primo caso è moltiplicato per 2 egli è un numero pari, e nel secondo caso è un numero impari, perchè questo residuo risulta da un numero pari diminuito di una unità: Onde ne nasce il seguente

191. Teorema 2. La differenza di due numeri pari è un numero pari, e la differenza tra un numero pari, e un numero impari è un numero impari.

192. Se fatta l'operazione vi saranno dei termini simili, se ne dovrà fare la riduzione giusta il num. 45. E per facilitare questa riduzione si scrivano una sotto l'altra le quantità simili; come dovendosi sottrarre $7ab^2 - acd^2 - 5cd + 2de^3$ da $9ab^2 + 3cd - 4bd^3$, si farà

Quantità da cui si deve fare la sottrazione	$9ab^2$	$+ 3cd - 4bd^3$
Quantità da sottrarsi	$7ab^2 - acd^2 - 5cd$	$+ 2de^3$
Residuo	$2ab^2 + acd^2 + 8cd - 4bd^3 - 2de^3$	

A R T I C O L O V I I I.

Della moltiplicazione, e divisione delle quantità complesse.

193. **P** Rob. 1. Debba si moltiplicare una quantità complessa per un'altra.

194. Rifol. Si scriva il moltiplicatore sotto al moltiplicando, indi con ciascun termine del moltiplicatore si moltiplichino tutti i termini del moltiplicando, e ciascun prodotto parziale si scriva sotto la linea orizzontale, avvertendo di notare uno sotto l'altro quelli, che sono simili, per poterne fare la riduzione, ad ognuno de' quali deve si dare il conveniente segno giusta il num. 57, ed il loro aggregato darà il prodotto cercato.

E S E M P I O I.

195. Prob. 2. Essendo data una quantità a divisa in quante parti si vogliono b, c, d, e, f , cercasi il valore, che nasce dal moltiplicarsi tale quantità in ciascuna delle sue parti; o pure dal moltiplicarsi un'altra qualunque quantità m in ciascuna di queste parti.

196. Rifol. Si faccia la moltiplicazione nel modo detto, e come qui sotto si vede

Primo caso	Secondo caso
Quantità data $b + c + d + e + f = a$	Quan. data $b + c + d + e + f = a$
Moltiplicatore a	Moltiplicat. m
Prodotto $ab + ac + ad + ae + af = a^2$	Prodotto $bm + cm + dm + em + fm = am;$

dalla quale operazione nasce il seguente

197. Teorema 1. Se faranno date due quantità, una delle quali sia divisa in più parti, in ciascuna delle quali si moltiplichino l'altra quantità, la somma di tutti questi rettangoli sarà eguale al rettangolo delle due quantità date: Che se farà una sola quantità, la quale divisa in più parti si moltiplichino in ciascuna di queste parti, farà la somma di questi rettangoli eguale al quadrato della quantità data. Queste sono la prima, e la seconda prop. del lib. 2. d'Euclide.

E S E M P I O I L

198. Prob. 3. Cercasi che cosa nasca dal moltiplicare la somma di due quantità nella loro differenza.

199. Risol. Una delle quantità date si dica $= a$, l'altra $= b$; la loro somma sarà $a + b$, e la differenza $a - b$. Ora se ne faccia la moltiplicazione così

Moltiplicando	$a + b$
Moltiplicatore	$a - b$

Prodotto $a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$, perchè $+ab$ — ab si elidono a motivo dei segni opposti. Ora da questa operazione ne nasce il seguente

200. Teorema 2. Il prodotto che nasce dal moltiplicarsi la somma di due quantità nella loro differenza è eguale alla differenza de' quadrati di tali quantità.

201. Acciò si possa vedere più distesamente questa operazione proporrò un altro Esempio, ove si offervi come devonfi notare uno sotto all'altro i prodotti parziali simili, onde facilitarne la riduzione nel prodotto totale. Si debba moltiplicare la quantità $a^3 d - a^2 b^2 d^2 + a^2 b^2 d^4$ per la quantità $b d^4 - b^2 d^2 - b^3 d^4$. Ecco il Calcolo.

Moltiplicando	$a^3 d - a^2 b^2 d^2 + a^2 b^2 d^4$
Moltiplicatore	$b d^4 - b^2 d^2 - b^3 d^4$

$$\begin{array}{r} a^3 b d^5 - a^3 b^3 d^4 + a^2 b^4 d^5 + a^2 b^2 d^5 - a^2 b^5 d^7 - a^2 b^6 d^8 \\ - a^3 b^3 d^6 + a^2 b^4 d^6 - a^2 b^5 d^5 \end{array}$$

Prodotto totale $a^3 b d^5 - 2 a^2 b^3 d^4 + 2 a^2 b^4 d^5 - a^2 b^5 d^7 - a^2 b^6 d^8.$

202. Il più delle volte torna comodo l'indicare soltanto l'operazione mediante il segno χ , tirando poscia una linea sopra tutte le quantità, a cui si estende l'azione del segno χ ; come dovendosi moltiplicare la quantità $2cm^2 - ab + 7ac$ per

la quantità $3ad + 8cem$ si farà $2cm^2 - ab + 7ac \chi 3ad + 8cem$. Ho detto che torna comodo l'indicare soltanto la moltiplicazione, e perchè si risparmia l'attuale operazione, e perchè restando inconfusi i fattori, se nel progresso del calcolo occorrerà di fare la divisione per uno di loro se ne troverà risparmiata l'operazione.

203. Prob. 4. Si debba dividere una quantità complessa per un'altra.

204. Risol. O il divisore è una quantità incompleta, o è completa. Se è incompleta con tale divisore si dividano tutti i termini del dividendo regolandosi giusta il num. 71.

ESEM-

E S E M P I O.

205. Prob. 5. Cercasi se sia pari, o impari il numero, che nasce dal dividerli un numero impari per un numero pari.

206. Risol. Il dividendo, sia $4a^3 + 16ab + 32ad + 1$, e il divisore sia $2a$. Si cominci a dividere il primo termine $4a^3$ del dividendo pel divisore $2a$, e il quoziente $2a$ si noti a parte; poscia si moltiplichì il quoziente nel divisore, e il prodotto si sottragga dal dividendo; indi si passi a dividere il susseguente termine del dividendo, e così in seguito, come si pratica nella divisione numerica. Ecco il Calcolo.

Divisore	Dividendo
$2a$	$4a^3 + 16ab + 32ad + 1$
	$4a^3$
	$0 + 16ab$
	$16ab$
	$0 + 32ad$
	$32ad$
	$0 + 1$
	1
Quoz. $2a + 8b + 16d +$	$\frac{1}{2a}$

Ora perchè per ultimo residuo si ha una unità, da cui nasce la frazione $\frac{1}{2a}$, perciò ne nasce il seguente

207. Teorema 3. Il quoziente che nasce dal dividerli un numero impari per un numero pari è sempre un numero impari.

208. Se anche il divisore sarà una quantità complessa, si ordini primieramente il divisore, e il dividendo secondo una stessa lettera, quale più piace, lo che si fa con prendere per primo termine del dividendo (lo stesso si dica del divisore) quello, in cui la lettera fissata ha il massimo esponente; per secondo termine quello, in cui tale lettera ha l'esponente prossimo minore, e così in seguito: Che se vi fossero più termini, ne quali questa lettera medesima fosse elevata alla stessa potenza, in tal caso devesi in oltre avere riguardo di ordinarli ancora secondo un'altra lettera comune al dividendo, e al divisore. Intanto poi si ordinano in questo modo i termini del divisore, e del dividendo per facilitare, anzi eseguire la divisione, che alle volte senza questa preparazione potrebbe sembrare non fattibile: Anzi se ordinato il dividendo, e il divisore secondo una lettera comune non riuscirà la divisione, bisognerà tentarla un'altra volta dopo averli ordinati secondo un'altra lettera. Disposto il dividendo, e il divisore in questo modo, si cominci l'operazione con dividere il primo termine del dividendo pel primo termine del divisore, il di cui quoziente devesi notare a parte, poscia si moltiplichì questo quoziente in ciascun termine del divisore; e il prodotto si sottragga dal dividendo, lo che fatto si divida di nuovo il primo termine del residuo pel primo termine del divisore, e il quozien-

ziente si noti col suo conveniente segno appresso all'altro quoziente trovato, indi si moltiplichino quest'ultimo quoziente in tutto il divisore, e il prodotto sottragga al solito, e collo stesso metodo si continui fino in ultimo l'operazione. Si debba per Esempio dividere la quantità $2abde + 6a^2de + 14adce - abcd - 3a^2cd - 7ac^2d + a^2be + 3a^3e + 7a^2ce$ per la quantità $-cd + 2de + ae$. Si ordini in primo luogo il dividendo, e il divisore per la lettera a , come qui sotto si vede, poscia si operi nel modo detto. Ecco il Calcolo

Divisore				
$ae + 2de - cd$	3a ³ e + 6a ² de - 3a ² cd + a ² be + 7a ² ce + 2abde - abcd + 14acde - 7ac ² d			
Quant. da sottr.	3a ³ e + 6a ² de - 3a ² cd			
Primo residuo	o o o	+ a ² be + 7a ² ce + 2abde - abcd + 14acde - 7ac ² d		
Quantità da sottrarsi		a ² be + 2abde - abcd		
Secondo residuo	o + 7a ² ce o	o + 14acde - 7ac ² d		
Quantità da sottrarsi		7a ² ce + 14acde - 7ac ² d		
Ultimo residuo	o o o			

Quoz. $3a^2 + ab + 7ac$

L'aggregato pertanto di tutti questi quozienti parziali dà il cercato quoziente totale.

209. Può alle volte succedere, che nella quantità da dividersi non si trovi tutta quella quantità, che nasce dalla moltiplicazione del quoziente nel divisore, ciò non ostante devesi seguitare l'operazione, mentre potrà ellere, che la divisione succeda: Come dovendosi dividere $a^2 - b^2$ per $a + b$, diviso il primo termine a^2 del dividendo pel primo termine a del divisore, e moltiplicato il divisore $a + b$ pel quoziente a , ne nasce la quantità $a^2 + ab$, la quale non si trova tutta nel dividendo; fatta pertanto la sottrazione rimane $-ab - b^2$, il di cui primo termine $-ab$ diviso pel primo termine a del divisore lascia di quoziente $-b$, che moltiplicato nel divisore $a + b$, e il prodotto $-ab - b^2$ sottratto al solito, poichè nulla rimane, la divisione si fa esattamente, venendone di quoziente $a - b$. Ecco il Calcolo.

Divisore	a + b	Dividendo
Quantità da sottrarsi.		a ² - b ²
Residuo		-ab - b ²
Quantità da sottrarsi.		-ab - b ²
Residuo		o o

Quoz. $a - b$.

210. Se vi farà un residuo, che non si possa dividere, in tal caso a questo residuo si sottoscriverà il divisore, come si è fatto al num. 206.; o pure si rappresenterà a dirittura la divisione a modo di frazione: Come dovendosi dividere $a^2bd - acd^2 + de - ac$ per $ab - cd$, la quale divisione non si può fare esattamente, el-

ella s'indicherà così $\frac{a^2bd - acd^2 + de - ac}{ab - cd}$; e questo modo torna sovente comodo per più capi.

ARTICOLO IX.

Modo di ritrovare tutti i divisori di una data quantità algebrica, e tra due quantità il massimo comun divisore.

211. **Q**Uì io suppongo le nozioni, e la dimostrazione, che a questo Problema ho data all' Articolo X. del Capo I. del I. Tomo.

212. Prob. 1. Si debbano ritrovare tutti i divisori incompletti di una data quantità algebrica.

213. Rifol. La quantità data sia $15a^2b$, in cui si operi a norma del citato Articolo X., come qui sotto si vede.

$15a^2b.$	3.																		
$5a^2b.$	5.	15.																	
$a^2b.$	a.	3a.	5a.	15a.															
$ab.$	a.	a^2.	3a^2.	5a^2.	15a^2														
$b.$	b.	3b.	5b.	15b.	ab.	3ab.	5ab.	15ab.	a^2b.	3a^2b.	5a^2b.	15a^2b.							

214. In secondo luogo si debbano ritrovare tutti i divisori della quantità $acm - acd + bcm - bcd$, per lo che fare si operi come segue.

$acm - acd + bcm - bcd . c$
 $am - ad + bm - bd . a + b. ac + bc$
 $m - d . m - d. cm - cd. am - ad + bm - bd. acm - acd + bcm - bcd.$

215. Qui pure suppongo le nozioni circa il massimo comun divisore date all' Articolo XI. del Capo I. del Tomo I., e la dimostrazione ivi esibitane.

216. Prob. 2. Si debba ritrovare il massimo comun divisore tra due quantità algebriche.

217. Rifol. Devesi primieramente ordinare (giusta il num. 208.) ciascuna delle quantità date secondo una lettera ad amendue comune, poscia dividerne una per l'altra a norma dello stesso num. 208., e se il residuo farà maggiore del divisore, dovrasì egli collo stesso divisore dividere, e così in seguito, finchè si arrivi a una divisione senza residuo, nel qual caso l'ultima quantità, che ha servito di divisore, farà il massimo comun divisore. Che se capiterà un residuo minore del divisore, in allora si inverta l'ordine, e col residuo si divida il divisore. Prima però di accingersi alla divisione si osservi, se mai ciascun termine d'amendue le quantità fosse multipli-

plicato per una medesima quantità, o numero; o pure se una sola di loro, o i nati residui ammettono un divisore, e tanto in un caso, come nell'altro si tolga questo divisore mediante la divisione. Ma veniamo agli Esempi, e primieramente si debba ritrovare il massimo comun divisore di queste due quantità $18a^3bd - 8a^2b - 3abd^3 - 8a^2bd^2 + bd^4$, e $6a^3b + bd^3 - abd^2 - 8a^2bd$, ciascun termine delle quali essendo divisibile per b , se ne faccia prima la divisione, poscia si ordinino per la lettera d , come si vede fatto in A, e B, e si divida B per A, dalla quale divisione nasce di residuo $-2ad^3 + 12a^2d - 8a^4$, il quale avendo $-2a$ per fattore comune, perciò egli si tolga, onde tale residuo rimarrà $d^3 - 6a^2d + 4a^3$, che scrivo in D. Colla quantità A si divida la quantità D, e ne viene di residuo $ad^3 + 2a^2d - 2a^3$, che essendo divisibile per a se ne faccia la divisione, con che rimarrà $d^3 + 2ad - 2a^2$, che scrivo in E. Ma perchè il primo termine d^3 di questo residuo è minore del primo termine d^3 del divisore, si inverta l'ordine, e si faccia servire questo residuo di divisore, e il primo divisore di dividendo, e perchè fatta la divisione si ha di residuo $-3ad^3 - 6a^2d + 6a^3$, che spogliato del suo divisore $-3a$ resta $d^3 + 2ad - 2a^2$, il quale è lo stesso, che ha servito di divisore, però il massimo comun divisore sarà $d^3 + 2ad - 2a^2$, che scrivo in F, quale però devesi moltiplicare per b , con cui si dividerò le due date quantità; onde il loro massimo comun divisore è $bd^3 + 2abd - 2a^2b$. Ecco il Calcolo.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l}
 \text{A} \\
 d^3 - ad^3 - 8a^2d + 6a^3
 \end{array}
 \quad | \quad
 \begin{array}{l}
 \text{B} \\
 d^3 - 3ad^3 - 8a^2d^3 + 18a^2d - 8a^4
 \end{array} \\
 \hline
 \text{Quantità da sottrarsi} \quad d^3 - ad^3 - 8a^2d^3 + 6a^3d \\
 \hline
 \text{Primo residuo} \quad -2ad^3 \quad + 12a^2d - 8a^4 \\
 \hline
 \begin{array}{l}
 \text{D} \\
 \text{residuo spogliato del fattore } -2a \\
 d^3 - 6a^2d + 4a^3
 \end{array}
 \quad | \quad
 \begin{array}{l}
 \text{A} \\
 d^3 - ad^3 - 8a^2d + 6a^3
 \end{array} \\
 \hline
 \text{Quantità da sottrarsi} \quad d^3 - 8a^2d + 6a^3 - ad^3 \\
 \hline
 \text{Secondo residuo} \quad 2a^2d - 2a^3 + ad^3 \\
 \hline
 \begin{array}{l}
 \text{E} \\
 \text{residuo spogliato del divisore } a \\
 d^3 + 2ad - 2a^2
 \end{array}
 \quad | \quad
 \begin{array}{l}
 \text{A} \\
 d^3 - ad^3 - 8a^2d + 6a^3
 \end{array} \\
 \hline
 \text{Quantità da sottrarsi} \quad d^3 + 2ad^3 - 2a^2d \\
 \hline
 \text{Terzo residuo} \quad -3ad^3 - 6a^2d + 6a^3
 \end{array}$$

e perchè con ispogliare questo residuo del suo fattore $-3a$ rimane $d^3 + 2ad - 2a^2$, che è lo stesso divisore; però se si moltiplicherà in b fattore comune delle due date quantità, si avrà $bd^3 + 2abd - 2a^2b$, che è il loro cercato massimo comun divisore.

218. Può alle volte accadere, che le due date quantità abbiano un comun divisore, ma che essendo esse ordinate secondo una tal lettera non si possa trovare, nel

E

nel

nel qual caso fa di mestieri ordinarle secondo altra lettera, finchè ci venga fatto di rinvenirlo. Se poi dopo averle ordinate secondo ciascuna lettera non riesce l'intento, non avranno esse un comun divisore. Altre volte ancora succederà, che dopo avere avanzata l'operazione bisognerà ordinare il residuo, e il divisore secondo altra lettera a fine di potere continuare la divisione. Ecco l'Esempio, in cui haffi a ritrovare il massimo comun divisore delle due quantità A, B. Divisa B per A si ha di residuo C, che diviso per A lascia di residuo D, che non si può dividere per A. Si ordinino pertanto il residuo D, e il divisore A per a (le due date quantità erano ordinate per c), e perchè spogliata ciascuna quantità del suo rispettivo fattore, che riguardo alla prima è $c + g$, riguardo alla seconda $g^2 + c^2$, la divisione si fa senza residuo per $a - d$, però $a - d$ è il massimo comun divisore. Ecco il calcolo.

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{l} A \\ ac - cd + ag - dg \end{array} & | & \begin{array}{l} B \\ ac^2 - c^2d + ac^2 - dc^2 \end{array} \\
 \text{Quantità da sottrarsi} & & \begin{array}{l} ac^2 - c^2d + acg - cdg \\ \hline - acg + cdg + ac^2 - dc^2 \\ - acg + cdg - ag^2 + dg^2 \\ \hline + ag^2 - dg^2 + ac^2 - dc^2 \end{array} \\
 \text{Primo residuo C.} & & \\
 \text{Quantità da sottrarsi} & & \\
 \text{Secondo residuo D.} & &
 \end{array}$$

Ora questo residuo non potendosi dividere pel divisore A, si ordini l'uno, e l'altro per la lettera a , come qui sotto si vede in A, D, poscia si continui al solito la divisione.

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{l} A \\ a \sqrt{c+g} - d \sqrt{c+g} \end{array} & | & \begin{array}{l} D \\ a \sqrt{g^2+c^2} - d \sqrt{g^2+c^2} \end{array} \\
 \text{cioè } a - d, \text{ che divide } a - d \text{ esattamente.} & &
 \end{array}$$

219. Talora affinchè una quantità possa essere divisa per l'altra, o pure il residuo pel divisore, o *vice versa*, bisognerà talmente preparare i loro termini, onde si possa accuratamente fare la divisione senza frazione, lo che si farà osservando quali siano i fattori del primo termine del divisore, che non si trovano nel primo termine del dividendo. Se pel fattore, che non è ad ambidue comune, si potrà dividere tutto il divisore, si divida; se no, si moltiplichi tutto il dividendo con esso, nel qual modo si otterrà sempre la divisione senza frazioni, senza che si venghi a turbare l'invenzione del comun divisore. Si debba per Esempio trovare il massimo comun divisore di queste due quantità, o formole (qualunque quantità algebrica con termine generale si chiama formola) $2a^3 + 8a^2 + 2a - 12$, e $5a^3 + 9a - 18$. Non potendosi accuratamente dividere il primo termine $2a^3$ della prima pel primo termine $5a^3$ della seconda, nè per 5 potendosi dividere tutta la seconda formola, si moltiplichi per 5 tutta la prima, e si avrà $10a^3 + 40a^2 + 10a - 60$, che si divida per la seconda formola, e ne verrà di residuo $22a^2 + 46a - 60$, il di cui primo termine $22a^2$ non potendo essere diviso pel primo termine $5a^2$ del divisore, si moltiplichi perciò col 5 tutto questo residuo, e ne verrà $110a^2 + 230a - 300$, che diviso pel divisore $5a^2 + 9a - 18$ risulta di residuo $32a + 96$. Con questo residuo si dovrebbe ora dividere il divisore $5a^2 + 9a - 18$, ma perchè il di lui primo termine $5a^2$ non è divisibile per $32a$, e altronde tutto il residuo $32a + 96$ può essere divi-

io

fo per 32, perciò egli si divida, e col quoziente $a + 3$ si divida la formola $5a^2 + 9a - 18$, e perchè la divisione succede esattamente, venendone di quoziente $5a - 6$, però farà $a + 3$ il massimo comun divisore delle proposte due formole.

ARTICOLO X.

Del Calcolo delle Frazioni.

220. Siccome in Aritmetica, così in Algebra nascono le frazioni qualora non si può fare una qualche divisione, nel qual caso siamo costretti d'indicarla.

221. Poichè col dividerli una data quantità per un'altra a lei eguale ne nasce di quoziente l'unità (pel num. 76.), però se il denominatore di una data frazione farà eguale al numeratore, tale frazione esprimerà l'unità; onde $\frac{a^2 - b^2}{a^2 - b^2} = 1$. E siccome (pel num. 129. del Tomo I.) il quoziente, che nasce dal dividerli una qualunque quantità per l'unità, è la stessa quantità, quindi si potrà esprimere qualsivoglia quantità a modo di frazione con sottoscriverci l'unità separata da una linea, così $\frac{a}{1}$, o $\frac{ab + d'e - ce}{1}$.

222. Qui ha luogo tutto ciò, che ho detto delle Frazioni nel Tomo I.

223. Data una frazione ella si ridurrà a minimi termini (pel num. 228. del Tomo I.) con dividere il numeratore, e il denominatore pel loro massimo comun divisore, che devesi ritrovare giusta il num. 217. ec., mentre i due quozienti, che ne verranno faranno il numeratore, e il denominatore della frazione cercata: onde con dividerli il numeratore, e il denominatore della frazione $\frac{a^2 - a^2b}{a^2c - abc}$ per $a^2 - ab$ loro massimo comun divisore si avrà, $\frac{a}{c} = \frac{a^2 - a^2b}{a^2c - abc}$.

224. Avendosi una frazione impropria si potrà ridurla a quantità intera con dividerne il numeratore pel denominatore giusta il num. 231. del Tomo I., nel qual modo farà $\frac{abc}{ac} = b$.

225. Che se si vorrà ridurre una quantità intera a frazione, che abbia un tale denominatore, basterà (pel num. 238. del Tomo I.) moltiplicare la proposta quantità per questo denominatore, e al prodotto sottoscriverci lo stesso denominatore separato da una linea: Onde per ridurre $a + b$ a frazione, che abbia per denominatore $c - d$ si farà $\frac{c-d \times a + b}{c-d} = \frac{ac + bc - ad - bd}{c-d}$. Che se farà data una quantità intera con frazione, si ridurrà tutto a frazione (giusta il num. 240. del Tomo I.) con moltiplicare la quantità intera pel denominatore della frazione, indi sottoscrivere

questo denominatore a tutta l'intera quantità: Così $an + \frac{bc}{e^2 - m}$ farà $\frac{e^2 - m \times an + bc}{e^2 - m}$

$$= \frac{ae^2n - amn + bc}{e^2 - m}$$

226. Dovendosi ridurre due, o più frazioni allo stesso denominatore, si moltiplichino i numeratori, e i denominatori in croce, e a ciascuno di questi prodotti si dia per denominatore il prodotto de' denominatori (giusta il num. 255., e 257. del Tomo I.): Onde le due frazioni $\frac{a}{b+c}$, $\frac{d-m}{n}$ ridotte allo stesso denominatore

$$\text{faranno } \frac{a \times n}{n \times b+c}, \frac{b+c \times d-m}{n \times b+c}, \text{ cioè } \frac{an}{bn+cn}, \frac{bd+cd-bm-cm}{bn+cn}.$$

227. Per sommare insieme due, o più frazioni basterà scriverle una dopo l'altra co' propri segni. O pure si regoli così: si riducano queste frazioni allo stesso denominatore, lo che fatto si scrivano uno dopo l'altro i numeratori delle risultate frazioni con quei segni, che hanno, e a tale somma si sottoscriva il comune denominatore. Così per sommare le tre frazioni $\frac{b}{a-c}$, $\frac{a^2-m^2}{c+c}$, $\frac{c-e}{a}$, si farà $\frac{b}{a-c} +$

$$\frac{a^2-m^2}{c+c} + \frac{c-e}{a}. \text{ O pure si riducano prima allo stesso denominatore così } \frac{a \times c+c \times b}{a \times c+c \times a-c}, \frac{a \times a-c \times a^2-m^2}{a \times a-c \times c+c}, \frac{a-c \times c+c \times c-e}{a \times a-c \times c+c}, \text{ cioè } \frac{abc+abe}{a^2c-ac^2+a^2c-ace},$$

$$\frac{a^3-a^2m^2-a^2c+acm^2}{a^2c-ac^2+a^2c-ace}, \frac{ac^3-ac^2-c^3+ce^2}{a^2c-ac^2+a^2c-ace}, \text{ e sommando questi numeratori, indi}$$

dando loro il comune denominatore si avrà

$$\frac{abc+abe+a^3-a^2m^2-a^2c+acm^2+ac^3-ac^2-c^3+ce^2}{a^2c-ac^2+a^2c-ace}, \text{ che è la somma cercata delle tre date frazioni.}$$

228. Istessamente si opera per sommare una quantità intera con una frazione, come dovendosi sommare a con $\frac{de}{a+c}$, si farà $a + \frac{de}{a+c}$, o sia (pel num. 225.)

$$\frac{a^2+ac+de}{a+c}.$$

229. Quanto alla sottrazione di una frazione da un'altra, ella si farà collo scrivere la frazione da sottrarsi coi segni mutati presso alla frazione, da cui si deve fare la sottrazione. O pure si risurrà l'una, e l'altra frazione allo stesso denominatore, poscia presso al numeratore, da cui devesi fare la sottrazione si scriverà coi segni mutati il numeratore della frazione, che devesi sottrarre, e sotto si scriverà il comune denominatore: Come dovendosi sottrarre da $\frac{ab^2-m}{ce+an}$ la $\frac{bd}{a-c}$, si farà

$$\frac{ab^2-m}{ce+an} - \frac{bd}{a-c}. \text{ O pure si riduca l'una, e l'altra allo stesso denominatore così } \frac{a^2b^2-am-ab^2c^2+c^2m}{ace+a^2n-c'e-ac'n}, \frac{+bde+abd n}{ace+a^2n-c'e-ac'n}, \text{ e facendo l'attuale sottrazione ne' numeratori, si avrà } \frac{a^2b^2-am-ab^2c^2+c^2m-bde-abdn}{ace+a^2n-c'e-ac'n}, \text{ differenza cercata delle due date frazioni.}$$

230. Egualmente si opera per sottrarre una quantità intera da una frazione, o una frazione da una quantità intera: Come dovendosi sottrarre ab da $\frac{cd-e}{a+a}$, si

farà $\frac{cd-e}{a+b} - ab$, o sia (pel num. 225.) $\frac{cd-e-a^2b-ab^2}{a+b}$. Così dovendosi

sottrarre $\frac{ac+be}{m^2-ac}$ da mn , si farà $mn - \frac{ac+be}{m^2-ac}$, o sia (per lo stesso num. 225.)

$$\frac{m^3n-acmn-ac-be}{m^2-ac}.$$

231. Dovendosi moltiplicare insieme due, o più frazioni basterà (giusta il num. 272. del Tomo I.) moltiplicare tra loro i numeratori di queste frazioni, indi i denominatori, con che si avrà il numeratore, e il denominatore di una nuova frazione, che farà il prodotto cercato: Come dovendosi moltiplicare la frazione $\frac{2ab+5dc}{am+ce}$

$$\text{per la frazione } \frac{7ab-3dc}{cd-np}, \text{ si farà } \frac{2ab+5dc}{am+ce} \times \frac{7ab-3dc}{cd-np} = \\ = \frac{14a^2b^2+35abdc-6abdc-15d^2c^2}{acdm+c^2de-amnp-cenp} = \frac{14a^2b^2+29abdc-15d^2c^2}{acdm+c^2de-amnp-cenp}.$$

232. Che se si dovrà moltiplicare una quantità intera per una frazione, in tal caso si moltiplichino la quantità intera col numeratore della frazione, ed al prodotto si sottoscriva il denominatore della frazione: Come dovendosi moltiplicare $cm-de$ per $\frac{ab+cn}{ac}$, si farà $\frac{cm-de}{ac} \times \frac{ab+cn}{ac} = \frac{abc m - abdc + c^2 mn - cden}{ac}$. Se la quantità intera da moltiplicarsi con una frazione farà eguale al denominatore della frazione, in tal caso (pel num. 76.) il prodotto sarà il numeratore moltiplicato nell'unità, mentre egli è moltiplicato, e diviso per la stessa quantità, cioè a dire farà lo stesso numeratore: Per lo che il prodotto di $c+d$ in $\frac{ab}{c+d}$ farà ab .

233. Per dividere una frazione con un'altra frazione si moltiplichino (giusta il num. 287. del Tomo I.) il numeratore della frazione dividenda nel denominatore della frazione, che divide, ed il prodotto si scriva per numeratore della nuova frazione, cui si dia per denominatore il prodotto del denominatore della frazione dividenda nel numeratore della frazione, che divide: O pure, che è lo stesso, nella frazione, che divide si cambi il numeratore in denominatore, e il denominatore in numeratore, poscia si moltiplichino fra loro le due frazioni giusta il num. 231. Si debba per Esempio dividere la frazione $\frac{ad+ac}{cm}$ per la frazione $\frac{bn-ae}{an}$, si cambi questa così $\frac{an}{bn-ae}$, poscia si moltiplichino fra loro così $\frac{an}{bn-ae} \times \frac{ad+ac}{cm} = \frac{a^2dn+a^2cn}{bcmn-accm}$, e questa frazione è il quoziente cercato.

234. Se le due date frazioni avranno lo stesso denominatore, si avrà il quoziente cercato con dividere il numeratore del dividendo pel numeratore del divisore; Come dovendosi dividere $\frac{ab}{c}$ per $\frac{bd-ce}{c}$ il quoziente farà $\frac{ab}{bd-ce}$.

235. Dovendosi dividere una quantità intera per una frazione, basterà moltiplicare la quantità intera pel denominatore della frazione, ed al prodotto sottoscrivere per denominatore il numeratore della frazione: Come dovendosi dividere $ab - cd$ per $\frac{eb + cb}{d}$, si farà $\frac{d \times ab - cd}{eb + cb} = \frac{abd - cd}{eb + cb}$. Se poi si dovrà dividere una frazione per una quantità intera, basterà moltiplicare la quantità intera nel denominatore della frazione: Come dovendosi dividere la frazione $\frac{cd + ae}{am}$ per $b - ac$, si farà

$$\frac{cd + ae}{b - ac} \times am = \frac{cd + ae}{ab - m - acm}.$$

236. Una cosa si osservi, ed è, che alle volte una quantità comparirà sotto forma di frazione, quando per altro in realtà si potrebbe fare la divisione del numeratore pel denominatore, nè altro v'è, che osti a questa divisione, se non la varietà de' segni. Quando pertanto ciò succeda vi si potrà rimediare con cambiare i segni al numeratore, e al denominatore, nel caso però, in cui il numeratore abbia un fattore, mentre allora mutato il segno a questo fattore, restano mutati tutti i segni del numeratore, lo che fatto, siccome si renderà la quantità, che è in numeratore affetta dagli stessi segni, de' quali è affetta quella, che è in denominatore, si potrà perciò farne l'attuale divisione: Che poi si possano mutare i segni nel modo detto costa dal num. 81. Per Esempio essendo proposta la frazione $\frac{ad \times e - m}{-e + m}$, in cui l'attuale disposizione de' segni non permette di dividere il numeratore pel denominatore, se si muteranno i segni al numeratore, e al denominatore, si avrà $\frac{ad \times e - m}{-e + m} = - \frac{ad \times e - m}{e - m}$, nel qual modo si può fare l'attuale divisione, e però $\frac{ad \times e - m}{-e + m} = - \frac{ad \times e - m}{e - m} = - ad$. Non si trascuri questa osservazione, poichè in molti casi può essere di grande vantaggio, servendo ad abbreviare i calcoli.

ARTICOLO XI.

Modo di inalzare una quantità algebrica complessa a qualsivoglia potestà tanto determinata, come indeterminata: Della formola Newtoniana, e della maniera di servirsene.

237. **P**ROB. Si debba elevare una data quantità complessa ad una qualunque potestà.

238. **RISOL.** Si moltiplichi giusta la regola della moltiplicazione data al num. 194 la proposta quantità complessa tante volte in se stessa una meno, quante unità contiene l'esponente della cercata potestà.

239. Per indagare i metodi di abbreviare questa operazione inalzerò a varie potestà un dato binomio, per esempio $b + a$, onde esaminando la legge con cui procedono i termini di queste potenze se ne possa dedurre un Canone ecumenico per la facile, e spedita formazione di qualsivoglia potenza. Dovendosi pertanto inalzare al quadrato il binomio $b + a$ si farà

Qua-

$$\begin{array}{r} b+a \\ b+a \\ \hline \end{array}$$

Quadrato $\left\{ \begin{array}{l} b^2+ab+a^2 \\ +ab \end{array} \right.$

cioè $b^2+2ab+a^2$.

240. Si debba elevare al cubo il binomio $b+a$: Poichè per formarne il cubo gli devesi moltiplicare due volte in se stesso, e dall' averlo moltiplicato una volta in se stesso n'è venuto $b^2+ab+ab+a^2$, se questo quadrato si moltiplicherà per $b+a$, si avrà

$$\begin{array}{r} b^2+ab+ab+a^2 \\ b+a \\ \hline \end{array}$$

Cubo $\left\{ \begin{array}{l} b^3+ab^2+a^2b+a^3 \\ +ab^2+a^2b \\ +ab^2+a^2b \end{array} \right.$

cioè $b^3+3ab^2+3a^2b+a^3$

241. Si debba elevare al quadrato-quadrato il binomio $b+a$. Si moltiplichì il ritrovato cubo $b^3+ab^2+ab^2+a^2b+a^2b+a^2b+a^3$ per $b+a$, e si avrà

$$\begin{array}{r} b^3+ab^2+ab^2+a^2b+a^2b+a^2b+a^3 \\ b+a \\ \hline \end{array}$$

Quarta potestà $\left\{ \begin{array}{l} b^4+ab^3+a^2b^2+a^3b+a^4 \\ +ab^3+a^2b^2+a^3b \\ +ab^3+a^2b^2+a^3b \\ +ab^3+a^2b^2+a^3b \\ +a^4b^2 \\ +a^4b \end{array} \right.$

cioè $b^4+4ab^3+6a^2b^2+4a^3b+a^4$

242. Si debba elevare alla quinta potestà il binomio $b+a$. Si moltiplichì per $b+a$ la ritrovata quarta potestà $b^4+ab^3+ab^3+ab^3+ab^3+a^2b^2+a^2b^2+a^2b^2+a^3b+a^3b+a^3b+a^4$, e si avrà

b^5+

$$b^5 + 1b^4 + 1b^3 + 1b^2 + 1b + ab^4 + a^2b^3 + a^3b^2 + a^4b + a^5b^4 + a^6b^3 + a^7b^2 + a^8b + a^9b^4 + a^{10}b^3 + a^{11}b^2 + a^{12}b + a^{13}$$

$$\left. \begin{array}{l} b^5 + ab^4 + a^2b^3 + a^3b^2 + a^4b + a^5 \\ + ab^4 + a^2b^3 + a^3b^2 + a^4b + \\ + ab^4 + a^2b^3 + a^3b^2 + a^4b + \\ + ab^4 + a^2b^3 + a^3b^2 + a^4b + \\ + ab^4 + a^2b^3 + a^3b^2 + a^4b + \\ + a^5b^4 + a^6b^3 + \\ + a^7b^4 + a^8b^3 + \\ + a^9b^4 + a^{10}b^3 + \\ + a^{11}b^4 + a^{12}b^3 + \end{array} \right\} \text{Quinta potestà}$$

cioè $b^5 + 5ab^4 + 10a^2b^3 + 10a^3b^2 + 5a^4b + a^5$.

243. Le cinque prime potestà pertanto del binomio $b+a$ sono

- I. $b + a$
- II. $b^2 + 2ab + a^2$
- III. $b^3 + 3ab^2 + 3a^2b + a^3$
- IV. $b^4 + 4ab^3 + 6a^2b^2 + 4a^3b + a^4$
- V. $b^5 + 5ab^4 + 10a^2b^3 + 10a^3b^2 + 5a^4b + a^5$

e queste bastano per determinare la legge costante, con cui in ciascuna potestà procedono i termini del binomio; mentre della legge con cui procedono i loro coefficienti numerici tratteremo fra poco.

244. Ora per poco, che si osservino queste potestà, si scorgerà, che il primo termine di ciascuna è la prima parte del binomio elevata alla potestà cercata; il secondo termine risulta dal moltiplicarsi la seconda parte del binomio nella prima elevata ad una potestà, il di cui esponente è minore di una unità del precedente; nel terzo termine cresce di una unità l'esponente della seconda parte del binomio, e decresce di una unità l'esponente della prima parte (se però lo permette il grado della potestà); e così nei sull'eguenti termini va continuamente crescendo di una unità l'esponente della seconda parte del binomio, e calando all'opposto di una unità l'esponente della prima parte; e finalmente nell'ultimo termine ritrovasi la sola seconda parte del binomio elevata alla potestà proposta: Da ciò pertanto se ne deduce il seguente canone.

245. Dato un binomio da inalzarsi ad una potestà proposta, si ritroveranno tutti i termini di questa potestà così. Colla prima parte del binomio si formino tutte le potestà cominciando dalla cercata, e discendendo fino alla potestà zero, che (pel num. 98.) è l'unità, per le potestà inferiori; poscia colla seconda parte si facciano tutte le potestà, cominciando dall'unità fino alla proposta, e disposti con ordine questi termini sotto gli altri si moltiplicino fra loro i corrispondenti termini, e questi prodotti daranno tutti i termini della potestà cercata: Come volendosi i termini della terza potestà di $c+d$ si farà

$$\begin{array}{cccc} c^3 & c^2 & c & 1 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{array}$$

Termini cercati. $c^3 \ c^2 d \ c d^2 \ d^3$

Che se si fossero cercati i termini della settima potenza di $c+d$, si farebbe fatto

$$\begin{array}{cccccccc} c^7 & c^6 & c^5 & c^4 & c^3 & c^2 & c & 1 \\ 1 & d & d^2 & d^3 & d^4 & d^5 & d^6 & d^7 \end{array}$$

Termini cercati. $c^7 \ c^6 d \ c^5 d^2 \ c^4 d^3 \ c^3 d^4 \ c^2 d^5 \ c d^6 \ d^7$

245. Da ciò si vede, che tanti sono i termini di qualsivoglia potenza di radice binomia, quante unità contiene il di lei esponente accresciuto di una unità.

247. Restano ora da determinarsi i coefficienti numerici, che convengono a ciascuno di questi termini, e per ciò fare si osservi in primo luogo, che in qualsivoglia potenza tanto la prima come la seconda parte del binomio, a motivo della replicata moltiplicazione di tale binomio in se stesso, si prende tante volte, quante unità contiene l'esponente di tale potenza: In secondo luogo si considerino nelle formole esposte ai num. 239, 240, 241, 242 i coefficienti letterali risultanti dalla seconda parte del binomio, da cui sono assiete le decrecenti potestà della prima parte, che formano i termini della potenza proposta, e si vedrà, che nel secondo termine questo coefficiente non è altro, che la seconda parte del binomio presa tante volte, quante unità contiene l'esponente della potenza; nel terzo termine questo coefficiente non è altro, che il numero di tutti gli ambi, i quali possono risultare dalla seconda parte del binomio presa tante volte, quante unità contiene lo stesso esponente; il coefficiente del quarto termine ne è il numero de' terni; così egli è il numero delle quaderne il coefficiente del quinto termine ec.; il coefficiente poi del primo, e dell'ultimo termine è l'unità. Per lo che il ritrovare i coefficienti di ciascun termine di una cercata potenza non è altro, che ritrovare i numeri delle combinazioni secondo ciascun esponente, cominciando dall'unità fino all'esponente della potenza, che può ricevere un numero di cose eguale all'esponente della stessa potenza. Ma questo problema si scioglie, giusta il num. 1355. del Tomo I., in questo modo: Si facciano due progressioni Aritmetiche naturali, la prima delle quali incominci dall'esponente della potenza cercata, e discenda fino all'unità, la seconda poi incominci dall'unità, e ascenda fino all'esponente della stessa potenza: Fatto ciò si prenda il primo termine della prima progressione per numeratore, e il primo termine dell'altra progressione per denominatore della frazione, che deve fare le veci del coefficiente del secondo termine, o sia si divida il primo termine della prima progressione pel primo termine della seconda, e il quoziente sarà il coefficiente del secondo termine: Di poi si divida il prodotto del primo termine nel secondo della prima progressione pel prodotto del primo termine nel secondo della seconda, e il quoziente darà il coefficiente del terzo termine: Si passi indi a dividere il prodotto de' tre primi termini della prima progressione pel prodotto de' tre primi termini della seconda, e il quoziente sarà il coefficiente del quarto termine; e collo stesso metodo si continui finchè sian ritrovati tutti i necessari coefficienti. Si debbano per esempio ritrovare i coefficienti numerici della settima potenza. Si ordinino nel seguente modo le due progressioni

Ter. II.

F

7.

$$\begin{array}{ccccccc} 7. & 6. & 5. & 4. & 3. & 2. & 1. \\ 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. \end{array}$$

per lo che farà

$$\frac{7}{1} = 7. \text{ Coefficiente del secondo termine della settima potestà.}$$

$$\frac{7 \times 6}{1 \times 2} = \frac{42}{2} = 21. \text{ Coefficiente del terzo termine.}$$

$$\frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3} = \frac{210}{6} = 35. \text{ Coefficiente del quarto termine.}$$

$$\frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = \frac{840}{24} = 35. \text{ Coefficiente del quinto termine.}$$

$$\frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} = \frac{2520}{120} = 21. \text{ Coefficiente del sesto termine.}$$

$$\frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} = \frac{5040}{720} = 7. \text{ Coefficiente del settimo termine.}$$

Se pertanto si daranno questi ritrovati coefficienti numerici ai termini della settima potestà trovata al num. 545, ella farà

$$a^7 + 7a^6d + 21a^5d^2 + 35a^4d^3 + 35a^3d^4 + 21a^2d^5 + 7ad^6 + d^7$$

248. Ed ecco con che facilità, e speditezza si possa inalzare un dato binomio ad una qualunque potestà.

249. Se il binomio farà positivo, tutti i termini della potestà, qualunque ella sia, faranno positivi; ma se la seconda parte del binomio farà negativa, come se il binomio fosse $a-b$, faranno negativi tutti quei termini, in cui la parte $-b$ è elevata a potestà impari, cioè a dire ha per esponente i numeri 1, 3, 5, 7, 9 ec. Per lo che la settima potestà di $a-b$ farà

$$a^7 - 7a^6b + 21a^5b^2 - 35a^4b^3 + 35a^3b^4 - 21a^2b^5 + 7ab^6 - b^7$$

250. Alle volte può accadere, che l'una, o l'altra, o tutte due le parti del binomio abbiano coefficienti, nel qual caso si operi così: Si inalzi alla potestà cercata il puro binomio trascurando per ora i coefficienti; poscia si inalzi il coefficiente, o ciascuno de' coefficienti (se ambedue le parti del binomio sono affette da coefficiente) alle corrispondenti potestà, a cui in ciascun termine si trova elevata quella parte, alla quale serviva di coefficiente, indi per ultimo si moltiplichino queste potestà nei coefficienti dei detti termini. Si debba per Esempio inalzare alla quarta potestà il binomio $2a+3b$. Si inalzi primieramente nel modo detto alla potestà cercata il binomio $a+b$, e si avrà

$$a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

indi si inalzi ciascuno de' coefficienti 2, 3 alle corrispondenti potestà, che in ciascun ter-

termine ottiene la quantità, cui era prefisso, e acciocchè più chiaramente si scorga l'operazione ve le noterò sotto

$$a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Potestà del coefficiente 2.	16.	8.	4.	2.	
Potestà del coefficiente 3.		3.	9.	27.	81.

Ora se ne faccia la moltiplicazione così

$$16a^4 + 4 \times 8 \times 3a^3b + 6 \times 4 \times 9a^2b^2 + 4 \times 2 \times 27ab^3 + 81b^4$$

$$\text{cioè } 16a^4 + 96a^3b + 216a^2b^2 + 216ab^3 + 81b^4$$

351. Qualora non si voglia fare l'attuale operazione, ella si indicherà con tirare una linea sopra la quantità proposta, alla di cui estremità deve si notare l'esponente della potenza cercata: Per lo che la terza potenza di $ab - 1d$ si indicherà così

$\overline{ab - 1d}^3$. La quinta potenza di $am + 2c - 7en$ così $\overline{am + 2c - 7en}^5$.

252. Che se l'esponente della potenza cercata farà una quantità indeterminata, come m , il modo di ritrovare tutti i termini di tale potenza non farà punto difficile da quanto si è detto al num. 245. Si debba per esempio elevare alla potenza

m il binomio $a + b$, la quale potenza si esprime così $\overline{a + b}^m$. Si formino le due serie di tutte le potestà delle parti del binomio dato in questo modo

$$\begin{array}{cccccccccc} a^m, & a^{m-1}, & a^{m-2}, & a^{m-3}, & a^{m-4}, & a^{m-5}, & a^{m-6}, & a^{m-7}, & \text{ec.} \\ 1, & b, & b^2, & b^3, & b^4, & b^5, & b^6, & b^7, & \text{ec.} \end{array}$$

Term. cerc. $a^m, a^{m-1}b, a^{m-2}b^2, a^{m-3}b^3, a^{m-4}b^4, a^{m-5}b^5, a^{m-6}b^6, a^{m-7}b^7, \text{ec.}$

253. Questa formola generale ha una specie d'infinità, in quanto che dovendo servire per tutte le potestà deve ella andare all'infinito: Ciò non pertanto qualora si determina l'esponente m per applicarla ai casi particolari, il numero de' termini si rende finito, mentre determinato tale esponente è d'uopo arrivare finalmente a qualche termine, il cui esponente diventi zero, lo che seguendo, ivi si interrompe la serie de' termini, ponendo fine ai termini della potenza cercata: Sia per esempio $m=3$: In questo caso la formola generale trovata finirà nel termine $a^{m-3}b^3$, il quale mediante la sostituzione del valore di m farà $a^{3-3}b^3 = a^0b^3 = b^3$, perchè $a^0 = 1$. (pel num. 98.), e conseguentemente i termini cercati saranno $a^3, a^{3-1}b, a^{3-2}b^2, a^{3-3}b^3$, cioè a^3, a^2b, ab^2, b^3 .

254. Il metodo dato al num. 247. per trovare i coefficienti numerici da prefiggere ai termini delle potestà serve ancora per trovare questi coefficienti nel caso, che debbano essere indeterminati, nel qual caso coll' esponente indeterminato m della potenza si dovrà formare la prima progressione aritmetica, e però le due progressioni, mediante le quali han si a ritrovare i ricercati coefficienti indeterminati saranno

$$\begin{array}{ccccccc} m. & m-1. & m-2. & m-3. & m-4. & m-5. & m-6 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{ccccccc} m. & m-1. & m-2. & m-3. & m-4. & m-5. & m-6 \end{array}} \right\} \text{ ec.}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7 \end{array}$$

per lo che si avranno i coefficienti indeterminati per ciascun termine in questo modo

$$\frac{m}{1} \quad \text{Coefficiente del secondo termine}$$

$$\frac{m}{1} \frac{\overline{m-1}}{\overline{2}} \quad \text{Coefficiente del terzo termine}$$

$$\frac{m}{1} \frac{\overline{m-1}}{\overline{2}} \frac{\overline{m-2}}{\overline{3}} \quad \text{Coefficiente del quarto termine}$$

$$\frac{m}{1} \frac{\overline{m-1}}{\overline{2}} \frac{\overline{m-2}}{\overline{3}} \frac{\overline{m-3}}{\overline{4}} \quad \text{Coefficiente del quinto termine}$$

$$\frac{m}{1} \frac{\overline{m-1}}{\overline{2}} \frac{\overline{m-2}}{\overline{3}} \frac{\overline{m-3}}{\overline{4}} \frac{\overline{m-4}}{\overline{5}} \quad \text{Coefficiente del sesto termine ec.}$$

255. Nella stessa maniera poi, che col determinarsi l'esponente m si interrompe la serie de' termini nella formola generale (giusta il num. 253.), e ne risulta una moltitudine finita di termini corrispondentemente al grado della potenza cercata; così determinato lo stesso esponente resterà determinato il numero de' coefficienti, che ai termini della proposta potenza convengono, e ognuno di loro verrà con numeri espresso: Come supponendosi $m=4$, farà $m-4=0$, e però farà zero quel coefficiente, in cui entra l'espressione $m-4$, mentre qualunque quantità moltiplicata per zero rende zero, conseguentemente resteranno determinati solamente tre coefficienti per la potenza, il di cui esponente è 4, non considerando per coefficiente l'unità, che affetta l'ultimo termine della potenza.

256. Se pertanto a ciascuno de' termini generali ritrovati al num. 252. si darà il suo corrispondente coefficiente pur ora trovato, si avrà la seguente formola generale, che rappresenterà qualsivoglia potenza di un binomio.

Formola generale per la elevazione di un binomio a qualsivoglia potestà.

a^m Primo termine

$+ \frac{m}{1} a^{m-1} b$ Secondo termine

$+ \frac{m \times m-1}{1 \times 2} a^{m-2} b^2$ Terzo termine

$+ \frac{m \times m-1 \times m-2}{1 \times 2 \times 3} a^{m-3} b^3$ Quarto termine

$+ \frac{m \times m-1 \times m-2 \times m-3}{1 \times 2 \times 3 \times 4} a^{m-4} b^4$ Quinto termine

$+ \frac{m \times m-1 \times m-2 \times m-3 \times m-4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} a^{m-5} b^5$ Sesto termine ec.

257. Da questa formola generale ne ha dedotta il Newton un'altra più ristretta, di cui al bisogno usar se ne possa per inalzare una quantità data a qualsivoglia potestà. E primieramente (pel num. 101.) essendo $a^{m-1} = \frac{a^m}{a}$; $a^{m-2} = \frac{a^m}{a^2}$; $a^{m-3} = \frac{a^m}{a^3}$ ec., la precedente formola generale si ridurrà a quest'altra

$- a^m$ Primo termine

$+ \frac{m}{1} \frac{a^m b}{a}$ Secondo termine

$+ \frac{m \times m-1}{1 \times 2} \frac{a^m b^2}{a^2}$ Terzo termine

$+ \frac{m \times m-1 \times m-2}{1 \times 2 \times 3} \frac{a^m b^3}{a^3}$ Quarto termine

$+ \frac{m \times m-1 \times m-2 \times m-3}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \frac{a^m b^4}{a^4}$ Quinto termine

$+ \frac{m \times m-1 \times m-2 \times m-3 \times m-4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} \frac{a^m b^5}{a^5}$ Sesto termine ec.

258. Che se si farà la prima parte del binomio eguale a P, cioè $a = P$, ed eguale a Q il Quoziente, che nasce dividendo la seconda parte b del binomio per la prima a , cioè $\frac{b}{a} = Q$, farà $a^m = P^m$; $\frac{b}{a} = Q$; $\frac{b^2}{a^2} = Q^2$; $\frac{b^3}{a^3} = Q^3$; $\frac{b^4}{a^4} = Q^4$ ec., e però sostituendo questi valori in quest' ultima precedente formola, si avrà la seguente anche più ristretta

$$\begin{aligned}
 & P^m && \text{Primo termine} \\
 & + \frac{m}{1} P^{m-1} Q && \text{Secondo termine} \\
 & + \frac{m \times m-1}{1 \times 2} P^{m-2} Q^2 && \text{Terzo termine} \\
 & + \frac{m \times m-1 \times m-2}{1 \times 2 \times 3} P^{m-3} Q^3 && \text{Quarto termine} \\
 & + \frac{m \times m-1 \times m-2 \times m-3}{1 \times 2 \times 3 \times 4} P^{m-4} Q^4 && \text{Quinto termine} \\
 & + \frac{m \times m-1 \times m-2 \times m-3 \times m-4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} P^{m-5} Q^5 && \text{Sesto termine ec.}
 \end{aligned}$$

259. Finalmente per restringere ancora questa formola si offervi, che essendo P^m il primo termine, e $\frac{m}{1} P^{m-1} Q$ il secondo, sarà il primo al secondo, come 1 ad $\frac{m}{1} Q$, per lo che chiamandosi A il primo termine, farà $\frac{m}{1} A Q$ il secondo. Similmente stando il secondo termine $\frac{m}{1} P^{m-1} Q$ al terzo $\frac{m \times m-1}{1 \times 2} P^{m-2} Q^2$, come 1 ad $\frac{m-1}{2} Q$, se il secondo termine si chiamerà B, il terzo farà $\frac{m-1}{2} B Q$. Parimente stando il terzo termine $\frac{m \times m-1}{1 \times 2} P^{m-2} Q^2$ al quarto $\frac{m \times m-1 \times m-2}{1 \times 2 \times 3} P^{m-3} Q^3$, come 1 ad $\frac{m-2}{3} Q$, se il terzo termine si chiamerà C, il quarto farà $\frac{m-2}{3} C Q$, e così in seguito: Laonde

Essendo

$$P^m = A, \quad \text{farà } \frac{m}{1} P^m Q = \frac{m}{1} A Q$$

$$\frac{m-1}{1} P^m Q = B, \quad \text{farà } \frac{m}{1} \frac{X^{m-1}}{X^2} P^m Q^1 = \frac{m-1}{2} B Q$$

$$\frac{m-1}{2} B Q = C, \quad \text{farà } \frac{m}{1} \frac{X^{m-1}}{X^2} \frac{X^{m-2}}{X^3} P^m Q^1 = \frac{m-2}{3} C Q$$

$$\frac{m-2}{3} C Q = D, \quad \text{farà } \frac{m}{1} \frac{X^{m-1}}{X^2} \frac{X^{m-2}}{X^3} \frac{X^{m-3}}{X^4} P^m Q^1 = \frac{m-3}{4} D Q$$

$$\frac{m-3}{4} D Q = E, \quad \text{farà } \frac{m}{1} \frac{X^{m-1}}{X^2} \frac{X^{m-2}}{X^3} \frac{X^{m-3}}{X^4} \frac{X^{m-4}}{X^5} P^m Q^1 = \frac{m-4}{5} E Q$$

$$\frac{m-4}{5} E Q = F, \quad \text{farà } \frac{m}{1} \frac{X^{m-1}}{X^2} \frac{X^{m-2}}{X^3} \frac{X^{m-3}}{X^4} \frac{X^{m-4}}{X^5} \frac{X^{m-5}}{X^6} P^m Q^1 = \frac{m-5}{6} F Q$$

$$\frac{m-5}{6} F Q = G, \quad \text{farà } \frac{m}{1} \frac{X^{m-1}}{X^2} \frac{X^{m-2}}{X^3} \frac{X^{m-3}}{X^4} \frac{X^{m-4}}{X^5} \frac{X^{m-5}}{X^6} \frac{X^{m-6}}{X^7} P^m Q^1 = \frac{m-6}{7} G Q \text{ ec.}$$

onde si ha la

Formola generale del Newton

$$P^m + \frac{m}{1} A Q + \frac{m-1}{2} B Q + \frac{m-2}{3} C Q + \frac{m-3}{4} D Q + \frac{m-4}{5} E Q \text{ ec.}$$

260. E qui si offervi, che essendosi posto $a = P$, $\frac{b}{a} = Q$, farà il binomio

$$a + b = P + P Q, \text{ e } \overline{a+b^m} = \overline{P + P Q^m}.$$

261. Ora proporrò alcuni esempi per far vedere il modo di adoperare questa formola in occasione di inalzare un binomio ad una cercata potestà: E primieramente si debba inalzare alla terza potestà il binomio $a+c$. Si scriva nella suddetta formola a in luogo di P , e $\frac{c}{a}$ in luogo di Q , e in luogo di m si scriva 3 esponente della potestà cercata, mediante le quali sostituzioni il primo termine P^m della formola farà a^3 ; il secondo termine $\frac{m}{1} A Q$ farà $\frac{3Ac}{a}$; il terzo termine $\frac{m-1}{2} B Q$ farà $\frac{3c^2}{a}$; il quarto termine $\frac{m-2}{3} C Q$ farà $\frac{1}{3} C \frac{c}{a}$; il quinto termine

sva.

svanisce, perchè $m-3=3-3=0$ (ed ecco come col sostituirsi nella formola generale l'esponente determinato in luogo dell'indeterminato, s'interrompe la serie dei termini, e il loro numero d'indefinito, che egli era, si fa finito, e determinato relativamente al grado della potenza). Laonde nel proposto esempio la formola generale $P^m + \frac{m}{1} A Q + \frac{m-1}{2} B Q + \frac{m-2}{3} C Q$ ec. si muta in quest'altra $a^3 + \frac{3Ac}{a} + \frac{Bc}{a} + \frac{1}{3} \frac{Cc}{a}$, nella quale restano solamente da sostituirsi i corrispondenti

valori di A, B, C, acciò si abbia il ricercato cubo di $a+c$: Per lo che essendo (pel num. 259.) $A = a^2$; $B = \frac{3a^2c}{a} = 3a^2c$; $C = \frac{3a^2c^2}{a} = 3ac^2$, se si sostituiranno nella pot' anzi ritrovata formola questi valori in luogo di A, B, C, si avrà $a^3 + 3a^2c + 3ac^2 + c^3$, che è il cubo cercato.

262. Egualmente si opera ogniquale volta la quantità data sia un polinomio, se non che le di lui prime parti, ad esclusione della ultima sola, devonti considerate come un termine. Si debba per esempio elevare alla terza potenza il trinomio $a+b+c$. Si considerino le due prime parti $a+b$ come una, per lo che nella formola si scriverà $a+b$ in luogo di P; $\frac{c}{a+b}$ in luogo di Q; e 3 in vece di m,

con che la formola $P^m + \frac{m}{1} A Q + \frac{m-1}{2} B Q$ ec. si cambierà in quest'altra $\frac{(a+b)^3}{a+b} + \frac{m}{1} \frac{Ac}{a+b} + \frac{m-1}{2} \frac{Bc}{a+b} + \frac{m-2}{3} \frac{Cc}{a+b}$: e qui termina la formola, perchè il coefficiente $m-3=0$. Ora si rimettano in luogo di A, B, C i propri loro valori; e perchè è $\frac{(a+b)^3}{a+b} = a^2 + 3ab + 3ab^2 + b^3$, farà $\frac{m}{1} \frac{Ac}{a+b} =$

$\frac{3a^2c + 9a^2bc + 9ab^2c + 3b^3c}{a+b}$, e facendo l'attuale divisione si avrà

Divisore $a+b$	Dividendo $3a^2c + 9a^2bc + 9ab^2c + 3b^3c$ $3a^2c + 3a^2bc$ $0 + 6a^2bc + 9ab^2c + 3b^3c$ $0 + 6a^2bc + 6ab^2c$ $0 + 3ab^2c + 3b^3c$ $0 + 3ab^2c + 3b^3c$ 0
-------------------	---

Quoziente $3a^2c + 6abc + 3b^2c = \frac{m}{1} \frac{Ac}{a+b}$

dunque farà $\frac{m-1}{2} \frac{Bc}{a+b} = \frac{3a^2c^2+6abc^2+3b^2c^2}{a+b}$, e facendo l'attuale divisione, si avrà

Divisore	Dividendo
$a+b$	$3a^2c^2+6abc^2+3b^2c^2$ $3a^2c^2+3abc^2$ $0 \quad +3abc^2+3b^2c^2$ $\quad +3abc^2+3b^2c^2$ $0 \quad 0$

Quoziente $3ac^2+3bc^2 = \frac{m-1}{2} \frac{Bc}{a+b}$

E però farà $\frac{m-2}{3} \frac{Cc}{a+b} = \frac{ac^3+bc^3}{a+b}$, e facendo l'attuale divisione si avrà

Divisore	Dividendo
$a+b$	ac^3+bc^3 bc^3+bc^3 $0 \quad 0$

Quoziente c^3 .

Quindi essendo $P^m = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$$\begin{aligned}
 &+ \frac{m}{1} \frac{Ac}{a+b} = 3a^2c+6abc+3b^2c \\
 &+ \frac{m-1}{2} \frac{Bc}{a+b} = 3ac^2+3bc^2 \\
 &+ \frac{m-2}{3} \frac{Cc}{a+b} = c^3
 \end{aligned}$$

Se si sostituiranno nella formola questi valori si avrà

$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3+3a^2c+6abc+3b^2c+3ac^2+3bc^2+c^3$ cubo cercato di $a+b+c$.
 263. Siccome poi l'operazione mediante la formola Newtoniana riesce laboriosa a motivo delle divisioni, perciò qualora si debba elevare un polinomio ad una proposta potestà, tornerà più comodo servirsi della formola data al num. 255. Si debba per esempio elevare alla quarta potestà il trinomio $d+b+c$. Si faccia la prima parte del trinomio $d=a$; le altre due parti $b+c=b$, ed $m=4$; onde si avrà $\overline{a+b+c}^4 = d^4+4d^3 \times \overline{b+c} + 6d^2 \times \overline{b+c}^2 + 4d \times \overline{b+c}^3 + \overline{b+c}^4$,
 cioè a dire

Tom. II.

G

a^m

$$\begin{aligned}
 & a^m = d^4 \\
 & ma^{m-1}b = 4d^3 \times \overline{b+c} \\
 & \frac{m \times \overline{m-1}}{2 \times 2} a^{m-2}b^2 = 5d^2 \times \overline{b+c}^2 \\
 & \frac{m \times \overline{m-1} \times \overline{m-2}}{1 \times 2 \times 3} a^{m-3}b^3 = 4d \times \overline{b+c}^3 \\
 & \frac{m \times \overline{m-1} \times \overline{m-2} \times \overline{m-3}}{1 \times 2 \times 3 \times 4} a^{m-4}b^4 = \overline{b+c}^4
 \end{aligned}$$

Ma essendo $\overline{b+c}^3 = b^3 + 2bc^2 + c^3$

$$\overline{b+c}^3 = b^3 + 3b^2c + 3bc^2 + c^3$$

$$\overline{b+c}^4 = b^4 + 4b^3c + 6b^2c^2 + 4bc^3 + c^4$$

col sostituire questi valori nella formola, ne verrà $d^4 + 4d^3b + 4d^2c + 6d^2b^2 + 12d^2bc + 6d^2c^2 + 4db^3 + 12db^2c + 12dbc^2 + 4dc^3 + b^4 + 4b^3c + 6b^2c^2 + 4bc^3 + c^4$, che è la cercata quarta potenza del dato trinomio $d+b+c$. Sarebbe si avuto lo stesso se si fosse posto $e=a$, $b+d=b$. Mediante questa formola si scorge, che un polinomio elevato a qualsivoglia potenza risulta da tutte le successive potenze inferiori (cominciando dalla potenza proposta fino alla potenza zero) dello stesso polinomio diminuito dell'ultima parte, e queste potenze devono essere rispettivamente moltiplicate nei prodotti, che nascono dal moltiplicarsi le continuamente crescenti potenze dell'ultima parte, cominciando dalla potenza zero fino alla potenza cercata nei coefficienti della stessa potenza cercata, contando per primo, e ultimo coefficiente l'unità. Prenderò gli Esempi dal polinomio $a+b+c+d+e$, di cui darò le potenze fino alla quinta.

Seconda potenza di $a+b+c+d+e$

$$(a+b+c+d)^2 + 2e \times \overline{a+b+c+d} + e^2$$

Terza potenza di $a+b+c+d+e$

$$(a+b+c+d)^3 + 3e \times \overline{a+b+c+d}^2 + 3e^2 \times \overline{a+b+c+d} + e^3$$

Quarta potenza di $a+b+c+d+e$

$$(a+b+c+d)^4 + 4e \times \overline{a+b+c+d}^3 + 6e^2 \times \overline{a+b+c+d}^2 + 4e^3 \times \overline{a+b+c+d} + e^4$$

Quinta potenza di $a+b+c+d+e$

$$\begin{aligned}
 & (a+b+c+d)^5 + 5e \times \overline{a+b+c+d}^4 + 10e^2 \times \overline{a+b+c+d}^3 + 10e^3 \times \overline{a+b+c+d}^2 \\
 & + 5e^4 \times \overline{a+b+c+d} + e^5.
 \end{aligned}$$

264. Ma per tornare alla formola Newtoniana ella serve egualmente eziandio quando l'esponente della potestà cercata è negativo. Si debba per esempio elevare $a - \epsilon$ alla potestà d'esponente -2 . Poichè la seconda parte del dato binomio è negativa, la formola (pel num. 249.) farà $P^m = \frac{m}{1} A Q + \frac{m-1}{2} B Q - \frac{m-2}{3}$

$CQ + \text{ec.}$, in cui si sostituisca a in luogo di P ; $\frac{\epsilon}{a}$ in luogo di Q ; e -2 in luogo

di m , con che ella si cambierà in quest'altra $a^{-2} + \frac{2A\epsilon}{a} - \frac{3B\epsilon^2}{a^2} + \frac{4C\epsilon^3}{a^3} - \frac{5D\epsilon^4}{a^4} \text{ ec.}$

Laonde in vece di A, B, C, D ec. rimettendo i proprj valori coi loro convenienti segni, si avrà $\frac{1}{a^2} + \frac{2\epsilon}{a^3} - \frac{3\epsilon^2}{a^4} + \frac{4\epsilon^3}{a^5} - \frac{5\epsilon^4}{a^6} + \text{ec.}$ in infinito. Siccome poi

$\frac{1}{a-\epsilon} = \frac{1}{a-\epsilon} = \frac{1}{a^2-2a\epsilon+\epsilon^2}$, egli è lo stesso l'inalzare $a-\epsilon$ alla potestà -2 ,

che dividere l'unità pel quadrato di $a-\epsilon$, o generalmente l'elevare $a-\epsilon$ alla potestà $-m$ è lo stesso, che dividere l'unità per la potestà m di $a-\epsilon$: Ma da questa divisione nasce una serie infinita, e però una serie infinita risulta dall'inalzare una quantità ad una potestà negativa, delle quali serie parlerò a suo luogo.

265. Per inalzare una data frazione ad una cercata potestà basterà inalzare a tale potestà tanto il numeratore come il denominatore.

ARTICOLO XII.

Dell'effrazione delle Radici.

266. **P**Rob. 1. Da una data quantità algebrica si debba levare la radice quadrata.

267. **Risol.** Si ordini primieramente la data quantità secondo una lettera a piacere, cominciando dalla massima potestà di tale lettera, cui devono seguire per ordine le altre potestà inferiori: Fatto ciò dal primo termine di questa quantità si levi la radice quadrata (giusta il num. 110.), dopo di che si cancelli questo primo termine, indi pel doppio della ritrovata radice (che sarà il primo termine della radice cercata) si divida la rimanente quantità, e il quoziente farà la seconda parte della cercata radice: Con questa seconda parte si moltiplichino ora il doppio della prima parte più la seconda, e questo prodotto si sottragga dalla residua quantità; e ciò, che rimane si divida pel doppio del primo termine della finora trovata radice, il di cui quoziente farà la terza parte della radice. Con questa terza parte si moltiplichino il doppio delle due prime parti accresciuto della terza parte, ed il prodotto si sottragga al solito, e collo stesso metodo si continui l'operazione.

268. La dim. di questa operazione è la stessa di quella data al num. 787. del Tomo I.

269. Debba per esempio levare la radice quadrata dalla quantità $a^2 + 6a^2b + 5a^2b^2 - 12ab^3 + 4b^4$, che scrivo in A. Dal primo termine si levi la radice quadrata, che è a^2 , quale scrivo in B; e cancellato il primo termine a^2 noto in D il residuo $+6a^2b + 5a^2b^2 - 12ab^3 + 4b^4$, il di cui primo termine diviso per $2a^2$ doppio

della radice trovata a^2 lascia di quoziente $+3ab$ seconda parte della radice cercata, che scrivo in B dopo a^2 . Si moltiplichì poscia $2a^2+3ab$ con questo quoziente $3ab$, e il prodotto $6a^2b+9a^2b^2$ si sottragga dalla quantità posta in D, con che si avrà di residuo $-4a^2b^3-12ab^3+4b^4$, quale scrivo in H. Passò quindi a dividere il primo termine della quantità posta in H pel primo termine di $2a^2+3ab$ doppio della ritrovata radice a^2+3ab , e mi viene di quoziente $-2b^3$, che scrivo in B dopo a^2+3ab ; dopo di che moltiplico $2a^2+3ab-2b^3$ con questo quoziente $-2b^3$, il di cui prodotto si sottrae dalla quantità posta in H, e perchè nulla più rimane, però farà $a^2+3ab-2b^3$ la radice cercata. Ecco l'operazione.

	Quantità proposta		
A.	$a^4+6a^2b+5a^2b^3-12ab^3+4b^4$		
Quantità da sottrarsi	a^4		
Primo residuo D.	$0+6a^2b+5a^2b^3-12ab^3+4b^4$		
Quantità da sottrarsi	$6a^2b+9a^2b^3$		Primo divisore $2a^2$
Secondo residuo H.	$0-4a^2b^3-12ab^3+4b^4$		
Quantità da sottrarsi	$-4a^2b^3-12ab^3+4b^4$		Secondo divisore $2a^2+3ab$
Residuo	$0 \quad 0 \quad 0$		
Doppio della prima parte della radice accresciuto della seconda			$2a^2+3ab$
Seconda parte della radice			$+3ab$
Seconda quantità da sottrarsi			$6a^2b+9a^2b^3$
Doppio delle due prime parti della radice accresciuto della terza			$2a^2+3ab-2b^3$
Terza parte della radice			$-2b^3$
Terza quantità da sottrarsi			$-4a^2b^3-12ab^3+4b^4$
Radice cercata B.	$a^2+3ab-2b^3$		

270. Se nel fine dell'operazione avanzerà qualche cosa, sarà segno, che la proposta quantità non è un quadrato perfetto, e in tal caso si esprimerà la cercata radice mediante il vincolo $\sqrt{\text{così } \sqrt{2ab-cm^2+3d}}$: Lo che pure sovente per più capi torna comodo in luogo di fare l'attuale estrazione.

271. Prob. 2. Si debba estrarre la radice cuba da una data quantità algebrica.

272. Risol. Si ordini secondo una lettera a piacere la quantità data, poscia dal di lei primo termine si levi la cercata radice cuba (giusta il num. 110.), e cancellato tale primo termine si divida il primo termine della quantità residua col triplo del quadrato della radice trovata, e il quoziente farà la seconda parte della cercata radice. Ora con questa seconda parte si moltiplichì il triplo del quadrato della prima parte, più il triplo della prima parte moltiplicato nella seconda, più il quadrato della seconda parte, e il prodotto si sottragga dalla residua quantità. Fatta la sottra-

zione si divida il primo termine del residuo pel primo termine del triplo del quadrato delle due ritrovate parti radicali, e il quoziente ne farà la terza parte. Si moltiplichi pertanto con questa terza parte il triplo del quadrato delle prime due parti, più il triplo delle due prime parti moltiplicate nella terza, più il quadrato della terza, e il prodotto si sottragga al solito, continuando poscia collo stesso metodo l'operazione.

273. La dim. è la stessa di quella data al num. 826 del Tomo I.

274. Debba per esempio levare la radice cuba dalla quantità $27a^3 - 54a^2c + 36ac^2 - 8c^3 - 54a^2d + 72acd - 24c^2d + 36ad^2 - 24cd^2 - 8d^3$, che scrivo in A. Si levi la radice cuba dal primo termine $27a^3$, che è $3a$, quale scrivo in B; quindi cancellando il termine $27a^3$, noto il residuo in D, di cui divido il primo termine pel triplo del quadrato della ritrovata radice $3a$, cioè per $27a^2$, e mi viene di quoziente $-2c$, che scrivo in B dopo $3a$. Fatto ciò moltiplico con questo quoziente, o sia con questa seconda parte radicale il triplo del quadrato della prima parte, più il triplo della prima moltiplicato nella seconda, più il quadrato della seconda, e ne sottraggo il prodotto $-54a^2c + 36ac^2 - 8c^3$ dalla quantità posta in D, con che mi viene di residuo $-54a^2d + 72acd - 24c^2d + 36ad^2 - 24cd^2 - 8d^3$, che scrivo in H. Poscia divido il primo termine di questa quantità posta in H pel primo termine del triplo del quadrato delle due ritrovate parti radicali $3a - 2c$, che è $27a^2 - 36ac + 12c^2$, e ne scrivo il quoziente $-2d$ in B dopo $3a - 2c$. Finalmente moltiplico con questa terza parte radicale $-2d$ il triplo del quadrato delle due prime parti radicali, più il triplo delle due prime parti radicali moltiplicato nella terza, più il quadrato della terza, e mi viene di prodotto $-54a^2d + 72acd - 24c^2d + 36ad^2 - 24cd^2 - 8d^3$, dalla di cui sottrazione dalla quantità posta in H nulla rimane, e però sarà $3a - 2c - 2d$ la radice cuba cercata. Ecco l'operazione.

Quantità proposta.	
A	$27a^3 - 54a^2c + 36ac^2 - 8c^3 - 54a^2d + 72acd - 24c^2d + 36ad^2 - 24cd^2 - 8d^3$
Quant. da sott.	$27a^3$
Prim. resid. D	$-54a^2c + 36ac^2 - 8c^3 - 54a^2d + 72acd - 24c^2d + 36ad^2 - 24cd^2 - 8d^3$
Quant. da sott.	$-54a^2c + 36ac^2 - 8c^3$
Sec. resid. H	$-54a^2d + 72acd - 24c^2d + 36ad^2 - 24cd^2 - 8d^3$
Quant. da sott.	$-54a^2d + 72acd - 24c^2d + 36ad^2 - 24cd^2 - 8d^3$
Residuo	o o o o o o
Primo divisore	$27a^2$
Secondo divisore	$27a^2 - 36ac + 12c^2$

Tripla del quadrato della prima parte radicale, più il triplo della prima moltiplicato nella seconda, più il quadrato della seconda

Seconda quantità da sottrarsi $-54a^2c + 36ac^2 - 8c^3$

Tri-

Triplo del quadrato delle due prime figure radicali, più il triplo delle due prime multipl. nella terza, più il quad. della terza $27a^2 - 36ac + 12c^2 - 18ad + 12cd + 4d^2$
Terza parte $-2d$

Terza quantità da sottrarsi $- 54a^2d + 72acd - 24c^2d + 36ad^2 - 24cd^2 - 8d^3$

Radice cercata
B. $3a - 2c - 2d$

275. Se nel fine dell'operazione avanzerà qualche cosa, farà segno, che la data quantità non è un cubo perfetto, nel qual caso si farà uso del vincolo $\sqrt[3]{\text{cosi}}$

$\sqrt[3]{a^3 + 2ab - cm}$, e ciò praticasi anche sovente con risparmiare l'attuale operazione.

276. Per quello spetta all'estrazione delle radici dalle potestà superiori, dopo essersi levata la cercata radice dal primo termine della quantità proposta, niente altro rimane, che ritrovare i divisori, e le quantità da sottrarsi. Ora però darò le formole degli uni, e dell'altre fino alla sesta potestà. Suppongo pertanto, che A rappresenti i termini già trovati della radice, cioè o uno, o due, o tre ec. secondo il progresso dell'operazione, e che B rappresenti il termine radicale ultimamente trovato mediante la divisione. La formola dei divisori sarà

Per la quarta potestà	$4A^3$
Per la quinta potestà	$5A^4$
Per la sesta potestà	$6A^5$

La formola delle quantità da sottrarsi sarà

Per la quarta potestà	$4A^3B + 6A^2B^2 + 4AB^3 + B^4$
Per la quinta potestà	$5A^4B + 10A^3B^2 + 10A^2B^3 + 5AB^4 + B^5$
Per la sesta potestà	$6A^5B + 15A^4B^2 + 20A^3B^3 + 15A^2B^4 + 6AB^5 + B^6$

Siccome poi queste formole niente altro sono, che i termini, a riserva del primo, delle potestà di un binomio, quindi è facile avere le altre intervenienti alla determinazione dei divisori, e delle quantità da sottrarsi nell'estrazione delle seguenti superiori radici.

277. Per estrarre una qualunque radice da una frazione basta levarla tanto dal numeratore, come dal denominatore. Il più delle volte però per conoscere se da una data frazione si possa levare una cercata radice, fa di mestieri ridurla a minimi termini giusta il num. 223. Se non si può levare la cercata radice nè dal numeratore, nè dal denominatore, si metta tutta la frazione sotto al vincolo così $\sqrt[ab-c]{\frac{cm+d}{}}$.

Che se ella si potrà levare da uno dei due, ciò si faccia, e all'altro si prefigga il vin-

vincolo: Come dovendosi levare la radice cuba da $\frac{dc+m^3}{a^3}$, si farà $\sqrt[3]{\frac{dc+m^3}{a^3}}$:

Così dovendosi levare la radice quadrata da $\frac{a^2+2ab+b^2}{cm-a}$ si farà $\frac{a+b}{\sqrt{cm-a}}$.

278. La formola Newtoniana data al num. 259, di cui si è fatto uso per inalzare una qualunque quantità algebrica a qualsivoglia potestà, serve egualmente per estrarre da una quantità proposta una qualunque cercata radice, niente altro richiedendosi a ciò fare, se non se, dopo di avere fatto le convenienti sostituzioni in luogo di P, e di Q, mettere in vece di m l'esponente fratto della radice cercata. Comunemente però ella si adopera per quelle quantità, che non sono potestà perfette, di cui perciò avere non si può la giusta radice, ma soltanto una radice, che alla vera infinitamente si accosti. Ed ecco come.

279. Si debba levare la radice quadrata da a^2-b^2 . Si faccia $P=a^2$; $Q=-\frac{b^2}{a^2}$; $m=\frac{1}{2}$ esponente della cercata radice: Per lo che si avrà

$$P^m = P^{\frac{1}{2}} = a^2 = a = A.$$

$$\frac{m}{1}AQ = \frac{1}{2}a \times -\frac{b^2}{a^2} = -\frac{b^2}{2a} = B.$$

$$\frac{m-1}{2}BQ = \frac{\frac{1}{2}-1}{2} \times \frac{-b^2 \times -b^2}{2a \times a^2} = \frac{1-2 \times b^4}{4 \times 2a^3} = \frac{-b^4}{8a^3} = C.$$

$$\frac{m-2}{3}CQ = \frac{\frac{1}{2}-2}{3} \times \frac{-b^4 \times -b^2}{8a^3 \times a^2} = \frac{1-4 \times b^6}{6 \times 8a^5} = \frac{-3b^6}{48a^5} = \frac{-b^6}{16a^5} = D.$$

$$\frac{m-3}{4}DQ = \frac{\frac{1}{2}-3}{4} \times \frac{-b^6 \times -b^2}{16a^5 \times a^2} = \frac{1-3 \times b^8}{8 \times 16a^7} = \frac{-5b^8}{128a^7} = E.$$

$$\frac{m-4}{5}EQ = \frac{\frac{1}{2}-4}{5} \times \frac{-5b^8 \times -b^2}{128a^7 \times a^2} = \frac{1-8 \times 5b^{10}}{10 \times 128a^9} = \frac{-7b^{10}}{256a^9} \text{ ec. in infinito}$$

E però trovasi essere $\sqrt{a^2-b^2} = a - \frac{b^2}{2a} - \frac{b^4}{8a^3} - \frac{b^6}{16a^5} - \frac{5b^8}{128a^7} - \frac{7b^{10}}{256a^9} \text{ ec. in infinito.}$

280. Coll' estrarre pertanto una qualsivoglia radice da una quantità, che non sia potestà perfetta, nasce una serie infinita, delle quali serie parleremo a suo luogo.

281. In vece di servirsi della formola $\sqrt[m]{P+PQ}$ si può far uso della formola $\sqrt[m]{P+PQ} = P^{\frac{m}{n}} + \frac{m}{n}AQ + \frac{m+n}{2n}BQ + \frac{m-2n}{3n}CQ$ ec. Come volendo levare la radice quadrata da a^3+b^3 , si ponga $P=a^3$; $Q=\frac{b^3}{a^3}$; $m=1$, $n=2$, con che si avrà

$$\begin{aligned} P^{\frac{m}{n}} &= a^{\frac{1}{2}} = a = A. \\ \frac{m}{n}AQ &= \frac{b^3}{2a} = B. \\ \frac{m+n}{2n}BQ &= -\frac{b^4}{8a^4} = C. \text{ ec.} \end{aligned}$$

Nel qual modo si avrà $\sqrt{a^3+b^3} = a + \frac{b^3}{2a} - \frac{b^4}{8a^4} + \frac{b^5}{16a^7} - \frac{5a^8}{128a^7} + \text{ec.}$

A R T I C O L O XIII.

Del calcolo delle quantità radicali, e immaginarie.

282. IL modo di ridurre le quantità radicali complesse alla più semplice espressione non è punto differente da quanto ho detto al num. 124. Come dovendosi ridurre alla più semplice espressione la quantità radicale $\sqrt{a^2b-ac} = \sqrt{a} \sqrt{b-c}$ si farà $a\sqrt{b-c}$: Così per ridurre alla più semplice espressione la quantità radicale $\sqrt{a^3+3a^2b+3b^2a+b^3} = \sqrt{a^3+2ab+b^2} \sqrt{a+b}$, si farà $a+o\sqrt{a+b}$. Ineffamente per ridurre alla più semplice espressione la quantità radicale $\sqrt[3]{a^3b^2c+a^2b^2d} = \sqrt[3]{a^3b^2} \sqrt[3]{c+d}$, si farà $ab\sqrt[3]{c+d}$. Per la stessa ragione farà $\sqrt{ab-ac} = \sqrt{a} \sqrt{b-c} = a^{\frac{1}{2}} \sqrt{b-c}$, ed $ab\sqrt{cb+db^2} = ab^2 + \frac{1}{2} \sqrt{c+db^2}$.

283. *Vice versa* si opererà per ridurre una quantità razionale sotto al vincolo.

284. Qui pure ha luogo la regola data al num. 132. per ridurre due, o più quantità radicali allo stesso esponente, o sia alla stessa denominazione: Come dovendosi ridurre allo stesso denominatore i due radicali $\sqrt[3]{ab+e}$, $\sqrt[3]{m-ce^2}$, si farà

$\sqrt[2 \times 3]{\frac{ab+e}{27}} = \sqrt[6]{\frac{ab+e}{27}}$, e $\sqrt[2 \times 3]{\frac{m-ce^2}{27}} = \sqrt[6]{\frac{m-ce^2}{27}}$. Ineffamente per ridurre allo stesso

stesso denominatore i due radicali $\sqrt[m]{a+c}$, $\sqrt[n]{ac+d}$, si farà $\sqrt[mn]{a+c}$, $\sqrt[mn]{ac+d}$.

285. Se i radicali da ridursi faranno più di due, dopo di avere ridotti i due primi, si dovranno essi ridurre col terzo nel modo stesso, che si riducono più frazioni alla stessa denominazione.

286. Che se di due radicali proposti da ridursi allo stesso denominatore uno avrà l'esponente, che sia divisore esatto dell'esponente dell'altro, in tal caso basterà considerare quest'altro, come il quoziente, che nasce dall'attuale divisione: Come do-

vendosi ridurre allo stesso denominatore i due radicali $\sqrt{a-c}$, $\sqrt[8]{cd+me}$, basterà considerare l'esponente del secondo radicale come 4, che nasce dal dividerli l'esponente 8, per l'esponente 2, e però i due radicali da ridursi faranno

$$\sqrt{a-c}, \sqrt[4]{cd+me}, \text{ che ridotti sono } \sqrt[8]{a-c}, \sqrt[8]{cd+me}.$$

287. Dovendosi sommare insieme più quantità radicali si scrivano una dopo l'altra coi propri segni; e dovendo sottrarne alcune da altre si scrivano pure una dopo l'altra, avvertendo però di cambiare nelle quantità da sottrarsi il segno prefisso al vincolo; nell'uno, e nell'altro caso poi se le quantità radicali sono comunicanti, cioè se sotto al vincolo v'è la stessa quantità, si facciano le convenienti riduzioni mediante la somma, o la sottrazione de' coefficienti. Ecco l'esempio

$$\begin{array}{r} \text{Quantità da sommarfi} \quad 2d\sqrt{a'b} - m + \sqrt[5]{ac^3+de} \\ - 5d\sqrt{a'b} + am - 3\sqrt[5]{ac^3+de} + \sqrt{bc} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Somma} \quad 2d\sqrt{a'b} - m + \sqrt[5]{ac^3+de} - 5d\sqrt{a'b} + am - \\ 3\sqrt[5]{ac^3+de} + \sqrt{bc} = -m - 3d\sqrt{a'b} + am - 2\sqrt[5]{ac^3+de} + \sqrt{bc}. \end{array}$$

288. Quanto alla sottrazione dovendosi sottrarre $-\sqrt[3]{bc^3} + ab + \sqrt{a'm-ad}$ da $2\sqrt[7]{ae+cf} + 2ab + \sqrt{a'm-ad}$, si farà

$$\begin{array}{r} 2\sqrt[7]{ae+cf} + 2ab + \sqrt{a'm-ad} \\ - \sqrt[3]{bc^3} + ab + \sqrt{a'm-ad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Residuo} \quad 2\sqrt[7]{ae+cf} + 2ab + \sqrt{a'm-ad} + \sqrt[3]{bc^3} - ab - \sqrt{a'm-ad} \\ = 2\sqrt[7]{ae+cf} + ab + \sqrt[3]{bc^3}. \end{array}$$

289. Nella moltiplicazione delle quantità radicali si regola egualmente come se fossero quantità razionali, se non che le quantità radicali da moltiplicarsi devono essere della stessa denominazione. Ecco l'esempio

Tom. II.

H

Mol-

$$\text{Moltiplicando} \quad 5\sqrt{em-d^2} + 2be - \sqrt{ac^3}$$

$$\text{Moltiplicatore} \quad 2\sqrt{ac^3} + 3\sqrt{bd-am^2}$$

$$\text{Prodotto} \quad 10\sqrt{ac^4m-ac^2d^2} + 4be\sqrt{ac^3-2ac^2} + 15\sqrt{bcdm-bd^2} \\ + 6be\sqrt{bd} - 3\sqrt{abc^2d} - 5am^2\sqrt{em-d^2} - 2abem^2 + am^2\sqrt{ac^3}.$$

290. Iteffamente nella divisione delle quantità radicali ha luogo la regola della divisione delle quantità razionali. Ecco l'esempio

Divisore	Dividendo
$\sqrt{e^1f} - 2\sqrt{ad}$	$3b\sqrt{e^1f} + \sqrt{cd^1e^1f} - \sqrt{ae^1fm} - 6b\sqrt{ad} - 2\sqrt{acd^2} + 2\sqrt{a^2dm}$
Quant. da sottrarsi	$3b\sqrt{e^1f} - 6b\sqrt{ad}$
Residuo primo ..	$+\sqrt{cd^1e^1f} - \sqrt{ae^1fm} - 2\sqrt{acd^2} + 2\sqrt{a^2dm}$
Quant. da sott.	$\sqrt{cd^1e^1f} - 2\sqrt{acd^2}$
Residuo secondo	$-\sqrt{ae^1fm} + 2\sqrt{a^2dm}$
Quant. da sott.	$-\sqrt{ae^1fm} + 2\sqrt{a^2dm}$
Residuo ultimo	$0 \qquad 0$
Quoziente	$3b + \sqrt{cd^1} - \sqrt{am}$

291. Qualora non si possa fare l'attuale divisione nel modo detto, devesi ella indicare collo scrivere il divisore sotto al dividendo separato da una linea: Come

$$\text{dovendosi dividere } \sqrt{ca-a^2b^2} + \sqrt{ad} \text{ per } \sqrt{ab+m^2}, \text{ si farà } \frac{\sqrt{ca-a^2b^2} + \sqrt{ad}}{\sqrt{ab+m^2}}.$$

292. Dovendosi dividere una quantità razionale per una radicale, o una radicale per una razionale, si regoli giusta il num. 153.

293. Quando o dalla moltiplicazione, o dalla divisione di quantità radicali risulta una tale quantità radicale, da cui levare si possa la radice indicata dall'esponente del vincolo, ciò si faccia.

294. Per elevare le quantità radicali a una cercata potestà devesi operare come se fossero quantità razionali: Così per inalzare al cubo il radicale $\sqrt[3]{ac-m}$ si farà $\sqrt[3]{a-m^3} = \sqrt[3]{a^3c^3-3a^2c^2m+3acm^2-m^3}$. Istessamente per inalzare al quadrato la quantità radicale $3\sqrt{bd}+5\sqrt{ac}-\sqrt{em}$ si farà

$$\text{Quantità data} \quad \left\{ \begin{array}{l} 3\sqrt{bd} + 5\sqrt{ac} - \sqrt{em} \\ 3\sqrt{bd} + 5\sqrt{ac} - \sqrt{em} \end{array} \right.$$

$$\text{Prodotti} \quad \left\{ \begin{array}{l} 9bd + 15\sqrt{abcd} - 3\sqrt{bdem} + 25ac - 5\sqrt{acem} + em \\ + 15\sqrt{abcd} - 3\sqrt{bdem} - 5\sqrt{acem} \end{array} \right.$$

Quadrato cercato

$$9bd + 30\sqrt{abcd} - 6\sqrt{bdem} + 25ac - 10\sqrt{acem} + em$$

295. Trattandosi di estrarre una cercata radice da una quantità radicale, si regoli giusta il num. 158 se la quantità proposta è tutta sotto un vincolo; o pure giusta il num. 159 se la quantità proposta è sotto diversi vincoli: Come dovendosi

estrarre la radice cuba da $\sqrt[3]{ac-b^3}$ si farà $\sqrt[3]{ac-b^3} = \sqrt[3]{ac-b^3}$. Istessamente

la radice n della quantità $\sqrt[n]{cd+a^n}$ farà $\sqrt[n]{cd+a^n} = \sqrt[n]{cd+a^n}$. La radice n

poi di $\sqrt[n]{bd^3} - \sqrt[n]{ac} + \sqrt[n]{ce-d^3}$ farà $\sqrt[n]{\sqrt[n]{bd^3} - \sqrt[n]{ac} + \sqrt[n]{ce-d^3}}$. A suo luogo esporrò la maniera di attualmente estrarre una cercata radice anche da queste quantità radicali.

296. Quanto alle quantità immaginarie si offervi, che non solo ogni radice pari di una quantità negativa è immaginaria, come $\sqrt{-b}$, ma lo è ancora l'aggregato di due quantità, una reale, e l'altra immaginaria, come $c + \sqrt{-b}$. Di fatto fingasi, che $c + \sqrt{-b}$ non sia quantità immaginaria, ma sia una reale eguale per esempio a d , farà $c + \sqrt{-b} = d$ per l'ipotesi: Ora perchè col sottrarsi una stessa quantità da quantità eguali i residui sono eguali (pel num. 45 del Tomo I.) se da ciascuna di queste quantità eguali si sottrarrà la quantità c , si avrà $c - c + \sqrt{-b} = d - c$, cioè $\sqrt{-b} = d - c$, e però una quantità immaginaria eguale ad una quantità reale, lo che è impossibile. Dunque l'aggregato di due quantità una reale, e l'altra immaginaria, è immaginario.

297. La somma, e la sottrazione delle quantità immaginarie complessive si farà giusta i num. 287, 288, avvertendo di farne la riduzione alla più semplice espressione, qualora sotto al vincolo vi siano quantità istesse. Ecco l'esempio.

H 2

Quan-

$$\begin{array}{rcl} \text{Quantità da sommarli} & \left\{ \begin{array}{l} 3\sqrt{-ac} + m^2 - 2\sqrt{-de} + \sqrt{-b} \\ -\sqrt{-ac} - a^2b + 2\sqrt{-de} + 4\sqrt{-b} \end{array} \right. & \\ \hline \text{Somma} & & 2\sqrt{-ac} + m^2 - a^2b + 5\sqrt{-b} \sqrt{-b} \end{array}$$

298. Dovendosi sottrarre $5\sqrt{-bd} - 7a^2c^3 - \sqrt{-a^2}$ da $5\sqrt{-bd} + 3cd^3 - \sqrt{-a^2}$ si farà

$$\begin{array}{r} 5\sqrt{-bd} + 3cd^3 - \sqrt{-a^2} \\ 5\sqrt{-bd} - 7a^2c^3 - \sqrt{-a^2} \\ \hline \text{Residuo.} \quad 3cd^3 + 7a^2c^3 \end{array}$$

299. Ecco come tanto mediante la somma, come mediante la sottrazione possono svanire o in parte, o in tutto le quantità immaginarie, restando sole quantità reali.

300. La moltiplicazione, e la divisione delle quantità immaginarie si fa colle stesse regole date per la moltiplicazione, e divisione delle quantità radicali, se non che rispetto ai segni da prefiggersi ai prodotti, o ai quozienti parziali devonsi regolare giusta i num. 168, 173. Ecco gli Esempi

$$\begin{array}{rcl} \text{Moltiplicando.} & 2\sqrt{-c^2} - a - d\sqrt{-b} & \\ \text{Moltiplicatore.} & ab\sqrt{-bd} + d\sqrt{-b} & \\ \hline \text{Prodotto.} & -2ab\sqrt{bc^2d} - a^2b\sqrt{-bd} + abd\sqrt{b^2d} - 2d\sqrt{bc^2} & \\ - a d \sqrt{-b} + b d^2, \text{ cioè} & -2abc\sqrt{bd} - a^2b\sqrt{-bd} + ab^2d\sqrt{d} - 2cd\sqrt{b} & \\ - a d \sqrt{-b} + b d^2. & & \end{array}$$

Altro Esempio

$$\begin{array}{rcl} \text{Moltiplicando.} & m^2 - a^2b - \sqrt{-c} & \\ \text{Moltiplicatore.} & m^2 + \sqrt{-c} - a^2b & \\ \hline \text{Prodotto.} & m^4 - a^2bm^2 - m^2\sqrt{-c} + m^2\sqrt{-c} - a^2b\sqrt{-c} & \\ + c - a^2bm^2 + a^2b^2 + a^2b\sqrt{-c}, \text{ cioè} & m^4 - 2a^2bm^2 + c + a^2b^2. & \end{array}$$

Esem-

Esempio della divisione

Divisore	Dividendo
$\sqrt{-cd} - 3\sqrt{-am}$	$5\sqrt{-bc^2d} - 15\sqrt{-abcm} + 2\sqrt{-acd} - 6\sqrt{-a^2m}$
Quantità da sottrarsi	$5\sqrt{-bc^2d} - 15\sqrt{-abcm}$
Residuo	$2\sqrt{-acd} - 6\sqrt{-a^2m}$
Quantità da sottrarsi	$2\sqrt{-acd} - 6\sqrt{-a^2m}$
Residuo	$0 \quad 0$

Quoziente $5\sqrt{bc} + 1\sqrt{a}$

Per fare questa divisione comincio a dividere il primo termine del dividendo $5\sqrt{-bc^2d}$, che confidero così $5\sqrt{-1} \times \sqrt{bc^2d}$ pel primo termine del divisore $\sqrt{-cd}$, che confidero così $\sqrt{-1} \times \sqrt{cd}$, dalla quale divisione si ha $5 \times 1 \times \sqrt{bc} = 5\sqrt{bc}$; poscia moltiplico questo quoziente nel divisore, e ne sottraggo il prodotto dal dividendo. Indi collo stesso metodo passo a dividere il primo termine del residuo pel primo termine del divisore, e così si continua l'operazione fino in ultimo.

301. Siccome dal dividerli una quantità immaginaria per un'altra si ha un quoziente reale (pel num. 174.), così *vice versa* dal dividerli una quantità reale per una immaginaria, o una quantità immaginaria per una reale, il quoziente risulterà immaginario. Ecco l'Esempio

Divisore	Dividendo
$\sqrt{-cd} - 3\sqrt{-am} + \sqrt{-a^2}$	$-3a\sqrt{cdm^3} + 3a\sqrt{am^4} - 3a\sqrt{a^2m^3} + 2\sqrt{-c^2d} - 6\sqrt{-acm} + 2\sqrt{-a^2c} + 5\sqrt{-abcd} - 15\sqrt{a^2bm} + 5\sqrt{a^2b}$
$-3a\sqrt{cdm^3} + 3a\sqrt{am^4} - 3a\sqrt{a^2m^3}$	$-3a\sqrt{cdm^3} + 3a\sqrt{am^4} - 3a\sqrt{a^2m^3}$
$0 \quad 0 \quad 0$	$+2\sqrt{-c^2d} - 6\sqrt{-acm} + 2\sqrt{-a^2c} + 5\sqrt{-abcd} - 15\sqrt{a^2bm} + 5\sqrt{a^2b}$
$0 \quad 0 \quad 0$	$+2\sqrt{-c^2d} - 6\sqrt{-acm} + 2\sqrt{-a^2c}$
$0 \quad 0 \quad 0$	$+5\sqrt{-abcd} - 15\sqrt{a^2bm} + 5\sqrt{a^2b}$
$0 \quad 0 \quad 0$	$+5\sqrt{-abcd} - 15\sqrt{a^2bm} + 5\sqrt{a^2b}$
$0 \quad 0 \quad 0$	$0 \quad 0 \quad 0$

Quoziente $3a\sqrt{-m^3} + 2\sqrt{c} - 5\sqrt{-ab}$

Per eseguire questa divisione comincio a dividere con $\sqrt{-cd} = \sqrt{-1} \times \sqrt{cd}$ primo termine del divisore il primo termine del dividendo $-3a\sqrt{cdm^3}$, che confidero così $-1 \times 3a\sqrt{cdm^3}$, e mi vic.

viene di quoziente $\sqrt{-1} \times 3\sqrt{-m} = 3\sqrt{-m}$, e questo stesso metodo of-
ferve per fare le altre susseguenti divisioni.

302. Dal secondo esempio della moltiplicazione si scorge, che dato un polino-
mio, in cui entri una quantità radicale, sia ella reale, o immaginaria, per far spa-
rire questo radicale basterà moltiplicare il dato polinomio in un altro, che non dif-
ferisca dal primo, se non nel segno prefisso al vincolo.

303. Si inalzerà a qualsivoglia potenza una proposta quantità immaginaria com-
plessa con moltiplicare tante volte in se stessa la detta quantità, quante unità con-
tiene l'esponente della potenza cercata diminuito di una unità.

304. Che se si dovrà estrarre una cercata radice da una quantità immaginaria
complessa, si faccia uso del vincolo universale.

305. Prima di terminare questo Articolo osserverò una cosa, ed è, che molti
Teoremi, i quali si dimostrano delle quantità reali, non hanno luogo nelle quan-
tità immaginarie: Per Esempio si dimostra, che la somma de' quadrati di due quan-
tità reali è maggiore del doppio del loro rettangolo, come essendo a, b le due
quantità, sarà $a^2 + b^2 > 2ab$, poichè di fatto la differenza tra la somma de' qua-
drati delle quantità date, e il doppio del loro rettangolo, essendo eguale al quadra-
to della differenza delle medesime quantità, siccome questa differenza è reale, e po-
sitiva, così tale sarà ancora il suo quadrato. Intendamente se faranno date tre quan-
tità, la somma de' loro quadrati sarà maggiore della somma de' loro ambi: Se le
quantità faranno quattro, la somma de' loro quadrati sarà maggiore di due terzi
della somma de' loro ambi ec. E questi Teoremi non solo sono veri mentre tutte le
date quantità reali sono positive, ma molto più se qualcuna sarà negativa, perchè
i loro quadrati saranno sempre positivi (pel num. 57.), laddove fra i loro ambi
ve ne faranno alcuni, che essendo affetti dal segno — diminuiranno la somma to-
tale. Ora questi Teoremi non hanno luogo nelle quantità immaginarie, come assai
chiaramente s'intende dall'osservare, che tutti questi Teoremi dipendono dal pri-
mo, la di cui dimostrazione esige, che il quadrato dell'una, e dell'altra parte sia
positivo.



C A P O II.

DELLA MANIERA DI USARE IL CALCOLO ALGEBRAICO
NELLA SOLUZIONE DE' PROBLEMI.

A R T I C O L O I

Del modo di esprimere algebricamente i Problemi; delle equazioni di primo grado, e della loro risoluzione.

306. **A**bbiamo veduto ai num. 3, 40, e 55, che l'Algebra mediante le combinazioni, e il calcolo delle quantità rappresentate con segni più universali, che i numeri, quali appunto sono le lettere dell'Alfabeto, serve ad abbreviare, e facilitare le operazioni Aritmetiche: Questo però è il minore vantaggio, che noi riportiamo dall'Algebra. L'uso, che principalmente se ne fa, e a cui è ordinato il metodo generale di calcolare già esposto, ha luogo (lo che ora sono per isplanare) nelle quistioni, o sia ne' Problemi complicati, nella soluzione de' quali entrano certi rapporti, e certe combinazioni, che racchiudono non meno le quantità date, che le cercate. L'Algebra pertanto ci somministra la maniera di fare queste combinazioni senza conoscere le quantità, che si cercano, e di maneggiare con tal arte, e maestria tanto le quantità cognite, come le incognite, così che mediante le cognite si venga a scuoprire i valori di quelle, che erano incognite.

307. Tutto l'artificio consiste in supporre come cognita la quantità, che si cerca, e denominandola con una lettera dell'Alfabeto paragonarla per tal maniera colle altre quantità cognite denominate parimente con lettere dell'Alfabeto, così che mediante o la somma, o la sottrazione, o la moltiplicazione, o la divisione, o l'estrazione delle radici, si giunga a scuoprire l'eguaglianza, che ha la quantità incognita alle cognite, con che vien si a determinare il ricercato valore dell'incognita. Questo metodo poi di risoluzione, con cui nello sciogliere i Problemi si passa dalle cose cercate alle già date, e cognite, è quello, che propriamente dà all'Algebra il nome d'Analisi: Poichè quantunque si possano chiamare operazioni analitiche la sottrazione, la divisione, e l'estrazione delle radici, risolvendosi per loro mezzo quello che aveva composto l'addizione, la moltiplicazione, e la formazione delle potestà, pure soltanto le accennate operazioni sogliono passare sotto nome d'Analisi, in quanto che la loro composizione essendo più intralciata, la risoluzione n'è perciò più rilevante.

308. Def. 1. Il Problema, come si è detto al num. 59 del Tomo I., è una proposizione, in cui si dimanda di fare, o di sapere alcune cose per mezzo di certe condizioni, o altre cose già date, che chiamansi i dati del problema, siccome le

co-

cofe, che cercanfi, fi dicono i quefti. Quefte condizioni efprimono, e fomminiſtrano le relazioni, che hanno fra loro le quantità cognite, e le incognite, o ſia cercate, le quali relazioni rappreſentate algebricamente vengono a formare quella legge di rapporto, che chiamati Equazione.

309. Qualora pertanto trattafi di riſolvere algebricamente un Problema più coſe devonfi fare: La prima, e principale ſi è di prendere una chiara, e diſtinta cognizione di ciò, che è dato, e di ciò, che ſi cerca, diſtinguendo cioè i dati dai queſiti, e formando una giuſta idea delle condizioni propoſte: La ſeconda è di denominare, ed efprimere con lettere convenienti le differenti quantità, tanto date, che cercate: La terza è di ridurre il Problema in equazione mediante le condizioni propoſte: La quarta è la riduzione dell'equazione alla forma più ſemplice: l'ultima finalmente conſiſte nella riſoluzione di queſta equazione, lo che ſi ottiene con ritrovare l'eguaglianza tra le quantità date, e la cercata, con che vienſi a determinarne il valore. Ma affinché la dottrina rieſca più evidente, e palpabile ſpiegherò coll'Eſempio ad una ad una le eſpoſte regole.

310. Prob. 1. Cercafi di quante doppie foſſe l' Aſſe di un Padre, che venuto a morte, dopo avere diſpoſto di 1200 doppie per l'anima ſua, laſciò eredi tre ſuoi figliuoli, due maschi, e una femmina, con queſta legge, che il primo maschio dovette toccare la metà del ſuo Aſſe, cinque dicioteſimi al ſecondo, e un quinto alla femmina. Per venire alla cercata ſoluzione oſſervo prima di tutto quai ſiano i dati in queſto Problema, e che coſa ſia ciò, che ſi cerca, e veggo, che una ſola coſa ſi cerca, ed è l'intero Aſſe di queſto Padre; i dati poi ſono 1200 doppie, più una metà dell'Aſſe, più un di lui quinto, più cinque dicioteſimi. Preſo in queſto modo una giuſta idea dello ſtato del Problema, paſſo a fare la conveniente denominazione delle quantità, che in eſſo hanno luogo, e però ſupponendo come incognito l'Aſſe cercato, lo chiamo $= x$; dico $= x$ le 1200 doppie, e perchè ho fatto $= x$ l'Aſſe, farà una metà dell'Aſſe $= \frac{x}{2}$, cinque dicioteſimi faranno $= \frac{5x}{18}$, e un quinto farà $\frac{x}{5}$, nel qual modo le denominazioni fatte

corriſpondono alle relazioni, che oſſervano le quantità propoſte. Fatto ciò debbo paſſare all'equazione, la quale non è altro, che un rapporto d'eguaglianza, che hanno fra loro due, o più quantità differentemente denominate, o che hanno col zero, ſe ad eſſo ſi paragonano, e queſta equazione ſi troverà facilmente, niente altro a tale effetto richiedendofi, che mettere in linguaggio algebrico la condizione propoſta, cioè che l'Aſſe cercato ſia eguale a una di lui metà, più cinque dicioteſimi, più un quinto, più 1200, così $x = \frac{x}{2} + \frac{5x}{18} + \frac{x}{5} + 1200$. Reſta finalmente da ridurre queſta equazione alla forma più ſemplice, e da riſolverla, lo che ſi ottiene con fare, che da una parte del ſegno d'egualità reſti ſola la x quantità cercata, e dall'altra parte ſi trovino ſole quantità cognite. Ora per ſeparare le quantità cognite dall'incognita, o dalle incognite ſervono le operazioni di ſommare, ſottrarre, moltiplicare, dividere, eſtrarre radici, e inalzare a poteſtà.

311. La ſomma, e la ſottrazione hanno luogo quando ſi deve trasferire qualche termine da un membro all'altro dell'equazione (chiamanſi membri dell'equazione le quantità incomplete, o compleſſe, che ſono avanti, e dopo il ſegno $=$), aggiungendo cioè ad ambidue i membri dell'equazione quel termine, che ſi vuol trasferi-

ferire, se egli è affetto dal segno $-$, o pure levandolo da ambi i membri, se egli è affetto dal segno $+$, e in questo modo mediante la contrarietà de' segni tale termine svanirà da quel membro, in cui ritrovavasi, e comparirà nell' altro membro con segno mutato. Questa operazione chiamasi trasposizione, la quale non altera punto l' equazione, mentre (pel num. 45. del Tomo 1.) se a quantità eguali si aggunderanno, o dalle medesime si leveranno una, o più quantità eguali, le quantità, che nel primo, e nel secondo caso risulteranno, faranno eguali: Onde nella precedente equazione per mettere da una sola parte dell' equazione tutti i termini,

in cui entra l' incognita, si incominci dal termine $\frac{x}{2}$, quale per essere affetto dal segno $+$ si sottragga da ambi i membri, e si avrà $x - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} - \frac{x}{2} + \frac{5x}{18} + \frac{x}{5} + a$, cioè $x - \frac{x}{2} = \frac{5x}{18} + \frac{x}{5} + a$; poscia la stessa operazione si ripeta rispetto ai termini $+\frac{5x}{18} + \frac{x}{5}$, e si avrà $x - \frac{x}{2} - \frac{5x}{18} - \frac{x}{5} = a$.

312. Si vede pertanto, che ogniquale volta si voglia trasferire qualche termine da un membro all' altro dell' equazione, basterà senza intituire l' addizione, o la sottrazione, scrivere tale termine col segno mutato in quel membro, a cui si vuol trasferire. Per lo che si potrà sempre a piacere rendere positivo un qualche termine, che sia negativo, o renderlo negativo, se egli è positivo. Si potranno in oltre trasferire tutti i termini a una sola parte dell' equazione, lo che dicei eguagliare a zero, mentre in questo caso la collezione di tutti i termini risulta eguale a zero: Di fatto se da una quantità se ne sottrarrà un' altra a lei eguale, il risultato sarà zero, e però l' equazione precedente eguagliata a zero è $x - \frac{x}{2} - \frac{5x}{18} - \frac{x}{5} - a = 0$.

313. Se adunque nell' uno, e nell' altro membro dell' equazione si troverà lo stesso termine affetto dal medesimo segno, si potrà cancellarlo da ambi i membri senza turbare l' eguaglianza, poichè se da un membro si trasferisse all' altro, egli svanirebbe per la contrarietà de' segni.

314. Si fa uso della moltiplicazione, o della divisione, quando in uno stesso termine è congiunta la quantità incognita con una, o più cognite. Se sono congiunte per mezzo della moltiplicazione, così che l' incognita abbia coefficiente, se ne deve ella liberare mediante la divisione, dividendo cioè con tale coefficiente tutti gli altri termini dell' equazione. Se sono congiunte per mezzo della divisione, così che l' incognita abbia qualche divisore, se ne dovrà ella liberare mediante la moltiplicazione, moltiplicando cioè con tale divisore tutti gli altri termini dell' equazione. Queste due operazioni poi non alterano l' eguaglianza, mentre egli è Assioma, che se quantità eguali si moltiplicheranno, o si divideranno per una stessa quantità, o per quantità eguali, tanto i prodotti, come i quozienti saranno eguali.

315. Or ecco come devei applicare questa regola alla nostra equazione: $x - \frac{x}{2} - \frac{5x}{18} - \frac{x}{5} = a$. Primieramente bisogna liberare dai denominatori i termini in cui entra l' incognita, lo che faccio cominciando dal termine $\frac{x}{2}$, col di cui

denominatore 2 moltiplico tutti gli altri termini dell'equazione, e mi viene $2x - x - \frac{10x}{18} - \frac{2x}{5} = 2a$; poscia passo al termine $\frac{10x}{18}$, e col suo denominatore 18 moltiplico tutti gli altri termini dell'equazione, dal che risulta $36x - 18x - 10x - \frac{36x}{5} = 36a$: Finalmente colla stessa maniera libero dal divisore il termine $\frac{36x}{5}$, con che si ha l'equazione libera dalle frazioni così $180x - 90x - 50x - 36x = 180a$, e perchè $-90x - 50x - 36x = -176x$, e $180x - 176x = 4x$, però l'equazione proposta trovata ridotta a $4x = 180a$, nella quale resta per ultimo da liberare l'incognita, mediante la divisione, dal coefficiente 4 così $x = \frac{180a}{4}$, cioè (fatta l'attuale divisione) $x = 45a$, e rimettendo in luogo di a il suo valore 1200, si avrà $x = 54000$, che è l'Atte cercato. Per mettere sempre più sotto gli occhi le regole esposte, e renderne così più famigliare la pratica, proporrò un altro Esempio.

Prob. 2. Essendosi data a censo una certa somma di denaro, cercasi quanto si avrà d'interesse dopo un dato tempo, e però a quanto monterà dopo un dato tempo l'aggregato del capitale, e dell'interesse o sia frutto.

Risol. Nella denominazione delle quantità, che entrano nel calcolo, mi servirò delle loro lettere iniziali, e però dirò $=c$ il capitale, il tempo $=t$, la somma del capitale, e del frutto, che ricavasi dopo il dato tempo t , $=s$, il numero arbitrario, come 100, su cui si regola il frutto, $=a$, il frutto, che su questo numero si ricava, $=f$. Ciò posto determino primieramente il frutto, che rende in un anno il capitale, così $a : f :: c : \frac{cf}{a}$. Dunque il frutto, che rende il capitale in un

anno è $\frac{cf}{a}$; se pertanto si moltiplicherà questo frutto annuo per t numero del tempo dato, si avrà $\frac{cft}{a}$ frutto, che ricavasi dal capitale dopo il tempo t : che se finalmente a questo frutto si aggiungerà il capitale, si avrà $c + \frac{cft}{a} = s$ equazione cercata.

Ora che si è trovato il valore di t , supponiamo che dei cinque elementi, che entrano in questa equazione, uno dopo l'altro sia incognito, e debbasi determinare, restando cogniti gli altri quattro; e primieramente debbasi determinare il capitale. Riducendo tutti i termini dell'equazione allo stesso denominatore si avrà $ac + cft = as$, e dividendo l'uno, e l'altro membro per $a + ft$, ne verrà $t = \frac{as}{a + ft}$. Si debba determinare il tempo: Prendo l'equazione $ac + cft = as$, trasporto il termine ac così $cft = as - ac$, poscia divido l'uno, e l'altro membro per cf , ed ho $t = \frac{as - ac}{cf}$. Si debba determinare il frutto: Prendo l'equazione $cft = as - ac$, e dividendo l'uno, e l'altro membro per ct , mi viene $f = \frac{as - ac}{ct}$. Finalmente per determinare il numero arbitrario a , su cui si regola l'interesse, preda-

prendo l'equazione $efi = at - ac$, e dividendo l'uno, e l'altro membro per $t - c$ mi viene $\frac{efi}{t-c} = a$.

Per venire al caso particolare sia $c = 14900$ lire, $t = 24$, $a = 100$, $f = 6$, farà $t = 14900 + \frac{14900 \times 24 \times 6}{100} = 14900 + 149 \times 24 \times 6 = 14900 + 21456 = 36356$. Ritenuti gli stessi valori se si supponrà incognito il tempo, si avrà $t = \frac{100 \times 36356 - 100 \times 14900}{14900 \times 6} = \frac{2145600}{89400} = 24$ ec.

316. Quando vi siano più frazioni da togliersi, come nell'equazione del Prob. 1. si opererà più speditamente con moltiplicare tutti i termini dell'equazione col prodotto de' denominatori, lo che fatto devesi sopprimere il comune denominatore.

317. Def. 2. Quelle equazioni, in cui l'incognita ascende a una sola dimensione, si dicono equazioni semplici, o di primo grado.

318. Def. 3. Radice dell'equazione è quella quantità, che sostituita nell'equazione in luogo dell'incognita fa verificare l'equazione, vale a dire, che i suoi due membri siano eguali, e conseguentemente, che il loro aggregato, mediante lo scambievole distruggersi de' termini, sia uguale a zero: Per lo che la radice della proposta equazione è 54000, cui si è trovata uguale l'incognita x , mentre col sostituirsi 54000 trovato al num. 315. in luogo di x nell'equazione $4x = 180a$, o sia $4x = 180 \times 1200$, si ha $4 \times 54000 = 180 \times 1200$, o sia $216000 = 216000$, e però $216000 - 216000 = 0$. Se la quantità, che fa verificar l'equazione è positiva, la radice dell'equazione diceasi vera, o positiva; se è negativa, la radice diceasi falsa, o negativa. Il ritrovare poi la radice dell'equazione chiamasi risolvere l'equazione.

319. Ho detto al num. 307., che devonsi denominare colle lettere dell'Alfabeto le quantità cognite, e le incognite, ciò però devesi fare con qualche regola a fine di non confondere le une colle altre; per lo che si è convenuto tra gli Algebristi di esprimere le quantità cognite colle prime lettere a, b, c , ec., e le incognite colle ultime x, y, z, u .

320. Dal num. 312. costa, che si possono cambiare tutti i segni ai termini di una equazione, senza che se ne alteri l'eguaglianza: Onde la precedente equazione si può rappresentare tanto così $x - \frac{x}{2} - \frac{5x}{18} - \frac{x}{5} - a = 0$, come così $-x +$

$\frac{x}{2} + \frac{5x}{18} + \frac{x}{5} + a = 0$. Non però tale cambiamento si può fare rispetto all'espressione per Elenpio $x > 2m - n$, senza che parimente si cambi il segno $>$ in $<$; poichè se non si mutasse il segno $>$, col mutare i segni prefissi alle quantità, che gli stanno avanti, e dopo, ne nascerebbe un assurdo che sarebbe cioè tanto $-x > 2m + n$, come $-2m + n > -x$. Di fatto $-x > -2m + n$ risulta dal cambiare i segni all'espressione $x > 2m - n$ senza mutarci il segno $>$ in $<$, e in oltre si ha $-2m + n > -x$ con aggiungere primieramente ad ambe le parti $+n$ nell'espressione $x > 2m - n$, con che si ha $x + n > 2m - n + n$, cioè $x + n > 2m$, indi con sottrarre x da ambe le parti così $x - x + n > 2m - x$, cioè $n > 2m - x$, e finalmente con sottrarre $2m$ da ambe le parti, così $-2m + n > 2m - 2m - x$, cioè $-2m + n > -x$. Ma egli è assurdo, che sia nello stesso tempo $-x > -2m + n$, e $-2m + n > -x$, dunque non si possono mutare i segni alle quantità

dell'espressione $z > 2m - n$, senza che si cambi pure il segno $>$ in $<$. Lo stesso si dica se l'espressione fosse stata $z < 2m - n$.

321. Quando i Problemi da risolversi vengono proposti colle condizioni, che immediatamente portano alla equazione, la loro soluzione è facilissima, bastando ridurli dal linguaggio comune a linguaggio algebrico, vale a dire bastando esprimere con segni algebrici le nostre idee su i rapporti delle quantità, che entrano nel Problema. Ma non sempre coi Problemi vengono proposte le condizioni necessarie, essendovene molti, anzi moltissimi (e tali in buona parte sono i Problemi Fittici), i quali si propongono nudamente senza alcuna condizione; ma deve l'Algebrista da altre cognizioni filiche ricavarne le condizioni opportune, che alla bramata soluzione lo conducano. L'Esempio fornirà un'idea generale di questi Problemi, e del modo, che devesi tenere nella loro soluzione.

322. Prob. 3. Avendosi una corona mista d'oro, e d'argento, cercasi la quantità dell'uno, e dell'altro metallo, di cui è composta.

323. Rifol. Questo è il famoso Problema, che propose Jerone Re di Siracusa ad Archimede. Aveva egli ordinata a un Artefice una corona d'oro, e al solo vederla sospettando, che vi fosse mescolato dell'argento più di quello richiede la lega, fece chiamare a se Archimede, cui ordinò di scuoprire l'inganno; su di che meditò lungo tempo il Geometra, ma indarno, quando a caso, essendo un giorno nel bagno, osservò, che il suo corpo nell'acqua perdeva una quantità del suo peso eguale al peso di un simile volume d'acqua, dal che ravvisando egli poterne dedurre la soluzione del proposto Problema, trasportato dal giubilo si mise a correre nudo, come era, per le strade di Siracusa gridando *Eureka*, cioè *L'ho trovato*. Ora fu la fatta osservazione si mise egli a raziocinare così: Poichè ogni corpo immerso nell'acqua perde una certa porzione del suo peso, e lo stesso corpo comunque cambi figura, purchè conservi lo stesso volume, perde sempre la stessa quantità di peso, però se la corona è di oro puro, basterà prendere una massa d'oro puro, che essendo dello stesso peso della corona, gli farà ancora eguale in volume, e immergendo queste due masse nell'acqua perderà l'una, e l'altra lo stesso peso: Che se nella corona coll'oro v'è mescolato dell'argento, in tal caso la massa d'oro puro eguale di peso alla corona gli farà inferiore nel volume, poichè l'oro tra tutti i metalli contiene più di materia sotto un minor volume, e però immersa nell'acqua la massa d'oro puro perderà meno del suo peso, che la corona; prendendo poi una massa d'argento puro eguale in peso alla corona, gli farà maggiore in volume, e conseguentemente immersa nell'acqua perderà più di peso. Ora supposte queste notizie, ed essendo cognito tanto il peso della corona, come il peso che ella perde immersa nell'acqua, e in oltre essendo cognito il peso, che perde la già detta massa tanto d'oro come d'argento immersa nell'acqua, veniamo alla soluzione generale del proposto Problema.

324. Sia $= a$ il peso della corona, e il peso, che ella perde nell'acqua si dica $= b$; il peso, che perde nell'acqua la detta massa d'oro si chiami $= c$, e il peso, che perde la massa d'argento $= d$. Sia $= x$ la quantità incognita dell'oro, che entra nella corona, farà $= a - x$ la quantità d'argento mescolata coll'oro: E perchè come sta il peso della corona al peso di quella quantità d'oro, che v'è mescolata, così sta il peso c , che perde nell'acqua la massa d'oro al peso, che perde nell'acqua la mescolata quantità d'oro, cioè in linguaggio algebrico $a : x ::$

$c : \text{al quarto termine, però farà } \frac{cx}{a}$ il peso, che perde nell'acqua la quantità d'oro

ro x : Iſteſſamente ſtando il peſo della corona al peſo della quantità d'argento, che v'è meſcolata, come ſta il peſo d , che perde nell'acqua la maſſa d'argento al peſo, che perde nell'acqua la meſcolata quantità d'argento, cioè in linguaggio algebratico $a : a - x :: d :$ al quarto termine, farà $\frac{ad - dx}{a}$ il peſo, che perde nell'

acqua la meſcolata quantità d'argento $a - x$. Ma il peſo, che perde nell'acqua la quantità d'oro x più il peſo, che perde nell'acqua la quantità d'argento $a - x$ è eguale al peſo, che perde nell'acqua la corona, però l'equazione, che porta alla ſoluzione del

Problema farà $\frac{cx}{a} + \frac{ad - dx}{a} = b$, per riſolvere la quale comincio a liberare il primo

membro dal denominatore a , e ciò ottengo moltiplicando collo ſteſſo l'altro membro, con che ho $cx + ad - dx = ab$. Ora perchè il peſo d , che perde nell'acqua la maſſa d'argento è maggiore del peſo, che perde nell'acqua tanto la corona, come la maſſa d'oro, perchè ſotto a uno ſteſſo peſo la maſſa d'argento ha un maggior volume, perciò a fine di rendere poſitivo il termine dx , lo traſporto dall'altra parte del ſegno d'egualità facendo $cx + ad = ab + dx$. In oltre per mettere da una ſola parte del ſegno d'egualità tutti i termini, ne quali entra l'incognita x , e dall'altra tutti i termini cogniti, traſporto al di là il termine cx , e al di quà il termine ab , con

che ho $ad - ab = dx - cx$, cioè (perchè $ad - ab = a \times \overline{d-b}$, e $dx - cx = x \times \overline{d-c}$) $a \times \overline{d-b} = x \times \overline{d-c}$: Per lo che null'altro più rimane a fine di laſciare la incognita x ſola da una parte del ſegno d'egualità, che liberarla dal ſuo ſettore $d - c$, perciò con queſto ſettore divido l'altro membro dell'equazione, e ho

finalmente $a \times \frac{\overline{d-b}}{\overline{d-c}} = x$. Ed ecco con ſole quantità cognite eſpreſſo il valore dell'incognita x , che eſprime il peſo della quantità d'oro miſto nella corona, lo che ſi cercava. Che ſe nell'eſpreſſione $a - x$, che dà il peſo dell'argento meſcolato,

ſi ſoſtituirà in luogo di x il ſuo pur ora ritrovato valore ſi avrà $a - a \times \frac{\overline{d-b}}{\overline{d-c}}$, che è il ricercato peſo dell'argento meſcolato, cioè, riducendo allo ſteſſo denominatore, $ad - ac - ad + ab$, vale a dire $ab - ac = a \times \overline{b-c}$.

325. Si oſſervi l'artificio uſato nel denominare l'incognito peſo dell'argento, che entra nella compoſizione della corona, eſſendoli prevalſo dell'incognita già aſſunta ſenza introdurne alcun'altra, e ciò con oſſervare, che ſe dal peſo della corona ſi leverà il peſo dell'oro, il reſiduo farà il peſo dell'argento, che entra nel miſto, eguale perciò ad $a - x$. E ciò ſerva di regola per infiniti altri caſi.

326. Eſſendoci ritrovata l'equazione $a \times \overline{d-b} = x \times \overline{d-c}$, farà (pel num. 491. del Tomo I.) $d - c : d - b :: a : x$; cioè ſtarà la differenza, che paſſa tra il peſo d , che perde nell'acqua la maſſa d'argento, e il peſo c , che perde nell'acqua la maſſa d'oro, alla differenza, che paſſa tra il peſo, che perde nell'acqua la maſſa d'argento, e il peſo, che perde nell'acqua la corona, come ſta il peſo della corona al ricercato incognito peſo dell'oro, che v'è meſcolato.

327. Ma per paſſare dalla generalità al caſo particolare ſupponiamo, che la propoſta corona peti 7 libbre: Si ſa dalla Fiſica, che la gravità ſpecifica dell'oro fino

fino viene espressa da questo numero 19539, quella dell'argento fino da 10534, e quella dell'acqua da 1000: Si fa in oltre, che come sta la gravità specifica di un solido alla gravità specifica di un fluido, così sta il peso di tale solido alla porzione di peso, che egli perde qualora è immerso in questo fluido: Onde per sapere quanto di peso perda nell'acqua la massa d'oro eguale in peso alla corona, si farà come 19539 gravità specifica dell'oro a 1000 gravità specifica dell'acqua, così 7 peso

della massa d'oro al quarto termine, che trovasi essere $\frac{7000}{19539}$, peso, che perde la detta massa d'oro nell'acqua: Colla stessa maniera si troverà, che il peso perduto nell'acqua dalla massa d'argento eguale in peso alla corona viene espresso da $\frac{7000}{10534}$.

Ma perchè (pel num. 455. del Tomo 1.) le frazioni, che hanno lo stesso numeratore stanno fra loro in ragione reciproca de' denominatori, perciò la porzione di peso perduta nell'acqua dalla massa d'oro verrà espressa dal numero 10534, quella che si perde dalla massa d'argento dal numero 19539, e quella che si perde dalla corona dal numero $\frac{294054}{21}$: Per lo che sarà $a=7$, $d=19539$, $b=\frac{294054}{21}$, $c=$

10534, e sostituendo questi valori nella ritrovata equazione $a \times \frac{d-b}{a-c} = x$, ella si

cambierà in quest'altra $7 \times \frac{19539 - \frac{294054}{21}}{19539 - 10534} = x = \frac{7 \times \frac{12419 - 294054}{21}}{19539 - 10534} = \frac{7 \times 118365}{21 \times 9105} = 4 \frac{1}{3}$, e però la quantità d'oro mescolata nella corona è di libbre $4 \frac{1}{3}$, conse-

guentemente la quantità dell'argento è di libbre $2 \frac{2}{3}$, perchè $7 - 4 \frac{1}{3} = 2 \frac{2}{3}$.

328. Nella risoluzione delle equazioni s'incontrano non solo radici positive, ma ancora negative: Queste radici negative poi ci rendono avvertiti (giusta il num. 16.), che si è fatta qualche falsa supposizione nella enunciazione del Problema. Per rendere ciò manifesto coll' Esempio sia da risolversi il seguente

329. Prob. 4. Essendo entrati in società tre Mercanti con 1500 Filippi cercasi quale esser debba il loro guadagno, affinchè in capo al primo anno terminando la società gli possano toccare per cadauno 398 Filippi.

330. Risol. La cosa, che in questo problema si cerca, è il guadagno, che debbono fare in un anno questi tre Mercanti, quale guadagno si chiami $= x$. Due sono i dati, cioè il capitale di 1500 Filippi, che dico $= a$, e i 398 Filippi, che a ciascuno toccar devono alla fine del primo anno, quali chiamo $= b$. Una sola è la condizione proposta, cioè che il capitale a più il guadagno x divisi per 3 lascino un quoziente eguale a b , con che si ha l'equazione $\frac{a+x}{3} = b$, la quale porta alla soluzione cercata. Si liberi pertanto il primo membro dal denominatore 3, e si avrà $a+x=3b$: Si trasporti all'altro membro la quantità a , e ne verrà $x=3b-a$, che è l'equazione già risolta. Si rimettano adito in luogo di a , e di b i suoi valori, e si avrà $x=3 \times 398 - 1500$, cioè $x=1194 - 1500 = -306$

radice negativa, la quale dà a vedere, che è stato proposto malamente il Problema, mentre in vece di cercare quale dovesse essere il loro guadagno, si doveva cercare quale dovesse essere la loro perdita, affinchè dopo il primo anno dividendosi il capitale rimasto gli potessero toccare 398 Filippi per uno. Di fatto da 1500 levandosi 306 restano 1194, che divisi per 3 lasciano 398. Siccome quando tutte le radici di una equazione sono negative, ciò vuol dire, che il Problema è stato falsamente proposto, nel qual caso emendando l'enunciazione le radici risulteranno positive; così quando le radici sono in parte positive, e in parte negative, ciò dà a vedere che il Problema è stato enunciato in parte giustamente, e in parte falsamente, ma implicitamente, nel qual caso comunque si cambi l'enunciazione del Problema, non si potranno mai evitare le radici negative, mentre colle cose cercate si mescola una questione straniera, che non è possibile di evitare avvegnachè dal calcolo stesso venga introdotta.

331. I Problemi, che fino ad ora ho preso a risolvere sono stati tali che ammettevano una sola condizione, la quale portava tolto all'equazione finale: ma di tale natura non sono tutti i Problemi, essendovene molti, anzi moltissimi, che involgono più condizioni, di cui ciascuna porta a una equazione peculiare, dalle quali poscia hasiene a ricavare l'equazione finale, che scioglie il dato Problema. Per lo che sotto due punti di vista si possono considerare le equazioni: O come conclusioni ultime, alle quali si arriva nello sciogliere il Problema: o come mezzi e quali si giunge all'equazione finale. Le equazioni del primo genere contengono una sola incognita, come abbiamo veduto: le equazioni del secondo genere hanno più incognite; ma queste equazioni devonosi talmente maneggiare, e paragonare tra loro, che facciano svanire tutte le incognite a riserva d'una, ne risulti da tutte una sola equazione.

332. Per ritrovare le equazioni particolari niente altro debbesi fare, che ridurre a espressione algebrica le condizioni proposte nel Problema.

333. Se quante sono le condizioni date nel Problema altrettante sono le incognite, o sia le cose cercate, il Problema dicesi determinato: Siccome equazione determinata dicesi quella, in cui entra una sola incognita.

334. Ho detto, che per risolvere il Problema fa di mestieri dedurre dalle equazioni peculiari esprimenri le condizioni date una sola equazione, che contenga soltanto una incognita, e di ciò la ragione si è, perchè queste equazioni particolari non comprendono per ciascuna il Problema, che in parte, avvegnachè siano dedotte da quelle condizioni, che separatamente sonosi ridotte al calcolo; laddove poi quando si riducono tutte queste particolari equazioni a una sola, che contenga una sola incognita, tale equazione inchiuderà tutte le condizioni, e però i valori dell'altre incognite, conseguentemente comprenderà tutto il Problema.

335. Resta ora da esporre il metodo di ridurre più equazioni all'equazione finale mediante il farne sparire tutte le incognite a riserva d'una, lo che farò col seguente Esempio.

336. Prob. 5. Dovendosi fare una statua di 17 libbre di peso composta di due metalli, cioè d'Argento, e di Rame, de' quali il primo vale 38 lire alla libbra, e il secondo ne vale 7: Cercasi la quantità dell'uno, e dell'altro metallo da mescolarsi, affinchè ne risulti un composto, che vaglia 29 lire alla libbra.

337. Risol. Si chiamino $= a$ le 17 libbre, che pesa la statua, si facciano $= x$ le 38. lire, che vale l'argento alla libbra, si dicano $= b$ le 29 lire, che deve costare ogni libbra di misto, siano $= d$ le 7 lire, che vale il rame alla libbra, sa-

rà $= ab$ l'intero prezzo della statua. La quantità dell'argento, che deve entrare nel misto si ponga $= x$, e la quantità del rame $= y$. Perchè una condizione proposta nel Problema si è, che la quantità dell'argento, e del rame, che deve formare la statua, ascenda a 17 libbre, però tale condizione somministrerà l'equazione $x + y = a$. Oltre questa condizione poi ve n'è un'altra, cioè che la somma de' valori dell'uno, e dell'altro metallo, che compone la statua, sia eguale ad ab . Determiniamo adunque il valore di x , e il valore di y , indi facciamone la somma $= ab$. Per avere il valore di x si offervi, che come sta una libbra d'argento alla quantità x , così stà 38 prezzo di una libbra d'argento al prezzo di x , cioè $1 : x :: c : a$; al quarto, che è cx valore della quantità d'argento x : Nella stessa maniera si troverà essere dy il valore della quantità di rame y : Ma perchè la somma di questi due valori deve essere eguale ad ab , però si ha la seconda equazione $cx + dy = ab$. Ora somministrando questo Problema due equazioni, e due incognite, egli è determinato. Mediante poi queste due equazioni $x + y = a$, $cx + dy = ab$ si farà sparire un' incognita, per Esempio la y , in questo modo. Si ricavi dall'una, e dall'altra equazione il valore di y (non considerando la x come incognita, ma trattandola a modo dell'altre cognite) giusta il num. 315, e dalla prima equazione si avrà $y = a - x$, dalla seconda $y = \frac{ab - cx}{d}$; e perchè questi so-

no valori di una stessa incognita y , essi sono eguali, però farà $a - x = \frac{ab - cx}{d}$, cioè $ad - dx = ab - cx$, equazione, che comprendendo le condizioni proposte, include una sola incognita. Si risolverà poi questa equazione al solito, trasponendo da una sola parte del segno d'uguaglianza tutti i termini, in cui entra la incognita x , e dall'altra parte tutti i termini cogniti. e si avrà $cx - dx = ab - ad$,

o sia $x \times \overline{c-d} = a \times \overline{b-d}$, e però $x = a \times \frac{\overline{b-d}}{\overline{c-d}}$. Se pertanto in luogo

di b, c, d si sostituiranno i loro valori, si avrà $x = 17 \times \frac{29-7}{38-7} = 17 \times \frac{22}{31} = 12 \frac{2}{31}$ numero delle libbre di argento, che devono entrare nel misto. Che se questo valore, o sia peso dell'argento $12 \frac{2}{31}$ si sostituirà nell'equazione $x + y = a$ in luogo di x , si avrà $12 \frac{2}{31} + y = a$, conseguentemente $y = a - 12 \frac{2}{31}$, cioè, sostituendo il valore di a , $y = 17 - 12 \frac{2}{31} = 4 \frac{29}{31}$, che è la quantità del rame ricercata.

338. Dall'equazione $x \times \overline{c-d} = a \times \overline{b-d}$ si ricava $c-d : b-d :: a : x$, vale a dire come sta la differenza tra il prezzo dell'argento, e il prezzo del rame alla differenza tra il prezzo medio competente al composto, e il prezzo del rame, così sta il peso della statua al peso della quantità d'argento, che v'entra.

339. Mediante la somma, o la sottrazione si possono ancora eliminare le incognite, con fare cioè svanire quei termini in cui esse si ritrovano. Se i termini rinchiudenti l'incognita, che si vuol eliminare, e i quali devono essere identici, saranno affetti da segni contrarij, basterà sommare insieme le due proposte equazioni per far-

farli svanire, se poi saranno affetti dallo stesso segno, basterà sottrarre un'equazione dall'altra. Prenderò l'Esempio dalle due equazioni $x + y = a$, $cx + dy = ab$ del precedente Problema: Si voglia pertanto eliminare la y . Poichè, il termine, che contiene la y nella prima equazione $x + y = a$ non è identico al termine, che contiene la y nella seconda $cx + dy = ab$, e il metodo non ha luogo senza questa identità, però si riducano identici in questo modo: Col coefficiente d del termine dy nella seconda equazione si moltiplichi ciascun termine della prima equazione $x + y = a$ (lo che non turba l'egualità, perchè se quantità eguali si moltiplicheranno per una stessa quantità, i prodotti faranno eguali), e si avrà $dx + dy = ad$, in cui il termine, che contiene la y si è reso identico, come si cercava. Ora perchè i termini, che contengono la y nell'una, e nell'altra equazione sono affetti dallo stesso segno, però questa seconda equazione si sottragga dalla prima così

$$\begin{array}{r} cx + dy = ab \\ dx + dy = ad \\ \hline \text{Residuo} \quad cx - dx = ab - ad \end{array}$$

Si ha pertanto l'equazione $cx - dx = ab - ad$, in cui entra una sola incognita, e la quale comprende tutto il Problema, che è la stessa trovata al num. 337.

340. Acciò si possa vedere la generalità del metodo, e anche per maggior esercizio proporò un altro Problema, il quale ammettendo quattro condizioni inchiederà perciò quattro incognite, di cui tre dovranno eliminare.

341. Prob. 6. Si debbano trovare quattro numeri con queste condizioni, che il doppio del primo, più un terzo del secondo, più il quadruplo del terzo sia eguale a 19; in secondo luogo che due quinti del primo, più tre quarti del terzo, più tre quinti del quarto sieno eguali a 7; in terzo luogo che il triplo del secondo, più il settuplo del terzo, più due terzi del quarto sia eguale a 41; in quarto luogo che tre settimi del primo, più sei settimi del secondo, più una metà del quarto sieno eguali a 6.

342. Risol. Questo Problema porta una operazione un poco lunga, ma io l'ho sciolto a bella posta acciò serva di esercizio tanto pel calcolo, quanto per la maniera di procedere nello scioglimento de' Problemi. Quattro pertanto sono le cose cercate, e quattro sono le condizioni proposte, che portano ad altrettante equazioni, le quali devonfi talmente maneggiare, e paragonare fra loro, onde se ne ricavi una equazione, che contenendo una sola incognita, farà perciò l'equazione finale. I quattro numeri cercati si chiamino x, y, z, u : Le altre denominazioni si facciano come segue

$$\begin{array}{ll}
 2 = a & \frac{2}{3} = i \\
 \frac{1}{3} = b & \frac{3}{7} = k \\
 4 = c & \frac{6}{7} = m \\
 \frac{2}{5} = d & \frac{1}{7} = n \\
 \frac{3}{4} = e & 19 = p \\
 \frac{2}{5} = f & 41 = r \\
 3 = g & 6 = s \\
 7 = h &
 \end{array}$$

Dalle quattro condizioni proposte si hanno le seguenti quattro equazioni

$$\begin{array}{ll}
 \text{I.} & ax + by + cz = p \\
 \text{II.} & dx + ez + fu = b \\
 \text{III.} & gy + hz + iu = r \\
 \text{IV.} & kx + my + nu = s
 \end{array}$$

Ora prendo la prima, e la seconda equazione, e per fare svanire da loro la incognita x moltiplico ciascun termine della prima equazione per d , poscia ciascun termine della seconda per a , indi dalla seconda sottraggo la prima così

$$\begin{array}{ll}
 \text{Equaz. II. moltip. in } a & adx + aez + afu = ab \\
 \text{Equaz. I. moltip. in } d & adx + bdy + cdz = dp \\
 \hline
 \text{Residuo equaz. V.} & aez + afu - bdy - cdz = ab - dp
 \end{array}$$

$$\text{V.} \quad \text{cioè} \quad \overline{ae - cd} \times z + afu - bdy = ab - dp$$

Passo ora, mediante questa quinta equazione, e la terza, a eliminare la y , e a tale effetto moltiplico ciascun termine della V per g , e ciascun termine della III per $-bd$, poscia dalla V sottraggo la III così

$$\begin{array}{ll}
 \text{Equaz. V moltip. in } g & \overline{aeg - cdg} \times z + afgu - bdg y = agb - dgp \\
 \text{Equaz. III moltip. in } -bd & -bdgy - bdbz - bdiu = -bdr \\
 \hline
 \text{Residuo equaz. VI.} & \overline{aeg - cdg} \times z + afgu + bdbz + bdiu = agb - dgp + bdr
 \end{array}$$

$$\text{VI.} \quad \text{cioè} \quad \overline{aeg - cdg + bdb} \times z + \overline{afg + bdi} \times u = agb - dgp + bdr$$

Per avere un'altra equazione, in cui entrino solamente le due incognite z , u , or-
de

de per mezzo loro ricavarne finalmente una equazione, che ammetta una sola incognita, prendo la prima, e la quarta equazione, e moltiplicando primieramente la prima per k , indi la quarta per a , sottraggo poscia la prima dalla quarta così

$$\begin{array}{rcl} \text{Equaz. IV moltip. in } a & & akx + amy + anu = as \\ \text{Equaz. I moltip. in } k & & akx + bky + ckz = kp \\ \hline & & amy + anu - bky - ckz = as - kp \end{array}$$

Residuo equaz. VII.

$$\text{VII} \quad \text{cioè} \quad am - bk \times y + anu - ckz = as - kp$$

Mediante questa settima equazione, e la terza ritrovo un'altra equazione, in cui entrino solamente le due incognite z , u , e ciò ottengo con moltiplicare tutti i termini della VII per g , indi tutti i termini della III per $am - bk$, e con sottrarre poscia la VII dalla III così

$$\begin{array}{rcl} \text{Equaz. III moltip. in } am - bk & & agm - bgk \times y + abm - bbk \times z + aim - bik \times u = amr - bkr \\ \text{Equaz. VII moltip. in } g & & agm - bgk \times y + agnu - cgkz = ags - gkp \\ \hline \end{array}$$

$$\text{Residuo equaz. VIII} \quad abm - bbk \times z + aim - bik \times u - agnu + cgkz = amr - bkr - ags + gkp$$

$$\text{VIII} \quad \text{cioè} \quad abm - bbk + cgk \times z + aim - bik - agn \times u = amr - bkr - ags + gkp$$

Essendo giunto finalmente alle due equazioni VI, e VIII, le quali non hanno, che le stesse due incognite, con eliminarne una di loro arriverò ad una equazione, che inchiuerà una sola incognita. Delle due incognite pertanto z , u , a fine di eliminare la z , moltiplico primieramente tutti i termini dell'ottava equazione per $aeg - cdg + bdb$, poi tutti i termini della sesta per $abm - bbk + cgk$, indi sottraggo dalla VI l'VIII così

$$\begin{array}{rcl} \text{Equaz. VI moltip. in } abm - bbk + cgk & & \\ aeg - cdg + bdb \times abm - bbk + cgk \times z + abm - bbk + cgk \times aim - bik \times u = & & \\ aeg - cdg + bdb \times amr - bkr - ags + gkp & & \\ abm - bbk + cgk \times agb - agp + bdr & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Equaz. VIII moltip. in } aeg - cdg + bdb & & \\ aeg - cdg + bdb \times abm - bbk + cgk \times z + aeg - cdg + bdb \times aim - bik \times u = & & \\ aeg - cdg + bdb \times amr - bkr - ags + gkp & & \end{array}$$

Residuo equaz. IX

$$\begin{array}{rcl} abm - bbk + cgk \times aeg + bdi \times u - aeg + cdg - bdb \times aim - bik - agn \times u = & & \\ abg - dgp + bdr \times abm - bbk + cgk - aeg + cdg - bdb \times amr - bkr - ags + gkp & & \end{array}$$

K 2.

IX

76. DELLA MANIERA DI USARE IL CALCOLO ALGEBRAICO ec.

$$\text{IX cioè } \frac{abm - bbt + cgh \times aff + bdi - acg + cdg - vdb \times aim - vrk - agn \times u =}{abm - bbt + cgh \times agb - dgp + bdr - acg + cdg - vdb \times amr - bkr - ags + gkp}$$

$$\text{e però } u = \frac{abm - bbt + cgh \times agb - dgp + bdr - acg + cdg - vdb \times amr - bkr - ags + gkp}{abm - bbt + cgh \times aff + bdi - acg + cdg - vdb \times aim - vrk - agn}$$

se pertanto in questa equazione si sostituiranno in vece delle lettere i loro valori, si avrà il quarto numero cercato u , così

$$u = \frac{12 - 1 + \frac{26}{7} \times 42 - \frac{114}{5} + \frac{82}{15} - \frac{9}{2} + \frac{24}{5} - \frac{14}{15} \times \frac{493}{7} - \frac{41}{7} - 36 + \frac{272}{7}}{12 - 1 + \frac{26}{7} \times \frac{18}{5} + \frac{4}{45} - \frac{9}{2} + \frac{24}{5} - \frac{14}{15} \times \frac{8}{7} - \frac{2}{21} - 3}$$

$$\text{cioè } u = \frac{\frac{112}{7} \times \frac{74}{3} - \frac{19}{30} \times \frac{370}{7} = \frac{2553}{7}}{\frac{112}{7} \times \frac{166}{45} - \frac{19}{30} \times \frac{41}{21} = \frac{7659}{126}} = \frac{321678}{53613} = 6,$$

e però il quarto numero cercato u è = 6.

Per mezzo delle precedenti equazioni VI, e VIII ritrovo il valore del terzo numero z con eliminare l'incognita u ; ed ecco come: Moltiplico l'VIII equazione in $aff + bdi$, e la VI in $aim - bkr - agn$, poscia dall'ottava sottraendo la sesta trovo il valore di $z = 4$. Sostituisco questi ritrovati valori di u , z nella terza equazione, e ricavo il valore di $y = 3$. Finalmente sostituiti questi valori di u , z e y nella seconda mi viene il valore di $x = 1$. Il Calcolo si veda per esteso nella Tavola I.



Equaz. VIII. multipl. in $afg + bdi$

$$afg + bdi \times abm - bbk +$$

Equaz. VI multipl. in $aim - bik - agn$

$$aim - bik - agn \times aef -$$

Residuo equaz. X.

$$afg + bdi \times abm - bbk +$$

X cioè

$$afg + bdi \times abm - bbk + agk - aim +$$

e però $z =$

$$\frac{afg + bdi \times amr - bkr - ags + gkp - aim + bik + agn}{afg + bdi \times abm - bbk + agk - aim + bik + agn}$$

$$\text{cioè } z = \frac{\frac{166}{45} \times \frac{370}{7} + \frac{41}{21} \times \frac{74}{3}}{\frac{166}{45} \times \frac{113}{7} + \frac{41}{21} \times \frac{19}{30}} = \frac{\frac{61420}{315} + \frac{30340}{630}}{\frac{18758}{315} + \frac{779}{630}} = \frac{\frac{15311}{6}}{\frac{3825}{6}}$$

Per avere il valore del secondo numero cercato y sostituisco nella terza equazione g

$$y = \frac{g}{g} - \frac{b}{g} \times \frac{afg + bdi \times amr - bkr - ags + gkp - aim + bik + agn \times agv}{afg + bdi \times abm}$$

$$y = \frac{41}{3} - \frac{\frac{7}{3} \times \frac{18}{5} + \frac{4}{45} \times \frac{492}{7} - \frac{41}{7} - 36 + \frac{171}{7} - \frac{24}{21} + \frac{2}{21} + 3}{\frac{18}{5} + \frac{4}{45}} \times \frac{\frac{41}{3} \times \frac{\frac{61420}{315} + \frac{30340}{630} - \frac{2}{9} \times \frac{8362}{21} - \frac{703}{21}}{\frac{18758}{315} + \frac{779}{630}} - \frac{41}{3} \times \frac{\frac{1702}{7}}{\frac{851}{14}}}$$

Finalmente per avere il valore del primo numero x sostituisco nella seco

$$x = \frac{b}{d} - \frac{e}{d} \times \frac{afg + bdi \times amr - bkr - ags + gkp - aim + bik + agn \times agv}{afg + bdi}$$

$$x = \frac{15}{2} - \frac{\frac{15}{8} \times \frac{18}{5} + \frac{4}{45} \times \frac{492}{7} - \frac{41}{7} - 36 + \frac{171}{7} - \frac{24}{21} + \frac{2}{21} + 3}{\frac{18}{5} + \frac{4}{45}} \times \frac{\frac{15}{8} \times \frac{\frac{61420}{315} + \frac{30340}{630} - \frac{15}{10} \times \frac{8362}{21} - \frac{703}{21}}{\frac{18758}{315} + \frac{779}{630}} - \frac{15}{2} \times \frac{\frac{1702}{7}}{\frac{851}{14}}}$$

343. Dopo avere ritrovati i valori del terzo, e del quarto numero si sarebbero potuti ritrovare più speditamente i valori del primo, e del secondo, con sostituire i ritrovati valori numerici di x , e di u nella terza, e nella seconda equazione così: $111gy = r - 4b - 6i$, e $114x = b - 4e - 6f$, dalla prima delle quali si ha il valore di y così $y = \frac{r - 4b - 6i}{g}$, cioè sostituendo i valori numerici $y = \frac{41 - 28 - 4}{3} = \frac{9}{3} = 3$; e dalla seconda si ha il valore di x così $x = \frac{b - 4e - 6f}{d}$, cioè sot-

tuendo i valori numerici $x = \frac{7 - 3 - \frac{18}{5}}{\frac{1}{5}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{1}{5}} = \frac{10}{10} = 1$.

344. Spesse volte per facilitare il calcolo in luogo di una quantità qualunque, complessa, si suole porre un'altra quantità letterale ad arbitrio, lo che chiamasi sostituire nel calcolo una quantità a un'altra; e quella quantità, a cui se ne sostituisce un'altra, si dice il valore della quantità sostituita: Per Esempio, perchè nella precedente soluzione pel valore di y (lo stesso si dica pel valore di x) risultava una espressione molto lunga dalla sostituzione dei ritrovati valori di u , e di x nella terza equazione, però si poteva abbreviare il calcolo sostituendo r in vece del valore di u , e q in vece del valore di x , con che si sarebbe avuto $gy = r - bq - it$, e però $y = \frac{r - bq - it}{g}$ espressione assai più spedita, e breve. E questa sorte di sostituzione ha uso frequente nel calcolo.

345. Quantunque il metodo esposto per l'eliminazione delle incognite dalle equazioni di primo grado, essendo generale, possa sempre servire, pure per facilitare il calcolo, torna sovente comodo l'aver formole ecumeniche, di cui, mediante la sola sostituzione, poterli prevalere nei casi particolari. A tale oggetto darò qui il modo di ritrovar queste formole, di cui poter usare al bisogno.

346. E per procedere ordinatamente, comincerò dalle formole, che nascono dalle equazioni di primo grado a due incognite. Siano pertanto le due equazioni generali $Ax + By + C = 0$, $A'x + B'y + C' = 0$, in cui le lettere A , B esprimono generalmente i coefficienti delle due incognite x , y nella prima equazione, e C esprime il termine affatto cognito; lo che pur fanno le lettere A' , B' , C' nella seconda equazione. Si moltiplichino la prima di queste due equazioni per una lettera qualunque p , quantità per ora indeterminata, e da determinarsi poscia col calcolo con che si avrà $Ap + Bp + Cp = 0$, dalla quale, sottraendo la seconda equazione, si avrà $Ap - A'x + Bp - B'y + Cp - C' = 0$, come qui mostra l'esempio

$$\begin{array}{l} \text{Prima equazione moltiplicata in } p \quad Ap + Bp + Cp = 0 \\ \text{Seconda equazione} \quad A'x + B'y + C' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo (r)} \quad Ap - A'x + Bp - B'y + Cp - C' = 0$$

347. Ora acciò da questo residuo svanisca un'incognita per esempio x , bisogna, che il suo coefficiente sia eguale a zero, poichè (pel num. 318. del primo Tomo)

78 DELLA MANIERA DI USARE IL CALCOLO ALGEBRAICO ec.

mo) col moltiplicarsi una quantità in zero torna zero; però si faccia $Ap - A' = 0$, con che si verrà a determinare il valore dell' indeterminata p , così: $p = \frac{A'}{A}$, il qual valore sostituito negli altri due termini $Bp - B'x + Cp - C = 0$ dell' equazione (r) si avrà $\frac{AB}{A} - B'x + \frac{CA'}{A} - C = 0$, o sia $AB - AB'x + A'C - AC = 0$, e però $AB - AB'x = AC - A'C$, conseguentemente $y = \frac{AC - A'C}{AB - AB'}$, o sia $y = \frac{AC - A'C}{AB - AB'}$ che è la formola generale per la eliminazione dell' incognita x .

348. Che se si avesse voluto eliminare la y , avrebbe bisognato supporre eguale a zero il suo coefficiente, così $Bp - B' = 0$, da cui ricavasi $p = \frac{B'}{B}$, il qual valore sostituito nel primo, e nell'ultimo termine $Ap - A'x + Cp - C = 0$ dell' equazione (r), ne viene $\frac{AB'}{B} - A'x + \frac{CB'}{B} - C = 0$, cioè $AB' - AB'x + B'C - BC = 0$, vale a dire $AB' - AB'x = BC - B'C$, e però $x = \frac{BC - B'C}{AB' - AB'}$, o sia $x = \frac{BC - B'C}{AB' - AB'}$ che è la formola generale per la eliminazione dell' incognita y .

349. Date essendo pertanto due equazioni con due incognite, delle quali una debbasi eliminare, si prenda delle due ritrovate formole quella, che corrisponde all' eliminazione, che si vuol fare, e in vece delle lettere $A, B, C; A', B', C'$ si sostituiscano i corrispondenti valori, osservando sen pre nelle sostituzioni la legge de' segni, e in questo modo si avrà l' equazione cercata, in cui entra una sola incognita.

350. Passiamo ora alla formola generale per tre equazioni. e tre incognite, delle quali due si devono eliminare. Siano le equazioni generali $Ax + By + Cz + D = 0$; $A'x + B'y + C'z + D' = 0$; $A''x + B''y + C''z + D'' = 0$. Si moltiplichino la prima di queste equazioni per la indeterminata p , e la seconda per la indeterminata q , quali determineremo in appresso; indi dalla loro somma si sottragga la terza, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima equazione moltip. per } p \quad Ap + Bp + Cp + Dp = 0 \\ \text{Seconda equazione moltip. per } q \quad Aq + Bq + Cq + Dq = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Somma} \quad \overline{Ap + Aq} \quad \overline{Bp + Bq} \quad \overline{Cp + Cq} \quad \overline{Dp + Dq} = 0 \\ \text{Terza equazione} \quad \underline{A''x + B''y + C''z + D'' = 0} \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\Delta) \quad \overline{Ap + Aq - A''} \quad \overline{Bp + Bq - B''} \quad \overline{Cp + Cq - C''} \quad \overline{Dp + Dq - D''} = 0$$

351. Che però volendosi eliminare le due incognite x, y , bisognerà fare eguali a zero i loro coefficienti, così, $Ap + Aq - A'' = 0$; $Bp + Bq - B'' = 0$, medianre le quali due equazioni devonno determinare le due indeterminate p, q . Ora avendosi due

due equazioni, e due indeterminate si determinerà l'una, e l'altra col metodo poc' anzi elpoto, e i loro valori sostituiti poscia nei due ultimi termini

$Cp + Cq - Cx + Dp + Dq - D'z = 0$ dell'equazione (Δ), faranno scuoprire il valore dell'incognita z . A tale effetto pertanto moltiplico colla indeterminata r la prima di queste due equazioni, e dal prodotto sottraggo la seconda, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima equazione moltip. in } r \quad Apr + A'qr - A'r = 0 \\ \text{Seconda equazione} \quad Br + B'q - B' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\Theta) \quad Ar - B'x + Ar - B'x + A'r + B' = 0$$

352. Per avere intanto il valore dell'indeterminata q bisogna eliminare l'indeterminata p , lo che si ottiene con fare il suo coefficiente eguale a zero così: $Ar - B = 0$, dalla quale equazione si ricava il valore di r , che è $r = \frac{B}{A}$, e questo

valore sostituito ne' due ultimi termini $Ar - B'x + A'r + B' = 0$ dell'equazione (Θ) dà $\frac{Ar}{A} - B'x + \frac{A'r}{A} + B' = 0$, o sia $\frac{Ar}{A} - B'x + \frac{A'r}{A} + B' = 0$, mediante la qua-

le si ha il valore dell'indeterminata q , che è $q = \frac{A'B - AB'}{A'B - AB}$. Iteffamente si trova il valore di p con eliminare dall'equazione (Θ) l'indeterminata q , facendo cioè eguale a zero il suo coefficiente così: $A'r - B' = 0$, colla quale ricavasi il valore di r , che trovasi essere $r = \frac{B'}{A'}$, e questo valore sostituito nel primo e nell'ultimo termi-

ne dell'equazione (Θ) dà $\frac{AB}{A'} - B'x + \frac{A'B'}{A'} + B' = 0$, cioè

$\frac{AB - A'B}{A'B - AB}x + \frac{A'B - AB'}{A'B - AB} = 0$, da cui si ottiene il valore di p , che è $p = \frac{A'B - AB'}{A'B - AB}$. Ritrovati essendosi pertanto i valori delle assunte due indeterminate p , q , si sostituiscono adesso nei due ultimi termini dell'equazione (Δ) (poichè i due primi si sono fatti eguali a zero); e fatta questa sostituzione si avrà

$\frac{AB - A'B}{A'B - AB}x + \frac{A'B - AB'}{A'B - AB}x + C - C'x + z + \frac{A'B - AB'}{A'B - AB}x + \frac{A'B - AB'}{A'B - AB}x + D - D'z = 0$, o sia $\frac{AB - A'B}{A'B - AB}x + \frac{A'B - AB'}{A'B - AB}x + C + AB - AB'x + C'x + AB - AB'x + D + AB - AB'x + D'z = 0$; onde finalmente si ha il ricercato valore di z ; e però non solo si sono eliminate le due incognite, ma ancora, si è risolta l'equazione così

$$z = \frac{AB - AB'x + D' + AB' - A'B'x + D + AB - AB'x + D}{AB - A'B'x + C' + AB - AB'x + C + AB - A'B'x + C}$$

che è la formola generale, mediante la quale date tre equazioni, e tre incognite x , y , z si eliminano le due prime x , y , e si determina il valore della terza z .

353. Effendosi ritrovata la formola generale per la eliminazione delle due prime incognite, passiamo ora a ritrovare quella, che serve per la eliminazione delle due ultime y, z . A tale oggetto nell'equazione (A) faccio eguali a zero i coefficienti di y , e di z ; onde ho $Bp + Bq - B'r = 0$; $Cp + Cq - C'r = 0$, colle quali due equazioni devonfi determinare i valori delle due assunte indeterminate p, q , affine di poterle sostituire nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (A). Moltiplico pertanto colla indeterminata r la prima di queste due equazioni, e dal prodotto ne sottraggo la seconda così

$$\begin{array}{l} \text{Prima equazione moltip. in } r \quad Brp + Brq - B'r = 0 \\ \text{Seconda equazione} \quad Cp + Cq - C'r = 0 \end{array}$$

Residuo (A) $\overline{Br - C} \times p + \overline{Br - C} \times q - B'r + C'r = 0$
nella quale faccio primieramente eguale a zero il coefficiente di p , affine di determinare il valore di q così $Br - C = 0$, da cui ricavasi il valore di r , che è $r = \frac{C}{B}$, il qual valore sostituito nei due ultimi termini dell'equazione (A) dà $\frac{B'C}{B} - C \times q - \frac{B'C}{B} + C'r = 0$, o sia $\overline{B'C - BC} \times q - B'C + BC'r = 0$, la quale equazione mi dà il valore di q , che è $q = \frac{B'C - BC'}{\overline{B'C - BC}}$. Similmente per avere il valore di p faccio eguale a zero il coefficiente di q così: $Br - C = 0$, da cui si ha il valore di r , che è $r = \frac{C}{B}$, qual valore sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (A) dà

$\frac{B'C}{B} - C \times p - \frac{B'C}{B} + C'r = 0$; o sia $\overline{B'C - BC} \times p - B'C + BC'r = 0$, e però $p = \frac{B'C - BC'}{\overline{B'C - BC}}$. Si sostituiscano adesso questi ritrovati valori delle due assunte indeterminate p, q nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (A), con che si avrà

$$\begin{aligned} & \overline{B'C - BC} \times A + \overline{B'C - BC'} \times A' - A' \times \overline{B'C - BC} \times D + \overline{B'C - BC'} \times D' - D' = 0, \\ & \text{vale a dire } \overline{B'C - B'C} \times A + \overline{B'C - BC'} \times A' + \overline{B'C - BC} \times A' \times \overline{B'C - BC} \times D + \\ & \overline{B'C - BC'} \times D' + \overline{B'C - B'C} \times D' = 0, \\ & \text{e però } \ast = \frac{\overline{B'C - B'C} \times D + \overline{B'C - B'C} \times D' + \overline{B'C - BC} \times D'}{\overline{B'C - B'C} \times A + \overline{B'C - BC'} \times A' + \overline{B'C - BC} \times A'} \\ & \text{cioè } \ast = \frac{\overline{B'C - BC} \times D' + \overline{B'C - B'C} \times D' + \overline{B'C - BC} \times D}{AB - AB' \times C' + A'B - AB' \times C + AB - A'B' \times C} \end{aligned}$$

che è la formola generale, colla quale date tre equazioni, e tre incognite x, y, z si eliminano le due ultime, e si determina il valore della prima x .

354. Veniamo finalmente alla formola generale, colla quale restano eliminate la prima, e l'ultima delle tre incognite, e si determina il valore della seconda y . Nell'Equazione (Δ) si facciano eguali a zero i coefficienti di x , z , e si avrà $Ap + Aq - A' = 0$; $Cp + Cq - C' = 0$. Ora per determinare i valori delle indeterminate p , q da sostituirsi nel secondo, e nell'ultimo termine dell'equazione (Δ) si moltiplichino colla indeterminata r la prima di queste due equazioni, e dal prodotto se ne sottragga la seconda così:

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equazione moltiplic. in } r & & Apr + A'qr - A'r = 0 \\ \text{Seconda equazione} & & Crp + Cqr - C'r = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\Xi) \quad Ar - Cr \times p + Ar - Cr \times q - A'r + C'r = 0$$

nella quale faccio eguale a zero il coefficiente di p , onde poter determinare il valore della indeterminata q , così: $Ar - C = 0$, dalla quale si ricava il valore di r , che è $r = \frac{C}{A}$, il qual valore sostituito nei due ultimi termini dell'equazione (Ξ) dà

$$\frac{AC}{A} - C \times q - \frac{A'C}{A} + C' = 0, \text{ cioè } AC - AC' \times q - A'C + AC' = 0, \text{ la qua-}$$

le equazione esibisce il valore dell'indeterminata q , così $q = \frac{A'C - AC'}{AC - AC'}$. Itteffamente per determinare il valore dell'indeterminata p , faccio eguale a zero il coefficiente di q , così: $A'r - C' = 0$ dalla quale si ha il valore di r , che è $r = \frac{C'}{A'}$, e questo valore sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (Ξ) dà

$$\frac{AC}{A'} - C \times p - \frac{A'C}{A'} + C' = 0, \text{ cioè } AC - AC' \times p - A'C + A'C' = 0, \text{ colla}$$

quale si determina il valore dell'indeterminata p , che trovasi essere $p = \frac{A'C - A'C'}{AC - AC'}$.

Si sostituiscano pertanto questi ritrovati valori delle due assunte indeterminate p , q nel secondo, e nell'ultimo termine dell'equazione (Δ), e si avrà

$$\frac{AC - A'C}{AC - AC'} \times B + \frac{A'C - AC'}{AC - AC'} \times B' - B' \times C + \frac{A'C - A'C'}{AC - AC'} \times D + \frac{A'C - AC'}{AC - AC'} \times D'$$

$$- D' = 0, \text{ o sia } AC - A'C \times B + A'C - AC \times B' + AC - A'C \times B' \times C +$$

$A'C - A'C \times D + A'C - AC \times D' + AC - A'C \times D' = 0$, dalla quale si ha finalmente il valore della seconda incognita y cioè

$$y = \frac{AC - A'C \times D + A'C - AC \times D' + AC - A'C \times D'}{AC - A'C \times B + A'C - AC \times B' + AC - A'C \times B'}$$

L

y =

$$y = \frac{\overline{AC - AC} \times D' + \overline{A'C - AC} \times D + \overline{AC - A'C} \times D}{\overline{AB - AB} \times C + \overline{A'B - AB} \times C + \overline{AB - A'B} \times C}, \text{ che è la formola}$$

generale, colla quale date tre equazioni, e tre incognite x, y, z , si eliminano la prima, e l'ultima, e si determina il valore della seconda y .

355. Ritrovate le formole generali per eliminare una, e due incognite, cerchiamo adesso quelle, che servono per eliminarne tre. Siano pertanto le quattro equazioni generali $Ax + By + Cz + Du + E = 0$; $A'x + B'y + C'z + D'u + E' = 0$; $A''x + B''y + C''z + D''u + E'' = 0$; $A'''x + B'''y + C'''z + D'''u + E''' = 0$, nelle quali il diverso apice affisso alle lettere A, B, C ec. disegna i coefficienti delle diverse equazioni. Di queste generali equazioni si moltiplichino la prima per la indeterminata p , la seconda per q , e la terza per r ; indi dalla loro somma si sottragga la quarta, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima eq. molt. in } p \quad Apx + Bpy + Cpz + Dpu + E p = 0 \\ \text{Seconda eq. molt. in } q \quad A'qx + B'qy + C'qz + D'qu + E'q = 0 \\ \text{Terza eq. molt. in } r \quad A''rx + B''ry + C''rz + D''ru + E''r = 0 \end{array}$$

$$\text{Som. } \overline{Ap + A'q + A''r} \times x + \overline{Bp + B'q + B''r} \times y + \overline{Cp + C'q + C''r} \times z + \overline{Dp + D'q + D''r} \times u + \overline{Ep + E'q + E''r} = 0$$

$$4. \text{Eq. } \overline{A'''}x + \overline{B'''}y + \overline{C'''}z + \overline{D'''}u + \overline{E'''} = 0$$

$$\text{Res. (II)} \quad \overline{Ap + A'q + A''r - A'''} \times x + \overline{Bp + B'q + B''r - B'''} \times y + \overline{Cp + C'q + C''r - C'''} \times z + \overline{Dp + D'q + D''r - D'''} \times u + \overline{Ep + E'q + E''r - E'''} = 0$$

356. Volendo pertanto eliminare le tre incognite y, z, u , e conseguentemente trovar l'equazione, che contenga la sola incognita x , bisognerà supporre eguali a zero i coefficienti delle dette tre incognite, facendo $Bp + B'q + B''r - B''' = 0$; $Cp + C'q + C''r - C''' = 0$; $Dp + D'q + D''r - D''' = 0$. mediante le quali tre equazioni devonfi determinare i valori delle tre indeterminate p, q, r . Per ottenere ciò, mi prevalgo del metodo usato finora, e moltiplico la prima di queste tre equazioni per la indeterminata s , e la seconda per la indeterminata t : poscia dalla loro somma sottraggo la terza, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima eq. molt. in } s \quad Bsp + B'sq + B''sr - B'''s = 0 \\ \text{Seconda eq. molt. in } t \quad Ctp + C'tq + C''tr - C'''t = 0 \end{array}$$

$$\text{Somma} \quad \overline{Bs + Ct} \times p + \overline{B's + C't} \times q + \overline{B''s + C''t} \times r - \overline{B'''s + C'''t} = 0$$

$$\text{Terza equazione } \overline{Dp} + \overline{D'q} + \overline{D''r} - \overline{D'''} = 0$$

$$\text{Residuo [2]} \quad \overline{Bs + Ct - D} \times p + \overline{B's + C't - D'} \times q + \overline{B''s + C''t - D''} \times r - \overline{B'''s + C'''t + D'''} = 0$$

Poscia faccio eguali a zero i coefficienti di p, q così, $Bs + Ct - D = 0$; $B's + C't - D' = 0$, colle quali due equazioni si devono determinare i valori delle assunte indeterminate s, t , per avere i quali moltiplico la prima di queste due equazioni per la indeterminata m , e dal prodotto sottraggo la seconda, come segue:

Pri-

$$\begin{array}{l} \text{Prima eq. molt. per } m \\ \text{Seconda equazione} \end{array} \quad \begin{array}{l} Bms + Cms - Dm = 0 \\ B's + C't - D' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo [T]} \quad Bm - B' \chi s + Cm - C' \chi t - Dm + D' = 0$$

nella quale facendo eguale a zero il coefficiente di s si ha il valore dell'affunta indeterminata m così: $m = \frac{B'}{B}$, il qual valore sostituito negli altri due termini ultimi

dell'equazione [T] dà $\frac{BC}{B} - C' \chi t - \frac{BD}{B} + D' = 0$, mediante la quale si trova il valore di t , che è $t = \frac{BD - BD'}{B'C - BC}$: poscia facendo uguale a zero il coefficiente di t , si avrà $Cm - C' = 0$, e però $m = \frac{C'}{C}$, il qual valore sostituito nel primo, e ultimo termine

dell'equazione [T] dà $\frac{BC}{C} - B' \chi s - \frac{CD}{C} + D' = 0$, mediante la quale si avrà il ricercato valore di s così: $s = \frac{CD' - CD}{B'C - BC}$. Ritrovati essendosi dunque i valori di s , t si sostituiscano adesso negli ultimi due termini dell'Equazione [S], con che si avrà

$$\begin{aligned} & B' \chi \frac{CD' - CD}{B'C - BC} + C' \chi \frac{BD - BD'}{B'C - BC} - D' \chi r - B' \chi \frac{CD' - CD}{B'C - BC} - C' \chi \frac{BD - BD'}{B'C - BC} + D' \\ & = 0, \text{ o sia } \overline{BC' - B'C} \chi D + \overline{B'C - BC'} \chi D' + \overline{BC - B'C} D' \chi r + \overline{B'C - BC'} \chi D \\ & + \overline{BC' - B'C} \chi D' + \overline{B'C - BC'} \chi D' = 0 \text{ e però} \\ & r = \frac{\overline{BC' - B'C} \chi D + \overline{B'C - BC'} \chi D' + \overline{BC - B'C} \chi D'}{\overline{BC' - B'C} \chi D + \overline{B'C - BC'} \chi D' + \overline{BC - B'C} \chi D'}, \text{ ed ecco ritrovato il valore} \\ & \text{dell'indeterminata } r. \end{aligned}$$

357. Veniamo ora a determinare il valore della indeterminata q , e a tale oggetto facciamo eguali a zero i coefficienti di p , r nell'Equazione [S] con che si avrà $Bs + Ct - D = 0$, $B's + C't - D' = 0$, per mezzo delle quali due equazioni si elimini la indeterminata s con moltiplicare la prima equazione colla indeterminata m , indi sottrarre la seconda, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima eq. molt. in } m \\ \text{Seconda equazione} \end{array} \quad \begin{array}{l} Bms + Cms - Dm = 0 \\ B's + C't - D' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo [*]} \quad Bm - B' \chi s + Cm - C' \chi t - Dm + D' = 0$$

in cui per eliminare la indeterminata s si faccia uguale a zero il suo coefficiente così $Bm - B' = 0$, dalla quale ricavasi il valore dell'introdotta indeterminata m , che è $m = \frac{B'}{B}$, il qual valore sostituito negl'ultimi due termini dell'equazione (Φ) , si avrà

$\frac{CB''}{B} - C' \chi t - \frac{B'D}{B} + D' = 0$, o sia $\overline{B'C - BC'} \chi t - B'D + BD' = 0$, dalla quale si ricava il valore di t , che è $t = \frac{BD' - B'D}{BC' - B'C}$. Egualmente per determinare il valore

di s faccio uguale a zero il coefficiente di s , così $Cm - C' = 0$, da cui si ha $m = \frac{C'}{C}$ il qual valore sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (Φ) dà

$\frac{BC''}{C} - B' \chi t - \frac{C'D}{C} + D' = 0$, o sia $\overline{BC' - B'C'} \chi t - C'D + CD' = 0$, e però $t = \frac{C'D - CD'}{BC' - B'C'}$, i quali valori di t , se si sostituiranno nel secondo, e nel quarto termine dell'equazione (Σ) , ne verrà $B' \chi \frac{C'D - CD'}{BC' - B'C'} + C' \chi \frac{BD' - B'D}{BC' - B'C'} - D' \chi q +$

$B'' \chi \frac{CD' - C'D}{BC' - B'C'} + C'' \chi \frac{B'D - BD'}{BC' - B'C'} + D'' = 0$, vale a dire

$\overline{B'C - B'C'} \chi D + \overline{B'C - B'C'} \chi D' + \overline{B'C - B'C'} \chi D'' \chi q + \overline{B'C - B'C'} \chi D + \overline{B'C - B'C'} \chi D' + \overline{B'C - B'C'} \chi D'' = 0$ e però $q =$

$\frac{\overline{B'C - B'C'} \chi D + \overline{B'C - B'C'} \chi D' + \overline{B'C - B'C'} \chi D''}{\overline{B'C - B'C'} \chi D + \overline{B'C - B'C'} \chi D' + \overline{B'C - B'C'} \chi D''}$, che è il cercato valore dell'altra indeterminata q .

358. Resta per ultimo da determinarsi il valore della indeterminata p , per ottenere il quale faccio uguali a zero i coefficienti di q, r nell'equazione (Σ) , onde si ha $B'r + C't - D' = 0$, $B'r + C't - D' = 0$ mediante cui devonosi determinare i valori delle indeterminatè r, t , per avere i quali moltiplico la prima di queste due equazioni per la indeterminata m , e dal prodotto sottraggo la seconda, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima eq. moltip. per } m \\ \text{Seconda equazione} \end{array} \quad \begin{array}{l} B'mr + C'mt - D'm = 0 \\ B'r + C't - D' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\Psi) \quad \overline{Bm - B'} \chi r + \overline{Cm - C'} \chi t - D'm + D' = 0$$

in cui facendo uguale a zero il coefficiente di t , si ha $Cm - C' = 0$, e però $m = \frac{C'}{C}$ il qual valore sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (Ψ) ne viene

viene $\frac{B'C''}{C''} - B'' \times t - \frac{C'D'}{C''} + D'' = 0$, dalla quale si ottiene il valore di t , che è $t = \frac{C'D' - CD'}{B'C'' - B''C''}$. Parimente per determinare il valore di s faccio uguale a zero il coefficiente di s nell'equazione (*), con che ho $B''m - B'' = 0$, e però $m = \frac{B''}{B''}$, il qual

valore sostituito nel secondo, e terzo termine dell'equazione * dà $\frac{B'C''}{B''} - C'' \times s - \frac{B'D'}{B''} + D'' = 0$, ossia $\frac{B'C'' - B''C''}{B''} \times s - \frac{B'D' - B''D'}{B''} + D'' = 0$, conseguentemente $s = \frac{B'D' - B''D'}{B'C'' - B''C''}$. Essendosi pertanto ritrovati i valori di s , t , si sostituiscano adesso nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (3), dalla quale sostituzione si avrà

$$B \times \frac{C'D' - C'D''}{B'C'' - B''C''} + C \times \frac{B'D' - B''D'}{B'C'' - B''C''} - D \times p + B'' \times \frac{C'D' - C'D''}{B'C'' - B''C''} + C'' \times \frac{B'D' - B''D'}{B'C'' - B''C''} + D'' = 0, \text{ o sia } \frac{B'C'' - B''C''}{B''} \times D + \frac{B'C'' - B''C''}{B''} \times D' + \frac{B'C'' - B''C''}{B''} \times D'' = 0 \text{ e però } p = \frac{B'C'' - B''C''}{B''} \times D + \frac{B'C'' - B''C''}{B''} \times D' + \frac{B'C'' - B''C''}{B''} \times D''$$

359. Ecco, che finalmente abbiamo determinati i valori delle affunte indeterminate p , q , r : che però se si sostituiranno nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (II) (giacchè gli altri tre si sono supposti uguali a zero), si giungerà alla ricercata formola per la eliminazione di tre incognite. Si avrà pertanto in tal modo la formola generale, con cui date quattro equazioni, e quattro incognite x , y , z , u , si eliminano le tre ultime, e si determina il valore della prima x . Il calcolo si veda nella prima parte della Tavola II.

360. Passiamo ora a ritrovare la formola generale, che nasce dalla eliminazione delle tre incognite x , z , u , e però che serve a determinare il valore della seconda incognita y . Per ottenerla comincio dal fare uguali a zero nell'equazione [II] i coefficienti di x , z , u così $Ap + A'q + A''r - A'' = 0$; $Cp + C'q + C''r - C'' = 0$; $Dp + D'q + D''r - D'' = 0$, mediante le quali devonfi determinare i valori delle indeterminate p , q , r , affine di sostituirli nel secondo, e nell'ultimo termine dell'equazione [II]. A questo fine moltiplico la prima di queste tre equazioni per la indeterminata s , e la seconda per la indeterminata t , e dalla loro somma sottraggo la terza come segue

Prima eq. molt. per s $As + A'sq + A''s - A''s = 0$ Second. eq. molt. per t $Ctp + C'tq + C''tr - C''s = 0$

$$\begin{array}{rcll} \text{Somma} & As + C't & \times p + As + C's & \times q + As + C't & \times r - A''s - C''s = 0 \\ \text{Terza equazione} & Dp & + & Dq & + & D'r - D'' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } [p] \quad As + C't - D' \times p + As + C's - D' \times q + As + C't - D' \times r - A''s - C''s + D'' = 0$$

e primieramente per determinare il valore di p faccio eguali a zero i coefficienti di q, r così $A's + C't - D' = 0$; $A''s + C''t - D'' = 0$ delle quali due equazioni moltiplico la prima per m , e dal prodotto sottraggo la seconda così

Prima eq. molt. per m $A'ms + C'mt - D'm = 0$ Seconda Equazione $A''s + C''t - D'' = 0$

$$\text{Residuo } [p] \quad Am - A'' \times s + C'm - C'' \times t - D'm + D'' = 0$$

nella quale fatto uguale a zero il coefficiente di s si ha $A'm - A'' = 0$ e però $m = \frac{A''}{A'}$, il qual valore sostituito negli altri due termini dell'equazione $[p]$ dà

$\frac{A'C'}{A'} - C' \times t - \frac{A'D'}{A'} + D'' = 0$, vale a dire $\overline{A'C'} - \overline{A'C'} \times t - A'D' + A'D'' = 0$, da cui si ha il valore di t , che è $t = \frac{A'D' - A'D''}{\overline{A'C'} - A'C'}$. Istessamente supponendo eguale a zero il coefficiente di t , si avrà $C'm - C'' = 0$, e però $m = \frac{C''}{C'}$, e questo valore

sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione $[p]$ dà $\frac{A'C''}{C'} - A'' \times s - \frac{C'D'}{C'} + D'' = 0$, o sia $\overline{A'C''} - \overline{A'C''} \times s - C'D' + CD'' = 0$, conseguentemente $s = \frac{C'D' - CD''}{\overline{A'C''} - A''C'}$, che è il cercato valore della indeterminata s . Si sostituiscano pertanto questi ritrovati valori di s, t , nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione $[p]$,

$$\begin{array}{l} \text{dalla quale sostituzione ne verrà } A \times \frac{C'D' - CD''}{\overline{A'C''} - A''C'} + C \times \frac{A'D' - A'D''}{\overline{A'C'} - A'C'} - D \times p - \\ A'' \times \frac{C'D' - CD''}{\overline{A'C''} - A''C'} - C'' \times \frac{A'D' - A'D''}{\overline{A'C''} - A''C'} + D'' = 0; \text{ o sia} \\ \overline{A'C''} - A''C'' \times D + \overline{A'C''} - A''C'' \times D + \overline{A'C''} - A''C'' \times D \times p - \overline{A''C''} + A''C'' \times D - \\ \overline{A''C''} + A''C'' \times D - \overline{A''C''} + A''C'' \times D = 0 \text{ e però} \end{array}$$

 $p =$

$$p = \frac{\overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D' + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D''}{\overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D' + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D''} \text{ che è il cercato valore}$$

dell' indeterminata p .

361. Iſteſſamente per determinare il valore di q faccio eguali a zero i coefficienti di p, r nell'equazione (β) così $A's + C't - D'' = 0$; $A's + C't - D'' = 0$. Mediante queſte due equazioni devonſi determinare primieramente i valori di s, t , per avere i quali moltiplico la prima equazione per la indeterminata m , e dal prodotto ſottraggo la ſeconda come ſegue

$$\text{Prima equaz. molt. per } m \quad Am's + Cmt - Dm = 0$$

$$\text{Seconda equazione} \quad A's + C't - D'' = 0$$

$$\text{Reſiduo } (s) \quad Am - A'' \chi s + Cm - C'' \chi t - Dm + D'' = 0$$

nella quale fatto eguale a zero il coefficiente di s , ſi ha $Am - A'' = 0$, e però $m = \frac{A''}{A'}$, il qual valore ſoſtituito negli altri due termini dell' equazione (s) dà

$$\frac{A'C}{A} - C'' \chi t - \frac{A'D}{A} + D'' = 0, \text{ cioè } \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi t - A'D + AD'' = 0, \text{ da cui ſi ri-}$$

cava il valore di t , che è $t = \frac{A'D - AD''}{\overline{A^2C^2 - A^2C^2}}$ cercato valore della indeterminata t . Parimente ſuppoſto eguale a zero il coefficiente di t , ſi ha $Cm - C'' = 0$, e però $m = \frac{C''}{C'}$, e queſto valore ſoſtituito nel primo, e nell'ultimo termine dell' equazione (s)

$$\text{dà } \frac{AC''}{C} - A'' \chi s - \frac{CD}{C} + D'' = 0, \text{ o ſia } \overline{AC^2 - A^2C^2} \chi s - CD + CD'' = 0; \text{ e conſeguen-}$$

temente $s = \frac{CD - CD''}{\overline{A^2C^2 - A^2C^2}}$, che è il valore dell' altra indeterminata s . Eſſendoli pertanto ritrovati i valori delle due aſſunte indeterminate s, t , ſi ſoſtituiſcano ora nel ſecondo, e nel quarto termine dell'equazione (β), con che ſi ha

$$A' \chi \frac{CD' - C'D}{A^2C^2 - A^2C^2} + C' \chi \frac{A'D - AD''}{A^2C^2 - A^2C^2} - D'' \chi q - A'' \chi \frac{CD' - C'D}{A^2C^2 - A^2C^2} -$$

$$C'' \chi \frac{A'D - AD''}{A^2C^2 - A^2C^2} + D'' = 0, \text{ o ſia } \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D' + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D'' \chi q$$

$$- \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D - \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D' + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D'' = 0; \text{ e però}$$

$$q = \frac{\overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D' + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D''}{\overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D' + \overline{A^2C^2 - A^2C^2} \chi D''}$$

362. Resta ora da determinarsi il valore della indeterminata r . A questo fine faccio eguali a zero i coefficienti di p, q nell'equazione (β). Così $A's + C't - D = 0$; $A'r + C't - D = 0$; e primieramente devonli trovare i valori delle indeterminaate s, t ; per lo che moltiplico la prima di queste due equazioni per l'indeterminata m , e dal prodotto sottraggo la seconda così

$$\begin{array}{l} \text{Prima eq. molt. per } m \quad Amr + Cmt - Dm = 0 \\ \text{Seconda equazione} \quad A's + C't - D = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo (s)} \quad \overline{Am - A'} \chi s + \overline{Cm - C'} \chi t - Dm + D = 0$$

nella quale fatto eguale a zero il coefficiente di s così $Am - A' = 0$, si ha il valore di m , che è $m = \frac{A'}{A}$, il qual valore sostituito negli altri due termini dell'equazione

$$(s) \text{ dà } \frac{\overline{AC}}{A} - C' \chi t - \frac{AD}{A} + D = 0, \text{ o sia } \overline{AC - AC'} \chi t - AD + AD' = 0; \text{ e però } t = \frac{AD - AD'}{AC - AC'}, \text{ cercato valore della indeterminata } t. \text{ Istessamente facendo eguale a zero il coefficiente di } t \text{ così } Cm - C' = 0, \text{ si ha } m = \frac{C'}{C}, \text{ il qual valore sostituito}$$

nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (s) darà $\frac{\overline{AC}}{C} - A' \chi s - \frac{CD}{C} + D' = 0$, cioè $\overline{AC - AC'} \chi s - CD + CD' = 0$; conseguentemente $s = \frac{CD' - CD}{AC - AC'}$ valore dell'altra indeterminata s . Se pertanto si sostituiranno questi ritrovati valori di s, t nel terzo, e quarto termine dell'equazione (β), si avrà

$$\begin{aligned} A' \chi \frac{CD' - CD}{AC - AC'} + C' \chi \frac{AD - AD'}{AC - AC'} - D' \chi r - A'' \chi \frac{CD' - CD}{AC - AC'} - C'' \chi \frac{AD - AD'}{AC - AC'} + \\ D'' = 0; \text{ o sia } \overline{AC - A'C} \chi D + \overline{A'C - AC} \chi D' + \overline{AC - A'C} \chi D' \chi r + \\ \overline{A'C - A'C} \chi D + \overline{AC - A'C} \chi D' + \overline{AC - A'C} \chi D' = 0; \text{ e però } r = \\ \frac{\overline{AC - A'C} \chi D + \overline{A'C - AC} \chi D' + \overline{AC - A'C} \chi D'}{\overline{AC - A'C} \chi D + \overline{A'C - AC} \chi D' + \overline{AC - A'C} \chi D'} \text{ cercato valore della terza affun-} \\ \text{ta indeterminata } r. \end{aligned}$$

363. Ora, che ritrovati si sono i valori delle indeterminate p, q, r , null'altro rimane, che sostituirli nel secondo, e ultimo termine dell'equazione (Π), con che si avrà la formola generale, con cui date quattro equazioni, e quattro incognite x, y, z, u , si eliminano le tre x, z, u , e si determina il valore della seconda y . Se ne veda il calcolo nella parte seconda della Tavola II.

364. Ritrovati essendosi i valori di x, y , determiniamo adesso il valore di z , ritrovando la formola generale per la eliminazione delle tre incognite x, y, u . Faccio per-

pertanto nell'equazione (Π) i loro coefficienti uguali a zero così: $Ap + A'q + A''r - A''' = 0$; $Bp + B'q + B''r - B''' = 0$; $Dp + D'q + D''r - D''' = 0$. Con queste tre equazioni devonfi determinare i valori delle indeterminate p, q, r . A questo fine moltiplico la prima di queste due per s , e la seconda per t , e dalla loro somma sottraggo la terza, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima equaz. molt. per } s \quad Asp + A'sq + A''sr - A'''s = 0 \\ \text{Seconda equaz. molt. per } t \quad Btp + B'tq + B''tr - B'''t = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Somma} & As + Bt \times p + As + Bt \times q + As + Bt \times r - A'''s - B'''t = 0 \\ \text{Terza equazione} & Dp + D'q + D''r - D''' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo (s)} \quad As + Bt - D \times p + As + Bt - D' \times q + As + Bt - D'' \times r - A'''s - B'''t + D''' = 0$$

Per determinare in primo luogo il valore di p , faccio eguali a zero i coefficienti di q, r così: $A's + B't - D' = 0$; $A''s + B''t - D'' = 0$, colle quali due equazioni determino i valori di s, t moltiplicando la prima per la indeterminata m , e ad prodotto sottraendone la seconda, con che si ha

$$\begin{array}{l} \text{Prima eq. molt. per } m \quad A'ms + B'mt - D'm = 0 \\ \text{Seconda equazione} \quad A''s + B''t - D'' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo (s)} \quad Am - A'' \times s + B'm - B'' \times t - D'm + D'' = 0,$$

in cui facendo eguale a zero il coefficiente di s , si ha $A'm - A'' = 0$, e però $m = \frac{A''}{A'}$, il qual valore sostituito negli ultimi due termini dell'equazione (s) dà

$$\frac{A'B''}{A'} - B'' \times t - \frac{A'D'}{A'} + D'' \text{ quindi } t = \frac{A'D' - A''D'}{A'B'' - A''B'}. \text{ Iteffamente fatto uguale a } + D'' = 0; \text{ zero il coefficiente di } t \text{ ne viene } B'm - B'' = 0, \text{ conseguentemente } m = \frac{B''}{B'}, \text{ il qual valore sostituito nel primo e nell'ultimo termine dell'equazione (s) dà}$$

$$\frac{A'B''}{B'} = A'' \times s - \frac{B'D'}{B'} + D'' = 0, \text{ e però } s = \frac{B'D' - B''D}{A'B'' - A''B'}. \text{ Questi ritrovati valori di } s, t \text{ si sostituiscano nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (s), e si avrà}$$

$$A \times \frac{B'D' - B''D}{A'B'' - A''B'} + B \times \frac{A'D' - A''D'}{A'B'' - A''B'} - D \times p - A''' \times \frac{B'D' - B''D}{A'B'' - A''B'} - B''' \times \frac{A'D' - A''D'}{A'B'' - A''B'} + D''' = 0, \text{ conseguentemente } p =$$

$$\frac{A'B'' - A''B'' \times D' + A'B'' - A''B'' \times D'' + A''B'' - A''B'' \times D''}{A'B'' - A''B'' \times D + A'B'' - A''B'' \times D' + A''B'' - A''B'' \times D''}. \text{ Ora per determinare il valore di } q, \text{ faccio uguali a zero i coefficienti di } p, r \text{ nell'equazione (s) così: } As + Bt - D = 0; A''s + B''t - D'' = 0, \text{ colle quali due equazioni determino i valori di } s, t \text{ mol}$$

M

t mol

e moltiplicando la prima equazione per m , e dal prodotto sottraendo la seconda come segue

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equazione molt. per } m & Am + Bmt - Dm = 0 \\ \text{Seconda equazione} & A's + B't - D' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\mu) \quad Am - A' \chi + Bm - B' \chi - Dm + D' = 0$$

in cui faccio uguale a zero il coefficiente di s così $Am - A' = 0$, da cui ricavo $m = \frac{A'}{A}$, il qual valore sostituito negli altri due termini dell'equazione (μ) dà

$$\frac{AB}{A} - B' \chi - \frac{A'D}{A} + D' = 0; \text{ e però } \chi = \frac{A'D - AD'}{A'B - AB'}.$$

Parimente fatto uguale a zero il coefficiente di t , si ha $Bm - B' = 0$; quindi $m = \frac{B'}{B}$, il qual valore sostituito nel primo, e ultimo termine dell'equazione (μ) dà

$$\frac{AB}{B} - A' \chi - \frac{B'D}{B} + D' = 0, \text{ conseguentemente } \chi = \frac{BD' - B'D}{A'B - AB'}.$$

Questi valori di s , t si sostituiscono nel secondo, e ultimo termine dell'equazione (θ) , e si avrà

$$A' \chi \frac{BD' - B'D}{A'B - AB'} + B' \chi \frac{A'D - AD'}{A'B - AB'} - D' \chi + A'' \chi \frac{BD' - B'D}{A'B - AB'} - B'' \chi \frac{A'D - AD'}{A'B - AB'} + D'' = 0$$

e però $q = \frac{A'B - A'B'' \chi D + A'B - AB'' \chi D' + AB' - A'B \chi D''}{A'B - AB' \chi D + AB'' - A'B'' \chi D' + AB - AB' \chi D''}$

Resta da determinarsi il valore di r , per lo che faccio uguali a zero i coefficienti di p , q nell'equazione (θ) così: $As + Bs - D = 0$; $A's + B't - D' = 0$, colle quali due equazioni devo primariamente determinare i valori di s , t . A tale motivo moltiplico la prima colla indeterminata m , e dal prodotto ne sottraggo la seconda come segue

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equazione molt. per } m & Am + Bmt - Dm = 0 \\ \text{Seconda equazione} & A's + B't - D' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\xi) \quad Am - A' \chi + Bm - B' \chi - Dm + D' = 0$$

in cui facendo uguale a zero il coefficiente di s , si ha $Am - A' = 0$, e però $m = \frac{A'}{A}$, il qual valore sostituito negli altri due termini dell'equazione (ξ) dà

$$\frac{AB}{A} - B' \chi - \frac{A'D}{A} + D' = 0; \text{ quindi } \chi = \frac{A'D - AD'}{AB - AB'}.$$

Similmente fatto uguale a zero il coefficiente di t , si ha $Bm - B' = 0$, conseguentemente $m = \frac{B'}{B}$ il qual valo-

re sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (E) dà

$\frac{AB}{B} - A'X - \frac{BD}{B} + D' = 0$; e però $s = \frac{BD - AB}{AB - AB}$. Ora si sostituiscano questi valori di s , t nei due ultimi termini dell'equazione (E), e si avrà

$$A'X \frac{BD - AB}{AB - AB} + B'X \frac{AD - AD'}{AB - AB} - D'X - A'X \frac{BD - AB}{AB - AB} - B'X \frac{AD - AD'}{AB - AB} + D' = 0;$$

$$\text{conseguentemente } r = \frac{A'B - AB'X D + AB' - A'B'X D + A'B - AB'X D}{A'B - AB'X D + AB' - A'B'X D + A'B - AB'X D}$$

Questi ritrovati valori di p , q , r si sostituiscano adesso nel terzo, e nell'ultimo termine dell'equazione (II), con che si avrà la formola terza generale esprimente l'equazione finale, a cui si giunge mediante quattro equazioni, e quattro incognite x , y , z , u , delle quali x , y , u si eliminano, e si determina il valore di z . Il Calcolo si veda alla prima parte della Tavola III.

365. Resta per ultimo da ritrovarsi la formola generale per la eliminazione delle tre incognite x , y , z , con cui resta ancora determinato il valore della quarta incognita u . Per lo che nell'equazione (II) faccio uguali a zero i coefficienti di x , y , z , con che ho $A'p + A'q + A'r - A' = 0$; $B'p + B'q + B'r - B' = 0$; $C'p + C'q + C'r - C' = 0$; poscia moltiplico la prima per s , e la seconda per t ; e dalla loro somma sottraggo la terza, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima equazione moltip. per } s \quad A's + A'q + A'r - A' = 0 \\ \text{Seconda equaz. moltip. per } t \quad B't + B'q + B'r - B' = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Somma} \quad A's + B't + C'p + A'q + B'q + A'r + B'r - A' - B' - C' = 0 \\ \text{Terza equazione} \quad C'p + C'q + C'r - C' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo (e)} \quad A's + B't - C'Xp + A's + B't - C'Xq + A's + B't - C'Xr - A' - B' - C' = 0$$

E primieramente per determinare il valore di p faccio uguali a zero i coefficienti di q , r , onde ho $A's + B't - C' = 0$; $A's + B't - C' = 0$; indi moltiplico la prima per la indeterminata m , e dal prodotto ne sottraggo la seconda come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima equaz. moltip. per } m \quad A'ms + B'mt - Cm = 0 \\ \text{Seconda equazione} \quad A's + B't - C' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo (e)} \quad A'm - A'Xs + B'm - B'Xt - Cm + C' = 0$$

in cui facendo uguale a zero il coefficiente di s , si ha $A'm - A' = 0$, e però $m = \frac{A'}{A'}$, il qual valore sostituito negli altri due termini dell'equazione (e) dà

$\frac{A'B'}{A} - B' \chi t - \frac{A'C}{A} + C' = 0$; quindi $t = \frac{A'C - A'C'}{A'B' - AB'}$. Parimente fatto uguale a zero il coefficiente di t , si ha $B'm - B'' = 0$; e però $m = \frac{B''}{B'}$, il qual valore sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (s) dà

$\frac{AB''}{B'} - A' \chi t - \frac{B'C}{B'} + C' = 0$; conseguentemente $t = \frac{B'C' - B'C}{A'B' - AB'}$. Che se si sostituiranno questi valori di t , t nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (s), si avrà

$$A \chi \frac{B'C' - B'C}{A'B' - AB'} + B \chi \frac{A'C - A'C'}{A'B' - AB'} - C \chi p - A'' \chi \frac{B'C' - B'C}{A'B' - AB'} - B' \chi \frac{A'C - A'C'}{A'B' - AB'} + C' = 0; \text{ e però}$$

$$p = \frac{A'B' - A''B' \chi C + A''B' - AB'' \chi C' + A'B' - A''B' \chi C'}{AB' - A'B' \chi C + A''B' - AB'' \chi C' + AB' - AB' \chi C'}$$

Determinato il valore di p , si determinerà il valore di q con fare uguali a zero i coefficienti di p , r nell'equazione (s); onde si ha $As + Br - C = 0$; $A's + B'r - C' = 0$, la prima delle quali moltiplico per m , e dal prodotto sottraggo la seconda come segue

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equazione moltip. per } m & Am + Bmt - C = 0 \\ \text{Seconda equazione} & A's + B'r - C' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo (r)} \quad Am - A'' \chi t + Bm - B'' \chi t - Cm + C' = 0$$

nella quale faccio uguale a zero il coefficiente di t , onde ho $Am - A'' = 0$, e però $m = \frac{A''}{A}$, il qual valore sostituito negli altri due termini dell'equazione (r) dà

$\frac{A''B}{A} - B'' \chi t - \frac{A''C}{A} + C' = 0$; quindi $t = \frac{A''C - A''C'}{A'B' - AB'}$. Parimente fatto uguale a zero il coefficiente di t , si ha $Bm - B'' = 0$; e però $m = \frac{B''}{B'}$, il qual valore sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (r), dà

$\frac{AB''}{B'} - A'' \chi t - \frac{B'C}{B'} + C' = 0$; conseguente $t = \frac{B'C' - B'C}{A'B' - AB'}$. Si sostituiscono pertanto questi valori di t , t nel secondo, e nell'ultimo termine dell'equazione (s), e si avrà

A'X

$$A' \times \frac{BC - B'C}{A'B - AB'} + B' \times \frac{AC - AC'}{A'B - AB'} - C' \times q - A'' \times \frac{BC - B'C}{A'B - AB'} - B'' \times \frac{AC - AC'}{A'B - AB'} + C'' = 0$$

$$\text{conseguentemente } q = \frac{A'B' - A''B' \times C + A'B - AB'' \times C' + AB' - A''B' \times C''}{A'B - AB' \times C + AB - A''B' \times C' + AB - AB' \times C''}$$

Finalmente per avere il valore di r faccio uguali a zero i coefficienti di p , q nell'equazione (7) così $A's + B's - C = 0$; $A's + B's - C' = 0$, la prima delle quali moltiplico coll' indeterminata m ; indi dal prodotto ne sottraggo la seconda come segue

$$\begin{array}{r} \text{Prima equazione moltip. per } m \\ \text{Seconda equazione} \end{array} \quad \begin{array}{r} Am's + Bms - C = 0 \\ A's + B's - C' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo (8)} \quad Am - A' \times s + Bm - B' \times s - Cm + C' = 0$$

in cui faccio uguale a zero il coefficiente di s , onde ho $Am - A' = 0$, e però $m = \frac{A'}{A}$, il qual valore sostituito negli altri due termini dell'equazione (8) dà

$$\frac{A'B}{A} - B' \times s - \frac{AC}{A} + C' = 0; \text{ quindi } s = \frac{A'C - AC'}{A'B - AB'}. \text{ Parimente fatto eguale a zero il coefficiente di } t, \text{ si ha } Bm - B' = 0, \text{ e però } m = \frac{B'}{B}, \text{ il qual valore sostitui-$$

to nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (8) dà $\frac{AB'}{B} - A' \times s - \frac{BC}{B} + C' = 0$; quindi $s = \frac{BC - B'C}{A'B - AB'}$. Questi ritrovati valori di s , t si sostituiscono nei due ultimi termini dell'equazione (7), e si avrà

$$A'' \times \frac{BC - B'C}{A'B - AB'} + B'' \times \frac{AC - AC'}{A'B - AB'} - C'' \times r - A'' \times \frac{BC - B'C}{A'B - AB'} - B'' \times \frac{AC - AC'}{A'B - AB'} + C'' = 0,$$

$$\text{conseguentemente } r = \frac{A'B' - A''B' \times C + A'B - AB'' \times C' + AB' - A''B' \times C''}{A'B - AB' \times C + AB - A''B' \times C' + AB - AB' \times C''}$$

Restano ora per ultimo da sostituirsi questi valori di p , q , r nei due ultimi termini dell'equazione (II), lo che facendo, si avrà il cercato valore di u , come si vede nella seconda parte della Tavola III.

366. Collo stesso metodo, col quale trovate si sono le formole generali per la eliminazione di una, di due, e di tre incognite, si dovrebbe procedere all'invenzione delle formole generali per la eliminazione di cinque, di sei ec. incognite: vale a dire, che se fossero date cinque equazioni con cinque incognite, delle quali quattro si dovessero eliminare, si dovrebbero moltiplicare le quattro prime equazioni per

q^{ma}.

quattro indeterminate p, q, r, s , cioè la prima per p , la seconda per q ec. Così dare sei equazioni con sei indeterminate, delle quali cinque si dovessero eliminare, bisognerebbe moltiplicare le cinque prime equazioni per cinque indeterminate p, q, r, s, t ordinatamente. Quanto più poi cresce il numero delle indeterminate da eliminarsi, tanto più a dismisura cresce il calcolo necessario per l'invenzione delle formole generali. Che però siccome i coefficienti di queste indeterminate nelle formole generali osservano fra loro una certa disposizione, o sia relazione, basterà osservare le formole già trovate, a fine di scoprire per induzione la relazione, che nelle formole generali per qualunque numero d'incognite devono osservare i coefficienti delle medesime. A questo fine ho messo per ordine nella Tavola IV. le formole già trovate, sulle quali fare le osservazioni opportune per l'invenzione delle altre.

367. Ora dalla osservazione di queste formole immediatamente si scorgono quattro regole. La prima è, che qualunque formola ha altrettanti termini, quante sono le equazioni, e però le incognite date. La seconda, che le formole, che esprimono il valore di altrettante incognite in altrettante equazioni, hanno comune il denominatore. La terza, che, mediante il denominatore delle formole, che servono per l'eliminazione di una incognita in due equazioni, e due incognite, si ottiene il denominatore, che serve per l'eliminazione di due in tre equazioni, e tre incognite; e mediante quell'ultimo si ottiene quello, che serve per l'eliminazione di tre incognite in quattro equazioni, e così in seguito. La quarta, che mediante il denominatore si trovano i differenti numeratori, che esprimono il valore di ciascuna delle incognite contenute nelle date equazioni. Per mezzo di queste quattro regole si possono facilmente trovare le formole generali, che servono per qualunque numero d'incognite, e di equazioni, e si può tralasciare di far questi calcoli sì lunghi, e tediosi per l'invenzione di quelle, che servono per un maggior numero d'equazioni, e d'incognite. A ciò fare però è necessario primieramente dare il modo di trovare i denominatori comuni alle formole, che servono per un qualunque numero d'equazioni, e secondariamente il modo di trovare i numeratori differenti, dato essendo il denominatore comune.

368. Le formole, che servono per due equazioni, sono $x = \frac{BC - B'C}{AB - A'B}$,

$y = \frac{AC - A'C}{AB - A'B}$ (come si è veduto ai num. 347, e 348.), delle quali il denominatore comune $AB - A'B$ costa di due termini. Mediante questo denominatore, si otterrà quello, che serve per tre equazioni, il quale però costerà di tre termini. Il primo termine si ricava da tutto il denominatore precedente $AB - A'B$ moltiplicato pel coefficiente della terza incognita nella terza equazione; cioè per la lettera C prossima seguente le contenute nel denominatore, la quale deve essere affetta dall'apice " immediatamente seguente il più alto de' contenuti nello stesso denominatore;

onde il primo de' tre termini cercati è $\overline{AB - A'B} \times C$. Da questo primo termine si ricavano gli altri due colla sola variazione degli apici, e de' segni: Si avrà cioè il secondo diminuendo l'apice maggiore " di una unità, accrescendo di una unità il prof-

simo minore, e mutando i segni; però il secondo termine sarà $\overline{A'B - AB} \times C$. Si troverà finalmente il terzo mediante il primo diminuendo l'apice maggiore " di due unità, cioè togliendo l'apice " alla lettera C, accrescendo di due unità il secondo prossimo minore, cioè affiggendo l'apice " a quelle lettere, che non ne hanno alcuno,

no, e cambiando i segni, onde il terzo termine è $A'B'' - A''B' \times C$. Dunque il cercato denominatore comune per tre incognite, e tre equazioni è $AB - A'B \times C +$

$A'B - AB' \times C + A''B'' - A''B' \times C$.

369. Si cerchi ora il denominatore per quattro equazioni: Si riassume per ciò il denominatore precedente, che serve cioè per tre equazioni, quale si moltiplichi per la prossima seguente lettera D, che esso non rinchiude, quale lettera D è affetta dall'apice " , che supera di una unità il massimo " contenuto nello stesso denomi-

natore; il prodotto $AB' - A'B \times C + A''B'' - A''B' \times C + A''B'' - A''B' \times C \times D'$, che nasce da questa moltiplicazione è il primo de' quattro termini componenti il denominatore cercato, e dal quale si ricavano gli altri tre. Il secondo si ottiene diminuendo di una unità il massimo apice, accrescendo di una unità il prossimo minore (lasciando gli altri apici quali sono), e mutando i segni; onde il secondo termine è

$A'B - AB' \times C + AB'' - A''B \times C + A''B'' - A''B' \times C \times D'$. Il terzo si ha diminuendo nel primo l'apice massimo di due unità, e accrescendo di due unità il secondo prossimo minore, e di più cambiando i segni; e però il terzo termine è

$A''B'' - A''B' \times C + AB'' - A''B \times C'' + A''B'' - A''B' \times C \times D'$. Finalmente per avere il quarto si diminuisce nel primo termine di tre unità l'apice massimo, si accresce di tre unità il terzo minore seguente, e si mutano i segni; onde il quarto termine è

$A'B'' - A''B' \times C + A''B'' - A''B' \times C + A''B'' - A''B' \times C'' \times D$. La somma poi di questi quattro termini dà il denominatore cercato.

370. Collo stesso metodo si procederà all' invenzione del denominatore per cinque equazioni, e cinque incognite; cioè si moltiplicherà il denominatore ora trovato per E, e il prodotto sarà il primo de' cinque termini, mediante il quale colle sopradette variazioni di apici, e di segni si otterranno gli altri quattro.

371. Ritrovato in tal modo il denominatore, passiamo ora a cercare i rispettivi numeratori, che somministrano il valore di qualunque incognita nato dall' eliminazione delle altre. Dato per esempio il denominatore, che serve per tre equazioni, e tre incognite, si cerchino i rispettivi numeratori per le tre incognite x, y, z. Si cangi la lettera C in D, e si mutino i segni; questa mutazione darà il numeratore per l'ultima incognita z: Ora se a questo numeratore si muterà la lettera B in C, e si muteranno i segni, si avrà il numeratore per la seconda incognita y, e se finalmente a questo secondo numeratore si cambierà la lettera A in B, e si cambieranno i segni, si avrà il numeratore della prima incognita x. La serie di quest' operazione abbastanza si vede nelle formole riportate nella Tavola IV.

372. Similmente dato il denominatore per quattro equazioni, si avrà il numeratore, che serve per l'ultima incognita u cambiando la lettera D in E, e cambiando i segni: per mezzo di questo numeratore si avrà quello, che serve per la penultima z mutando la lettera C in D, e mutando i segni: si avrà quello, che serve per la seconda y col mutare al denominatore, che serve per z, la lettera B in C, e col mutare i segni; e finalmente si avrà quello, che serve per la prima x col cambiare a quest'ultimo l'A in B, e col cambiare i segni,

373. Generalmente dunque dato il denominatore si troveranno i numeratori colla seguente regola. Si cambierà nel denominatore la lettera, che serve di coefficiente all'ultima incognita in quella, che rappresenta il termine affatto cognito, si muteranno i segni, e così si avrà il numeratore, che esprimerà il valore dell'ultima incognita: si troverà il numeratore che dà il valore della penultima mutando i segni al numeratore poco fa trovato, e cambiando la lettera che serve di coefficiente a questa penultima in quella, che serve di coefficiente all'ultima; e così successivamente per gli altri numeratori.

374. Qui poi si offervi, che ciascuno de' numeratori apparterrà a quella incognita, il coefficiente della quale non si troverà fra le lettere componenti lo stesso numeratore; così la lettera A non si troverà nel numeratore, che esprime il valore di x , perchè di x nelle equazioni date il coefficiente è A quantunque affetta da diversi apici: Nel numeratore, che esprime il valore di y non si troverà la lettera B, perchè B, quantunque affetta da diversi apici, è il coefficiente di y nelle date equazioni. Lo stesso si dica rispetto alle altre incognite, qualunque sia il loro numero, e il numero delle equazioni.

374. Affinchè si veda il modo di usare queste formole, lo che per altro per se stesso è chiarissimo, proporrò un Problema a tre equazioni, e tre incognite, che è il seguente.

375. Problema. Cercasi il numero de' piedi solidi d'acqua, che in tempo uguale scaricherà ciascuna di tre fontane, la prima delle quali ne scarica il triplo della seconda più il duplo della terza; la seconda ne scarica quanto la prima meno 9 volte la scaricata dalla seconda più 27 piedi; La terza ne scarica $\frac{2}{9}$ della seconda

più $\frac{2}{9}$ della prima meno 7 piedi.

376. Ris. Relativamente alle tre date condizioni, si hanno le tre seguenti equazioni $x=3y+2z$; $y=x-9z+27$; $z=\frac{2}{9}y+\frac{2}{9}x-\frac{7}{9}$, e liberando quest'ultima dalle frazioni $9z=2y+2x-7$; ossia fatta l'eguaglianza a zero $x-3y-2z=0$; $y-x+9z-27=0$; $9z-2y-2x+7=0$, cioè ordinandole per x , y , z , $x-3y-2z=0$; $-x+y+9z-27=0$; $-2x-2y+9z+7=0$. Poichè tre sono le incognite, e tre le equazioni, devonfi prendere le formole generali, che servono alla eliminazione di due incognite. Si determinino pertanto i valori delle indeterminate di queste formole, con che si avrà $A=1$, $B=-3$, $C=-2$, $D=0$; $A'=-1$, $B'=+1$, $C'=9$, $D'=-27$; $A''=-2$, $B''=-2$, $C''=9$, $D''=7$. Si sostituiscano adesso questi valori nella prima delle tre formole per tre equazioni nella Tav. IV. la quale diventerà

$$x = \frac{1 \times -2 + 3 \times 9 \times 7 - 1 \times 9 + 2 \times -2 \times -27}{1 \times 1 + 1 \times -3 \times 9 - 2 \times -3 - 1 \times -2 \times 9 - 1 \times -2 + 2 \times 1 \times -2} =$$

$$\frac{-2+27 \times 7 - 27 - 4 \times -27}{1 - 3 \times 9 + 6 + 2 \times 9 + 2 + 2 \times -2} = \frac{25 \times 7 - 31 \times -27}{-2 \times 9 + 8 \times 9 + 4 \times -2} = \frac{175+837}{-18+72-8} = \frac{1012}{46} = 22$$

Ed ecco ritrovato il valore di x , che è 22. Si sostituiscano ora nella seconda formola i valori delle indeterminate di questa formola, e si avrà

$$y =$$

c
c
n
f
t
f


g
n
d
E
e
n
f
il

le
f
v

pi

zi
fr
y
x
ce
el
di
B
fe
IV

—
—
—
E
mc



5. The fifth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers some final thoughts on the importance of maintaining accurate financial records and the role of the accounting department in ensuring the success of the organization.

L



$$y = \frac{1 \times 9 + 1 \times -2 \times 7 - 2 \times -2 - 1 \times 9 \times -27}{1 \times 1 + 1 \times -3 \times 9 - 2 \times -3 - 1 \times -2 \times 9 - 1 \times -2 + 2 \times 1 \times -2} =$$

$$\frac{9 - 2 \times 7 + 4 - 9 \times -27}{1 - 3 \times 9 + 0 + 2 \times 9 + 2 + 2 \times -2} = \frac{7 \times 7 - 5 \times -27}{-2 \times 9 + 8 \times 9 + 4 \times -2} = \frac{49 + 135}{-18 + 72 - 8} = \frac{184}{46} = 4$$

Il valore dunque della seconda incognita y è 4. Si sostituiscano finalmente nella terza formola i valori delle indeterminate di quella formola, onde avere il valore di z , che fatta la seguente operazione si troverà essere 5.

$$z = \frac{-1 \times -3 - 1 \times 1 \times 7 + 1 \times -2 + 2 \times -3 \times -27}{1 \times 1 + 1 \times -3 \times 9 - 2 \times -3 - 1 \times -2 \times 9 - 1 \times -2 + 2 \times 1 \times -2} =$$

$$\frac{3 - 1 \times 7 - 2 - 6 \times -27}{1 - 3 \times 9 + 0 + 2 \times 9 + 2 + 2 \times -2} = \frac{2 \times 7 - 8 \times -27}{-2 \times 9 + 8 \times 9 + 4 \times -2} = \frac{14 + 216}{-18 + 72 - 8} = \frac{230}{46} = 5.$$

377. Chiunque rifletterà alle fatte sostituzioni, potrà per se stesso osservare, che ogni qualvolta nelle equazioni condizionali mancherà qualche termine, succedendo ciò a motivo che va a zero il suo coefficiente, sarà pure eguale a zero la lettera, che nelle formole gli corrisponde; onde è, che nella formola mancheranno tutti i termini, in cui entrerà quella tal lettera, perchè col moltiplicarsi una quantità in zero il prodotto è zero: Per lo che mancando nella prima equazione condizionale il termine cognito, a cui corrisponde D, svaniranno nelle formole tutti i termini, in cui entra questa lettera D.

378. Inoltre un'altra cosa, a cui riflettere si è il segno, da cui deve essere affetto ciascun prodotto parziale, e in ciò ha luogo la regola data al num. 57., mentre se il prodotto dei valori corrispondenti a un termine sarà positivo, e nelle formole quello tal termine sia affetto dal segno +, o —, tale pure sarà dopo fatta la sostituzione; ma se il prodotto dei valori sarà negativo, il corrispondente termine della formola dopo fatta la sostituzione dovrà essere affetto da segno contrario a quello che aveva; cioè se era positivo deve essere negativo, e se era negativo deve essere positivo.

A R T I C O L O I I.

Della risoluzione delle equazioni di secondo grado, o sia quadrate.

379. **D**EF. L'equazione dicesi quadrata, quando la massima potestà, a cui ascende l'incognita, è il quadrato, come farebbe $x^2 - ab + ac = 0$, o pure $x^2 - bx + ad = 0$.

380. Le equazioni di secondo grado si distinguono in pure, o sia incomplete, e in affette, o complete. Le prime oltre il termine, che comprende il quadrato dell'incognita, non altro contengono, che quantità cognite, come $x^2 + cx - ab = 0$, cioè $x^2 \sqrt{1+c} - ab = 0$. Le seconde oltre il quadrato dell'incognita, e le quantità cognite, comprendono ancora un altro termine, in cui entra l'incognita elevata alla prima dimensione, come $x^2 + ux - bc = 0$.

381. Per cominciare dalle prime, qualora sia proposta da risolversi una equazione pura di secondo grado, bisogna primieramente prepararla con lasciare da una parte del segno d'uguaglià il quadrato dell'incognita soltanto affetto dal segno positivo, e libero da qualunque fattore, o divisore, indi trasportare dall'altra parte del segno d'uguaglià tutte le quantità cognite; nel qual modo tutte le equazioni quadratiche pure, e preparate caderanno sotto questa formola generale $x^2 = \pm p$, in cui p esprime il complesso di tutte le quantità cognite affette da qualsivoglia segno, o positivo, o negativo. Preparata poi così l'equazione, ella si risolverà con estrarre da ambi i membri la radice quadrata così $x = \pm \sqrt{\pm p}$, lo che non altera punto l'uguaglià, avvegnachè le radici de' quadrati eguali sian eguali. L'espressione poi

$\pm \sqrt{\pm p}$ è il valore di x , o sia è la radice della equazione. Qualora pel valore dell'incognita si troverà una quantità radicale, ciò vorrà dire, che il Problema non ammette soluzione numerica esatta, ma solo per approssimazione.

382. E qui si osservi, che alla radice della quantità cognita si è prefisso il doppio segno $\pm$ a tenore di quanto si è detto al num. 114; onde è, che le equazioni di secondo grado hanno doppia radice, e però ammettono doppia soluzione:

Per lo che le radici della proposta equazione generale $x^2 = \pm p$ sono $+\sqrt{\pm p}$, e $-\sqrt{\pm p}$. Veramente la regola del doppio segno ha luogo non solo nella quantità cognita, ma ancora nell'incognita, così che nel risolverli l'equazione $x^2 = \pm p$ si avrebbe dovuto fare $\pm x = \pm \sqrt{\pm p}$, con che si farebbero avute quattro combinazioni, cioè $x = +\sqrt{\pm p}$; $-x = -\sqrt{\pm p}$; $x = -\sqrt{\pm p}$; $-x = +\sqrt{\pm p}$, ma poichè le due prime non sono fra loro diverse, siccome non lo sono le due seconde, mentre cambiati i segni a una di loro, lo che si può fare senza turbare l'eguaglianza (giusta il num. 320.), ne ritorna l'altra; come cambiando i segni ad $x = +\sqrt{\pm p}$ si ha $-x = -\sqrt{\pm p}$; e cambiando i segni ad $x = -\sqrt{\pm p}$ si ha $-x = +\sqrt{\pm p}$, però le accennate quattro combinazioni si riducono a due sole espresse da questa formola $x = \pm \sqrt{\pm p}$.

383. Alla quantità cognita p ho prefisso il doppio segno così $\pm$, perchè secondo le diverse condizioni del problema ella può essere o positiva, o negativa. Se tale quantità cognita sarà positiva, l'equazione avrà due radici, una positiva

$x = +\sqrt{+p}$, e l'altra negativa $x = -\sqrt{+p}$; ma se la quantità cognita sarà affetta dal segno negativo, l'equazione avrà bensì due radici una positiva, e l'al-

tra negativa così $x = \pm\sqrt{-p}$, ma ambedue saranno immaginarie giusta i num. 114, e 160. Qualora poi si trova immaginario il valore dell'incognita, egli è segno, che il Problema, a cui l'equazione si riferisce, è stato proposto con condizioni ripugnanti, che lo rendono impossibile o in tutto, o in parte, secondo che o tutte, o parte delle radici sono immaginarie.

384. Ho detto, che dell'equazione $x^2 = \pm p$, o sia $x^2 \mp p = 0$ le radici sono

$x = +\sqrt{\pm p}$, e $x = -\sqrt{\pm p}$. Di fatto in queste due equazioni si trasporti dalla parte del segno, ove è l'incognita, il suo valore, ed eguagliandone una di loro a zero, si moltiplichi una nell'altra, con che ne verrà l'equazione proposta, e ciò mostra abbastanza, che, essendo esse le di lei componenti, ne sono i suoi fattori, e però le sue radici: Mentre per radici di una equazione non altro si intendono, che i valori dell'incognita, che colla stessa incognita sommati, o sottratti, e fra loro moltiplicati, restituiscono la stessa equazione: Ecco il Calcolo

$$\begin{array}{r} x - \sqrt{\pm p} = 0 \\ x + \sqrt{\pm p} \end{array} \} \text{ Fattori}$$

$$\begin{array}{r} x^2 - x\sqrt{\pm p} \\ + x\sqrt{\pm p} \mp p = 0 \end{array}$$

Prodotto $x^2 \mp p = 0$, e però $x^2 = \pm p$ equazione proposta. Ma passiamo a vedere coll'esempio le dottrine esposte. Proponnò pertanto un Problema generalmente, che poscia applicherò al caso particolare.

385. Prob. 1. Si debbano ritrovare due numeri, de' quali il prodotto sia ab , e in oltre la differenza di questi due numeri cercati stia al secondo, come b sta a $b+c$.

386. Risol. Il primo de' due numeri cercati si dica $=x$, e il secondo $=y$. Per la prima condizione proposta sarà $xy = ab$; per la seconda sarà $x-y :: b : b+c$, e però $bx - by + cx - cy = by$, cioè $bx + cx = 2by + cy$. Ora dalla prima equazione $xy = ab$ prendo il valore di y , che è $y = \frac{ab}{x}$, che sostituisco in luogo di y nella seconda equazione a fine di eliminare questa incognita, con che ho $bx + cx = \frac{2ab^2}{x} + \frac{acb}{x}$. Passo adesso a preparare questa equazione con liberarne primieramente il secondo membro dal denominatore x così $bx^2 + cx^2 = 2ab^2 + abc$, cioè $b+c \times x^2 = 2ab^2 + abc$, poscia a liberare l'incognita dal suo coefficiente, a fine di lasciarla sola da una parte del segno d'uguaglianza, lo che ottengo con dividere

tutta l'equazione per $b+c$ così $x^2 = \frac{2ab^2 + abc}{b+c}$. Preparata in questo modo l'equazione non resta altro, che risolverla, e ciò si fa con estrarre la radice quadrata da ambi i membri dell'equazione così $x = \pm \sqrt{\frac{2ab^2 + abc}{b+c}}$.

387. Paragonando questa ritrovata equazione coll'equazione ecumenica $x^2 = \pm p$ si vede, che è $\frac{2ab^2 + abc}{b+c} = +p$.

388. Per avere il valore dell'altro numero cercato y si prenda dall'equazione $xy = ab$ il valore di x così $x = \frac{ab}{y}$, quale si sostituifica nell'equazione $bx + cx = 2ky + cy$, e si avrà $\frac{ab^2}{y} + \frac{abc}{y} = 2ky + cy$, cioè $ab^2 + abc = 2ky^2 + cy^2$, e liberando l'incognita dal coefficiente, si avrà $\frac{ab^2 + abc}{2b+c} = y^2$, e finalmente estraendo da ambi i membri la radice quadrata, si avrà $y = \pm \sqrt{\frac{ab^2 + abc}{2b+c}}$.

389. Ma per venire al caso particolare sia $a = 23 \frac{1}{3}$; $b = 6$, e però de' due cercati numeri il prodotto $ab = 140$; sia $c = 9$. Sostituendo questi valori numerici nella prima espressione $x = \pm \sqrt{\frac{2ab^2 + abc}{b+c}}$, si avrà $x = \pm \sqrt{\frac{1087 + 135}{15}} = \pm \sqrt{\frac{1222}{15}}$

$= \pm \sqrt{196} = \pm 14$. Sostituendo poi gli stessi valori numerici nella seconda espressione $y = \pm \sqrt{\frac{ab^2 + abc}{2b+c}}$, si avrà $y = \pm \sqrt{\frac{840 + 1260}{21}} = \pm \sqrt{\frac{2100}{21}} = \pm \sqrt{100} = \pm 10$.

De' cercati numeri adunque il primo x è $= \pm 14$, il secondo y è $= \pm 10$. Di fatto con loro si adempiono le due proposte condizioni, cioè che il loro prodotto $14 \times 10 = 140$ sia $= ab$, e che in oltre sia $b : b+c :: x-y : y$, cioè $6 : 6+9 :: 14-10 : 10$. Il calcolo poi con darci l'uno, e l'altro numero affetto da doppio segno ci fa vedere, che questi numeri soddisfano al proposto Problema tanto prendendoli positivi, come prendendoli negativi, relativamente al senso indiretto del Problema. Se fosse stato $a = 17$; $b = 6$; $c = 9$, fatta la sostituzione di questi valori si farebbe trovato $x = \pm \sqrt{\frac{2088}{15}}$, o sia $x = \pm \sqrt{\frac{696}{5}}$, vale a dire $x = \pm 26 \sqrt{\frac{1}{5}}$; e $y = \pm \sqrt{\frac{1475}{21}}$,

cioè $y = \pm \sqrt{\frac{492}{7}}$, le quali due radici essendo irrazionali danno a vedere (giusta il num. 381), che nell'ipotesi di $a = 27$, $b = 6$, $c = 9$ il Problema non è aritmeticamente risolubile.

390. Prob. 2. Dato il tempo, in cui un grave percorre un dato spazio, si debba ritrovare il tempo, in cui percorrerà un'altro spazio dato.

391. Rifol. Il tempo dato si dica $= t$, lo spazio percorso $= s$, lo spazio da per-

percorrerli $= a$, il tempo cercato $= x$. Poichè gli spazi percorsi da' corpi cadenti fanno fra loro in ragione duplicata dei tempi, sarà $s: a :: t^2: x^2$, e però $s x^2 = a t^2$, e liberando l'incognita dal coefficiente, si avrà $x^2 = \frac{a t^2}{s}$, ed estraendo da ambi i

membri la radice quadrata sarà $x = \pm \sqrt{\frac{a t^2}{s}}$. Ora ponendo, che il tempo dato s sia $= 3$ secondi, lo spazio s percorso in questo tempo $= 145$ piedi, lo spazio a da percorrerli $= 35834 \frac{8}{9}$ piedi, se si sostituiranno questi valori si avrà $x = \pm$

$\sqrt{\frac{34.514}{145}} = \pm \sqrt{2209} = 47$. Il tempo cercato adunque è di 47 secondi.

392. Veniamo alle equazioni quadrate affette, o complete. La formola generale, che rappresenta tutte le quadratiche affette, che diversamente risultano dalla diversità de' segni, che possono convenire a ciascuno de' loro termini, è la seguente $x^2 \pm p x \pm q = 0$, in cui la lettera p rappresenta il complesso delle quantità cognite, che moltiplicano l'incognita elevata alla prima dimentione, e la lettera q esprime il complesso delle quantità, che formano il termine cognito dell'equazione.

393. Per riguardo ai segni da' quali possono essere affetti i termini delle equazioni di secondo grado, la proposta equazione generale $x^2 \pm p x \pm q = 0$ si risolve nelle quattro seguenti.

- | | |
|------|---------------------|
| I. | $x^2 + p x + q = 0$ |
| II. | $x^2 - p x - q = 0$ |
| III. | $x^2 + p x - q = 0$ |
| IV. | $x^2 - p x + q = 0$ |

394. Il modo di preparare queste equazioni si è di fare, che la massima potenza dell'incognita resti positiva, e immune tanto da fattori, come da divisori, e in oltre che da una parte del segno d'egualità restino tutti i termini, in cui entra l'incognita, e dall'altra parte rimangano le sole quantità cognite: Per Esempio essendo proposta l'equazione $a x^2 - d x^2 = a b - c x + a c$, ella si preparerà così

$$x^2 + \frac{c x}{a-d} = \frac{a b + a c}{a-d}.$$

395. Preparata in questo modo l'equazione devesi passare a risolverla. Il modo pertanto di risolverla si è di estrarre la radice quadrata da ambi i membri dell'equazione. Ma affinchè, estraendo la radice quadrata dal primo membro, in cui si ritrova l'incognita, si possa separare l'incognita dalle quantità cognite, bisogna che questo primo membro sia un quadrato perfetto, e siccome nella formola $x^2 \pm p x = \mp q$ egli non lo è, però tutto l'artificio consiste in ridurre il primo membro ad essere un quadrato perfetto. Per ottenere ciò, osservo, (giusta il num. 771. del Tomo I.) che gli elementi, da' quali risulta un quadrato di radice binomia sono il quadrato della prima parte del binomio, più il doppio del prodotto della prima parte nella seconda, più il quadrato della seconda parte. Dunque rispetto al primo membro $x^2 \pm p x$ dell'equazione prendendosi x per una parte della radice, farà il coefficiente del secondo termine cioè p , il doppio dell'altra parte, e però l'altra parte

te farà $\frac{1}{2}p$: Quindi, perchè coll'aggiungerfi una stessa quantità a quantità eguali non si turba l'eguaglianza, se si aggiungerà all'uno, e all'altro membro dell'equazione il quadrato di $\frac{1}{2}p$, che è $\frac{1}{4}p^2$, si avrà $x^2 \pm px + \frac{1}{4}p^2 = +\frac{1}{4}p^2 \mp q$, il di cui primo membro è un quadrato perfetto, che ha per radice $x \pm \frac{p}{2}$: Per lo che estraendo la radice quadrata da ambi i membri della proposta equazione, si avrà $x \pm \frac{p}{2} = \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 \mp q}$, e però $x = \mp \frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 \mp q}$. Conseguentemente avendo particolar riflesso alla varietà de' segni, ciascuna delle quattro equazioni proposte al num. 393. si risolverà come segue

$$\text{I. } x = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$$

$$\text{II. } x = +\frac{1}{2}p \pm \sqrt{+\frac{1}{4}p^2 + q}$$

$$\text{III. } x = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q}$$

$$\text{IV. } x = +\frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$$

395. Osserviamo adesso queste formole per determinare le spezie delle radici di ciascuna di queste equazioni. E primieramente se si rifletterà alle formole del num. 393. si vedrà apertamente, che solamente la prima, e la quarta in cui l'ultimo termine è positivo possono avere radici immaginarie, lo che succederà in caso,

che sia $\frac{1}{4}p^2 < -q$, nel qual caso la quantità $\sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$ essendo negativa, è necessariamente immaginaria. Ma supposto che niuna di queste formole ammetta radici immaginarie, consideriamo le stesse formole già risolte giusta il num. 395 per determinare lo stato delle radici di ciascuna, vale a dire se sono positive, o

negative. E primieramente poichè in ciascuna di queste formole si ha $\frac{1}{2}p = \sqrt{\frac{1}{4}p^2}$ i

nella prima formola farà $\frac{1}{2}p > \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$, e però l'una, e l'altra radice di

questa equazione farà negativa, cioè tanto $-\frac{1}{2}p + \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$, come $-\frac{1}{2}p -$

$\sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$. Per la stessa ragione la seconda, e terza formola, in cui è $\frac{1}{2}p <$

$\sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q}$ avrà una radice positiva; e l'altra negativa; vale a dire della seconda

for-

formola la radice positiva sarà $+\frac{1}{2}p + \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q}$, e la negativa $+\frac{1}{2}p - \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q}$; della terza formola la radice positiva sarà $-\frac{1}{2}p + \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q}$, la negativa $-\frac{1}{2}p - \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q}$. Finalmente la quarta formola, in cui è $\frac{1}{2}p > \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$, ha tutte due le radici positive. Rispetto alla prima, e quarta formola resta da osservarsi il caso, in cui sia $\frac{1}{4}p^2 = q$, nel qual caso sarà $\sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q} = 0$, e però queste equazioni avranno ambe le radici eguali, cioè l'una, e l'altra delle radici della prima formola sarà eguale a $-\frac{1}{2}p$, e della quarta formola a $+\frac{1}{2}p$.

397. Che poi i ritrovati valori sieno le vere radici dell'equazione, basta, per accertarsene, moltiplicare fra loro i due valori di una equazione, che se ne vedrà risultare di prodotto la stessa equazione. Prendo pertanto le due ritrovate radici $-\frac{1}{2}p + \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$, e $-\frac{1}{2}p - \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$ della prima formola $x^2 + px + q = 0$, e le moltiplico tra loro come segue, trasferendole prima dalla parte dell'incognita, e uguagliandone una a zero

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Fattori} & \left\{ \begin{array}{l} x + \frac{1}{2}p - \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q} = 0 \\ x + \frac{1}{2}p + \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q} \end{array} \right. & \\
 \hline
 \text{Prodotto} & \left\{ \begin{array}{l} x^2 + \frac{1}{2}px - x\sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q} + \frac{1}{4}p^2 - \frac{1}{2}p\sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q} + q = 0 \\ + \frac{1}{2}px + x\sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q} - \frac{1}{4}p^2 + \frac{1}{2}p\sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q} \end{array} \right. & \\
 \hline
 \text{Somma} & x^2 + px & 0 \quad 0 \quad 0 \quad +q = 0.
 \end{array}$$

Il prodotto pertanto delle due proposte radici restituendo l'equazione da cui erano state dedotte, fa vedere, che sono le vere radici di tale equazione.

398. Una cosa poi nel precedente prodotto devesi osservare, che è comune non solo a tutte le equazioni di secondo grado affette, ma eziandio a tutte le equazioni di qualunque grado siano, come farò vedere a suo luogo, ed è, che il coefficiente del secondo termine non è altro, che la somma delle radici dell'equazione prese con segno mutato, e il termine cognito dell'equazione è il prodotto delle stesse radici. Ma coll'Esempio riduciamo al caso particolare il modo di risolvere le equazioni di secondo grado affette.

399. Prob. 3. Uno si mise a giocare con 150 zecchini, e dopo averne perso un certo numero gli capitò un colpo di fortuna, in cui guadagnando 5518 zecchini venne a rifarsi di quanto aveva perso, e in oltre a raddoppiare tante volte i suoi 150 zecchini, quante ne esprimeva il numero de' rimastigli dalla perdita. Cercasi il numero de' zecchini, che aveva perso.

400. Rifol. I 150. zecchini si dicano $=a$, il numero de' perfi $=x$, i rimasti dalla perdita faranno stati $a-x$, il guadagno si dica $=b$. Una sola è la condizione in questo Problema proposta, cioè che il guadagno b sia eguale ad x più il prodotto di x in $a-x$, con che si ha l'equazione $x+a-x-x^2=b$, e riducendo positivo il termine, in cui l'incognita è elevata alla massima potestà, si avrà x^2-x+ax

$=-b$, o sia $x^2 + \overline{1+a}x - x = -b$, equazione, che si riferisce alla IV. formola, per risolvere la quale bisogna primieramente aggiungere ad ambi i membri il quadrato della metà del coefficiente del secondo termine così $x^2 + \overline{1+a}x - x + \frac{\overline{1+a}^2}{4} = -b + \frac{\overline{1+a}^2}{4}$, indi passare all'estrazione della radice quadrata, con che si avrà

$x - \frac{1-a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1+a}{4} - b}$ e però $x = + \frac{1+a}{4} \pm \sqrt{\frac{1+a}{4} - b}$. Che se in luogo delle lettere si sostituiranno i loro valori numerici, si avrà $x = \frac{151}{2} \pm \sqrt{\frac{22801}{4} - 5518}$, cioè $x = \frac{151}{2} \pm \sqrt{\frac{729}{4}}$, e però $x = \frac{151}{2} \pm \frac{27}{2}$. Due per-

tanto sono i numeri, che soddisfano al presente quesito, il primo è $\frac{151+27}{2} = 89$, il secondo è $\frac{151-27}{2} = 62$, cioè a dire la perdita fatta giusta la proposta condizione può essere stata tanto di 89, come di 62 zecchini. Di fatto se la differenza tra 150, e 89, che è 61, si moltiplicherà per 89, e al prodotto si aggiungerà 89, si avrà 5518: Parimente se la differenza tra 150, e 62, che è 88, si moltiplicherà per 62, e al prodotto si aggiungerà 62, si avrà 5518.

401. Prob. 4. Data dentro il Barometro una qualunque quantità d'aria, cercasi l'altezza, a cui dentro il tubo starà sospeso il mercurio.

402. Rifol. L'altezza incognita, a cui deve stare sospeso il mercurio si dica $=x$, si chiami $=a$ la pressione di una colonna aerea, che pesa quanto una colonna egualmente grossa di mercurio alta 28 pollici, farà $a-x$ la pressione dell'aria rinchiusa dentro il tubo: In oltre, sia $=d$ la quantità d'aria dentro rinchiusa, si faccia $=b$ la lunghezza del tubo, farà $b-x$ lo spazio, in cui dentro al tubo si dilaterà l'aria rinchiusa. Ma gli spazi, ne' quali una data massa d'aria si dilata sono in ragione reciproca delle forze, che la comprimono, quindi si avrà la seguente proporzione $a:a-x::b-x:d$, e facendo il prodotto de' medj, e degli estremi si avrà $ad = ab - bx = ax + x^2$, o sia $x^2 - \overline{b-a}x = a \times \overline{d-b}$ equazione, che si riferirebbe alla II. formola se il termine $a \times \overline{d-b}$ fosse positivo, ma perchè egli è necessariamente negativo, però l'equazione si riferisce alla quarta formola. Si aggiunga pertanto all'uno, e all'altro membro di questa equazione il quadrato della metà del coeffi-

ciente del secondo termine, e si avrà $x^2 - \overline{b-a}x + \frac{\overline{b-a}^2}{4} = a \times \overline{d-b} + \frac{\overline{b-a}^2}{4}$,
e le-

e levando la radice quadrata da ambi i membri ne verrà $x = \frac{b-a}{2} \pm \sqrt{a \times \frac{d-b+b+a}{4}}$, e conseguentemente $x = + \frac{b+a}{2} \pm \sqrt{a \times \frac{d-b+b+a}{4}}$.

403. Per venire al caso particolare si ponga eguale a 28 la pressione della colonna aerea, onde sarà $a=28$, la rinchiusa quantità d'aria $d=1\frac{11}{28}$, la lunghezza del tubo $b=38$ pollici; sostituiti questi valori in luogo delle lettere, si avrà

$$x = \frac{38+28}{2} \pm \sqrt{-36\frac{17}{28} \times 28 + \frac{4356}{4}}, \text{ cioè } x = 33 \pm \sqrt{-1025+1089},$$

e però $x = 33 \pm \sqrt{64}$, e finalmente $x = 33 \pm 8$. Due pertanto sono le radici di questa equazione, la prima $x = 33+8=41$, la seconda $x = 33-8=25$, e questa seconda è la sola, che scioglie il problema proposto; che però la cercata altezza del mercurio nel tubo sarà di 25 pollici. La prima radice poi 41 scioglie il Problema nella supposizione, che (la lunghezza del tubo essendo assai maggiore della data) si cercasse l'altezza, a cui dovrebbe alzare il mercurio, qualora il peso della colonna aerea si aumentasse di $1\frac{11}{28}$. E qui opportunamente si osservi, che vi

sono de' casi, ne' quali tutte le radici di una equazione risolvono ciascuna il Problema nel senso diretto coerentemente alla fatta enunciazione, e tali a cagion d' Esempio sono le due radici del precedente 3. Problema, ma ve ne sono ancora di quelli, in cui le radici sciolgono il Problema in sensi opposti, come succede nel presente per cui trovansi due radici reali, e positive, e pure la sola 25 scioglie direttamente il Problema nel senso proposto. La ragione poi, per cui si trovi l'altra radice 41 si è, perchè ne sarebbe venuta la stessa equazione, e però la stessa soluzione anche dal supporli $a+x :: b+x :: d$, per lo che l'equazione trovata deve necessariamente inchiodare le dette due differenti questioni.

404. Mediante l'introduzione di una nuova incognita si possono ridurre le equazioni di secondo grado affette ad essere pure, ed ecco come. Ho detto al num. 395, che nell'equazione $x^2 \pm px = \pm q$, acciò il primo membro sia un quadrato perfetto, vi si deve aggiungere il quadrato della metà del coefficiente del secondo termine così $x^2 \pm px + \frac{1}{4}p^2$: se pertanto questa quantità si farà eguale al quadrato di una nuova incognita, per Esempio y , si avrà $x^2 \pm px + \frac{1}{4}p^2 = y^2$, e trasponendo il

termine incognito $\frac{1}{4}p^2$, sarà $x^2 \pm px = y^2 - \frac{1}{4}p^2$, con che i due termini incogniti dell'equazione si rendono eguali a due altri termini, uno cognito, e l'altro incognito. Stante poi questa ritrovata eguaglianza, se nell'equazione ecumenica $x^2 \pm px = \pm q$ si sostituiranno i due termini $y^2 - \frac{1}{4}p^2$ in luogo del primo membro, ne verrà $y^2 - \frac{1}{4}p^2 = \pm q$, e però $y^2 = + \frac{1}{4}p^2 \pm q$, ed estraendo finalmente da ambi i membri la radice quadrata, si avrà per ultimo $y = \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 \pm q}$.

Qualora pertanto vogliasi ridurre all'espressione di quadratica pura una equazione affetta del secondo grado, si operi in questo modo: si eguagli ad una nuova incognita l'incognita dell'equazione proposta accresciuta della metà del coefficiente del secondo termine, poscia si alzi al quadrato l'uno, e l'altro membro di questa equazione, indi si trasporti dalla parte della nuova incognita il termine affatto cognito, finalmente si sostituisca nell'equazione proposta questo secondo membro in luogo del primo, e se ne avrà una pura eguale alla proposta affetta, come si cercava. Ma veniamo all'Esempio.

405. Prob. 5. Cercansi i due lati di uno spazio di terra di piedi quadrati 4465, e de' quali lati la differenza è 48.

406. Risol. De' lati cercati il maggiore si dica $=x$, il minore $=y$, lo spazio dato di piedi quadrati 4465 $=a$, la differenza 48 $=b$. Poichè lo spazio dato risulta dal prodotto de' lati, sarà $xy=a$, e la differenza de' lati essendo b , si avrà $x-y=b$. Ora mediante queste due equazioni si elimini una incognita, per esempio la y , lo che si ottiene con prendere dalla prima equazione $xy=a$ il valore di y così $y=\frac{a}{x}$, e sostituirlo nella seconda equazione $x-y=b$ in questo modo

$x-\frac{a}{x}=b$, cioè, liberando il secondo termine dal denominatore, $x^2-a=bx$, e però $x^2-bx=a$. A fine di ridurre ad equazione pura questa equazione affetta, faccio $x-\frac{1}{2}b=x$, e quadrando l'uno, e l'altro membro ho $x^2-bx+\frac{1}{4}b^2=x^2$,

e trasponendo il termine cognito $x^2-bx=x^2-\frac{1}{4}b^2$. Ora nell'equazione $x^2-bx=a$ sostituisco $x^2-\frac{1}{4}b^2$ in vece del primo membro, onde ho $x^2-\frac{1}{4}b^2=a$, cioè $x^2=a+\frac{1}{4}b^2$ equazione pura, che risolvo mediante l'estrazione della radice

quadrata così $x=\pm\sqrt{a+\frac{1}{4}b^2}$. Ma la x si è fatta eguale a $x-\frac{1}{2}b$, quale valore rimesso in luogo di x darà finalmente $x-\frac{1}{2}b=\pm\sqrt{a+\frac{1}{4}b^2}$, e pe-

rò $x=\frac{1}{2}b\pm\sqrt{a+\frac{1}{4}b^2}$, risoluzione, che in sostanza non è differente dalla già data per le quadratiche affette. Che se questo valore di x si sostituirà nell'equazione $x-y=b$, si avrà $\frac{1}{2}b\pm\sqrt{a+\frac{1}{4}b^2}-y=b$, e $y=-\frac{1}{2}b\pm\sqrt{a+\frac{1}{4}b^2}$ valore dell'altro lato cercato y . Si rimettano adesso in luogo delle lettere i loro valori numerici, e si avrà $x=24\pm\sqrt{4465+576}$, cioè $x=24\pm\sqrt{5041}$ cioè $x=24\pm71$, e $y=-24\pm71$. Valendo il segno superiore in queste due espressioni trovasi $x=95$, e $y=47$, valendo poi il segno inferiore il lato x è $=-47$, e il $y=-95$, e tanto i primi, come i secondi numeri soddisfanno al Problema, mentre il loro prodotto è 4465, e la loro differenza è 48. Questi secondi numeri poi indicano, che i cercati lati devonfi prendere in una direzione opposta ai primi; che pe-

però ne verrà un quadrato uguale al primo, ma a lui opposto di sito, e questa soluzione fa vedere, che il Problema pativa doppio senso, uno diretto, e l'altro indiretto.

407. Alcune volte le condizioni, che accompagnano il Problema ammettono quantità radicali, che involgono l'incognita, e in tal caso per preparare l'equazione bisogna primieramente liberarla dai radicali. Se nell'equazione proposta v'è un sol termine radicale, basta lasciarlo solo da una parte del segno d'uguaglià, e trasferire all'altra parte tutti gli altri, indi alzare l'uno, e l'altro membro alla potestà indicata dall'esponente del vincolo, e in questo modo si farà egli svanire:

Come per far svanire il radicale dall'equazione $\sqrt[m]{ax^3 + c^3} + ab = cd$, si farà $\sqrt[m]{ax^3 + c^3} = cd - ab$, ed elevando l'uno, e l'altro membro alla potestà indicata dall'esponente del vincolo, si avrà $ax^3 + c^3 = \overline{cd - ab}^m$, che se si vorrà risolvere questa equazione, si farà primieramente $ax^3 + c^3 = \overline{cd - ab}^m$, indi $x^3 = \frac{\overline{cd - ab}^m - c^3}{a}$, finalmente $x = \sqrt[3]{\frac{\overline{cd - ab}^m - c^3}{a}}$.

408. Essendovi più radicali, essi si faranno svanire mediante una semplice sostituzione nel seguente modo. Si debbano far svanire i radicali dalla seguente equazione $ab = \sqrt[3]{cx} + \sqrt[3]{dx}$. Ciascun radicale si faccia eguale a una nuova incognita, quale si sostituisca nell'equazione in luogo del corrispondente radicale, con che si avrà primieramente in luogo dell'equazione proposta una nuova equazione, la quale non comprenderà radicali; in secondo luogo si avranno altrettante equazioni a due termini, quanti erano i radicali nell'equazione proposta, e ciascuna di queste equazioni si renderà libera dal radicale con alzare i suoi due membri alla potestà indicata dall'esponente del vincolo: Per lo che non resterà più, che far svanire le incognite introdotte, e ciò otterrassi così. Si faccia adunque $\sqrt[3]{cx} = y$,

$\sqrt[3]{dx} = z$, e si avranno queste tre equazioni $ab = y + z$; $y^3 = cx$; $z^3 = dx$. Dalla prima si ha $y = ab - z$, dal qual valore sostituito nella seconda equazione in luogo di y^3 , ne risulta $a^3b^3 - 3a^2b^2z + 3abz^2 - z^3 = cx$, la quale mediante la sostituzione del valore di x^3 trovai essere $a^3b^3 - 3a^2b^2z + 3abz^2 - dx = cx$; dalla quale ricavo il valore di z^3 facendo al solito $z^3 = \frac{cx + dx + 3a^2b^2z - a^3b^3}{3ab}$. Moltiplico adessò per z i due membri di questa equazione, e mi viene $z^3 = \frac{cxz + dxz + 3a^2b^2z^2 - a^3b^3z}{3ab}$, nella quale di nuovo rimetto dx in luogo di z^3 , con che ho $dx = \frac{cxz + dxz + 3a^2b^2z^2 - a^3b^3z}{3ab}$, da cui prendo il valore di z^3 così $z^3 = \frac{3abdx - cxz - dxz + a^3b^3z}{3a^2b^2}$. Ora paragono i due ritrovati valori di z^3 così

$\frac{cx + dx + 3a^2b^2z - a^2b^2}{3a^2b^2} = \frac{3abdx - cxz - dxz + a^2b^2z}{3a^2b^2}$, e ne ricavo una equazione, in cui la z ascende a una sola dimensione, quale risolvo facendo $z = \frac{a^2b^2 + 2abdx - abcx}{2ab^2 + cx + dx}$, e questo valore sostituito in una delle precedenti equazioni,

come nella $a^2b^2 - 3a^2b^2z + 3abz^2 - dx = cx$, dà finalmente $a^2 \sqrt{c^2 + d^2} + 3a^2b^2x^2 \sqrt{c^2 + d^2} + 7cd - d^2 + 3a^2b^2cx + 3a^2b^2dx - a^2b^2$ equazione, che non contiene altra incognita, che quella, che era nell'equazione proposta, che si è liberata dai radicali. Per venire al caso particolare sia il seguente

409. Prob. 6. Cercasi un numero tale, che stia alla radice quadrata del prodotto del medesimo numero nella differenza tra 21, e il quadrato di questo stesso numero, come 21 sta al doppio di se stesso.

410. Risol. il numero cercato si dica x , il $21 = a$, a tenore della condizione proposta si avrà $x : \sqrt{ax - x^2} :: a : 2a$, e facendo il prodotto degli estremi, e de' medj sarà $2ax = a\sqrt{ax - x^2}$. Ma a fine di preparare questa equazione bisogna togliere il radicale, lo che ottengo con inalzare l'uno, e l'altro membro al quadrato così $4x^2 = a^2x - a^2x^2$. Questa equazione poi ha per fattore a^2x , e siccome col dividerli quantità eguali per una stessa quantità i quozienti sono eguali, però fatta la divisione per a^2x , si avrà $x^2 + 4x = a$. La risolvo pertanto al modo delle quadratiche affette così $x^2 + 4x + 4 = a + 4$, ed estraendo da ambi i membri la radice quadrata, ne hò $x + 2 = \pm\sqrt{a+4}$, cioè $x = -2 \pm \sqrt{a+4}$, in cui rimeffo il valore di a si ha $x = -2 \pm \sqrt{21+4}$, vale a dire $x = -2 \pm 5$. Due adunque sono le radici, la prima $x = 3$, la seconda $x = -7$, ognuna delle quali soddisfa al quesito nel modo altre volte esposto. Giusta il num. 395. quando l'ultimo termine di una equazione di secondo grado uguagliata a zero essendo positivo trovasi essere maggiore del quadrato della metà del coefficiente del secondo termine, l'equazione

ha due radici immaginarie. Ma siccome colla formola data $x = \pm \frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$ non appariscono tali, torna commodo esprimerle in quest'altra maniera $x = \pm \frac{1}{2}p \pm \sqrt{q - \frac{1}{4}p^2} \times \sqrt{-1}$, o sia $x = \pm \frac{1}{2}p \pm \frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2} \times \sqrt{-1}$, la quale formola non differisce dalla precedente, che nella sola espressione.

411. A questa spezie di equazioni si riducono molte altre equazioni, in cui l'esponente della massima potestà dell'incognita eccede il secondo grado; siccome però queste equazioni si possono trattare egualmente, che le equazioni quadrate, perciò si chiamano derivate del secondo grado. La loro formola generale [supposto che m sia una potestà di 2.] è la seguente $x^m \pm px^{m-2} \pm q = 0$, vale a dire (determinando l'esponente m) $x^4 \pm px^2 \pm q = 0$; o $x^6 \pm px^4 \pm q = 0$; o $x^8 \pm px^6 \pm q = 0$ ec. Queste equazioni pertanto non devono avere, che due termini, in cui entri l'incognita, e l'esponente della massima potestà dell'incognita deve essere doppio dell'esponente dell'incognita nel secondo termine. Ogniquivolta adunque una equazione, in cui l'esponente della massima potestà dell'incognita, sia maggiore di 2, avrà queste due condizioni, ella si risolverà col metodo usato per le quadratiche affette.

fette: Onde per risolvere l'equazione $x^4 + px^2 = q$ si farà $x^4 + px^2 + \frac{1}{4}p^2 = q + \frac{1}{4}p^2$,

e levando la radice quadrata da ambi i membri, si avrà $x^2 + \frac{1}{2}p = \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$,

cioè $x^2 = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$, e di nuovo estraendo da ambi i membri la ra-

dice quadrata, si avrà finalmente $x = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}$. Istessamente dovendosi risolvere l'equazione $x^4 + px^2 = q$, si aggiunga a tutti due i membri il quadrato della metà del coefficiente del secondo termine, onde si abbia $x^4 + px^2 + \frac{1}{4}p^2 = q + \frac{1}{4}p^2$, da cui levandosi la radice quadrata ne verrà $x^2 + \frac{1}{2}p = \pm$

$\sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$ cioè $x^2 = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$, ed estraendo ad ambi i membri

la radice quadrata si avrà $x = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}$, e finalmente levando di nuovo la radice quadrata da una parte, e dall'altra, farà

$x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{-\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}}$. Così rispetto all'equazione $x^4 + px^2 = q$ si

avrà $x^2 = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$, o sia $x^2 = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}$, e pe-

rò $x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{-\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}}$, e finalmente

$x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{\pm \sqrt{-\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}}}$. Ma veniamo all'Esempio.

412. Prob. 7. Data la somma di due quali si siano potenze dello stesso grado, e dato il loro prodotto, se ne debbano determinare le radici.

413. Rifol. Le potenze date siano per esempio di quarto grado, delle quali le radici si suppongano essere x , e y . Le dette potenze faranno x^4 , y^4 . La somma di queste potenze si dica $= a = 2482$, il loro prodotto si faccia $= b = 194481$. A tenore della prima condizione si avrà $x^4 + y^4 = 2482$, e rispetto alla seconda $x^4 y^4 = 194481$. Ora dalla seconda equazione si prenda il valore di y^4 così $y^4 = \frac{b}{x^4}$, che si sostituisca nella prima equazione in questo modo $x^4 + \frac{b}{x^4} = a$, e togliendo il denominatore si avrà $x^8 + b = ax^4$, cioè $x^8 - ax^4 = -b$, che risolve nella maniera delle quadratiche affette è $x^4 = \frac{a}{2} \pm \sqrt{-b + \frac{a^2}{4}}$, e di nuovo estraen-

do

do da ambi i membri la radice quadrata, si avrà $x^2 = \pm \sqrt{\frac{a}{2} \pm \sqrt{-b + \frac{a^2}{4}}}$, e finalmente estraendo ancora la radice quadrata, farà per ultimo

$$x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{\frac{a}{2} \pm \sqrt{-b + \frac{a^2}{4}}}}. \text{ Che se passeremo a determinare il valore di } y,$$

prendendo primieramente dalla seconda equazione il valore di x^2 , che è $x^2 = \frac{b}{y^2}$, e

sostituendolo nella prima, si avrà $\frac{b}{y^2} + y^2 = a$, cioè $y^2 - ay^2 = -b$ equazione in tutto eguale alla precedente, e in cui il valore di y trovasi essere affatto simile a

quello di x , cioè $y = \pm \sqrt{\pm \sqrt{\frac{a}{2} \pm \sqrt{-b + \frac{a^2}{4}}}}$. Se si sostituiranno pertanto in

$$x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{\frac{a}{2} \pm \sqrt{-b + \frac{a^2}{4}}}} \text{ i valori numerici di } a, \text{ e di } b, \text{ si avrà}$$

$$x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{1241 \pm \sqrt{-194481 + 1340081}}}, \text{ cioè}$$

$x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{1241 \pm \sqrt{1340000}}}$, ed estraendo la radice quadrata dall'ultimo radicale farà $x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{1241 \pm 1160}}$, cioè $x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{2401}}$, facendo valere il segno superiore, e $x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{81}}$ facendo valere il segno inferiore. Dal valore poi $x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{2401}}$ si ha primieramente $x = \pm \sqrt{49}$, e per ultimo $x = \pm 7$.

Dall'altro valore $x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{81}}$ si ha in primo luogo $x = \pm \sqrt{9}$, e finalmente $x = \pm 3$. La cercata radice adunque x può essere tanto 7, come 3, e tanto positiva, come negativa, poichè comunque sia o positiva, o negativa la radice di una potenza d'esponente pari, tale potenza è sempre positiva. Siccome poi pel valore di y ritorna la stessa espressione, che si è trovata pel valore di x , cioè $y = \pm 7$, e $y = \pm 3$; però prendendosi ± 7 pel valore di x farà ± 3 il valore della altra radice y ; e prendendosi ± 3 pel valore di x farà ± 7 il valore di y .

414 La ritrovata formola $x = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}$, che nasce dal risolvere l'equazione $x^4 + px^2 = q$ mi porta ora al modo di estrarre la radice quadrata dai radicali binomj. Per dare la formola generale, che serve a tale estrazione, prendo il generale binomio radicale $\sqrt{\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}$, e suppongo, che la

sua radice sia $x + \sqrt{y}$, onde sarà $\sqrt{\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}} = x \pm \sqrt{y}$, e quadrando l'uno, e l'altro membro, si avrà $\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2} = x^2 \pm 2x\sqrt{y} + y$, in cui le quantità razionali alle razionali, e le irrazionali alle irrazionali dovendo essere uguali, si avranno le due equazioni $\frac{1}{2}p = x^2 + y$, e $2x\sqrt{y} = \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$, per mezzo delle quali si determineranno i valori delle due indeterminate x, y , che si sono assunte. Dalla prima equazione pertanto $\frac{1}{2}p = x^2 + y$ si ha $x^2 = \frac{1}{2}p - y$; quindi quadrando la seconda equazione $2x\sqrt{y} = \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$ si ha $4x^2y = q + \frac{1}{4}p^2$, in cui sostituendo il ritrovato valore di x^2 , ne verrà $2py - 4y^2 = q + \frac{1}{4}p^2$, o sia $4y^2 - 2py = -q - \frac{1}{4}p^2$ e però $y^2 - \frac{1}{2}py = -\frac{q + \frac{1}{4}p^2}{4}$, quale risolvendosi (giusta il num. 395.), si ha

$$y = \frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{16}p^2 - \frac{q + \frac{1}{4}p^2}{4}}, \text{ cioè col farli la riduzione al comune denominatore } y = \frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}, \text{ e } \sqrt{y} = \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}. \text{ Determinato il valore di } y, \text{ si determini adesso il valore di } x. \text{ A tale effetto prendo dall'equazione } \frac{1}{2}p = x^2 + y \text{ il valore di } y, \text{ che è } y = \frac{1}{2}p - x^2, \text{ e lo sostituisco nell'equazione } 4x^2y = q + \frac{1}{4}p^2 \text{ onde ho } 2px^2 - 4x^4 = q + \frac{1}{4}p^2 \text{ cioè } 4x^4 - 2px^2 = -q - \frac{1}{4}p^2, \text{ e però } x^4 - \frac{1}{2}px^2 = -\frac{q + \frac{1}{4}p^2}{4}, \text{ la quale risol-$$

vendosi giusta il num. 411. lascia $x = \pm \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{16}p^2 - \frac{q + \frac{1}{4}p^2}{4}}}$, cioè, fatta la riduzione al comune denominatore, $x = \pm \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$. Per lo che mettendo nella supposta radice $x \pm \sqrt{y}$ i ritrovati valori di x, y si avrà $\pm \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}} \pm \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$, che è la formola ecumenica per l'estrazione della radice quadrata dai binomj radicali della forma $\sqrt{\quad}$

$\sqrt{\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}}$, o sia $\sqrt{n \pm \sqrt{m}}$, intendendo per n le quantità razionali, e per $\sqrt{m}$ le irrazionali. Siccome ogni quadrato ha doppia radice, quindi è, che la ritrovata formola è affetta da doppio segno; e però del proposto binomio radi-

cale $\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$ una radice quadrata è $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$ + $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$, l'altra è $-\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}} - \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$.

415. Affinchè poi a niuno rimanga difficoltà su la ritrovata formola generale, ne farò l'applicazione al caso particolare. Debbiti estrarre la radice quadrata dal binomio $3 + \sqrt{8}$, che indicata sarebbe $\sqrt{3 + \sqrt{8}}$. Paragonato questo bin. $3 + \sqrt{8}$ al binomio generale $\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$, si avrà $\frac{1}{2}p = 3$, e però $\frac{1}{4}p = \frac{3}{2}$: In oltre $\sqrt{q + \frac{1}{4}p^2} = \sqrt{8}$, e sostituendo in vece di $\frac{1}{4}p^2$ il suo valore, che ricavasi dal quadrare l'equazione $\frac{1}{2}p = 3$ così $\frac{1}{4}p^2 = 9$, si avrà $\sqrt{q + 9} = \sqrt{8}$, e quadrando $q + 9 = 8$, e però $q = 8 - 9$, cioè $q = -1$, conseguentemente $\frac{1}{4}q = -\frac{1}{4}$. Ora i ritrovati

valori di $\frac{1}{4}p$, e $\frac{1}{4}q$ si sostituiscano nella formola generale $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$ + $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$, con che si avrà $\sqrt{\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}}} + \sqrt{\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}}}$, cioè $\sqrt{\frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}}$, e perchè $\sqrt{\frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}}$ è tanto $\sqrt{2}$, come 1, però la radice cercata farà tanto $1 + \sqrt{2}$ come $\sqrt{2} + 1$.

416. Si offervi, che se le parti del binomio proposto saranno unite col segno +, tale binomio si riferirà al binomio generale $\frac{1}{2}p + \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$, e però per l'estrazione della radice servirà la formola generale $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$ +

$\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$: Ma se le parti del binomio saranno unite col segno -, tale binomio si riferirà al binomio generale $\frac{1}{2}p - \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}$, conseguentemente per

l'estrazione della radice servirà la formola generale $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$ —

$\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$. Questi due casi poi sono indicati dal binomio generale

$\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p}$, e dalla formola ecumenica per l'estrazione della radice

$\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}} \pm \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$. Quando per la prima parte della radice si

prende la prima parte $\sqrt{\frac{1}{4}p + \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$ della formola, per la seconda parte della

radice devesi prendere l'altra parte $\sqrt{\frac{1}{4}p - \sqrt{-\frac{1}{4}q}}$, e *vice versa*.

417. Ritrovata la formola ecumenica per l'estrazione della radice quadrata dai binomj reali, passiamo adesso all'invenzione della formola generale per l'estrazione della radice quadrata dai binomj immaginari. Abbiamo veduto al num. 410, che i

binomj immaginari cadono sotto a questa forma $\frac{1}{2}p \pm \frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2} \times \sqrt{-1}$, la di

cui radice quadrata supponghasi essere $x \pm y\sqrt{-1}$, onde sarà

$\sqrt{\frac{1}{2}p \pm \frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2} \times \sqrt{-1}} = x \pm y\sqrt{-1}$, e quadrando l'uno, e l'altro mem-

bro si avrà $\frac{1}{2}p \pm \frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2} \times \sqrt{-1} = x^2 \pm 2xy\sqrt{-1} - y^2$, in cui le quantità

reali tra loro, e tra loro le immaginarie dovendo essere eguali (affinchè l'equazio-

ne possa verificarsi) farà $x^2 - y^2 = \frac{1}{2}p$, e $\frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2} \times \sqrt{-1} = 2xy\sqrt{-1}$,

o sia dividendo per $\sqrt{-1}$, $\frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2} = 2xy$, vale a dire $\sqrt{4q - p^2} = 4xy$,

che inalzata al quadrato è $4q - p^2 = 16x^2y^2$, da cui prendendosi il valore di y^2 ,

si avrà $y^2 = \frac{4q - p^2}{16x^2}$, che sostituito nell'equazione $x^2 - y^2 = \frac{1}{2}p$ dà $x^2 - \frac{4q - p^2}{16x^2}$

$= \frac{1}{2}p$, cioè $16x^4 - 4q + p^2 = 8px^2$, vale a dire $x^4 - \frac{1}{2}px^2 = \frac{4q - p^2}{16}$, quale ri-

soluta a tenore del num. 411. dà $x^2 = \frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{16}p^2 + \frac{4q - p^2}{16}}$, e però

$x^2 = \frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}q}$, conseguentemente $x = \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}q}}$. Se pertanto questo ri-

trovato valore di x si sostituirà nell'equazione $\sqrt{4q - p^2} = 4xy$, si avrà y così

$$\sqrt{4q-p^2} = 4\gamma \times \sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}q}}, \text{ e però } y =$$

$$\frac{\sqrt{4q-p^2}}{4\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}q}}}, \text{ o sia riducendo nel denominatore il numero 4 sotto ai vincoli}$$

$$y = \frac{\sqrt{4q-p^2}}{\sqrt{4p \pm 16\sqrt{\frac{1}{4}q}}} = \frac{\sqrt{4q-p^2}}{2\sqrt{p \pm 2\sqrt{q}}}. \text{ Ora se questi ritrovati valori di } x, y \text{ si}$$

sostituiranno nella supposta radice $x \pm y\sqrt{-1}$, si avrà $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}q}} \pm$

$$\frac{\sqrt{4q-p^2} \times \sqrt{-1}}{2\sqrt{p \pm 2\sqrt{q}}}, \text{ che è la formola generale per l'estrazione della radice qua-}$$

drata da un binomio immaginario della forma $\frac{1}{2}p \pm \frac{1}{2}\sqrt{4q-p^2} \times \sqrt{-1}$.

418. Siccome poi l'espressione generale $\sqrt{\frac{1}{2}p \pm \sqrt{4q-p^2} \times \sqrt{-1}}$ rappresenta le radici immaginarie di una qualsivoglia equazione; per le quali si è trovata la

formola ecumenica $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}q}} \pm \frac{\sqrt{4q-p^2} \times \sqrt{-1}}{2\sqrt{p \pm 2\sqrt{q}}}$, ben si vede, che rap-

presentando colla lettera A le quantità reali di questa formola, e colla lettera B le altre quantità, che sono coefficienti di $\sqrt{-1}$, farà $A+B\sqrt{-1}$ la forma delle radici immaginarie di qualsivoglia equazione.

419. Ma veniamo all'applicazione della formola trovata al caso particolare. Debba estrarre la radice quadrata dal binomio $-40-42\sqrt{-1}$, dal di cui par-

ragone col binomio generale $\frac{1}{2}p \pm \frac{1}{2}\sqrt{4q-p^2} \times \sqrt{-1}$ si ha $-40 = \frac{1}{2}p$,

$-42\sqrt{-1} = -\frac{1}{2}\sqrt{4q-p^2} \times \sqrt{-1}$, e dividendo per $\sqrt{-1}$, $-42 =$

$-\frac{1}{2}\sqrt{4q-p^2}$. Essendo pertanto $-40 = \frac{1}{2}p$, farà $\frac{1}{4}p = -20$, $p = -80$,

$p^2 = 6400$; che però nell'equazione $42 = \frac{1}{2}\sqrt{4q-p^2}$ sostituendo il ritrovato va-

lore di p^2 , si avrà $42 = \frac{1}{2}\sqrt{4q-6400}$, o sia $84 = \sqrt{4q-6400}$, e quadrando

$7056 = 49 - 6400$, e però $49 = 13456$, e finalmente $q = 3364$, onde sarà

$\frac{1}{4}q = 841$. Si sostituiscano pertanto nella formola generale $\sqrt{\frac{1}{4}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}q}}$

$\frac{\sqrt{49 - p^2} \times \sqrt{-1}}{2\sqrt{p \pm 2\sqrt{q}}}$ i ritrovati valori; e si avrà $\sqrt{-20 \pm \sqrt{841}}$

$\frac{\sqrt{13456 - 6400} \times \sqrt{-1}}{2\sqrt{-80 \pm 2\sqrt{3364}}}$, cioè $\sqrt{-20 \pm 29} = \frac{\sqrt{7056} \times \sqrt{-1}}{2\sqrt{-80 \pm 116}}$

Ma il primo termine è tanto 3, come $\sqrt{-49}$, o sia $7\sqrt{-1}$, ed il secondo è tanto $-\sqrt{49} \times \sqrt{-1}$, o sia $-7\sqrt{-1}$, come $-\sqrt{-9} \times \sqrt{-1}$, o sia $-\sqrt{9} = 3$; dunque la radice quadrata del proposto binomio è tanto $3 - 7\sqrt{-1}$, come $-3 + 7\sqrt{-1}$.

420. Queste formole generali sono bensì comode al bisogno per operare più speditamente, non però è necessario averle sempre presenti alla mente, bastando ancora fare le sopra esposte operazioni col binomio, di cui si tratta. Così pel bino-

mio dato al num. 415. si farà $\sqrt{3 + \sqrt{8}} = x + y\sqrt{-1}$, indi si opererà nel modo ivi esposto: Parimente pel binomio $-40 - 42\sqrt{-1}$ dato al num. 419 si farà

$\sqrt{-40 - 42\sqrt{-1}} = x + y\sqrt{-1}$, poscia col metodo tenuto si proseguirà l'operazione.

ARTICOLO III.

Dei Problemi più che determinati, indeterminati, semideterminati, e degli artificij di Diofanto.

421. Siccome (pel num. 333.) Problema determinato è quello, in cui il numero delle cose, che si cercano, è uguale al numero delle condizioni date, così problema più che determinato è quello, in cui il numero delle condizioni proposte è maggiore del numero delle cose cercate. E tale farebbe il seguente Problema: Trovare due numeri x, y , de' quali la somma de' quadrati sia 34, la differenza de' cubi 98, e il prodotto 26, in cui tre sono le condizioni date, e due le cose cercate. In questi Problemi tante sono le condizioni superflue, che alla determinazione del problema non si richiedono, quante ne mostra la differenza, che passa tra il numero delle condizioni proposte, e delle cose cercate: Il più delle volte poi queste condizioni superflue pugnando colle necessarie rendono il problema impossibile, come nel proposto esempio il Problema è impossibile, poichè la terza condizione pugna colle due prime; che se la terza condizione fosse stata, che il prodotto de' due numeri fosse 15, il problema farebbe bensì stato possibile, ma la condizione in

quanto che derivante necessariamente dalle due prime, sarebbe stata superflua. Tali problemi rendonsi determinati con togliere le condizioni superflue. Se le condizioni non pugnano, basta ritenerne tante, quante sono le cose cercate; se pugnano queste tali devonsi levare: Così nel problema proposto, perchè la terza condizione, che il prodotto de' due numeri sia 26, pugna, ella deve esser levata, e il problema resterà determinato: Che se la terza condizione farà, che il prodotto de' due numeri sia 15, per rendere il problema determinato basterà levarne una qualunque siasi, ritenendo o la prima, e la seconda, o la prima, e la terza, o la seconda, e la terza.

422. Problema indeterminato è quello, in cui il numero delle condizioni proposte è minore delle cose cercate, e siccome a fine di giungere ad una equazione finale, in cui entri una sola incognita, è necessario che tante siano le condizioni, o sia le equazioni, quante sono le incognite, essendo in questa sorte di Problemi il numero delle equazioni minore del numero delle incognite, ben si vede, che nell'equazione finale necessariamente rimarrà più d'una incognita: Quindi è, che non si potrà mai venire alla soluzione del problema, e però non si potrà ritrovare il valore di una incognita, qualora non si determini ad arbitrio il valore dell'altra, o delle altre, nel qual caso il Problema d'indeterminato si fa determinato; e poichè infiniti sono i valori, che a tali incognite si possono assegnare, perciò il Problema ammette infinite soluzioni. Ma veniamo all'Esempio.

P R O B L E M A I.

423. Cercansi due numeri con questa condizione, che il loro prodotto sia alla differenza de' loro quadrati come $a : b$.

424. Risol. Il numero maggiore si chiami x , il minore y , de' quali il prodotto è xy , e la differenza de' quadrati è $x^2 - y^2$, e però giusta la condizione proposta si avrà $a : b :: xy : x^2 - y^2$, e facendo il prodotto degli estremi, e de' medj, ne verrà $ax^2 - ay^2 = bxy$, in cui prendendo la x per la incognita, si ordinerà l'equazione così, $ax^2 - bxy = ay^2$, e però $x^2 - \frac{by}{a}x = y^2$, che risolvo giusta il num. 395 così

$$x = \frac{by}{2a} \pm \sqrt{y^2 + \frac{b^2y^2}{4a^2}}, \text{ o sia } x = \frac{b}{2a}y \pm \frac{y}{2a}\sqrt{4a^2 + b^2}.$$

Se pertanto la ragione, con cui il prodotto de' due cercati numeri sta alla differenza de' loro quadrati farà

$$1 : 3, \text{ si avrà } a=1, b=3, \text{ dalla sostituzione de' quali valori ne verrà } x = \frac{3}{2}y$$

$$\pm \frac{y}{2}\sqrt{4+9}, \text{ in cui se si supporrà } y=1, \text{ si avrà } x = \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{13}; \text{ supposta}$$

$$y=2, \text{ farà } x=3 \pm \sqrt{13}; \text{ supposta } y=3, \text{ farà } x=\frac{9}{2} \pm \frac{3}{2}\sqrt{13} \text{ ec.};$$

$$\text{fatta } y=-1, \text{ farà } x=\mp \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{13}; \text{ fatta } y=-2, \text{ farà } x=-3 \pm \sqrt{13} \text{ ec.}$$

$$\text{fatta } y=\frac{1}{2}, \text{ farà } x=\frac{3}{4} \pm \frac{1}{4}\sqrt{13}; \text{ fatta } y=\frac{1}{3}, \text{ farà } x=\frac{1}{2} \pm \frac{1}{6}\sqrt{13} \text{ ec.};$$

$$\text{fatta } y=\sqrt{3}, \text{ farà } x=\frac{3\sqrt{3}}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{13}; \text{ fatta } y=\sqrt{13}, \text{ farà } x=3\sqrt{13} \pm \frac{13}{2} \text{ ec.};$$

e co-

e così in infinito continuando pel valore di y le supposizioni di numeri interi, o fratti, razionali, o irrazionali, positivi, o negativi, si avranno infinite soluzioni, e in conseguenza infiniti valori di x .

P R O B L E M A 2.

425. Cercansi quattro numeri con queste due condizioni, la prima che la somma del primo col secondo sia uguale al quadrato del terzo, la seconda che la somma del primo col quadrato del terzo sia uguale al prodotto del secondo nell'ultimo più 2.

426. Rifol. Il primo de' cercati numeri sia x , il secondo y , il terzo z , il quarto u . Sarà, giusta la prima condizione, $x + y = z^2$; giusta la seconda $x + z^2 = yu + 2$, mediante le quali due equazioni eliminando una incognita, per esempio la x , si avrà $z^2 - y = yu - z^2 + 2$, e però $y = \frac{2z^2 - 2}{u + 1}$, il qual valore sostituito nella prima equazione $x + y = z^2$ darà $x = z^2 - \frac{2z^2 - 2}{u + 1}$, o sia $x = \frac{uz^2 - z^2 + 2}{u + 1}$, vale a dire $x = \frac{u-1}{u+1} \times \frac{z^2 + 2}{1}$. In queste due equazioni $y = \frac{2z^2 - 2}{u + 1}$, ed $x = \frac{u-1}{u+1} \times \frac{z^2 + 2}{1}$ vi sono le due u, z da determinarsi ad arbitrio: Se pertanto si sup-

porrà $u = 1$, $z = 2$, la prima equazione sarà $y = 3$, la seconda sarà $x = \frac{0+2}{2}$.

Che cosa poi significhi l'espressione $\frac{0}{2}$ s' intende chiaramente dal numero 226. del primo Tomo, poichè col diminuirsi il numeratore di una frazione, diminuendosi il suo valore, qualora il numeratore si diminuirà a segno di divenire infinitamente piccolo, anche il valore della frazione sarà infinitamente piccolo, lo che succede nel presente caso, e perchè una quantità infinitamente piccola aggiunta ad una quantità finita non l'augmenta, però sarà $x = \frac{2}{2} = 1$: Chi desiderasse ancora un'idea più

chiara del valore di questa espressione $\frac{0}{2}$, basta che rifletta, che (giusta il num. 497. del I. Tomo), in qualsivoglia frazione il divisore sta al dividendo, come l'unità al quoziente, o sia alla frazione, ma in questa espressione il divisore essendo 2, e il dividendo essendo 0, la ragione del divisore al dividendo, e però dell'unità alla frazione è infinitamente grande, dunque *vice versa* la ragione della frazione all'unità è infinitamente piccola, conseguentemente il valore di questa frazione $\frac{0}{2}$ è una quan-

tità infinitamente piccola. Facendosi $u = \frac{2}{3}$, $z = 5$, sarà $y = 36$, $x = -11$ ec.

427. Problema semideterminato è quello, che a motivo di certe condizioni ammette un finito, e determinato numero di soluzioni, quantunque di natura sua sia indeterminato, in quanto che la di lui equazione include più d'una incognita. Le con-

condizioni, che diminuendo il numero delle soluzioni fanno passare il Problema da indeterminato a essere semideterminato, possono essere tre, ed aver luogo, o separatamente, o tutte insieme. La prima che le quantità cercate siano intere, la seconda che siano positive, la terza che siano razionali, al che si riducono gli artifizi di Diofanto. Per fare, che si verifichino queste condizioni, tutta l'arte consiste in sapere assegnare tali valori all'incognita, o all'incognite da determinarsi ad arbitrio, onde il valore dell'equazione risulti intero, positivo, e razionale, se tutte tre le condizioni saranno proposte, o pure l'uno, o l'altro, se solamente l'una, o l'altra condizione sarà data.

428. Se l'equazione essendo immune dalle frazioni non monterà, che al primo grado, la sola seconda condizione, cioè che le quantità da trovarsi siano positive, potrà aver luogo ogni qualvolta l'incognita, o l'incognite da determinarsi ad arbitrio siano affette dal segno —: Se l'equazione avendo frazioni sarà di primo grado, avrà sempre luogo la prima condizione, che le quantità da trovarsi siano intere, e ve lo potrà avere anche la seconda, che siano positive nel caso poc' anzi detto. Se finalmente l'equazione avendo frazioni ascenderà a grado maggiore del primo, potrà sempre cadervi la prima, e l'ultima condizione, e spessissimo anche la seconda. Il primo caso spetta all'equazione di quella forma $y = \pm d \pm ax$, ovvero

$y = \pm ax \pm bx \pm c$ ec. Il secondo all'equazione $y = \pm \frac{bx \pm d}{a}$, o pure

$y = \pm d \pm \frac{bx}{a}$, o $y = \pm \frac{ax \pm bx \pm c}{e}$ ec. Il terzo all'equazione $y = \pm \frac{bx \pm \sqrt{dx \pm e}}{a}$

Quant' al primo caso non potendo aver luogo se non se la condizione, che il valore di y sia positivo, per fare, che ella si verifichi nella supposizione, che il termine ax sia affetto dal segno —, bisognerà assegnare un tal valore a x , che sia minore di $\frac{d}{a}$, cioè sia $\frac{d}{a} > x$. Siane l'Esempio.

P R O B L E M A 3.

429. Cercasi quale sarà il peso di due masse di piombo, la prima delle quali accresciuta di 2 libbre è uguale a 9 libbre meno il triplo della seconda massa.

430. Risol. La prima massa si chiami x , e la seconda y . A tenore della condizione proposta si avrà l'equazione $x + 2 = 9 - 3y$, e però $x = 9 - 2 - 3y$, cioè $x = 7 - 3y$, in cui devonsi dare all'incognita y un tal valore, che sia $7 - 3y$ una quantità positiva: Ora acciò $7 - 3y$ sia positivo deve essere $\frac{7}{3} > y$, e però il 2 è il numero maggiore intero, che si possa sostituire in luogo di y , onde sia $7 - 3y$ una quantità positiva. Sostituendosi adunque il 2 in vece di y , si avrà $x = 1$; sostituendo 1, sarà $x = 4$; e questi sono i soli valori positivi, e interi, che nel presente caso possono convenire ad x , e y . Se il Problema fosse stato proposto con questa condizione, che la prima massa accresciuta di due libbre dovesse essere uguale al triplo della seconda massa meno 9 libbre, l'equazione sarebbe stata $x = 3y - 11$, in cui il valore di x è sempre positivo qualunque sia il numero intero sostituito in luogo

luogo di y cominciando dal 4, perchè deve essere $y > \frac{11}{3}$, per lo che il numero delle soluzioni va all'infinito: E perchè col sostituirsi in luogo di y i numeri 4, 5, 6, 7, 8 ec. si hanno pel valore di x i numeri 1, 4, 7, 10, 13 ec., che sono in progressione Aritmetica, la di cui differenza è 3, quindi è, che essendo proposto qualsivoglia numero da sostituirsi in luogo di y , si avrà tosto il valore di x giusta il num. 1012. del I. Tomo senza aver bisogno di fare l'attuale sostituzione, niente altro richiedendosi, che moltiplicare coll'esponente 3 il proposto numero diminuito di quattro unità, e al prodotto aggiungervi una unità. Qui poi si osservi, che da quelle equazioni della forma $x = \pm d \pm d ay$ ne nasce sempre una progressione aritmetica, la di cui differenza è a . Dalla formola $x = -d + ay$ nasce una progressione ascendente, e dalla formola $x = -ay$ nasce una progressione discendente.

431. Quanto al secondo caso potendo aver luogo le due prime condizioni, per determinare la maniera di farle verificare prendiamo a considerare le formole generali per le equazioni a due incognite, mentre le osservazioni, che se ne faranno serviranno di regola per le equazioni, che hanno più di due incognite. Le formole generali pertanto sono $x = \pm a \pm \frac{by}{c}$, ed $x = \pm \frac{a \pm by}{c}$. Quanto alla prima se fa-

rà $x = a + \frac{by}{c}$, il valore di x farà sempre intero, e positivo, ogni qual volta il valore sostituito in luogo di y farà un multiplo di c : Se farà $x = -a + \frac{by}{c}$, la x avrà sempre un valore intero, e positivo, se sostituendosi in luogo di y un multiplo di c , farà $\frac{a}{b} < \frac{y}{c}$. Essendo $x = a - \frac{by}{c}$, nè risulterà per x un numero intero, e positivo, se sostituendosi in luogo di y un multiplo di c così $\frac{bnc}{c}$, farà $a > bn$, il che non potendosi molte volte verificare, non ammetterà il Problema alcuna soluzione. Quando poi sia $x = -a - \frac{by}{c}$, il Problema farà sempre impossibile. Per non essere troppo lungo, porterò un Esempio solo, che poscia applicherò a tutti tre i casi.

P R O B L E M A 4.

432. Dovendosi distribuire un certo numero di soldi a due poveri con questa legge, che il numero de' soldi dati al primo diminuito di 3 sia uguale a 24 meno $\frac{3}{5}$ del numero de' soldi dati al secondo, cercasi il numero de' soldi dati a ciascuno.

433. Risol. Il numero de' soldi dati al primo si dica x , e il numero de' soldi dati al secondo si chiami y . A tenore della condizione proposta si avrà $x - 3 = 24 - \frac{27}{5}$, cioè $x = 27 - \frac{27}{5}$ equazione, che si riferisce all'ecumenica $x = a - \frac{by}{c}$.

Affinchè adunque x sia intera, e positiva deve essere $27 > \frac{27 \times 5}{5}$, o sia $27 > 27$,

e pe-

e però $\frac{27}{2} > n$, dunque n non deve sorpassare il numero 13, conseguentemente qualunque dei prodotti di 5 in qualsivoglia numero minore di 14 sostituito in vece di y darà ad x un valore intero, e positivo. Se pertanto si sostituirà 5 in luogo di y , si avrà $x=25$; se si sostituirà 10, si avrà $x=23$; se si sostituirà 15, si avrà $x=21$, i quali valori sono in progressione aritmetica decrescente, la di cui differenza è 2, lo che può servire per determinare senza l'attuale sostituzione il valore di x .

434. Se la condizione proposta nel Problema fosse stata, che il numero de' soldi dati al primo diminuito di 3 dovesse essere uguale a $\frac{2}{5}$ de' soldi dati al secondo diminuito di 24, l'equazione sarebbe stata $x-3=\frac{2}{5}y-24$, e però $x=\frac{2}{5}y-21$, equazione che si riferisce alla formola generale $x=-a+\frac{by}{c}$; onde acciò la x sia intera, e

positiva deve essere $\frac{a}{b} < \frac{nc}{c}$, cioè $\frac{a}{b} < n$, e però n deve essere maggiore di 10: Se adunque cominciando dall'11 fino all'infinito si moltiplicherà successivamente il 5, indi questi prodotti si sostituiranno in luogo di y , avrà sempre la x un valore positivo, e però il Problema riceverà infinite soluzioni. Così sostituendosi 55 in luogo di y , farà $x=1$; sostituendosi 60, farà $x=3$; sostituendosi 65, farà $x=5$ ec., i quali valori di x sono in progressione aritmetica principiante dall'unità, la di cui differenza è 2.

435. Finalmente se il problema fosse stato proposto con questa condizione, che il numero de' soldi dati al primo povero diminuito di 3 fosse uguale a 24 più $\frac{2}{5}$ del numero de' soldi dati al secondo, l'equazione sarebbe stata $x-3=24+\frac{2}{5}y$, cioè $x=27+\frac{2}{5}y$, che si riferisce alla formola generale $x=a+\frac{by}{c}$; che però qualunque sia il moltiplo di 5, che si sostituisca in vece di y , il valore di x sarà sempre positivo, e intero: Così sostituendosi 5 in luogo di y , si avrà $x=29$; sostituendosi 10, farà $x=31$ ec.

436. Passiamo ora a considerare la seconda formola generale $x=\frac{\pm a+by}{c}$, di cui le sole tre combinazioni $\frac{a+by}{c}=x$; $\frac{a-by}{c}=x$, $-\frac{a+by}{c}=x$ possono venire al calcolo. E quanto alla prima formola $\frac{a+by}{c}$ ben si vede, che acciò la x risulti un numero intero, si deve in luogo di y sostituire un tal numero, onde l'aggregato $a+by$ sia un moltiplo di c : Quanto alla seconda formola $\frac{a-by}{c}$ non solo si deve sostituire in vece di y un tal numero, che renda $a-by$ moltiplo di c , ma in oltre deve essere $\frac{a}{b} > y$, cioè in luogo di y si deve sostituire un numero, che
sia

fia minore di $\frac{a}{c}$, acciocchè il valore di x risulti positivo. Rispetto alla terza formola $-\frac{a+by}{c}$ il numero da sostituirsi in luogo di y e deve essere maggiore di $\frac{a}{b}$, e deve rendere $-a+by$ un multiplo di c . Rispetto poi a ciascuna di queste tre formole i diversi corrispondenti valori di x , e di y sono sempre in progressione aritmetica con questa legge costante, che la progressione aritmetica nata dai valori di x ha per differenza la quantità b , cioè il coefficiente di y , e la progressione aritmetica nata dai valori di y ha per differenza la quantità c , cioè il coefficiente di x in supposizione che la frazione sia ridotta a minimi termini. Rispetto alle due formole $\frac{a+by}{c} = x$, e $-\frac{a+by}{c} = x$ le progressioni tanto dei valori di x , come di y sono ascendenti, ma rispetto alla formola $\frac{a-by}{c} = x$ una delle progressioni è ascendente, e l'altra discendente, lo che costa dalla sola ispezione delle formole: Per lo che basta trovare di queste due progressioni il primo termine per avere nel tempo istesso anche tutti gli altri, che servono alla soluzione. Un poco d'esercizio poi unito a qualche destrezza basterà per scuoprire con facilità la prima quantità da sostituirsi in luogo di y , dalla quale sostituzione si avrà il primo valore di x , e così poscia ritrovati i primi termini delle due progressioni aritmetiche, si avranno mediant la regola data tutti gli altri.

P R O B L E M A 5.

437. Cercasi lo spazio percorso in tempi uguali da due mobili, i quali con celerità ineguali si muovono in guisa, che il quintuplo dello spazio percorso dal primo più 17 è costantemente uguale al sestuplo dello spazio percorso dal secondo.

Risol. Lo spazio percorso dal primo si chiami x , e lo spazio percorso dal secondo in tempo uguale si dica y . Giusta la condizione proposta si avrà $5x+17=6y$, e però $\frac{5x+17}{6}=y$. Si sostituisca pertanto in vece di x il 5, che è il primo numero, che possa aver luogo, e si avrà $y=7$. Ora giusta la regola data al num. 436. la progressione aritmetica, che nasce dai valori di x deve avere per differenza il 6, e la progressione aritmetica, che nasce dai valori di y deve avere per differenza il 5: Quindi la progressione, che dà i valori di x , è 5, 11, 17, 23 ec., e la progressione, che dà i valori di y , è 7, 12, 17, 22 ec. Se in vece di ritrovare il valore di y nel risolvere l'equazione, si fosse ritrovato il valore di x , così $x=\frac{6y-17}{5}$, si sarebbe tolto veduto, che pel valore di y sarebbe stato d'uopo prendere un numero maggiore di $\frac{17}{6}$, il quale rendesse $6y-17$ un multiplo di 5.

438. Si osservi, che acciò l'espressione $\frac{a+by}{c}$ risulti un numero intero mediante la sostituzione di qualche numero intero in luogo di y , devono le due quantità b, c essere numeri primi fra loro; che se non saranno tali, non si potrà assegnare a y alcun valore intero, che renda la frazione un numero intero. Difatto non essendo b, c numeri primi fra loro, sarà o $\frac{b}{c}=m$, o $\frac{b}{c}=\frac{mr}{m'}$, o $\frac{b}{c}=\frac{1}{m}$, conseguen-

temente $\frac{c}{b} = m$. Si faccia pertanto la frazione $\pm \frac{a \pm by}{c}$, uguale a Q , che suppongo numero intero, e sostituendosi m in luogo di $\frac{b}{c}$ giusta il primo caso, si avrà $\pm \frac{a}{c} \pm my = Q$, quindi essendo m numero intero, dovrà y essere necessariamente una frazione, mediante cui possa essere $\pm \frac{a}{c} \pm my$ un numero intero, e però non si potrà dare a y alcun valore intero, che renda la frazione un numero intero. Si sostituisca adesso $\frac{mr}{mt}$ in vece di $\frac{b}{c}$ giusta il secondo caso, e si avrà $\pm \frac{a \pm mry}{mt} = Q$, vale a dire $\pm \frac{a}{m} \pm ry = Qt$; che però essendo Qt un numero intero, lo dovrà essere ancora $\pm \frac{a}{m} \pm ry$, e non potendo esserlo, se y non è una frazione, ben si vede, che nemmeno in questo caso si potrà assegnare a y un numero intero, che renda intero il valore della frazione. Finalmente essendo $\frac{b}{c} = \frac{1}{m}$, purchè non sia b un divisore esatto di a , nemmeno in questo caso si potrà sostituire un numero intero in vece di y , che renda la frazione un numero intero; poichè facendo $\pm \frac{a \pm by}{c} = Q$, si avrà $\pm a \pm by = Qc$, o sia $\pm by = Qc \mp a$, e però $y = \frac{Qc \mp a}{b}$. Ma essendo $\frac{b}{c} = \frac{1}{m}$, è $\frac{c}{b} = m$; per lo che sostituito questo valore si ha $y = Qm \mp \frac{a}{b}$, in cui non essendo a divisibile per b , sarà $Qm \mp \frac{a}{b}$ una frazione, e tale necessariamente farà la y , alla quale perciò niun valore intero si potrà dare, che renda la frazione un numero intero. Lo che si doveva dimostrare.

439. Non si può dissimulare, che rispetto alla formola $x = \pm \frac{a \pm by}{c}$ il volere tentare diversi valori di y interi, che rendano la x un numero intero, 'oltre che non è un operare scientifico, riesce sovente un operare lungo, e noioso; però darò la maniera di potere ciò facilmente ottenere. Considero pertanto la proposta formola così $cx - by = a$, o $by - cx = a$ con liberarla dal divisore; poscia di questa formola $by - cx = a$ per esempio prendo i fattori b, c di y, x , e con loro ne formo una frazione così $\frac{b}{c}$, dopo di che cerco un' altra frazione $\frac{d}{e}$, la quale sottratta dalla precedente, e trascurato il comune denominatore lasci di residuo ± 1 , cioè sia $bg - cd = \pm 1$ (al num. 858. darò il modo di trovare la frazione $\frac{d}{e}$). Ora si moltiplichino questa equazione $bg - cd = \pm 1$ per a termine cognito della formola data, e si avrà $abg - acd = \pm a$, la quale si sommi, o si sottragga dalla precedente $by - cx = \pm a$, secondo che nell' una, e nell' altra la quantità a ha diverso, o lo stesso segno, con che ne verrà $b \chi y \mp a g - c \chi x \mp a d = 0$, da cui si ricava $\frac{b}{c} = \frac{x \mp a d}{y \mp a g}$. Ma per ipotesi i numeri b, c sono primi fra loro, dunque la frazione tro-

trovata è ridotta ai suoi minimi termini di maniera, che x , y dovendo essere numeri interi, bisognerà, che sia $x \mp a\beta = bm$, e $y \mp a\beta = cm$ (la lettera m esprime un qualunque numero intero); quindi si avrà $x = bm \pm a\beta$, e $y = cm \pm a\beta$. Queste pertanto sono le espressioni generali di tutti i numeri interi, che possono convenire ad x , y secondo i diversi infiniti valori, che si possono assegnare ad m . Prendo l'esempio dall'equazione $5y - 7x = 13$. I coefficienti delle due incognite ridotti nel modo detto a frazione danno $\frac{5}{7}$, e la frazione da sottrarsi, così che sia $b\beta -$

$c\beta = \pm 1$, trovasi essere $\frac{5}{7}$, di fatto sottraggo $\frac{5}{7}$ da $\frac{5}{7}$, e non curando il comune denominatore, trovo $3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$: multiplico questa equazione pel termine cognito 13 della proposta, e mi viene $13 \times 3 \times 5 - 13 \times 2 \times 7 = 13$. Sottraggo questa equazione dalla data $5y - 7x = 13$, e mi nasce $5 \times y - 13 \times 3 - 7 \times x + 13 \times 2 = 0$, cioè $\frac{5}{7} = \frac{x + 13 \times 2}{y - 13 \times 3}$. Faccio $x + 13 \times 2 = 5m$, e però $x = 5m - 13 \times 2$; e $y - 13 \times 3 = 7m$, quindi $y = 7m + 13 \times 3$. Acciò rispetto alla prima equazione $x = 5m - 13 \times 2$ il valore di x sia positivo, il minimo numero, che si possa supporre in luogo di m deve rendere $m > \frac{13 \times 2}{5}$, tutte le altre supposizioni poi all'infinito pel valore di m daranno infinite risoluzioni alla proposta equazione. Un altro esempio ci somministrerà l'equazione $33x - 59y = 76$. Coi due coefficienti delle incognite forma la frazione $\frac{33}{59}$, e la frazione da sottrarsi, acciò si abbia $b\beta - c\beta = \pm 1$, si trova

essere $\frac{14}{25}$, onde sottraendo questa dall'altra senza curare il comun denominatore si si trova $33 \times 25 - 59 \times 14 = -1$. Multiplico questa equazione pel termine cognito 76 così $76 \times 33 \times 25 - 76 \times 59 \times 14 = -76$, che sommo coll'equazione data $33x - 59y = 76$, e mi viene $33 \times x + 76 \times 25 - 59 \times y + 76 \times 14 = 0$, da cui si ricava $\frac{33}{59} =$

$\frac{y + 76 \times 14}{x + 76 \times 25}$. Ora nulla più resta a fare, che $y + 76 \times 14 = 33m$, ed $x + 76 \times 25 = 59m$.

Dalla prima si ha $y = 33m - 76 \times 14$, rispetto a cui deve essere $m > \frac{76 \times 14}{33}$, acciò il valore di y sia positivo; e dalla seconda $x = 59m - 76 \times 25$, rispetto alla quale deve essere $m > \frac{76 \times 25}{59}$, acciò il valore di x sia positivo.

440. Veniamo ora alla terza specie di Problemi, ne quali si tratta di ritrovare numeri, che siano potestà perfette, la quale condizione, come ognun vede, non esclude i numeri fratti, e rispetto alla potestà pari non esclude i numeri negativi, poichè (pel num. 114.) le potestà d'esponente pari sono sempre positive, comunque la loro radice sia positiva, o negativa. Essendo che la condizione proposta esige, che si ritrovino numeri commenfurabili, o sia razionali, i quali soddisfino ai Problemi indeterminati, ai quali porrebbe soddisfare una infinità di numeri incommenfurabili; però tutta l'arte da usarsi nella soluzione di questi Problemi consiste in far sparire dall'equazione il quadrato, e le più alte potestà dell'incognita,

che deve essere il valore dell'equazione, così che restando essa elevata al primo grado, si possa risolvere l'equazione senza che v'intervengano quantità radicali. Per ciò fare molti sono gli artifizj, che passano sotto il nome di Diofanto, per avere egli specialmente trattato di questa spezie di Problemi. Io indicherò i principali, da quali si potrà prender norma per gli altri casi, facendone l'applicazione agli esempj particolari.

P R O B L E M A 6

441. Si debbano ritrovare due numeri con questa condizione, che i loro quadrati più il rettangolo del secondo in una quantità cognita a , diano un numero quadrato.

442. Risol. Il maggiore de' due cercati numeri sia y , il minore sia x , ed u^2 sia il quadrato, cui deve essere uguale la somma de' loro quadrati più il rettangolo del secondo x in a : Si avrà a tenore della condizione $x^2 + ax + y^2 = u^2$. Ora u si faccia uguale a $y + b$, e si avrà $x^2 + ax + y^2 = y^2 + 2by + b^2$, cioè $x^2 + ax = 2by + b^2$, e però $y = \frac{x^2 + ax - b^2}{2b}$, in cui qualunque sia il valore sostituito in

luogo di x si ha sempre per y un valor razionale. Tutto l'artificio in questa soluzione è stato di introdurre il primo numero cercato y in luogo di u , onde si potesse far sparire il quadrato della stessa y . Ma veniamo a determinare i due numeri cercati: Sia $a=7$, $b=2$, se si sostituirà 1 in vece di x , si avrà $y = \frac{1+7-4}{4}$

$= 1$; se si sostituirà 2 in vece di x , si avrà $y = \frac{7}{8}$; se si sostituirà 3, si avrà

$y = \frac{13}{2}$ ec.

443. Lo stesso artificio si sarebbe potuto usare, qualora fosse stato proposto di ritrovare due numeri con questa condizione, che la somma de' loro quadrati, o pure la differenza fosse un numero quadrato, mentre chiamando x uno de' cercati numeri, e l'altro y , giusta la condizione proposta si avrebbe $x^2 + y^2 = u^2$, o $x^2 - y^2 = u^2$, e facendo $u = x \pm z$ ne viene giusta la prima condizione $x^2 + y^2 = x^2 + 2xz + z^2$, cioè $y^2 = 2xz + z^2$, e però $x = \frac{y^2 - z^2}{2z}$, e giusta la seconda condizione $x^2 - y^2 = x^2 -$

$2xz + z^2$, vale a dire $-y^2 = -2xz + z^2$, e però $x = \frac{y^2 + z^2}{2z}$. Un altro artificio ancora puossi usare, ed è rispetto alla prima condizione di chiamare il primo numero $x^2 - y^2$, ed il secondo $2xy$, mentre al quadrato del primo, che è $x^4 - 2x^2y^2 + y^4$ aggiungendosi il quadrato del secondo, che è $4x^2y^2$, si ha $x^4 + 2x^2y^2 + y^4$, che è un numero quadrato, la di cui radice è $x^2 + y^2$: Rispetto alla seconda condizione si chiami $x^2 + y^2$ il primo numero, e $2xy$ il secondo, e la differenza de' loro quadrati sarà $x^4 - 2x^2y^2 + y^4$, che è numero quadrato, la di cui radice è $x^2 - y^2$; o pure il primo numero si chiami $x^2 + y^2$, e il secondo $x^2 - y^2$, e la differenza de' loro quadrati sarà $4x^2y^2$ numero quadrato, la di cui radice è $2xy$.

444. Un'equazione di questa forma $ax^2 = x^4 - y^4$ si potrà risolvere ancora così: Poichè $x^4 - y^4 = (x+y)(x-y)$, si faccia $x+y=r$, ed $x-y=s$, e si avrà $as^2 = rs$

$\equiv r$ mediante la sostituzione; quindi $t = \frac{az^3}{r}$, onde bisognerà, che az^3 sia divisibile per r . Sia P la più grande misura di a , e di r , così che sia $a = PQ$, ed $r = PR$, essendo Q, R numeri primi fra loro, e si avrà $t = \frac{Qz^3}{R}$, conseguentemente $z^3 = RS$, e però $t = QS$, essendo P, Q due qualsivoglia fattori di a . Sia in oltre s la più grande misura di R, S , e siccome RS deve essere uguale a un quadrato, egli è chiaro, che R, S non potranno essere, che di questa forma $R = sm^2, S = sn^2$, essendo s, m, n numeri interi: Per lo che si avrà $z^3 = s^2 m^2 n^2, r = x + y = Prm^2, t = x - y = Qm^2$; dunque $z = smn, x = s \times \frac{Pm^2 + Qn^2}{2}, y = s \times \frac{Pm^2 - Qn^2}{2}$, e facendosi $s = 2$, giac-

chè è inutile questo comun fattore nell'espressione dei valori di x, y, z , farà $z = 2mn, x = Pm^2 + Qn^2, y = Pm^2 - Qn^2$. Or ecco risolta l'equazione, cioè ritrovati i valori razionali di z, x, y , mentre per m, n si possono prendere qualsivoglia numeri interi, e P, Q sono i due fattori di a , tra' quali devesi contare ancor l'unità. Quante poi faranno le maniere di dividere il numero a in due fattori, altrettante faranno le differenti espressioni di z, x, y . Per esempio l'equazione proposta sia $3z^3 = x^3 - y^3$, farà $3 = PQ$, e perchè i fattori di 3 non possono essere, che $1, 3$, cioè $3 = 1 \times 3$, farà $P = 1, Q = 3$. Prendendosi poi per m, n de' numeri ad arbitrio, se si dirà $m = 1, n = 2$, farà $z = 4, x = 1 + 12 = 13, y = 1 - 12 = -11$. Se pertanto si sostituiranno questi valori di z, x, y nell'equazione $3z^3 = x^3 - y^3$, ella diverrà $48 = 169 - 121$, cioè $48 = 48$ equazione identica, la quale fa vedere, che i trovati numeri razionali corrispondenti a z, x, y soddisfano all'equazione.

P R O B L E M A 7.

445. Si debbano ritrovare due numeri con questa condizione, che la somma de' loro quadrati sia al loro prodotto, come il primo numero cercato accresciuto di una quantità cognita a sta al secondo.

Risol. Il primo numero cercato si dica $x - a$, il secondo $y + b$; giusta la condizione proposta si avrà $x^2 - 2ax + a^2 + y^2 + 2by + b^2 : xy - ay + bx - ab :: x : y + b$, e moltiplicando insieme gli estremi, e i medj, si avrà $x^2y - 2axy + a^2y + y^3 + 2by^2 + b^2y + bx^2 - 2abx + a^2b + by^2 + 2b^2y + b^3 = x^2y - axy + bx^2 - abx$, cioè togliendo i termini, che si elidono, $-axy + ay^2 + y^3 + 3by^2 - abx + a^2b + b^3 = 0$, e però $a = \frac{y^3 + 3by^2 + a^2y + 2b^2y + a^2b + b^3}{ay + ab}$. Qui tutto l'artificio è consistito in diminuire la prima incognita aggiunta, ed accrescere la seconda di una quantità costante per modo, che nell'equazione svanissero i termini, in cui entra x^2 .

Questo stesso artificio ha luogo per far svanire delle potestà di quantità cognite: Per esempio cercandosi di dividere in due quadrati un dato numero risultante dalla somma di due quadrati, come $m^2 + n^2$, si chiami $ax - m$ uno de' cercati numeri, e $bx - n$ l'altro: Giusta la condizione proposta si avrà $m^2 + n^2 = a^2x^2 - 2amx + m^2 + b^2x^2 - 2bnx + n^2$, cioè $a^2x^2 - 2amx + b^2x^2 - 2bnx = 0$, e però $x = \frac{2am + 2bn}{a^2 + b^2}$.

Ncl.

Nella stessa maniera si sarebbe operato se fosse stato proposto di ritrovare due numeri con questa condizione, che la somma de' loro quadrati sia uguale alla somma di altri due quadrati; mentre chiamando x, y i due numeri cercati, si avrebbe, giusta la condizione proposta, $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$, e in luogo di a sostituendo $x - a$, e $y + b$ in vece di z ne verrebbe $x^2 + y^2 = x^2 - 2ax + a^2 + y^2 + 2by + b^2$, cioè $-2ax + a^2 + 2by + b^2 = 0$, e però $x = \frac{2by + b^2 + a^2}{2a}$.

P R O B L E M A 8.

445. Si debba ritrovare un numero con questa condizione, che dal di lui quadrato sottraendosi un quadrato dato, il residuo sia un quadrato.

Risol. Il quadrato dato sia b^2 , e il numero da cercarsi per ora si dica x , onde si avrà $x^2 - b^2$, che si faccia uguale ad $\frac{x-b}{x+b} \times u^2$ così $x^2 - b^2 = \frac{x-b}{x+b} \times u^2$, e dividendo per $x-b$, ne verrà $x+b = \frac{x-b}{x+b} \times u^2$, cioè $x+b = x - b + \frac{u^2}{x+b}$, e però $x = \frac{b^2 + u^2}{u^2 - 1}$, che è il numero cercato. Di fatto se dal quadrato di questo numero si sottrarrà il quadrato di b , il residuo farà un numero quadrato, come lo dimostra il calcolo, poichè $\frac{b^2 + u^2}{u^2 - 1} - b^2$ è, mediante la riduzione allo stesso de-

nominatore, $\frac{b^2 u^2 + 2b^2 u^2 + b^2 - b^2 u^4 + 2b^2 u^4 - b^2}{u^4 - 1} = \frac{4b^2 u^2}{u^4 - 1}$ numero quadrato.

Il medesimo artificio si sarebbe praticato, qualora avesse dovuto essere $b^2 - x^2$ uguale a un numero quadrato.

447. Quando nelle equazioni di questa forma $x^2 = Bx + A$, che nascono dal risolverli qualche problema semideterminato, ove perciò le incognite x, u devono essere numeri razionali, o l'una, o l'altra delle quantità A, B , o tutte due sono numeri quadrati, sarà sempre facile il ritrovare valori razionali per x, u giusta il num. 442, mentre se è $A = a^2$, basterà trasformare l'equazione facendo $x = a + ux$, e se è $B = b^2$, basterà fare $x = bu + x$; non egualmente però si potrà procedere alla risoluzione, qualora niuna delle quantità A, B sia numero quadrato. Prima di esporre il modo di operare in questo caso, farò vedere come qualunque equazione di secondo grado a due incognite, ciascuna delle quali debba essere razionale, sia riducibile a questa forma $x^2 = Bx + A$. Prendo a questo fine l'equazione ecumenica di secondo grado $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$, in cui a, b, c, d, e, f sono numeri cognitivi positivi, o negativi, che se fossero fratti, si potrebbero levare le frazioni mediante la riduzione allo stesso denominatore, che poi si trascura. Dispongo questa equazione così $ax^2 + bxy + dx = -cy^2 - ey - f$, indi la risolvo al mo-

do delle quadratiche affette, con che mi viene $x + \frac{by + d}{2a} =$

$$\sqrt{-\frac{cy^2 - ey - f}{a} + \frac{b^2 y^2 + 2bdy + d^2}{4a^2}}, \text{ o sia } 2ax + by + d =$$

✓

$\sqrt{b^2 - 4ac} \times y^2 + 2bd - 4ac \times y + d^2 - 4af$. Ora questo secondo membro deve essere quadrato, acciò la x riesca razionale, quindi deve determinarsi la y in modo, che egli lo possa essere: Per brevità faccio $b^2 - 4ac = B$, $bd - 2ac = m$, $d^2 - 4af = n$, con che si cambierà in $\sqrt{By^2 + 2my + n}$ la quantità

$\sqrt{b^2 - 4ac} \times y^2 + 2bd - 4ac \times y + d^2 - 4af$, e perchè questa quantità deve essere un quadrato, si faccia $By^2 + 2my + n = u^2$. Si disponga questa equazione così $By^2 + 2my = u^2 - n$, e risolvendola si avrà $By + m = \sqrt{Bu^2 + m^2 - Bn}$; onde niente altro più si richiede, se non che $Bu^2 + m^2 - Bn$ sia un quadrato; per lo che si faccia $m^2 - Bn = A$, così che si abbia $Bu^2 + A$, che deve essere un quadrato, e perciò lo uguaglio a z^2 . Tutta adunque la difficoltà consisterà in soddisfare a questa equazione $z^2 = Bu^2 + A$, alla quale si è ridotta l'equazione generale $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$, come era proposto, così che i valori di z , u siano razionali. Ma poichè si è fatto $\sqrt{By^2 + 2my + n} = 2ax + by + d = u$, e $\sqrt{Bu^2 + m^2 - Bn} = By + m = z$, farà $y = \frac{z-m}{B}$, $x = \frac{u-d}{2a} - \frac{b \times \frac{z-m}{B}}{2aB}$, i valori poi di z , u , si potranno

prendere ad arbitrio positivi, o negativi. Ora per avere i valori di x , y debbono prima esser cogniti i valori razionali di u , z : Quindi si deve risolvere l'equazione $z^2 = Bu^2 + A$ in modo, che u , z siano numeri razionali interi, o fratti. Prendiamoli primieramente a considerare fratti, così che ridotti allo stesso denominatore siano $z = \frac{r}{q}$, $u = \frac{t}{q}$, le quali frazioni siano espresse co' minimi termini, e però r , t , q siano numeri primi fra loro. Mediante la sostituzione di questi valori di z , u , l'equazione $z^2 = Bu^2 + A$ si cambierà in $\frac{r^2}{q^2} = \frac{Bt^2}{q^2} + A$, o sia $Aq^2 = r^2 - Bt^2$. Ed

ecco ridotta tutta l'operazione a ritrovare per r , t , q de' numeri interi razionali.

448. Siccome or si suppone, che nè A , nè B siano numeri quadrati, così suppongo, che nè A , nè B contenga fattori quadrati, mentre se fosse $A = c^2$, con fare $z = \frac{dr}{q}$, $u = \frac{dt}{q}$, l'equazione si cambierebbe in $\frac{d^2 r^2}{q^2} = \frac{Bd^2 t^2}{q^2} + c^2$, cioè $r^2 = Bt^2 + cq^2$, in cui B , c non solo non sono numeri quadrati, ma nemmeno contengono fattori quadrati. Se fosse $B = be^2$, con fare $z = \frac{r}{q}$, $u = \frac{t}{eq}$, l'equazione risulterebbe $\frac{r^2}{q^2} = \frac{be^2 t^2}{e^2 q^2} + A$, cioè $r^2 = bt^2 + Aq^2$, come prima: Finalmente se fosse $A = cd^2$, $B = be^2$,

con fare $z = \frac{dr}{q}$, $u = \frac{dt}{eq}$, l'equazione farebbe $\frac{d^2 r^2}{q^2} = \frac{be^2 d^2 t^2}{e^2 q^2} + cd^2$, cioè $r^2 = bt^2 + cq^2$, che ricade sempre nel caso supposto. Suppongo in oltre, che non sia $B = t$, perchè in tal caso la risoluzione dell'equazione si ridurrebbe al num. 444, lo che pure succederebbe ogniquale volta fosse $A = B$, poichè allora l'equazione essendo $z^2 = Au^2 + A$, con fare $z = \frac{Ar}{q}$, $u = \frac{t}{q}$, l'equazione diverrebbe $\frac{A^2 r^2}{q^2} = \frac{At^2}{q^2} + A$, vale a dire $Ar^2 = t^2 + q^2$. Suppongo per ultimo, che sia $A > B$, e conseguente-

mente $A > 1$; che se fosse $A < B$, non si avrebbe a far altro, che cambiare nell'equazione A in B , e t in q .

443. Poiché queste premesse veniamo alla risoluzione dell'equazione $Aq^2 = r^2 - Br^2$ nelle assunte ipotesi. Tutto l'artificio per giungere alla bramata risoluzione consiste in dedurre nella maniera, che or ora esporrò, da questa una seconda equazione, dalla seconda una terza ec, e così in poi, finché si giunga ad una equazione di questa forma $ax^2 = x^2 - y^2$, la di cui risoluzione si ha facilmente mediante il num. 444. Da questa equazione già risolta ripassando per tutte le altre, nelle quali si è sviluppata l'equazione $Aq^2 = r^2 - Br^2$, a lei finalmente si arriverà, e se ne otterrà la risoluzione cercata. Prima di vedere come ciò debba fare, osservo che se (avendo

la frazione $\frac{r}{t}$ tale, che con fare $\frac{r}{t} - \frac{r}{t}$, e con trascinare il comun denominatore sia $r't - rt = \pm 1$, di cui siccome r , t sono incognite, così r' , t' restano da determinarsi col calcolo) si moltiplicherà l'equazione $Aq^2 = r^2 - Br^2$ per $r'^2 - Br'^2$ onde si abbia $Aq^2 \times r'^2 - Br'^2 = r'^2 - Br'^2 \times r'^2 - Br'^2$, in cui $r'^2 - Br'^2 \times r'^2 - Br'^2 = r'r' \pm Br'^2 = B \times r'r' \pm r'^2$, come costa dal fare le indicate operazioni, poichè $-B \times r'r' \pm r'^2 = \mp B$, con supporre $r'r' \pm Br'^2 = a^2$, l'equazione sarà

$Aq^2 \times r'^2 - Br'^2 = a^2 - B$. Dunque il termine cognito A dell'equazione deve essere un divisore di una quantità di questa forma $a^2 - B$, cioè di un numero quadrato diminuito del coefficiente di r^2 , o sia $\frac{a^2 - B}{A}$ deve essere un numero intero: Che se

questo numero intero, vale a dire questo quoziente si dirà $= A'$, farà $AA' + B = a^2$, quindi un multiplo del termine cognito A aumentato del coefficiente B di r^2 deve essere un quadrato perfetto. Si osservi, che il prodotto di due, tre ec. formole di questa forma $m^2 - An^2 = A'^2$ è sempre della medesima forma, cioè $M^2 - AN^2$. Di fatto $m^2 - An^2 \times m'^2 - An'^2 = mm' \pm Ann'^2 = A \times mm' \pm mn'^2$ che con farsi $mm' \pm Ann'^2 = M^2$, $mn \pm mn' = N^2$, è $= M^2 - AN^2$. Se le formole faranno tre, come

$m^2 - An^2 \times m'^2 - An'^2 \times m''^2 - An''^2$, poichè il prodotto delle due prime, come pur ora si è veduto, è di questa forma $M^2 - AN^2$, se si moltiplicherà questo prodotto colla terza formola, si avrà $M^2 - AN^2 \times m''^2 - An''^2 = Mm'' \pm ANn''^2 = A \times Mm'' \pm Nn''^2 = P^2 - AQ^2$ con farsi $Mm'' \pm ANn''^2 = P^2$, $Mn'' \pm Nn''^2 = Q^2$ ec. Basta poi una leggerissima riflessione per osservare la legge, colla quale si formano dai proposti fattori le formole $mm' \pm Ann'^2 = A \times mm' - mn'^2$ ec.

450. Per trovare questo numero a , che deve cercar tentando, si rifletta che farà sempre $a < \frac{A}{2}$: Onde se fra i numeri naturali da 1 fino ad $\frac{A}{2}$ non se ne troverà alcuno, che renda

$\frac{a^2 - B}{A} = A'$ (non si considerino i segni di a , A), l'equazione non sarà risolubile con numeri razionali: E poichè è $a < \frac{A}{2}$, farà $a' < \frac{A'}{4}$ e molto più $a' - B < \frac{A'}{4}$; ma si è trovato $AA' = a^2 - B$, dunque fattane la sot-

sostituzione farà $AA' < \frac{A^2}{4}$, cioè $A' < \frac{A}{4}$. Che se in vece di essere $AA' = a^2 - B$, fosse $AA' = a^2 + B$, con sostituirsi A in luogo di B , si avrebbe $AA' < a^2 + A$, e molto più $AA' < \frac{A^2}{4} + A$ (con sostituire $\frac{A^2}{4}$ in luogo di a^2) conseguentemente $A' < \frac{A}{4} + 1$. Ed ecco fissati i limiti al numero a , che deve essere $< \frac{A}{2}$, e al quoziente A' , che deve essere $< \frac{A}{4}$ quando l'equazione è $Aq^2 = a^2 - Bt^2$, ma quando l'equazione è $Aq^2 = a^2 + Bt^2$, deve essere $A' < \frac{A}{4} + 1$.

Ciò posto veniamo al modo di giungere a una equazione di questa forma $ax^2 = x^2 - y^2$. L'equazione data è $Aq^2 = r^2 - Bt^2$: Colle regole date si trovi un numero a tale, onde sia $\frac{a^2 - B}{A} = A'$. Se A' , che deve essere un numero intero, è $< B$, o pure $= B$, non occorre far altro; ma se è $A' > B$, bisognerà trovare un'altro numero b tale, che sia $\frac{b^2 - B}{A} = A''$; lo stesso si ripeta se $A'' > B$; finchè si abbia un quoziente minore di B . Queste equazioni $\frac{a^2 - B}{A} = A'$, $\frac{b^2 - B}{A} = A''$ ec., o sia $a^2 - B = AA'$, $b^2 - B = AA''$ ec. si chiamino equazioni secondarie: L'equazione data poi $Aq^2 = r^2 - Bt^2$ si dica una equazione primaria. Supposto che il quoziente minore, o eguale a B sia A' , di lui si prevalga per giungere alla seconda delle equazioni primarie, che dovrà essere $Bq^2 = r'^2 - A't'^2$. Da questa equazione si deducano le sue secondarie, finchè si trovi un quoziente, per esempio $C = A'$, o $C < A'$ nel qual caso si passi alla terza delle equazioni primarie, che dovrà essere $A'q'^2 = r''^2 - Ct''^2$. Da questa si ricavano le convenienti secondarie giusta la legge fissata, cioè finchè si abbia un quoziente minore, o eguale a C , del qual quoziente, che sia per esempio D , si prevalerà per la quarta delle equazioni primarie, che sarà $Cq''^2 = r'''^2 - Dt'''^2$. Quando da una equazione secondaria si avrà per quoziente l'unità, niente altro più si richiederà per giungere a una equazione primaria di questa forma $ax^2 = x^2 - y^2$. Per mettere la cosa sotto degli occhi, ordinerò sotto l'equazione data le altre nascenti equazioni primarie, e a lato le equazioni secondarie corrispondenti a ciascuna

Equazioni primarie	Equazioni secondarie
Equaz. data I. $Aq^2 = r^2 - Br^2$	$\frac{a^2-B}{A} = C$
II. $Bq^2 = r^2 - Dr^2$	$\frac{b^2-B}{C} = D$ Si suppone $D < B$
III. $Dq^2 = r^2 - Er^2$	$\frac{c^2-D}{B} = E$ Si suppone $E < D$
IV. $Eq^2 = r^2 - r^2$	$\frac{e^2-E}{D} = F$
	$\frac{b^2-E}{F} = H$ Si suppone $H = 1$
vale a dire	

Equazioni primarie	Equazioni secondarie
Equaz. data I. $Aq^2 = r^2 - Br^2$	$AC = a^2 - B$
II. $Bq^2 = r^2 - Dr^2$	$CD = b^2 - B$ } (Δ)
III. $Dq^2 = r^2 - Er^2$	$BE = c^2 - D$ } (Θ)
IV. $Eq^2 = r^2 - r^2$	$DF = e^2 - E$ } (Λ)
	$FH = b^2 - E$

Se l'ultima equazione IV. fosse $Eq^2 = r^2 + r^2$ a motivo di $H = -1$, in tal caso bisognerebbe continuare ancora l'operazione, trovando un'altra equazione primaria nella solita maniera, onde si avesse un'equazione della forma $ax^2 = x^2 - y^2$.

Or che sono giunto a questa IV. delle equazioni primarie, basta così: Ella cade sotto la forma $ax^2 = x^2 - y^2$, e però si risolve giusta il num. 444, mediante il quale si hanno i valori di q^2, r^2, r^2 . Avuti questi valori si passi a trovare i valori di q, r, r , i quali si otterranno con mettere primieramente l'equazione IV. sotto la forma delle equazioni (Λ) (poichè ella era itata voltata così $r^2 = r^2 - Eq^2$) indi moltiplicarla nel loro prodotto, mentre paragonando ciò, che ne verrà coll'equazione III., si potranno determinare i valori di q^2, r^2, r^2 . Per ritrovare i valori di q, r, r si disponga per la stessa ragione precedente l'equazione III. così $Er^2 = r^2 - Dq^2$, e si moltiplichino nell'equazione (Θ), e questo prodotto si paragoni coll'equazione II., e con tal mezzo si determinino i valori di q^2, r^2, r^2 . Finalmente per avere i valori di q, r, r , si disponga l'equazione II. così $Dr^2 = r^2 - Bq^2$, quale si moltiplichino nel prodotto delle due epuazioni (Δ), e paragonandosi ciò, che ne viene coll'equazione I., si otterranno per ultimo i ricercati valori razionali di q, r, r .

L'efempio particolare richiariarà anche di più l'idea del metodo. Debba si risolvere l'equazione $157 = x^2 - 19u^2$ per modo, che essendo $x = \frac{r}{q}$, $u = \frac{t}{q}$, siano q, r, t numeri razionali, giacchè i due numeri 157, 19 nè sono quadrati, nè con-

contengono fattori quadrati. Fatta la sostituzione di $\frac{r}{q}$ in luogo di x , e di $\frac{t}{q}$ in luogo di u , l'equazione si cambierà in $157q^2 = r^2 - 19t^2 \dots (\Delta)$. Si ha adunque $A=157$, $B=-19$. Acciò l'equazione (Δ) possa sussistere deve essere un multiplo di A accresciuto di B eguale a un numero quadrato, cioè $m A + B = a^2$, e nello stesso tempo deve essere $a > \frac{A}{2}$ cioè $< \frac{157}{2}$, siccome deve essere $m < \frac{157}{4}$. Ora si trova $m=6$, $a=31$, con che si ha la prima equazione secondaria $157 \times 6 = 31^2 - 19 \dots (\Theta)$, e siccome il numero 6 , che è fattore di 157 , e nel tempo stesso quoziente di $\frac{31^2 - 19}{157}$, è minore di 19 , però la prima serie delle equazioni secondarie si riduce a questa sola. Passo pertanto alla seconda delle equazioni principali, che è $19q^2 = r^2 - 6t^2 \dots (\Lambda)$, la quale sussisterà ogniquivolta sia un multiplo di 19 accresciuto di 6 coefficiente di t^2 eguale a un quadrato perfetto, come $19n + 6 = b^2$, così che sia $n < \frac{19}{4}$, $b < \frac{19}{2}$. Per poco, che a ciò si rifletta si trova $n=1$, $b=5$, con che si ha l'equazione secondaria $19 \times 1 = 5^2 - 6 (\Pi)$, la quale è la sola, che si ceve dedurre dall'equazione (Λ) , perchè il fattore $1 < 6$. Passo quindi alla terza delle equazioni primarie, cioè $6q^2 = r^2 - t^2 (\Phi)$, che è anche l'ultima, poichè cade sotto la forma $az^2 = x^2 - y^2$. Ecco qui sotto le ritrovate equazioni primarie colle corrispondenti secondarie.

Equazioni primarie

$$(\Delta) \quad 157 q^2 = r^2 - 19 t^2$$

$$(\Lambda) \quad 19 q^2 = r^2 - 6 t^2$$

$$(\Phi) \quad 6 q^2 = r^2 - t^2$$

Equazioni secondarie.

$$157 \times 6 = 31^2 - 19 (\Theta)$$

$$19 \times 1 = 5^2 - 6 (\Pi)$$

Paragonando quest'ultima equazione $6q^2 = r^2 - t^2$ coll'equazione $az^2 = x^2 - y^2$ del num. 444, si ha $q'=x$, $r'=y$, e siccome è $a=6$, e i fattori di 6 possono essere tanto 1 , 6 , come 2 , 3 , però prendendo i due primi 1 , 6 , onde sia $p=1$, $Q=6$, sarà $q'=2mn$, $r'=m^2+6n^2$, $t'=m'-6n'$. Restano a determinarsi i valori di q' , r' , t' , e q , r , t . Per avere i valori di q' , r' , t' prendo l'equazione (Φ) , che ordino così $t'^2 = r'^2 - 6q'^2$, e la moltiplico nell'equazione (Π) , regolandomi in questa moltiplicazione giusta il num. 449, nel qual modo operando mi viene $19r'^2 = 5r' + 6q'^2 - 6 \times 5q' + r'^2$, poscia paragono questa equazione coll'equazione (Λ) , e ritrovo $r'=q'$, $5r' + 6q'^2 = 5q' + r'^2$. Finalmente per avere i valori di q , r , t , prendo l'equazione (Λ) , e dopo averla ordinata così $6r'^2 = r'^2 - 19q'^2$ la moltiplico nella maniera poc' anzi praticata coll'equazione (Φ) , onde mi nasce l'equazione $157 \times 6r'^2 = 31r' + 19q' - 19 \times 31q' + r'^2$, che paragonata coll'equazione (Δ) dà $q=6r$, $r=31r' + 19q'$, $t=31q' + r'$. Ed eccoci giunti ai valori da darsi a q , r , t , che risolvono la proposta equazione. Soggiungerò qui ordinatamente i ritrovati valori delle quantità q , r , t ; q' , r' , t' ; q , r , t .

$$\begin{array}{lll} q'' = 2mn & q' = r'' & q = 6r' \\ r'' = m^2 + 6n^2 & r' = 5r'' + 6q'' & r = 31r' + 19q' \\ t' = m^2 - 6n^2 & t = 5q' + r' & t = 31q' + r' \end{array}$$

o sia assegnandoci i suoi valori espressi da m, n , farà

$$\begin{array}{lll} q'' = 2mn & q' = m^2 - 6n^2 & q = 60mn + 6m^2 + 36n^2 \\ r'' = m^2 + 6n^2 & r' = 5m^2 + 30n^2 + 12mn & r = 155m^2 + 930n^2 + 372mn + 19m^2 - 114n^2 \\ t' = m^2 - 6n^2 & t' = 10mn + m^2 + 6n^2 & t = 31m^2 - 186n^2 + 5m^2 + 30n^2 + 12mn \end{array}$$

Ora egli è arbitrario il prendere per m, n quei numeri, che più piacciono; se pertanto si supporrà $m=2, n=3$, farà $q=708, r=10272, t=-1188$, dalla cui sostituzione l'equazione (A) diventa $78698448 = 105513984 - 26815536$; onde rispetto all'equazione $157 = x^2 - 19u^2$ trovasi essere $x = \frac{856}{59}, u = \frac{99}{59}$.

Se l'equazione proposta da risolversi fosse stata $628 = x^2 - 19u^2$, in cui 628 ha un fattore quadrato, essendo $628 = 4 \times 157$, in tal caso si farebbe fatto $x = \frac{2r}{q}, u = \frac{2t}{q}$, con che ne viene l'equazione $628q^2 = 4r^2 - 76t^2$, cioè $157q^2 = r^2 - 19t^2$, e siccome col risolversi questa equazione si è trovato $x = \frac{856}{59}, u = \frac{99}{59}$,

così per l'equazione $628 = x^2 - 19u^2$ deve essere $x = 2 \times \frac{856}{59}, u = 2 \times \frac{99}{59}$.

451. Quantunque la condizione, che accompagna la risoluzione di queste equazioni $A = x^2 \pm Bu^2$, riguardi soltanto i numeri razionali, comunque siano interi, o fratti, onde possa bastare la soluzione datane in numeri fratti, pure soggiungerò brevemente come si possa risolvere in numeri razionali interi l'equazione $A = x^2 + Bu^2$, allorchè lo permette la natura de' numeri A, B . Supposto che A, B siano numeri primi tra loro, acciò l'equazione sia risolubile bisogna in primo luogo, che, come si è provato di sopra, abbia luogo questa equazione $AA' = m^2 + B$, la quale ricavasi dal moltiplicare la data equazione per $x^2 + Bu^2$ così $A \times x^2 + Bu^2 = x^2 + Bu^2 \times x^2 + Bu^2$, che (giusta il num. 449) è $A \times x^2 + Bu^2 = x^2 + Bu^2$ + $B \times x^2 - x^2$ (le quantità x', u' sono tali, che rendono $x'u - x'u = \pm 1$), e perchè $+B \times x'u - x'u^2 = B$, se si farà $\frac{x'x' + Bu'^2}{2} = m^2$, farà $A \times \frac{x^2 + Bu^2}{2} = m^2 - B$: Ed essendo $x^2 + Bu^2$ il fattore di A , ben si vede, che è $x^2 + Bu^2 = A'$. Dalla espressione poi $\frac{x'x' + Bu'^2}{2} = m^2$ resta determinato anche il valore di m , che è $m = x'x' + Bu'^2$. Dalla formola $AA' = m^2 + B$ si passi nello stesso modo alla seconda $A'A'' = m^2 + B$, e così in poi, ritrovando successivamente i valori di A', A'', A''' ec., come di m', m'', m''' ec., onde si avrà

Equazioni condizionali

$$A'A' = m^2 + B$$

$$A'A'' = m'^2 + B$$

$$A'A''' = m''^2 + B$$

$$A'A^{(n)} = m^{(n)2} + B$$

$$\text{I. } A' = x'^2 + Bu'^2$$

$$\text{II. } A'' = x''^2 + Bu''^2$$

$$\text{III. } A''' = x'''^2 + Bu'''^2$$

$$\text{IV. } A^{(n)} = x^{(n)2} + Bu^{(n)2}$$

Equazioni dedotte

$$m = x'x' + Bu' u' (\theta)$$

$$m' = x''x'' + Bu'' u'' (\lambda)$$

$$m'' = x'''x''' + Bu''' u''' (\mu)$$

$$m^{(n)} = x^{(n)}x^{(n)} + Bu^{(n)} u^{(n)} (\tau)$$

Le equazioni condizionali devonfi tanto continuare, finchè si giunga ad una delle equazioni (P), che sia generalmente $A' = x'^2 + Bu'^2$ (la lettera n dinota l'apice), che sia facilmente risolubile, come fra poco dirò, con numeri razionali interi, mentre da x'', u'' rimontando per $x'' \rightarrow x''-1, u'' \rightarrow u''-1$; $x'' \rightarrow x''-2, u'' \rightarrow u''-2$ ec. fino a x, u , si giungerà così ai valori di x, u , che danno all'equazione proposta la soluzione bramata; fante che le quantità x'', u'' sono determinate dalla condizione, che $x''-1, u''-1 \rightarrow x''-n, u''-n = \pm 1$, e così delle altre come segue

 x', u' determinate da x'', u'' da x''', u''' da $x^{(n)}, u^{(n)}$ da

$$x' u' - x' u = \pm 1 (\beta)$$

$$x' u' - x'' u'' = \pm 1 (\gamma)$$

$$x'' u'' - x''' u''' = \pm 1 (\delta)$$

$$x^{(n)} u^{(n)} - x^{(n-1)} u^{(n-1)} = \pm 1 \text{ ec. } (\epsilon)$$

Supponiamo ora, che l'ultima delle equazioni (P) sia tale, che si possa agevolmente risolvere determinando i valori razionali interi di x'', u'' , e però veniamo al modo di rimontare da x'', u'' per x''', u''' ec. fino a x, u . Ciò si otterrà facilmente con ritrovare le equazioni, che diano i valori di x, x', x'' ec. e di u, u', u'' ec.

Per avere i valori di x, u si faccia uso delle due equazioni β, δ . Si prenda dall'una, e dall'altra il valore di u , così $u = \frac{x' u' \mp 1}{x'}$, $u = -\frac{x x' + m}{B u'}$, e si paragonino tra

loro questi due valori, onde si abbia $\frac{x' u' \mp 1}{x'} = -\frac{x x' + m}{B u'}$, cioè $x x'^2 + B x u'^2 = x' m$

$\pm B u'$, e però $x = \frac{m x' \pm B u'}{x'^2 + B u'^2}$; ma $x'^2 + B u'^2 = A'$, dunque $x = \frac{m x' \pm B u'}{A'}$. Nella

stessa maniera si troverà $u = \frac{m u' \pm x'}{A'}$. Iteffamente operando si avrà mediante le

due equazioni γ, λ $x' = \frac{m' x'' \pm B u''}{A'}$, $u' = \frac{m' u'' \pm x''}{A'}$, e così in poi come segue

$$\text{I. } x = \frac{m x' \pm B u'}{A'}$$

$$\text{II. } x' = \frac{m' x'' \pm B u''}{A'}$$

$$\text{III. } x'' = \frac{m'' x''' \pm B u'''}{A'}$$

ec. } (R)

$$\text{I. } u = \frac{m u' \pm x'}{A'}$$

$$\text{II. } u' = \frac{m' u'' \pm x''}{A'}$$

$$\text{III. } u'' = \frac{m'' u''' \pm x'''}{A'}$$

In queste equazioni i segni ambigui si possono prendere a piacere, onde avere per x, x', x'' ec., u, u', u'' ec. de' numeri interi.

452. Acciò l'equazione proposta sia risolubile con numeri razionali interi, non solo devono aver luogo le equazioni condizionali del num. 451., ma in oltre bisogna, che le

le equazioni dedotte (P) siano risolubili con numeri razionali interi, conseguentemente fa di mestiere, che le quantità z, z', z'' ec., u, u', u'' ec., ottenute dalle equazioni (R) siano numeri interi. Ciò poi avrà luogo ogniqualvolta l'ultimo fattore A'' sia uguale all'unità, cioè $A''=1$; poichè dovendo essere $A'' < B$, l'ultima equazione $A''=(z'')^3+B(u'')^3$ non può sussistere, se non è $u''=0$, e però $A''=(z'')^3$, di cui deve essere $z''=1$, e quindi $A''=1$, altrimenti non possono essere numeri interi i valori di $z''=1, u''=1$: Per lo che se $A'' < B$, è differente dall'unità, l'equazione non sarà risolubile con numeri interi. Quando adunque si farà giunti a un fattore $A''=1$, dovrà essere $u''=0$, e $z''=1$, le quali quantità essendo cognite, si arriverà per mezzo delle equazioni (R) a trovare finalmente i valori di z, u , che risolvono l'equazione.

Se si troveranno più numeri, che si possano prendere in luogo di m ; ognuno de' quali salvi la formula $AA'=m^3-B$, altrettante saranno le diverse soluzioni dell'equazione proposta, lo che pure s'intenda rispetto al poterli prendere la stessa quantità m positiva, e negativa, alle quali coté deve aver riguardo chi cerca tutte le soluzioni possibili.

Si debba per esempio risolvere l'equazione $166=z^3+13u^3$ in modo, che i valori di z, u siano numeri razionali interi: Comincio dal ritrovare le equazioni corrispondenti alle formole $AA'=m^3-B, A'A'=u^3-B$ ec. finchè giunga ad $A''=1$. Esse sono le seguenti

$$\begin{array}{rcl} 166 \times 17 & = & 53^3 + 13 \\ 17 \times 14 & = & 15^3 + 13 \\ 14 \times 1 & = & 1^3 + 13 \end{array}$$

Si ha pertanto $A'=17, A''=14, A'''=1$; $m=53, m'=15, m''=1$. Poichè si è ottenuto $A''=1$, sarà (pel num. 452.) $z''=1, u''=0$. Mediante questi valori di z'', u'' , e le formole (R) dei num. 251. si avranno i valori di $z', u'; z, u$, e finalmente di z, u , come segue

$$\begin{array}{rcl} z'' & = & 1 \\ z' & = & 1 \\ z & = & 2 \\ z & = & 7 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} u'' & = & 0 \\ u' & = & 1 \\ u' & = & 1 \\ u & = & 3 \end{array}$$

Ed ecco ritrovati i valori di z, u , che soddisfano all'equazione. Di fatto se li sostituirà 7 in luogo di z , e 3 in vece di u nell'equazione, essa si cambierà in $166=49+117=166$ equazione identica, che giustifica la ritrovata risoluzione.

OSSERVAZIONI SU LE EQUAZIONI FINALI.

453. Prima di finire questo capo stimo opportuno osservare alcune cose, che nelle equazioni finali dedotte dalla soluzione di qualche Problema possono occorrere: Una riguarda le equazioni identiche, che hanno cioè le stesse quantità da una parte, e dall'altra del segno d'uguaglianza, onde ne risulta 0=0: Queste equazioni, che nascono dopo essersi adempiute tutte le condizioni proposte, ci fanno sapere, che tutte le quantità, di cui si tratta, inchiodano le condizioni date, vale a dire che la proposizione non è un problema, ma un Teorema, mentre portandoci queste equazioni a conclusione vera, essendo verissimo, che il zero è uguale a zero, cioè

cioè sparendone l'incognita, fanno conoscere, che il valore dell'incognita, qualunque egli sia, è quello, che si vuole, il che si vedrà apertamente nel seguente Esempio.

P R O B L E M A.

454. Cercasi qual fosse il Capitale x di un Mercante, il quale aumentandolo ogni anno di $\frac{x}{m}$, dopo un numero m di anni lo trova essere $= \overline{m+1} \times x$.

455. Rifol. Dalla condizione proposta ne nasce l'equazione

$x + \frac{x}{m} \times m = \overline{m+1} \times x$, cioè $mx + x = mx + x$, e però $0 = 0$. Quindi è, che qualunque numero si prenda in vece di x , egli soddisfarà al quesito, conseguentemente il Capitale cercato poteva essere qualunque numero.

456. Che se l'equazione risulterà identica prima che siano adempiute tutte le condizioni proposte, ciò vorrà dire, che o si è commesso errore nel calcolo, o pure che in luogo di una condizione necessaria se n'è introdotta una superflua; poichè (giusta il num. 421.) le condizioni superflue non ripugnanti essendo inchiusse nelle condizioni necessarie, o sia essendo identiche alle necessarie, debbono indispensabilmente dare espressioni identiche, e però rendere identica l'equazione.

457. Succede alle volte, che nell'uno, e nell'altro membro dell'equazione finale si trovi la stessa incognita affetta dal medesimo segno, di cui perciò non si può determinare il valore, come sarebbe l'equazione $ax - cd + b^2 = ax + dc$. Ciò vuol dire, che il Problema è di sua natura indeterminato.

458. Quando l'equazione finale porta all'assurdo, dando il tutto uguale alla parte, o una quantità finita uguale a zero, in supposizione però che l'incognita non sia una grandezza infinita, il Problema sarà impossibile.



C A P O I I I.

TEORIA GENERALE DELLE EQUAZIONI,
E DELLA LORO RISOLUZIONE.

A R T I C O L O I .

Della genesi, e delle proprietà a qualsivoglia equazione comuni.

459. **T**eor. 1. Qualunque equazione risulta dal prodotto di tanti fattori di primo grado, o reali, o immaginari, o in parte reali, e in parte immaginari, il di cui primo termine è l'incognita x , e il secondo è una quantità cognita, che è radice dell'equazione, quante unità contiene il di lei massimo esponente.

460. **Dim.** Essendo le equazioni uguali a zero, fa di mestieri, che risultino per lo meno da due fattori, uno de' quali sia uguale a zero, poichè (pel num. 108. del Tomo I.) solo con moltiplicarsi in zero una quantità ne ritorna zero: Ma (pel num. 318.) la radice dell'equazione, che sostituita in luogo dell'incognita la fa verificare, è uguale alla stessa incognita; dunque il di lei aggregato coll'incognita essendo uguale a zero è un fattore dell'equazione; conseguentemente quante sono le quantità, che fanno verificar l'equazione, altrettanti dall'incognita, e da queste quantità risultano aggregati, che sono fattori dell'equazione. Ora il numero delle quantità, che fanno verificar l'equazione non può essere nè maggiore, nè minore del grado dell'equazione; imperocchè il primo termine di questi fattori essendo l'incognita x , e il massimo termine dell'equazione dovendo risultare (come costa dalla legge della moltiplicazione) dal prodotto di questi primi termini, altrettanti faranno questi primi termini, quante unità contiene il massimo esponente dell'equazione, conseguentemente altrettanti faranno questi aggregati, o sia fattori di primo grado, da' quali risulterà l'equazione: E però qualunque equazione ec. Lo che si doveva dimostrare.

461. **Corol. 1.** In qualunque equazione pertanto il numero delle radici corrisponde al massimo esponente dell'incognita. Qualsivoglia-ra lice poi unita all'incognita x col segno $+$, o $-$, secondo che ella è positiva, o negativa, farà un divisore esatto dell'equazione; e il quoziente farà un'equazione, che risulterà dal prodotto degli altri fattori.

462. **Corol. 2.** Se pertanto le radici di una proposta equazione faranno m, n, p, q, r ec., tale equazione sarà uguale al prodotto $\overline{x-m} \times \overline{x-n} \times \overline{x-p} \times \overline{x-q} \times \overline{x-r}$ ec. Questo prodotto poi (supposto che il numero de' fattori, o sia delle radici, sia $= t$) farà tale (come costa dalla legge della moltiplicazione), che per primo termine avrà l'incognita x elevata alla potestà t , nel secondo termine vi farà l'incognita x elevata alla potestà $t-1$, nel terzo termine vi farà l'incognita x elevata alla potestà $t-2$, e così di seguito; che però se i coefficienti del secondo, terzo, quarto termine ec. si diranno a, b, c, d ec., e il termine cognito si dica A , l'equazione sarà

$x^r + ax^{r-1} + bx^{r-2} + cx^{r-3} + dx^{r-4} + \dots + A = \overline{x-m} \overline{x-n} \overline{x-p} \overline{x-q} \overline{x-r}$ ec., che è la formula generale per qualsivoglia equazione.

453. Corol. 3. Essendo $x^r + ax^{r-1} + bx^{r-2} + cx^{r-3} + \dots$

$+ A = \overline{x-m} \overline{x-n} \overline{x-p}$ ec., se il prodotto di questi fattori sarà positivo, anche l'aggregato dei termini dell'equazione sarà positivo, e se quello sarà negativo, anche quello sarà parimente negativo. Quello poi sarà positivo, se o tutti questi fattori saranno positivi, o essendovene dei negativi, essi saranno in numero pari; e all'opposto sarà negativo, qualora vi sia un numero impari di fattori negativi.

454. Corol. 4. Quindi se nell'equazione si sostituirà in luogo di x una quantità positiva, che sia maggiore di qualsivoglia radice, tutti i fattori saranno positivi, comunque i valori dell'incognita siano positivi, o negativi, e però l'aggregato dei termini dell'equazione sarà positivo; o pure, se essendo impari il grado dell'equazione, si sostituirà una quantità negativa maggiore di ciascuna radice, l'aggregato dei termini dell'equazione sarà negativo; e se il grado dell'equazione sarà pari, l'aggregato dei termini sarà positivo.

455. Corol. 5. Considerando pertanto l'equazione sotto a questa forma

$x \pm m \overline{x \pm n} \overline{x \pm p} \overline{x \pm q}$ ec., in cui le radici m, n, p, q ec. sono disposte secondo l'ordine della grandezza, ben si vede, che siccome pel num. 454. col sostituirsi in luogo di x una quantità positiva maggiore di m , l'aggregato dei termini dell'equazione risulta positivo, e pel num. 318. col sostituirsi m , l'aggregato dei termini diventa zero, così col sostituirsi una quantità positiva minore di m , ma maggiore di n , l'aggregato dei termini diverrà negativo: Parimente poichè col sostituirsi in luogo di x una quantità positiva minore di m , ma maggiore di n , l'aggregato dei termini dell'equazione risulta negativo, e col sostituirsi n diventa zero, così se si sostituirà una quantità positiva minore di n , ma maggiore di p , l'aggregato dei termini dell'equazione risulterà positivo: E colla stessa legge varieranno alternativamente gli aggregati dei termini dell'equazione da positivi a negativi, e da negativi a positivi, col sostituirsi per ordine successivamente quantità minori della precedente, ma maggiori della susseguente prossima radice. Di fatto sia l'equazione $x^r + ax^{r-1} + bx^{r-2}$

$cx^{r-3} + \dots + T = \overline{x-m} \overline{x-n} \overline{x+p} \overline{x+q}$, della quale ho preso le due prime radici m, n positive, e le due ultime p, q negative, affinchè si veda, che la dottrina esposta ha sempre luogo, comunque le radici siano positive, o negative. Suppongo che le radici $m, n, -p, -q$ siano disposte secondo l'ordine della grandezza, così che m sia maggiore di $n, n > -p, -p > -q$. Ritenendo pertanto solamente il

prodotto dei fattori $\overline{x-m} \overline{x-n} \overline{x+p} \overline{x+q}$, ben si vede, che se in luogo di x si sostituirà una quantità A maggiore di ciascuna radice, si avrà

$A-m \overline{A-n} \overline{A+p} \overline{A+q}$ prodotto positivo, poichè egli risulta da fattori tutti positivi. Se in luogo di x si sostituirà una quantità B minore di m , ma maggiore di n , e conseguentemente di ciascuna delle rimanenti radici, sarà $B-m$ quantità negativa, e tutti gli altri fattori $B-n, B+p, B+q$ saranno positive, onde il prodotto

$B-m \overline{B-n} \overline{B+p} \overline{B+q}$ sarà negativo, poichè tra' suoi fattori ve n'è uno negativo. Iteffamente sostituendosi in luogo di x una quantità C minore di n , e perciò anche di m , ma maggiore di p , e quindi ancora di q , saranno $C-m, C-n$

Tom. II.

S

due

due quantità negative, e $C+p$, $C+q$ faranno positive, per lo che il prodotto

$\overline{C-m} \times \overline{C-n} \times \overline{C+p} \times \overline{C+q}$ sarà positivo, poichè tra' suoi fattori ve ne sono bensì de' negativi, ma in numero pari. Finalmente se in luogo di x si sostituirà una quantità D minore di p , e però eziandio di n , m , ma maggiore di q , non solo $D-m$, $D-n$ saranno negativi, ma ancora $D+p$ (pel num. 52.) perchè essendo D nell'essere di negativo una quantità minore di p , farà D un numero, che avrà maggiore espressione di p , e però $-D+p$ sarà quantità negativa, e per la stessa ragione si-

rà $D+q$ quantità positiva: Quindi il prodotto $\overline{D-m} \times \overline{D-n} \times \overline{D+p} \times \overline{D+q}$, che risulta da fattori negativi in numero dispari sarà negativo. Nello stesso modo poi si continui il raziocinio, se il numero delle radici sarà maggiore. Sostituendosi adunque in una equazione in luogo dell'incognita quantità successivamente minori per ordine di ciascuna delle sue radici, l'aggregato de' termini dell'equazione passerà alternativamente dal positivo al negativo, e dal negativo al positivo.

466. Quando le radici dell'equazione sono quantità razionali intere non si dà negli aggregati de' termini, che nascono dalle supposizioni di diversi valori di x , il passaggio dal $+$ al $-$ senza il passaggio pel zero, ma se le radici saranno o frazioni, o quantità radicali, si darà il passaggio dal $+$ al $-$ senza il passaggio pel zero, avvegnachè le quantità, che si sostituiscono sieno quantità razionali intere, che però devono per necessità essere o maggiori, o minori della radice o fratta, o irrazionale. Assolutamente però anche in questi casi il passaggio dal positivo al negativo si fa pel zero, poichè se in luogo dell'incognita si sostituirà quella radice o fratta, o irrazionale, l'aggregato de' termini andrà a zero.

467. Non sempre per altro il passaggio dal positivo al negativo si fa pel zero, ma si può fare anche per l'infinito. Sia per Esempio $x = \frac{b}{z-a}$. Sarà x positiva, se si supporrà $z > a$, farà x negativa, se si supporrà $z < a$, e finalmente sarà x infinita se si supporrà $z=a$, nel qual caso sarà $x = \frac{b}{0} = \infty$, e però in questo caso si passa dal positivo al negativo per l'infinito.

468. Non ogni volta però, che una quantità passa per l'infinito, o per il zero, divenga necessariamente di positiva negativa, potendo da positiva passare per l'infinito, o pel zero, e poi dopo risultare anche positiva, e ciò succederà nel caso di un numero pari di radici uguali. Tale sarebbe $y=x^2-6x+9$, in cui sostituendosi 4 in luogo di x , si ha $y=1$, sostituendosi 3, si ha $y=0$, e sostituendosi 2, si ha $y=1$.

469. Il negativo pertanto comincia ove finisce il positivo, lo che per altro deve intendersi in caso, che il positivo non diventi immaginario: Per Esempio essendo $y=\sqrt{x^2-a^2}$, sarà y positiva, quando si abbia $x > a$; sarà $y=0$ qualora sia $x=a$, ma essendo $x < a$, la y sarà immaginaria.

470. Corol. 6. Quando adunque dal sostituirsi nell'equazione in luogo dell'incognita due differenti quantità si avranno due aggregati dei termini dell'equazione in diverso stato, cioè uno positivo, e l'altro negativo, o vice versa, cioè sarà segno, che tra quelle due quantità ne cade un'altra, che perciò deve essere reale, la quale è radice dell'equazione. Quindi qualsivoglia equazione di grado pari, il di cui ultimo termine sia negativo, avrà per lo meno due radici reali; poichè (pel num. 464)

con

con sostituirsi in luogo di x la somma di tutti i coefficienti dell'equazione (tra i coefficienti vi è compreso anche l'ultimo termine), l'aggregato de' termini risulta positivo, comunque la quantità sostituita sia positiva, o negativa, e con sostituirsi zero in luogo di x l'aggregato de' termini si riduce al solo ultimo termine negativo, dunque l'equazione deve avere una radice reale fra il zero, e la sostituita quantità positiva, e un'altra parimente reale tra il zero, e la sostituita quantità negativa, cioè deve avere due radici reali. Tale equazione poi si suppone libera dai radicali.

471. Corol. 7. Per lo che se vi sarà un'equazione di grado pari, che abbia tutte le radici immaginarie, per qualunque quantità, che in essa si sostituisca in vece dell'incognita, l'aggregato de' termini non potrà mai passare dal positivo al negativo, o dal negativo al positivo, altrimenti l'equazione avrebbe delle radici reali contro l'ipotesi.

472. Corol. 8. E perchè (giusta il num. 464.) in qualsivoglia equazione di grado impari la sostituzione di una quantità presa prima positiva, e poi negativa, la quale sia maggiore di qualunque radice, fa passare l'aggregato de' termini da positivo a negativo, perciò le equazioni di grado impari hanno per lo meno una radice reale; e però il numero delle loro radici reali è sempre impari.

473. Corol. 9. Se dal sostituirsi successivamente diverse quantità nell'equazione in luogo dell'incognita, gli aggregati de' termini passeranno alternativamente dal positivo al negativo, e dal negativo al positivo, queste tali quantità saranno limiti delle radici dell'equazione, e *vice versa* queste di quelle.

474. Corol. 10. Finalmente se col sostituirsi nell'equazione in luogo dell'incognita tante diverse quantità, quante ne indica il grado dell'equazione, ne risulteranno altrettanti aggregati coi segni alternanti, l'equazione avrà tutte le sue radici reali: E generalmente quante faranno le alternazioni de' segni in questi aggregati, altrettante faranno le radici reali, e le rimanenti per uguagliare il grado dell'equazione saranno immaginarie a riserva del caso, in cui vi siano radici eguali.

475. Quantunque qualsivoglia radice presa separatamente sia uguale all'incognita, e però presa colla medesima formi un fattore di primo grado uguale a zero, non però si può dire, che tutti i fattori da' quali risulta l'equazione, siano nel tempo istesso uguali a zero, poichè mentre si suppone l'incognita uguale a una radice qualunque, dal che ne risulta un fattore uguale a zero, non si può nel tempo istesso supporre uguale alle altre radici, mentre non può la medesima incognita rappresentare nel tempo istesso quantità diverse, lo che per altro può fare, e fa separatamente: Oltre di che siccome in qualsivoglia equazione il primo termine è sempre una potenza dell'incognita, come si è veduto nell'equazione generale al num. 461., il di cui primo termine è x^n , se l'incognita esprimesse nel tempo stesso quantità diverse, il primo termine dell'equazione farebbe un prodotto, e non già una potenza, quale deve sempre risultare dalla replicata moltiplicazione di una medesima quantità in se stessa (pel num. 723. del Tomo I.) Per lo che avendosi $x' + ax'^{m-1} + bx'^{m-2}$

$+ cx'^{m-3} \dots + A = x - m \sqrt[m]{x - n} \sqrt[m]{x - p} \sqrt[m]{x - q} \dots$ ec., se si supponerà $x = m$, fatta la sostituzione si avrà $m^m + am^{m-1} + bm^{m-2} + cm^{m-3} \dots + A =$

$m - m \sqrt[m]{m - n} \sqrt[m]{m - p} \sqrt[m]{m - q} \dots$ ec., cioè il primo fattore sarà zero, ma gli altri saranno $m - n, m - p, m - q$ ec., lo che per altro per se stesso è evidente, poichè il sostituire nell'equazione in vece dell'incognita una sua radice, è lo stesso, che sostituirsi in vece della stessa incognita in tutti i suoi fattori.

476. Giacchè abbiamo veduto, che qualsivoglia equazione nasce dal prodotto di altrettanti fattori di primo grado, il di cui secondo termine è una radice dell'equazione, quanti ne mostra il grado dell'equazione, prese intanto alcune quantità, come m, n, p, q , che riguarderemo come radici, passiamo all'attuale loro formazione, a fine di potere osservare alcune proprietà, che a tutte le equazioni generalmente convergono. Poichè le radici dell'equazione, che si cerca, sono m, n, p, q , i fattori, da' quali ella risulterà, saranno $x-m, x-n, x-p, x-q$, de' quali uno, qualunque egli sia, deve essere uguale a zero, affinchè l'equazione possa parimente essere uguale a zero. Sia pertanto $x-m=0$; che però prendo i due fattori $x-m=0$, ed $x-n$, quali moltiplico insieme, e mi viene un'equazione di secondo grado, quale moltiplico nel terzo fattore $x-p$, e mi viene una equazione di terzo grado, dalla di cui moltiplicazione nell'ultimo fattore $x-q$ ho un'equazione di quarto grado, del che ecco il calcolo

Primo fattore	$x-m=0$
Secondo fattore	$x-n$
Equaz. di secondo grado	$\left\{ \begin{array}{l} x^2 - mx + mn = 0 \\ -nx \end{array} \right.$
Terzo fattore	$x-p$
Equaz. di terzo grado	$\left\{ \begin{array}{l} x^3 - mx^2 + mnx - mnp = 0 \\ -nx^2 + mpn \\ -px^2 + npx \end{array} \right.$
Quarto fattore	$x-q$
Equaz. di quarto grado	$\left\{ \begin{array}{l} x^4 - mx^3 + mnx^2 - mnp x + mnq = 0 \\ -nx^3 + mpn x - mnq x \\ -px^3 + npx^2 - mpq x \\ -qx^3 + mqx^2 - npqx \\ + nqx^2 \\ + pqx^2 \end{array} \right.$

477. Dal solo osservar poi queste formole generali si scorge apertamente: In primo luogo, che il coefficiente del secondo termine in qualsivoglia equazione è sempre la somma delle radici prese con segno contrario, come nel presente caso essendo le radici m, n, p, q , il coefficiente del secondo termine dell'equazione è $-m-n-p-q$.

478. Corol. 1. E perchè coll'aggiungerli ad una quantità data un'altra quantità uguale affetta da segno contrario, o pure col sottrarre da una quantità un'altra uguale, l'aggregato risulta zero (pel num. 34), se si accresceranno o diminuiranno secondo il bisogno le radici dell'equazione di una quantità, che ne renda l'aggregato uguale a zero, si farà sparire dall'equazione il secondo termine. Quale poi debba essere questa quantità, di cui devonli accrescere, o diminuire le radici dell'equazione, a fine di toglierne il secondo termine, lo determineremo in appresso.

479. In secondo luogo il coefficiente del terzo termine è la somma degli ambi delle radici prese col proprio segno: In terzo luogo il coefficiente del quarto termine è la somma dei terni delle radici prese con segno contrario: In quarto luogo

go il coefficiente del quinto termine è la somma delle quaderne delle radici prese col proprio segno, e così di seguito: L'ultimo termine poi, quello cioè che contiene sole quantità cognite, è il prodotto delle radici prese col proprio segno: Che però se sarà negativo l'ultimo termine di una equazione di grado impari avente tutte le radici reali (lo stesso si dimostrerà più abbasso anche in caso, che ne abbia delle immaginarie), ella dovrà aver per lo meno una radice reale positiva.

480. Corol. 1. Che però se una quantità sarà radice dell'equazione, ella sarà pure un divisore esatto dell'ultimo termine, ma non già *vice versa*.

481. Corol. 2. Dalle osservazioni fatte segue ancora, che siccome (giusta il num. 478.) qualora la somma delle radici positive è uguale alla somma delle negative, mancherà all'equazione il secondo termine, così mancherà il terzo termine, se la somma degli anni positivi delle radici sarà uguale alla somma degli ambi negativi: Parimente mancherà il quarto termine se la somma dei terni positivi delle radici sarà uguale alla somma dei terni negativi ec., e generalmente mancherà all'equazione qualche termine, ogni qual volta il suo coefficiente risulti uguale a zero. Il primo, e l'ultimo termine poi dell'equazione mai non possono mancare, a riserva del caso, in cui l'equazione avesse una, o più radici uguali a zero, poichè l'ultimo termine essendo il prodotto delle radici, e il prodotto di una quantità in zero essendo zero, l'ultimo termine dovrebbe necessariamente mancare; anzi quante saranno le radici uguali a zero altrettanti susseguenti termini all'ultimo mancheranno, come fra poco dirò.

482. I termini mancanti si sogliono indicare con altrettante stellette così $x^m * - bx^k * + cx^l * - b = 0$. Dalla genesi dell'equazioni raccogliasi ancora, che ogni equazione ha tanti termini (i quali per ordine distinguonsi dall'esponente dell'incognita), quanti ne indica il di lei massimo esponente accresciuto di una unità.

483. Le radici immaginarie diconsi pure quando costano di sole quantità immaginarie come $\sqrt{-a}$, $\sqrt{-ab-c^2}$: Diconsi miste quando risultano dall'aggregato di quantità reali, e immaginarie, come $a + \sqrt{-b^2}$.

484. Teor. 2. Nelle equazioni immuni dagli immaginari le radici immaginarie sono sempre in numero pari, cioè o due, o quattro, o sei ec.

485. Dim. Allora soltanto (pel num. 171.) nasce un prodotto reale dalla moltiplicazione di quantità immaginarie, quando esse sono in numero pari: Ma per ipotesi l'equazione è immune dagli immaginari, dunque le di lei radici immaginarie devono essere in numero pari.

486. Corol. Siccome poi il coefficiente del secondo termine risulta dalla somma delle radici, affinchè ivi non appariscano, una deve essere positiva, e l'altra negativa, ed uguali, onde mediante la contrarietà de' segni si distruggano: Che se le radici faranno miste, la quantità reale nell'una, e nell'altra radice sarà affetta dallo stesso segno, e la quantità immaginaria da segno positivo in una, e negativo nell'altra.

487. Ho detto, che quante radici uguali a zero avrà l'equazione, altrettanti faranno i termini mancanti, cominciando dall'ultimo; che però nell'equazione $x^m - 4x^6 + 3x^5 - 8x^4 = 0$, mancando i quattro ultimi termini, ella avrà quattro radici uguali a zero: Di fatto, come ho detto, risultando l'ultimo termine dal prodotto delle radici, non può egli andare a zero, se una radice non è uguale a zero: Così il coefficiente del penultimo termine, risultando dalla somma di tutte le combinazioni delle radici secondo l'esponente $m-1$ (supposto il numero delle radici uguale

uguale ad m), non può egli andare a zero, se due radici non sono uguali a zero; istelfamente devono essere tre le radici uguali a zero, affinchè diventi zero il coefficiente dell'antepenultimo termine, poichè egli risulta dalla somma di tutte le combinazioni delle radici secondo l'esponente $m-2$ ec.

488. Rispetto alla massima potestà, alla quale ascende l'incognita, distinguonsi in diversi gradi le equazioni, quali vengono denominate dal massimo esponente dell'incognita. Ciò però s'intenda quando l'equazione è immune dai radicali, poichè se l'equazione avrà quantita radicali per coefficienti, il di lei grado farà molto maggiore di quello mostra il massimo esponente dell'incognita: Così l'equazione

$x = \sqrt[ab]{\quad}$ è del secondo grado, poichè liberandola dal radicale, diventa $x^a = ab$.

489. I termini dell'equazione diconsi omogenei, quando ciascun di loro ottiene la stessa dimensione, nel qual caso si dice, che nell'equazione si è osservata la legge degli omogenei, come nell'equazione $x^a + a^1x^b + ab^1x^c - c^1dx^d + d^1x + c^2d^1 = 0$. Quando i termini di una qualche formola non sono omogenei, due sono i metodi più usati per ridurli alla omogeneità: Il primo per mezzo dell'unità, moltiplicando cioè il termine, che ha minori dimensioni, o dividendo quello, che ne ha maggiori, per l'unità, e sue convenienti potestà, quale unità sia fatta uguale a qualche lettera, che non entra nella proposta formola: Così per rendere omogenei i termini dell'equazione $x^4 + ax^3 - cx + d = 0$, si faccia $1 = m$, indi o si prevalga della moltiplicazione così $x^4 + amx^3 - cm^2x + m^3d = 0$, o della divisione così

$\frac{x^4}{m^1} + \frac{ax^3}{m^3} - \frac{cx}{m} + d = 0$. Il secondo per mezzo delle sostituzioni: Come avendosi

$ax + y^4 - by^3 = 0$, supponendosi $y^3 = z$, e $y^4 = z^{\frac{4}{3}}$; mediante la sostituzione si avrà

$ax + z^{\frac{4}{3}} - bz = 0$: Parimente supponendosi $y = \frac{1}{z}$ nell'equazione $bx - a^1y + c^1y^3 = 0$

si avrà $bx - \frac{a^1}{z} + \frac{c^1}{z^3} = 0$.

490. Le equazioni distinguonsi in razionali, e irrazionali: Le razionali sono quelle, i di cui coefficienti, e l'ultimo termine sono quantità razionali: Le irrazionali sono quelle, che liberate non si possono dalle quantità radicali.

491. Teor. 3. Una equazione qualunque immune da frazioni, e il di cui massimo termine sia libero da coefficiente, non può avere per radice una frazione razionale.

492. Dim. Sia l'equazione $x^4 + px^3 + qx^2 + rx + s = 0$, che supponga aver per radice la frazione $\frac{b}{a}$ ridotta a minimi termini. Si sostituisca questa radice in

luogo di x , e nè verrà $\frac{b^4}{a^4} + \frac{pb^3}{a^3} + \frac{qb^2}{a^2} + \frac{rb}{a} + s = 0$, vale a dire $b^4 + pab^3 +$

$qa^2b^2 + ra^3b + a^4s = 0$, in cui (pel num. 461.) la quantità b deve essere un divisore esatto dell'ultimo termine a^4s : Ora perchè b , a non hanno alcun divisore comune, a motivo che la frazione $\frac{b}{a}$ si è supposta ridotta a minimi termini, neppur

lo avranno b, a^2 ; quindi dovendo essere b un divisore esatto di a^2 , non potendo

b essere divisore di a^2 , lo farà di r : Sia adunque $\frac{r}{b} = l$, farà $r = bl$, e però l'equazione farà $b^4 + pab^3 + qa^2b^2 + ra^3b + a^4bl = 0$, cioè $b^4 + pab^3 + qa^2b + ra^3 + a^4l = 0$. In questa equazione parimente deve essere la quantità b un divisore esatto dell'ultimo termine $ra^3 + a^4l$, ma non potendolo essere di a^3 , lo farà di

$r + al$, si faccia adunque $\frac{r+al}{b} = m$, e farà $r + al = bm$, il qual valore sostituito nell'ultima equazione darà $b^4 + pab^3 + qa^2b + a^4bm = 0$, cioè $b^4 + pab + qa^2 + a^4m = 0$. Per la stessa ragione farà b un divisore esatto dell'ultimo termine $qa^2 + a^4m$, ma non potendolo esserlo di a^2 , lo farà di $q + am$, si faccia adunque

$\frac{q+am}{b} = n$, e si avrà $q + am = bn$, il qual valore sostituito nell'ultimo termine dell'ultima equazione, se ne avrà $b^4 + pab + a^4bn = 0$, cioè $b^4 + pa + a^4n = 0$,

quindi $\frac{b}{a} = -p - an$: Ma p, a, n sono numeri interi (per ipotesi), dunque $\frac{b}{a}$ non è una frazione, come si era supposto. E però un'equazione immune da frazioni, e il di cui massimo termine sia libero da coefficiente, non può avere per radice una frazione razionale. Lo che si doveva dimostrare. Lo stesso discorso si applichi a qualunque altra equazione.

493. Quantunque però una frazione immune da frazioni, e da radicali, non possa avere per radice una frazione razionale, può per altro avere per radici delle frazioni irrazionali, come costa dall'equazione $x^4 + x - 5 = 0$, le di cui radici sono

$$\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt[4]{21}.$$

494. Prima di terminare questo articolo vediamo come si possa da una equazione qualunque togliere il secondo termine. Abbiamo veduto al num. 481. che acciò da una equazione sparisca il secondo termine, deve essere uguale a zero il suo coefficiente, lo che succede quando la somma delle radici positive è uguale alla somma delle radici negative; onde (pel num. 478.) a fine di togliere da una equazione il secondo termine devonvi accrescere, o diminuire le radici dell'equazione di una tale quantità, che renda la somma delle radici positive uguale alla somma delle negative: Ora per accrescere, o diminuire di una qualche quantità, per Esempio m , le radici di una equazione, non altro devesi fare, che (supposta x l'incognita dell'equazione) $x \pm m = y$, e però $x = y \mp m$, cioè devesi porre l'incognita dell'equazione accresciuta, o diminuita della quantità data uguale ad una nuova incognita, e però devesi supporre l'incognita dell'equazione uguale ad una nuova incognita diminuita, o accresciuta della quantità data, indi in luogo dell'incognita, e delle sue potestà devesi sostituire nella proposta equazione questo nuovo aggregato. Ma veniamo al caso.

495. Prob. Da una data equazione qualunque debbasi levare il secondo termine.

496. Risol. L'equazione proposta sia $x^n + px^{n-1} + qx^{n-2} \dots A = 0$. Si faccia $x + u = y$, e però $x = y - u$; indi in luogo di x^n si sostituisca $y^n - \frac{n}{1}y^{n-1}u$, che

che (pel num. 256.) è $y^m - mny^{m-1} + \frac{m \times m-1}{2} n^2 y^{m-2}$ ec. in luogo di pn^{m-1} si sostituisca $p \times y^{m-1}$, che (per lo stesso num. 256.) è py^{m-1} — $m-1 \times pny^{m-2} + \frac{m-1 \times m-2}{2} \times pn^2 y^{m-3}$ ec.; in luogo di qx^{m-2} si sostituisca $q \times y^{m-2}$, che (per l'istesso num.) è $qy^{m-2} - m-2 \times qny^{m-3} + \frac{m-2 \times m-3}{2} qn^2 y^{m-4}$ ec., e lo stesso si faccia rispetto agli altri termini, con che si avrà

$$\begin{aligned} x^m &= y^m - mny^{m-1} + \frac{m \times m-1}{2} n^2 y^{m-2} - \frac{m \times m-1 \times m-2}{6} \times n^3 y^{m-3} \text{ ec.} \\ + p x^{m-1} &= + py^{m-1} - m-1 \times pny^{m-2} + \frac{m-1 \times m-2}{2} \times pn^2 y^{m-3} \text{ ec.} \\ + q x^{m-2} &= + qy^{m-2} - m-2 \times qny^{m-3} \text{ ec.} \end{aligned}$$

Somma $y^m - mn + p \times y^{m-1} + m \times \frac{m-1 \times m-2}{2} \times n^2 - m-1 \times pn + q \times y^{m-2}$ ec.

Ma perchè in questa nuova equazione deve mancare il secondo termine, cioè il di lui coefficiente deve essere uguale a zero, però si faccia $-mn + p = 0$, dalla quale si ha $p = mn$, conseguentemente $\frac{p}{m} = n$, quando il coefficiente del secondo termi-

ne dell'equazione data è positivo; e $\frac{-p}{m} = n$ quando il coefficiente del secondo termine della proposta equazione è negativo. Dunque essendo p il coefficiente del secondo termine nell'equazione data, ed m l'esponente della massima potenza, la quantità n , di cui devonfi accrescere, o diminuire le radici dell'equazione, non altro sarà, che il coefficiente del di lei secondo termine diviso per l'esponente della massima potenza dell'incognita, della quale quantità devonfi accrescere le radici dell'equazione, se il coefficiente del secondo termine è positivo, e pel contrario devonfi diminuire se egli è negativo; cioè a dire nel primo caso l'incognita dell'equazione devefi fare uguale ad una nuova incognita diminuita di tale quantità, e nel secondo accresciuta.

497. Per venire al caso particolare debbasi levare il secondo termine dall'equazione $x^3 - 2x^2 - 4x + 3 = 0$. Poichè il coefficiente del secondo termine è negativo, si farà $x = y + \frac{2}{3}$, e in vece di x , e delle sue potenze sostituendo questo valore, si avrà

$$\begin{array}{rcl}
 x^3 & = & y^3 + 2y^2 + \frac{4}{3}y + \frac{8}{27} \\
 - 2x^2 & = & - 2y^2 - \frac{8}{3}y - \frac{8}{9} \\
 - 4x & = & - 4y - \frac{8}{3} \\
 + 3 & = & + 3 \\
 \hline
 \text{Somma } y^3 & = & - \frac{16}{3}y - \frac{7}{27} = 0
 \end{array}$$

che è l'equazione cercata, in cui manca il secondo termine. Questa equazione poi ha per radici le radici della precedente equazione diminuite di 2, per lo che supposto, che le radici della proposta equazione fossero a, b, c , le radici di questa saranno $a-2, b-2, c-2$.

498. Collo stesso metodo si toglie dalle equazioni il terzo termine, e siccome acciò manchi il terzo termine la somma degli ambi positivi deve essere uguale (pel num. 481.) alla somma degli ambi negativi, però a fine di togliere da una equazione il terzo termine, bisognerà accrescere, o diminuire le radici dell'equazione di una tale quantità, che renda la somma degli ambi positivi uguale alla somma degli ambi negativi. Quale poi debba essere questa quantità, la determineremo nel modo seguente. Nell'equazione generale trovata al num. 495. si faccia uguale a zero il

coefficiente del terzo termine $\frac{m \times m-1}{2} \times n^2 - m-1 \times pn + q \times y^{m-1}$, così

$\frac{m \times m-1}{2} \times n^2 - m-1 \times pn + q = 0$, colla quale equazione si ritrovi il valore dell'af-

finita indeterminata n , di cui devonfi accrescere, o diminuire le radici dell'equazione. Per determinare adunque il valore di n , comincio a preparare l'equazione in

questo modo $m \times m-1 \times n^2 - 2m-2 \times pn = -2q$, o sia $n^2 =$

$\frac{2pn}{m} = -\frac{2q}{m \times m-1}$, la quale equazione di secondo grado risolvendosi giusta il num.

395, darà $n = \frac{p}{m} \pm \sqrt{\frac{-2q}{m \times m-1} + \frac{p^2}{m^2}}$ o sia $n = \frac{p}{m} \pm \sqrt{\frac{-2mq + p^2 \times m-1}{m^2 \times m-1}}$, che è

la formola generale, la quale dà la ricercata quantità, di cui devonfi accrescere, o diminuire le radici di una equazione per toglierne il terzo termine, mentre per servirsene non altro devesi fare, che sostituire in luogo di m l'esponente del massimo termine dell'equazione data, in luogo di p , il coefficiente del secondo termine, e il coefficiente del terzo termine in luogo di q . Collo stesso metodo si determinerà la quantità, di cui devonfi accrescere, o diminuire le radici dell'equazione per togliere qual altro termine più piaccia. Ma per togliere il quarto termine devesi risolvere

re una equazione del terzo grado; una del quarto per togliere il quinto termine ec.

ARTICOLO II.

Modo di distinguere le diverse spezie di radici nelle Equazioni.

499. **Q**uattro, come abbiamo veduto, sono le spezie di radici, cioè positive, negative, reali, e immaginarie. Per parlare in primo luogo delle radici positive, e negative, io dico, che sarà facile il distinguerle dal solo osservare i segni dell'equazione, supposto che ella abbia tutte le radici reali, e la regola è la seguente.

500. Una equazione, di cui tutte le radici siano reali, avrà tante radici positive, quanti in essa saranno i cambiamenti di segno di + in —, e di — in +; e tante radici negative, quante in essa saranno le continuazioni di segno, o +, o —: Per lo che l'equazione $x^4 + ax^3 - bx^2 + cx - dx^2 - ex^2 - fx + m = 0$ avrà quattro radici positive, e tre negative, perchè vi sono quattro variazioni di segni, cioè $+ax^3$, $-bx^2$, $+cx$, $-dx^2$, $-ex^2$, $-fx$, e tre continuazioni, cioè $+x^4 + ax^3$, $-dx^2 - ex^2$, $-fx$. La verità di questa regola abbastanza si raccoglie dalla genesi delle equazioni data al num. 476, e dai num. 477. e 479., poichè primieramente quando tutte le radici sono positive, i segni dell'equazione sono tutti alternanti: Di poi il coefficiente del secondo termine essendo la somma delle radici prese con segno contrario, siccome quando le radici sono tutte positive, egli è negativo, così non può essere egli positivo (dal che ne nasce una continuazione di segno col primo termine) qualora non vi sia qualche radice negativa: Parimente il coefficiente del terzo termine essendo la somma degli ambi delle radici prese col proprio segno, egli perciò deve avere un segno differente dal segno del secondo termine; o in altre essendo affetto dal segno positivo, egli deve risultare, o da radici tutte positive, o se ve ne sono delle negative, esse devono essere in numero pari: Quindi se il primo, il secondo, e il terzo termine saranno affetti dal segno positivo, l'equazione avrà necessariamente due radici negative, delle quali una viene indicata dal segno positivo del secondo termine, e l'altra dal segno pure positivo del terzo termine per la ragione addotta, che essendo positivo il coefficiente del terzo termine, se vi sono radici negative, devono essere necessariamente in numero pari, perchè il solo prodotto di — in — dà +. Per la stessa ragione essendo il coefficiente del quarto termine la somma de' termini delle radici prese col segno contrario, non può essere egli positivo, quando non vi sia un numero impari di radici negative: Che però se il secondo, e terzo termine saranno positivi, lo che, come si è detto, importa due radici negative, e il terzo sia eziandio positivo, con che vi saranno tre continuazioni di segno, l'equazione avrà necessariamente tre radici negative. Nella stessa maniera continuando il discorso si dimostrerà, che se nell'equazione tutti i segni saranno positivi, ella avrà tutte le radici negative; Lo che si poteva ancora dimostrare così: Tutti i termini dell'equazione essendo affetti dal segno +, per qualunque quantità positiva si sostituisca in luogo di x , non potrà mai l'aggregato dei termini dell'equazione andare a zero, ma sempre sarà positivo, dunque (pel num. 471.) niuna quantità positiva potrà essere radice dell'equazione. Quora poi essendo negativo il secondo termine dell'equazione, lo sia ancora il terzo termine, onde vi siano due continuazioni di segno, l'equazione avrà necessariamente

mente una radice negativa, perchè il coefficiente del terzo termine essendo la somma degli ambi delle radici col proprio segno, non può egli essere negativo, se non v'è per lo meno una radice negativa: Parimente il coefficiente del quarto termine essendo la somma dei terni delle radici prese col segno contrario, non può egli essere negativo, se non in caso, che o tutte le radici siano positive, o essendo delle negative, queste siano in numero pari: Ora essendo negativo il secondo, e il terzo termine, si è veduto, che l'equazione avrà una radice negativa; dunque essendo negativo ancora il quarto termine, con che vi faranno due continuazioni di segno, l'equazione avrà necessariamente due radici negative. Di pari passo continuando il raziocinio resta evidentemente provato, che in una equazione; di cui tutte le radici siano reali, quanti vi faranno cambiamenti di segno, altrettante faranno le radici positive, e tante faranno le radici negative, quante faranno le successioni di segno,

301. Corol. Quindi s'intende, che volendosi cambiare le radici di una equazione da positive in negative, e da negative in positive, basterà cambiare tutti i segni ai termini, che sono in posto pari, cioè al secondo, al quarto, al sesto ec.; senza punto toccare i segni de' termini posti in luogo impari, poichè essendo il coefficiente del secondo termine la somma di tutte le radici col segno mutato, non si potrà a lui cambiare il segno senza cambiarlo anche alle radici, e gli altri termini in posto pari risultando dalla somma di prodotti di un numero impari di radici, cioè il quarto da' terni, il sesto da cinque ec., qualora siano affetti dal segno positivo, faranno formati o dal prodotto di radici tutte negative, o da numero pari di radici positive, e numero dispari di radici negative; se hanno il segno negativo, faranno formati o dal prodotto di radici tutte positive, o da numero pari di radici negative, e numero dispari di radici positive; per lo che cambiando il segno a questi termini posti in luogo pari, le radici positive diverranno negative, e *viceversa*. Rispetto poi ai termini posti in luogo dispari, risultando essi dalla somma di prodotti di un numero pari di radici, se avranno il segno positivo, faranno formati o da un numero pari di radici negative, o da un numero pari di radici positive, o pure da un numero pari di radici positive, e pari di negative; che se avranno il segno negativo, faranno formati dalla somma di prodotti di un numero dispari di radici positive in un numero dispari di radici negative: Che però tanto nell' uno, come nell' altro caso cambiando reciprocamente il segno alle radici, sussisterà lo stesso il segno di questi termini.

302. Mancando nell' equazione qualche termine intermedio, se i termini esistenti di quà, e di là dal termine mancante, faranno affetti da differente segno, da questo cambiamento verranno indicate due radici, una positiva, e l'altra negativa se poi i termini esistenti di quà, e di là faranno affetti dallo stesso segno, ciò sarà indizio di due radici immaginarie. Basterà dimostrare la verità di questa proposizione in un caso solo, che è il primo, quando cioè manca il secondo termine, e gli altri due adiacenti sono affetti dallo stesso segno, mentre quanto agli altri casi, o sia quanto alla mancanza degli altri termini si potrà dagli stessi lumi dedurre la dimostrazione della proposizione. E primieramente quanto all' equazione di secondo grado non può mancare il secondo termine se non in caso, che le due radici siano eguali, e affette da diverso segno (pel num. 478.) lo che dà necessariamente l'ultimo termine negativo: Dunque se l'ultimo termine sarà positivo, e però dello stesso segno del primo, l'equazione avrà due radici immaginarie, come a chiunque è manifesto. Quanto alle equazioni di terzo grado allora solamente mancherà il se-

condo termine, quando delle tre radici dell'equazione una positiva sarà uguale a due negative, o una negativa a due positive, dalla di cui somma il secondo termine va a zero: Ora la somma, che nasce dagli ambi di queste radici, la quale deve servire per coefficiente al terzo termine, deve necessariamente essere negativa; poichè essendo le radici $m, n, -p$, o pure $-m, -n, p$, il coefficiente del terzo termine sarà $mn, -mp, -np$, ma essendo $m+n=p$, deve essere np maggiore di mn , dunque $mn - mp - np$ deve essere quantità negativa. Se pertanto il terzo termine sarà positivo, e però dello stesso segno del primo termine, questa equazione avrà due radici immaginarie. Passiamo collo stesso discorso alle equazioni del quarto grado, nelle quali acciò manchi il secondo termine, o tre radici devono essere positive, ed una negativa, come $m, n, p, -q$, o tre negative, ed una positiva, come $-m, -n, -p, q$, o due positive, e due negative, come $-m, -n, p, q$, ovvero $m, n, -p, -q$. Nel primo, e nel secondo caso il coefficiente del terzo termine sarà $mn, mp, np, -mq, -nq, -pq$, ma essendo $m+n+p=q$, deve essere $mq > mn, pq > mp, nq > np$, dunque $mq+nq+pq > mn+mp+np$, e conseguentemente il terzo termine non può non essere negativo. Quanto al terzo caso, in cui $m+n=p+q$, il coefficiente del terzo termine sarà $mn - mp - np - mq - nq + pq$, o sia $mn+pq - m-n \times p+q$, e però $m+n \times p+q = mp+mq+np+nq$. Si faccia $m+n=p+q$, onde sarà $mp+mq+np+nq = r^2$; e siccome r^2 è uguale tanto ad $m^2+2mn+n^2 = m+n^2$, quanto a $p^2+2pq+q^2 = p+q^2$, quindi è, che si può determinare sì il valore di mn , come il valore di pq , onde conoscere se $mn+pq - m-n \times p+q$ debba essere quantità positiva, o negativa. Ora dalle precedenti equazioni si ha $mn = \frac{r^2 - m^2 - n^2}{2}$, e $pq = \frac{r^2 - p^2 - q^2}{2}$, dunque $mn+pq = \frac{r^2 - m^2 - n^2 - p^2 - q^2}{2}$, conseguentemente $r^2 > mn+pq$. Sarà pertanto $mp+mq+np+nq > mn+pq$, e però il coefficiente del terzo termine non può non essere negativo. Qualora adunque sarà positivo, e però dello stesso segno del primo termine, l'equazione avrà due radici immaginarie. Lo stesso raziocinio si applichi all'altre equazioni superiori, e così resterà generalmente dimostrato, che ogniquolta in una equazione manchi il secondo termine, e il terzo sia positivo, ella avrà per lo meno due radici immaginarie. Cogli stessi principj si passi alla dimostrazione degli altri casi.

503. Poichè la regola data al num. 500. ha luogo solamente quando l'equazione ha tutte le radici reali, non già quando ammette radici immaginarie, come sarebbe questa $x^3 + bx^2 + ax + a^2b = 0$, che quantunque stante la successione del segno + sembri avere tutte le radici negative, pur non è vero a motivo, che ella ha radici immaginarie, che però le sue radici sono $-b, \pm \sqrt{-a^2}$; quindi per poter distinguere il numero delle radici positive, e negative di una proposta equazione, bisogna prima scuoprire se ella ha, o non ha tutte le radici reali.

504. Quantunque si possa immediatamente cercare se una data equazione ha tutte le radici reali, pure io mi rivolgerò piuttosto a scuoprire la maniera di conoscere se ella ha radici immaginarie, e quante presso a poco ne ha, mentre ciò egualmente basterà per determinare se l'equazione ha, o non ha tutte le radici reali, e in oltre quante presso a poco ne ha. Prima di venire al metodo di scuopri-

prire se una equazione ha radici immaginarie, mi è necessario premettere il seguente

505. Lemma. Se di una equazione, le di cui radici siano tutte reali, si moltiplicheranno ordinatamente i termini per i termini di una progressione aritmetica, o principiante dal zero, come o. 1. 2. 3. 4. ec., o risultante dagli esponenti dell' incognita; come $n, n-1, n-2, n-3$, ec. le radici dell' equazione, che ne verrà, saranno parimente reali.

506. Dim. Per dimostrare questo Lemma assumo una equazione generale comunque, per esempio la seguente del terzo grado $x^3 \pm a \pm b \pm c \times x^2 + ab + ac + bc \times x \pm abc = 0$, di cui tutte le radici saranno negative, se del segno $\pm$, valerà il segno superiore $+$, e pel contrario saranno tutte positive, se valerà il segno $-$, giusta il num. 477. Le radici poi a, b, c s' intendano disposte secondo l' ordine della grandezza numerica, così che essendo positive queste radici, farà a maggiore di b , e b maggiore di c , ma essendo negative, farà a minore di b , e b minore di c . Si moltiplichino pertanto i termini dell' equazione propolla per i termini della progressione aritmetica o. 1. 2. 3., come segue.

$$\begin{array}{rcccl} \text{(B)} & x^3 \pm a \pm b \pm c \times x^2 + ab + ac + bc \times x + abc = 0 \\ \text{Progr. arit.} & \text{o.} & \text{1.} & \text{2.} & \text{3.} \end{array}$$

$$\text{Prodotto (A)} \quad \pm a \pm b \pm c \times x^3 + 2ab + 2ac + 2bc \times x^2 + 3abc = 0$$

Ora in questa equazione si sostituiscano ad una ad una le radici a, b, c dell' equazione (B), quali radici si dovranno sostituir positive, se l' equazione farà

$-a-b-c \times x^3 + 2ab + 2ac + 2bc \times x^2 - 3abc = 0$, ma se l' equazione farà

$+a+b+c \times x^3 + 2ab + 2ac + 2bc \times x^2 + 3abc = 0$, si dovranno sostituir negative, poichè dovendosi sostituire le proprie radici, nel primo caso le radici dell' equazione sono positive, e nel secondo sono negative, come pur ora ho detto al num. 505. Sostituendosi pertanto a ne verrà l' equazione (C), sostituendosi b , ne verrà l' equazione (D), sostituendosi c ne verrà l' equazione (E).

$$\text{(C)} \quad -a^3 + a^2b + a^2c - abc = -a^3 + ab + ac - bc = 0$$

$$\text{(D)} \quad -b^3 + ab^2 + b^2c - abc = -b^3 + ab + bc - ac = 0$$

$$\text{(E)} \quad -c^3 + ac^2 + bc^2 - abc = -c^3 + ac + bc - ab = 0$$

Sostituendosi $-a$ si avrà l' equazione (F), sostituendosi $-b$, si avrà l' equazione (G), sostituendosi $-c$ si avrà l' equazione (H)

$$\text{(F)} \quad +a^3 - a^2b - a^2c + abc = a^3 - ab - ac + bc = 0$$

$$\text{(G)} \quad +b^3 - ab^2 - b^2c + abc = b^3 - ab - bc + ac = 0$$

$$\text{(H)} \quad +c^3 - ac^2 - bc^2 + abc = c^3 - ac - bc + ab = 0$$

Ma il valore dell' equazione (C) è negativo, perchè $a^3 + abc > a^2b + a^2c$, o sia, fatta la divisione per a , $a^2 + bc > ab + ac$, mentre la quantità $-a^3 - bc + ab + ac$ risulta da

da $-a-b \times a-c$; i due termini poi a^3 , ac risultano dal moltiplicarsi fra loro i termini estremi dei due fattori, e gli altri due termini ab , ac risultano dal moltiplicarsi scambievolmente in croce i termini stessi: Ma essendo $a > b$, $b > c$, il prodotto de' termini estremi fra loro è maggiore del prodotto, che nasce dal moltiplicarsi in croce gli stessi termini, adunque $-a^3 - bc > ab + ac$: E per la stessa ragione il valore dell'equazione (D) è positivo, e dell'equazione (E) è negativo. E *viceversa*, stante che cambiano i segni, il valore dell'equazione (F) è positivo, dell'equazione (G) è negativo, dell'equazione (H) è positivo. Sostituendosi pertanto nell'equazione A le radici dell'equazione (B), gli aggregati de' termini passano alternativamente da positivi a negativi, e da negativi a positivi. Dunque (pel num. 474.) le radici dell'equazione (A) sono reali, e però, siccome il raziocinio usato in quella equazione del terzo grado, è applicabile a qualunque altra equazione, se con una progressione aritmetica principiante dal zero si moltiplicheranno ordinatamente i termini di una equazione le di cui radici siano tutte reali, anche l'equazione, che ne verrà avrà tutte le radici reali. Lo che in primo luogo si doveva dimostrare.

507. Si moltiplichì adesso l'equazione (B) per la progressione aritmetica 3. 2. 1. 0., che ci viene esibita dagli esponenti dell'incognita, e si avrà, come segue

$$\begin{array}{rcccc} \text{(B)} & x^3 \pm a \pm b \pm c & \times & x^3 + ab + ac + bc & \times & x \pm a \pm b \pm c = 0 \\ \text{Progress. ar.} & 3. & & 2. & & 1. & & 0. \end{array}$$

$$\text{Prodotto (M)} \quad 3x^3 \pm 2a \pm 2b \pm 2c \times x + ab + ac + bc = 0$$

In questa equazione (M) si sostituiscano le radici a, b, c dell'equazione (B) prima positive, e poi negative, e dalle prime si avranno le tre equazioni (N) (P) (Q), dalle seconde si avranno le equazioni (R) (S) (T), come segue

$$\text{(N)} \quad +a^3 - ab - ac + bc = 0$$

$$\text{(P)} \quad +b^3 - ab - bc + ac = 0$$

$$\text{(Q)} \quad +c^3 - ac - bc + ab = 0$$

$$\text{(R)} \quad -a^3 + ab + ac - bc = 0$$

$$\text{(S)} \quad -b^3 + ab + bc - ac = 0$$

$$\text{(T)} \quad -c^3 + ac + bc - ab = 0$$

Questi aggregati poi essendo gli stessi di quelli, che sono risultati dalla moltiplicazione dell'equazione per la progressione 0. 1. 2. 3. ec., se non che gli aggregati, che qui sono risultati dalle sostituzioni delle radici positive, là sono risultati dalle sostituzioni delle stesse radici negative, e quelli, che là risultano dalle sostituzioni delle radici positive, qui risultano dalle sostituzioni delle radici negative. O si moltiplichì adunque una equazione, le di cui radici siano reali, per una progressione aritmetica principiante da zero, o per la progressione formata dagli esponenti dell'incognita, le radici dell'equazione, che ne risulterà, faranno parimente reali.

508. Ben si vede, che la stessa dimostrazione è applicabile alla proposizione, qualunque sia la progressione aritmetica, che si voglia adottare.

509. Dopo essersi moltiplicata una proposta equazione per gli esponenti dell' incognita, si moltiplichino di nuovo i termini dell'equazione, che ne risulterà, negli esponenti della sua incognita, e lo stesso si continui a fare colle successive equazioni, che si andranno ritrovando, e se l'equazione proposta avrà tutte le sue radici reali, anche le equazioni troverute, avranno parimente le loro radici reali: ma non già *viceversa* essendo reali le radici delle ritrovate, o della ritrovata equazione, dovranno esser tali anche quelle della proposta, perchè le radici della seconda equazione diventano limiti delle radici della prima, le quali sono medie fra la massima, e la minima, solo in ipotesi, che le radici della prima siano limiti delle radici della seconda. Cae però se mediante la replicata moltiplicazione per una progressione aritmetica, si giungerà ad una equazione di secondo grado, le di cui radici siano immaginarie, necessariamente l'equazione data avrà per lo meno due radici immaginarie.

510. Il modo di dimostrare usato quando le radici dell'equazione sono tutte o positive, o negative, ha luogo ugualmente quando le radici sono parte positive, e parte negative.

511. Si osservi poi, che siccome nelle equazioni ordinate il massimo termine deve essere positivo perciò nell'equazioni (C, D, E; R, S, T) positivo dovrassi rendere il primo termine, lo che si otterrà (giusta il num. 312.) con cambiare tutti i segni, nel qual caso queste equazioni faranno le stesse, che le equazioni (F, G, H): Quindi poichè col sostituirli la radice $\pm a$ nell'equazione A l'aggregato de' termini risulta positivo, col sostituire $\pm b$ risulta negativo, e di nuovo passa ad essere positivo col sostituirsi $\pm c$, egli è evidente, che le radici dell'equazione (B) sono limiti delle radici dell'equazione (A), e *viceversa*: Che però le ritrovate equazioni mediante la replicata moltiplicazione per una progressione aritmetica, si possono chiamare le equazioni dei limiti.

512. Ciò posto veniamo alla regola dataci dal Sig. Newton di determinare presso a poco il numero delle radici immaginarie di una data equazione. La regola è questa. Sopra i termini della data equazione del grado m , cominciando dal

secondo, si scrivano le frazioni $\frac{2m}{m-1}$, $\frac{3 \times m-1}{2 \times m-2}$, $\frac{4 \times m-2}{3 \times m-3}$, $\frac{5 \times m-3}{4 \times m-4}$ ec. ognuna

delle quali devesi moltiplicare nel prodotto de' coefficienti dei termini adjacenti di quà, e di là del termine, cui ella sta sopra, e se ciò, che ne verrà farà minore del quadrato del coefficiente di questo tal termine di mezzo, sotto vi si scriveva il segno +, se è maggiore sotto si scriveva il segno —; sotto al primo, e all' ultimo termine poi si scrive +, e quanti faranno i cambiamenti di segno, altrettante per lo meno faranno le radici immaginarie, che avrà l'equazione proposta. Per dichiarare la dottrina esposta coll' Esempio, prendo l'equazione $x^4 + 4x^3 + 19x^2 - 42x^3 + 66x^2 - 50x + 22 = 0$. Poichè nel presente caso $m=6$, le frazioni da scriverli sopra i termini dell'equazione, cominciando dal secondo, faranno $\frac{12}{5}$, $\frac{15}{8}$, $\frac{16}{9}$,

$\frac{15}{8}$, $\frac{12}{5}$, quali si noteranno, come segue —

$$x^6 + \frac{12}{5}x^5 + 19x^4 - 42x^3 + 66x^2 - 50x + 22 = 0$$

Per maggiore chiarezza denomino i coefficienti de' termini dell'equazione colle lettere A, B, C ec., onde sarà $A=4$, $B=19$, $C=-42$, $D=66$, $E=-50$, $F=22$: Denomino in oltre le corrispondenti frazioni colle lettere Δ , Θ , Λ , Π , Ξ , così che sia $\Delta = \frac{12}{5}$, $\Theta = \frac{19}{8}$, $\Lambda = \frac{16}{9}$, $\Pi = \frac{15}{8}$, $\Xi = \frac{12}{5}$. Ciò fatto procedo all'operazione, come segue

Quad. de' coefficienti Prodotti di ciascuna fraz. nel prodotto de' coefficienti adiacenti.

$$\begin{array}{lll} A^2 = 16 & \Delta \times B & = \frac{12}{5} \times 19 = 45 \frac{3}{5} \\ B^2 = 361 & \Theta \times A \times C & = \frac{19}{8} \times 4 \times 42 = 315 \\ C^2 = 1764 & \Lambda \times B \times D & = \frac{16}{9} \times 19 \times 66 = 2229 \frac{1}{3} \\ D^2 = 4356 & \Pi \times C \times E & = \frac{15}{8} \times 42 \times 50 = 3937 \frac{1}{2} \\ E^2 = 2500 & \Xi \times D \times F & = \frac{12}{5} \times 66 \times 22 = 3484 \frac{4}{5} \end{array}$$

Si ha adunque rispetto al secondo termine 16 $< 45 \frac{3}{5}$

rispetto al terzo 361 > 315

al quarto 1764 $< 2229 \frac{1}{3}$

al quinto 4356 $> 3937 \frac{1}{2}$

al sesto 2500 $< 3484 \frac{4}{5}$

che però se giusta la regola data si scriveranno i convenienti segni sotto a ciascun termine si avrà

$$\begin{array}{ccccccccc} x^6 & + & 4x^5 & + & 19x^4 & - & 42x^3 & + & 66x^2 & - & 50x & + & 22 & = & 0 \\ + & & - & & + & & - & & + & & - & & + & & \end{array}$$

Onde avendosi sei cambiamenti di segni si raccoglie, che la proposta equazione ha tutte sei le radici immaginarie.

513. Ora per dimostrare la verità del metodo, e far vedere, che le radici immaginarie vengono appunto indicate allora quando il quadrato del coefficiente di qualche termine è minore del prodotto de' coefficienti dei termini adjacenti moltiplicato nella frazione sovrapposta al termine di mezzo, basterà prendere una equazione generale, e moltiplicarla nella progressione aritmetica, che risulta dagli esponenti dell'incognita, poscia moltiplicare l'equazione, che ne nasce, per gli esponenti parimente della sua incognita, e così di seguito, finchè si giunga ad una equazione di secondo grado, mentre se le radici dell'equazione proposta sono reali, anche questa equazione di secondo grado avrà (pel num. 505.) le sue due radici reali, e se questa ha le due radici immaginarie, anche la proposta avrà necessariamente per lo meno due radici immaginarie, e la relazione de' coefficienti di questa equazione di secondo grado ci fornirà la condizione indicante nell'equazione proposta le due radici immaginarie. Sia pertanto l'equazione $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + cx^{m-3} + dx^{m-4} + ex^{m-5}$ ec. = 0, i di cui termini si moltiplichino per gli esponenti dell' incognita, e si dividano per la stessa incognita così $mx^{m-1} + m-1 \times ax^{m-2} + m-2 \times bx^{m-3}$

$+ m-3 \times cx^{m-4}$ ec. = 0. I termini di questa equazione si moltiplichino parimente per gli esponenti dell'incognita, e si avrà $m \times m-1 \times x^{m-3} + m-1 \times m-2 \times ax^{m-4}$ $+ m-2 \times m-3 \times bx^{m-5} + m-3 \times m-4 \times cx^{m-6}$ ec. = 0. Di nuovo si moltiplichino i termini di questa equazione per gli esponenti dell' incognita, e si avrà

$m \times m-1 \times m-2 \times x^{m-5} + m-1 \times m-2 \times m-3 \times ax^{m-6}$ $+ m-2 \times m-3 \times m-4 \times bx^{m-7} + m-3 \times m-4 \times m-5 \times cx^{m-8}$ ec. = 0. Iteffamente si moltiplichino i termini di questa equazione per gli esponenti dell'incognita, e così in seguito, finchè si giunga ad una equazione di secondo grado. Tale poi farebbe l'ultima equazione trovata $m \times m-1 \times m-2 \times x^{m-5} +$

$m-1 \times m-2 \times m-3 \times ax^{m-6} + m-2 \times m-3 \times m-4 \times bx^{m-7} +$ $m-3 \times m-4 \times m-5 \times cx^{m-8}$ ec. = 0, qualora fosse $m=5$: Di fatto sostituendosi questo valore di m nell'esponente dell'incognita, farà $m \times m-1 \times m-2 \times x^3 +$ $m-1 \times m-2 \times m-3 \times ax + m-2 \times m-3 \times m-4 \times bx = 0$, e fatta la divisione pel coefficiente di x^3 , si avrà $x^3 + \frac{m-3 \times ax}{m} + \frac{m-3 \times m-4}{m \times m-1} \times bx = 0$, vale a dire

$x^3 + \frac{2ax}{m} + \frac{2b}{m \times m-1} = 0$, di cui (pel num. 410.) le radici non possono essere

reali, se non è $\frac{a^2}{m^2} > \frac{2b}{m \times m-1}$, e però $a^2 > \frac{2mb}{m-1}$, che se farà $a^2 < \frac{2mb}{m-1}$, ella avrà le radici immaginarie: Per lo che se ancora nell'equazione data farà $a^2 < \frac{2mb}{m-1}$, vale a dire se il quadrato del coefficiente del secondo termine sarà minore

del prodotto del coefficiente del terzo termine nella frazione $\frac{2m}{m-1}$, l'equazione avrà due radici immaginarie. Ed ecco ritrovato il primo indizio di due radici immaginarie nell'equazione data.

§14. Passiamo al secondo indizio, e primieramente si moltiplichino l'equazione data $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + cx^{m-3} + dx^{m-4}$ ec. $= 0$ per la progressione aritmetica o. 1. 2. 3. 4 ec., con che si avrà $ax^{m-1} + 2bx^{m-2} + 3cx^{m-3} + 4dx^{m-4}$ ec. $= 0$ la quale avrà tutte le radici reali, in supposizione, che tali le abbia l'equazione data (pel num. 505.). Si moltiplichino adesso i termini di questa equazione per gli esponenti dell'incognita, e si dividano per la stessa incognita, dal che ne verrà $\overline{m-1} \times ax^{m-2} + \overline{m-2} \times 2bx^{m-3} + \overline{m-3} \times 3cx^{m-4} + \overline{m-4} \times 4dx^{m-5}$ ec. $= 0$: Di nuovo per gli esponenti dell'incognita, si moltiplichino i termini di questa ritrovata equazione, e si avrà $\overline{m-1} \times \overline{m-2} \times ax^{m-3} + \overline{m-2} \times \overline{m-3} \times 2bx^{m-4} +$

$\overline{m-2} \times \overline{m-4} \times 3cx^{m-5} + \overline{m-4} \times \overline{m-5} \times 4dx^{m-6}$ ec. $= 0$, e così questa si torni a moltiplicare ec. finchè si giunga ad una equazione di secondo grado, quale sarà l'ultima equazione trovata, supposto che sia $m=5$. Di fatto sostituendosi negli esponenti questo valore di m , si avrà $\overline{m-1} \times \overline{m-2} \times ax + \overline{m-2} \times \overline{m-3} \times 2bx +$

$$\overline{m-3} \times \overline{m-4} \times 3c, \text{ cioè (con liberare il primo termine dal coefficiente) } \\ x^2 + \frac{\overline{m-3} \times 2bx}{a \times \overline{m-1}} + \frac{\overline{m-2} \times \overline{m-4} \times 3c}{a \times \overline{m-1} \times \overline{m-2}} = 0; \text{ o sia } x^2 + \frac{2 \times 2bx}{a \times \overline{m-1}} + \frac{2 \times 3c}{a \times \overline{m-1} \times \overline{m-2}} \\ = 0, \text{ le cui radici saranno immaginarie, qualora sia } \frac{4b^2}{a^2 \times \overline{m-1}^2} < \frac{2 \times 3c}{a \times \overline{m-1} \times \overline{m-2}}, \text{ e pe-}$$

rò $b^2 < \frac{3 \times \overline{m-1} \times \overline{m-2} \times ac}{2 \times \overline{m-2}}$; lo che pure accadendo nell'equazione proposta, indicherà

due radici immaginarie. Ed ecco ritrovato il secondo indizio di due radici immaginarie nella data equazione.

§15. Per venire al terzo indizio si moltiplichino per la serie aritmetica o. 1. 2. 3. 4. ec. l'equazione $ax^{m-1} + 2bx^{m-2} + 3cx^{m-3} + 4dx^{m-4}$ ec. $= 0$, con che si avrà l'equazione $2bx^{m-2} + 6cx^{m-3} + 12dx^{m-4}$ ec. $= 0$, la quale si moltiplichino per la progressione aritmetica, che formano gli esponenti dell'incognita, onde si avrà $\overline{m-2} \times 2bx^{m-3} + \overline{m-3} \times 6cx^{m-4} + \overline{m-4} \times 12dx^{m-5}$ ec. $= 0$, la quale (supposto $m=5$) è di secondo grado, cioè $\overline{m-2} \times 2bx^2 + \overline{m-3} \times 6cx +$

$$\overline{m-4} \times 12d = 0, \text{ o sia } x^2 + \frac{\overline{m-3} \times 6cx}{\overline{m-2} \times 2b} + \frac{\overline{m-4} \times 12d}{2b \times \overline{m-2}} = 0, \text{ vale a dire } x^2 +$$

$$\frac{\overline{m-3} \times 3cx}{b \times \overline{m-2}} + \frac{\overline{m-4} \times 6d}{b \times \overline{m-2}} = 0, \text{ la quale equazione avrà le radici immaginarie, se}$$

fa-

farà $\left(\frac{m-3 \times 3c}{2b \times m-2} \right)^2 < \frac{m-4 \times 6d}{b \times m-2}$, cioè $\frac{m-3 \times m-3 \times ac^2}{4b^2 \times m-2^2} < \frac{m-4 \times 6d}{b \times m-2}$, e pe-

rò $c^2 < \frac{4b \times m-2 \times m-4 \times 6d}{9 \times m-3 \times m-3}$, conseguentemente $c^2 < \frac{24 \times m-2 \times bd}{18 \times m-3}$, e per ulti-

mo $c^2 < \frac{4 \times m-2 \times bd}{3 \times m-3}$, Che è il terzo indizio cercato, il quale avendo luogo

nell'equazione proposta indicherà due radici immaginarie.

§16. Nella stessa maniera continuando l'operazione si troveranno gli altri indizj di radici immaginarie proposti al num. §12., vale a dire si troveranno le relazioni, che avranno i coefficienti in caso di radici immaginarie.

§17. Siccome poi questi indizj possono essere tanti, quanti sono i coefficienti dell'equazione, de' quali il numero (supposto m il massimo esponente dell'equazione) è $m-1$, e ogni indizio, poichè ricavato da una equazione di secondo grado, mostra due radici immaginarie, qualora tutti questi indizj si verificino in una equazione, verrebbe il metodo a mostrare più radici, di quello porti il grado dell'equazione, mentre il numero delle radici risulterebbe $2m-2$, quando deve essere $= m$. Quantunque però ogni indizio, poichè ricavato da una equazione di secondo grado, nasca da due radici immaginarie, siccome può succedere, che due indizj si riferiscano alle stesse radici, quindi è, che il numero degli indizj non mostra sempre un corrispondente doppio numero di radici immaginarie. Che però se due indizj faranno consecutivi, cioè se uno verrà dopo l'altro, essi non indicheranno, che due radici immaginarie, ma se faranno separati, così, che di tre indizj manchi quel di mezzo, ognuno dei due indicherà due radici immaginarie.

§18. Si offervi, che il primo indizio farà tanto $a^2 < \frac{2mb}{m-1}$, come $\frac{m-1 \times a^2}{2m}$

$< b$; così il secondo farà tanto $b^2 < \frac{3 \times m-2 \times ac}{2 \times m-2}$, come $\frac{2 \times m-2 \times b^2}{3 \times m-1} < ac$ ec.

ARTICOLO III.

Delle trasformazioni delle equazioni.

§19. **D**Eff. Trasformare una equazione non è altro, che mutarla in un'altra; le di cui radici abbiano una data relazione alle radici dell'equazione proposta.

§20. Questo artificio serve a scuoprire le radici dell'equazione data mediante le radici già cognite della trasformata. Queste trasformazioni si riducono ad accrescere o diminuire di una quantità a piacere le radici dell'equazione proposta; o pure a moltiplicarle, o dividerle per una quantità data. Io intanto ne esporrò per ordine i metodi.

521. Prob. 1. Data l'equazione $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, si debba ella trasformare in un'altra, le di cui radici siano le radici della proposta accresciute della quantità n .

522. Rifol. Poichè le radici della trasformata devono essere $x+n$, si prenda una nuova incognita y , e si faccia $x+n=y$, e però $x=y-n$. Nell'equazione proposta si sostituisca in luogo di x , e delle sue potenze la quantità $y-n$, e le di lei corrispondenti potenze, il di cui aggregato darà la trasformata, che si cerca, come segue

$$\begin{array}{rcl} x^4 & = & y^4 - 4ny^3 + 6n^2y^2 - 4n^3y + n^4 \\ + ax^3 & = & + ay^3 - 3any^2 + 3an^2y - an^3 \\ + bx^2 & = & + by^2 - 2bny + bn^2 \\ + cx & = & + cy - cn \\ + d & = & + d \end{array}$$

Equaz. trasform. $y^4 - 4n + a \chi y^3 + 6n^2 - 3an + b \chi y^2 - 4n^3 + 3an^2 - 2bn + c \chi y + n^4 - an^3 + bn^2 - cn + d = 0$

523. Chiaramente s'intende in primo luogo, che mediante questa trasformazione si accresceranno le radici positive dell'equazione proposta, e si diminuiranno le negative: Per lo che se la quantità, con cui si accrescono le radici dell'equazione, sarà maggiore di ciascuna radice negativa, tutte le radici della trasformata saranno positive, e la minima radice positiva della trasformata risulterà dalla massima negativa della proposta.

524. In secondo luogo se la quantità, di cui si accrescono le radici dell'equazione proposta, sarà uguale ad una delle di lei radici negative, questa radice nella trasformata diverrà uguale a zero, per lo che l'ultimo termine della trasformata sarà uguale a zero (pel num. 481.), e però si potrà essa abbassare di un grado, dividendola per y .

525. In terzo luogo per mezzo di questa trasformazione si potrà compiere una equazione, nella quale manchi qualche termine, niente altro a ciò fare richiedendosi, che aumentare di una quantità data le sue radici.

526. Prob. 2. Data l'equazione $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$, si debba essa trasformare in un'altra, le di cui radici siano le radici della proposta diminuite della quantità n .

527. Rifol. Dovendo essere $x-n$ le radici della trasformata (la lettera x rappresenta le radici della proposta), si prenda una nuova incognita y , e si faccia $x-n=y$, e però $x=y+n$, indi nell'equazione proposta si sostituisca in luogo di x , e delle sue potenze la quantità $y+n$, e le di lei corrispondenti potenze, il di cui aggregato darà la ricercata equazione trasformata, come segue

$$\begin{array}{rcl}
 x^3 & = & y^3 + 3ny^2 + 3n^2y + n^3 \\
 + ax^2 & = & + 3y^2 + 2any + an^2 \\
 + bx & = & + by + bn \\
 + c & = & + c
 \end{array}$$

$$\text{Equaz. trasformata} \quad y^3 + 3n + a \chi y^2 + 3n^2 + 2an + b \chi y + n^3 + an^2 + bn + c = 0$$

528. Egualmente s'intende, che mediante questa trasformazione si diminuiscono della quantità n le radici positive dell'equazione proposta, e si aumentano nel loro genere le negative: Per lo che se la quantità n sarà uguale a qualcuna delle radici positive, una radice diverrà uguale a zero nella trasformata, in cui perciò mancherà l'ultimo termine (pel num. 481.); ond'è, che ella si potrà abbassare di un grado dividendola per y . Che se la quantità n sarà maggiore di qualunque radice positiva, le radici positive dell'equazione proposta passeranno a negative nella trasformata.

529. Si opererà ugualmente qualora si voglia, che le radici della trasformata sianò i residui, che nascono sottraendo da una data quantità, per Esempio n , le radici dell'equazione proposta, niente altro richiedendosi, che fare $n - n = y$, e però $x = n - y$, indi fare le sostituzioni, come sopra.

530. Parimente essendo data una equazione, il di cui ultimo termine abbia molti divisori, si potrà essa trasformare in un'altra, il di cui ultimo termine ne ammetta un numero minore, lo che si otterrà con diminuire le radici dell'equazione proposta di una tale quantità, la quale sostituita nell'equazione data dia per aggregato de' termini una quantità, la quale abbia meno divisori, che il detto ultimo termine, lo che è ben evidente, mentre l'ultimo termine della trasformata non è altro, che l'aggregato de' termini della equazione data, in cui siasi sostituita in luogo dell'incognita x la quantità, di cui si diminuiscono le sue radici. Sia per Esempio l'equazione $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$ da trasformarsi in un'altra, il di cui ultimo termine abbia meno divisori, che il 24. Poichè con sostituirsi 1 in luogo di x , l'aggregato de' termini di questa equazione diventa 12, il quale ha meno divisori, che il 24, però si faccia $x - 1 = y$, quindi $x = y + 1$, poscia si facciano le sostituzioni al solito, e si avrà la trasformata cercata.

531. Colle due dette trasformazioni si potrà togliere qual termine più piaccia da un'equazione; siccome pure si potrà rendere uguale ad una quantità qualunque p il coefficiente di qualsivoglia termine, bastando aumentare, o diminuire (secondo che quel tale coefficiente è positivo, o negativo) di una quantità indeterminata n le radici dell'equazione proposta, indi dall'equazione trasformata prendere il coefficiente di quel tal termine, di cui si tratta, e farlo uguale alla data quantità p , poscia con questa equazione determinando il valore dell'assunta indeterminata n , aumentare, o diminuire le radici dell'equazione data di questo valore, e così trovarne la trasformata, nella quale il termine di cui si tratta avrà per coefficiente la quantità p .

532. Ai numeri 522. 527. per ritrovate le due equazioni trasformate abbiamo elevato la quantità $y \pm n$ alle corrispondenti potestà di x , indi fatte le debite sostituzioni nei termini dell'equazione, abbiamo preso l'aggregato, che n'è risultato per la ricercata equazione trasformata. Non è però necessario far prima ad una ad una le dette potenze di $y + n$, lo che riesce molto noioso, massimamente quando l'equa-

quazione proposta è molto alta, ma si può con alcune opportune osservazioni abbreviare, e facilitare di molto il calcolo. A tal fine l'equazione trasformata del num. 527. si disponga così

$$\begin{array}{r} c + bn + an^2 + n^3 \\ + by + 2any + 3n^2y \\ + ay^2 + 3y^3 \\ + y^4 \end{array}$$

poscia si offervi, che la prima linea orizzontale, che è l'ultimo termine della trasformata, non è altro, che l'equazione proposta, in cui sia sostituita la quantità n in luogo di x : La seconda linea orizzontale risulta dalla prima con moltiplicarne ciascun termine per y , e per l'esponente di n , indi dividere ciascun termine per n : La terza linea orizzontale risulta dalla seconda con moltiplicare ciascun di lei termine per y , o per una metà dell'esponente di n , poscia dividere ciascun termine per n : La quarta linea orizzontale nasce dalla terza con moltiplicare ciascun di lei termine per y , e per un terzo dell'esponente di n , indi dividere ciascun termine per n . Se le linee orizzontali fossero itate di più, farebbe stato d'uopo per avere la quinta linea orizzontale moltiplicare ciascun termine della quarta per y , e per un quarto dell'esponente di n , poscia dividere ciascun termine per n ec., e in questo modo si ha la ricercata equazion trasformata. Prendo per Esempio l'equazione $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx^2 + dx + ex + b = 0$, la quale devesi trasformare in un'altra, le di cui radici siano $x = n$, onde assunta l'incognita y , sarà $x = y + n$. Per trovare la trasformata, comincio a scrivere l'equazione data sostituendo n in luogo di x poscia sotto a ciascun termine di questa linea orizzontale, come pure di tutte le altre scrivo le convenienti quantità, poco fa determinate, con cui devesi moltiplicare ciascun termine per avere la seguente linea, come segue.

$$\begin{array}{r}
 +b + cn + dn^2 + cn^3 + bn^4 + an^5 + n^6 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 +cy + 2d\frac{1}{2}y + 3cn^2y + 4bn^3y + 5an^4y + 6n^5y \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 0 \quad \frac{1}{2}y \quad \frac{1}{2}y \quad \frac{3}{2}y \quad \frac{4}{2}y \quad \frac{5}{2}y \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 dy^2 + 3cn^2y^2 + 6bn^3y^2 + 10an^4y^2 + 15n^5y^2 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 0 \quad \frac{1}{3}y \quad \frac{2}{3}y \quad \frac{3}{3}y \quad \frac{4}{3}y \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 +cy^3 + 4bn^2y^3 + 10an^3y^3 + 20n^4y^3 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 0 \quad \frac{1}{4}y \quad \frac{2}{4}y \quad \frac{3}{4}y \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 +by^4 + 5an^4y^4 + 15n^5y^4 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 0 \quad \frac{1}{5}y \quad \frac{2}{5}y \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 +ay^5 + 6n^5y^5 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 0 \quad \frac{1}{6}y \\
 \hline
 y^6
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

e però la ricercata equazione trasformata è $y^6 + \overline{a+6n}Xy^5 + \overline{b+5an+15n^2}Xy^4 + \overline{c+4bn+10an^2+20n^3}Xy^3 + \overline{d+3cn+6bn^2+10an^3+15n^4}Xy^2 +$

$\overline{e+2dn+3cn^2+4bn^3+5an^4+6n^5}Xy + \overline{f+b+cn+dn^2+cn^3+bn^4+an^5+n^6} = 0$.

533. Se fosse stata $x = y - n$, in tal caso nella trasformata farebbero negativi tutti que' termini, in cui n ha esponente impari, come per se stesso è evidente.

534. Prob. 3. Data l'equazione $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, si debba essa trasformare in un'altra le di cui radici siano le radici della proposta moltiplicate per m .

535. Rifol. Poichè le radici della trasformata devono essere mx , si prenda una nuova incognita y , e si faccia $mx = y$, e però $x = \frac{y}{m}$, indi nell'equazione data si sostituisca in luogo dell'incognita x , e delle sue potenze, questo suo valore $\frac{y}{m}$, e le di lui corrispondenti potenze, mediante che l'equazione trasformata sarà

$\frac{y^4}{m^4} + \frac{ay^3}{m^3} + \frac{by^2}{m^2} + \frac{cy}{m} + d = 0$, o sia (moltiplicando ciascun termine per m^4) $y^4 + amy^3 + bm^2y^2 + cm^3y + dm^4 = 0$,

536. Si vede pertanto, che per avere l'equazione trasformata, le di cui radici siano le radici della proposta moltiplicate nella quantità m , basterà sostituire nell'equazione data la nuova incognita y in luogo dell'incognita x , indi moltiplicare per m^4 .

ordine i di lei termini per i termini di una progressione geometrica principiante dall'unità, e il di cui secondo termine sia la quantità m : Così rispetto all'equazione $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, dopo essersi sostituita la y in vece di x , si moltiplicheranno i di lei termini per la progressione geometrica $1, m, m^2, m^3, m^4$, come segue

$$\frac{y^4}{1} + \frac{ay^3}{m} + \frac{by^2}{m^2} + \frac{cy}{m^3} + \frac{d}{m^4} = 0$$

Equazione trasformata. $y^4 + amy^3 + bm^2y^2 + cm^3y + dm^4 = 0$

537. Che se nell'equazione data la massima potestà dell'incognita avrà qualche quantità, come m , per coefficiente, mediante la sostituzione di $\frac{y}{m}$ in luogo di x , si avrà l'equazione trasformata, in cui la massima potestà dell'incognita non avrà, che l'unità per coefficiente, o pure basterà sostituire nell'equazione proposta la nuova incognita y in luogo di x , indi moltiplicare i di lei termini, cominciando dal secondo, per una progressione geometrica, il di cui primo termine sia l'unità, e il secondo sia la quantità m .

538. Qualora l'equazione data avesse frazioni, si otterrà l'equazione trasformata immune dalle frazioni con sostituire nell'equazione proposta in luogo di x una nuova incognita y divisa pel prodotto de' denominatori delle frazioni dell'equazione data, o pure divisa per un numero, che esattamente misuri ciascun denominatore: Che se questi denominatori non avranno un comun divisore, ma abbiano una simile parte aliquota, in tal caso basterà dividere la y per il prodotto di quelle parti aliquote, indi fare le debite sostituzioni. Il metodo ha luogo, o le frazioni siano razionali, o irrazionali.

539. Se si vorrà, che la massima radice dell'equazione proposta sia la minima della trasformata, e così pure le altre si reciprocino, bisognerà supporre $x = \frac{1}{y}$. Se poi le radici dell'equazione trasformata dovranno essere uguali ad una quantità data m divisa per le radici dell'equazione proposta, bisognerà supporre $x = \frac{m}{y}$. Finalmente se si vorrà, che le radici dell'equazione trasformata siano alle radici della proposta in una data ragione di $m:n$, cioè sia $y:x::m:n$, bisognerà supporre $x = \frac{yn}{m}$.

540. Mediante questa trasformazione si può ancora liberare dai radicali una data equazione, ma siccome questo metodo non vale, che in certi casi, però sarà meglio ricorrere al metodo esposto al num. 408, che è generale.

541. Prob. 4. Data l'equazione $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, si debba essa trasformare in un'altra, le di cui radici siano le radici dell'equazione proposta divise per la quantità m .

542. Rifol. Le radici dell'equazione trasformata dovendo essere $\frac{x}{m}$, si prenda

la

la nuova incognita y , e si faccia $\frac{x}{m} = y$, e però $x = my$, indi nell'equazione proposta si sostituisca in luogo di x questo suo valore, mediante la quale sostituzione si avrà la ricercata equazione trasformata, che è $m^2y^4 + am^2y^3 + bm^2y^2 + cmy + d = 0$, o sia (per liberare dal coefficiente m^2 la massima potenza dell'incognita)

$$y^4 + \frac{ay^3}{m} + \frac{by^2}{m^2} + \frac{cy}{m^3} + \frac{d}{m^4} = 0.$$

543. Quindi per trasformare una data equazione in un'altra, le di cui radici siano le radici della proposta divise per una qualunque quantità m , basterà sostituire nell'equazione data una nuova incognita y in luogo di x , indi dividere per ordine i di lei termini per i termini di una progressione geometrica principiante dall'unità, e il di cui secondo termine sia la quantità m .

544. Si potrà pertanto, data un'equazione, trovarne un'altra, i di cui coefficienti siano minori dei coefficienti della proposta, con trasformarla cioè in modo, che le radici della trasformata siano le di lei radici divise per una qualunque quantità.

545. Parimente si può trasformare una data equazione in maniera, che le radici della trasformata siano i quozienti, che nascono dal dividersi una quantità qualunque per le radici dell'equazione proposta.

546. Qui poi si osservi, che se le proposte equazioni da trasformarsi avranno radici immaginarie, lo stesso numero di radici immaginarie avranno pure le trasformate, lo che è per se stesso evidente.

ARTICOLO IV.

Delle equazioni, che contengono radici uguali, e del modo di ritrovarle.

547. **L**E equazioni, che contengono radici uguali risultano da due fattori: Il primo è della forma $\overline{x \pm A^n}$, in cui A disegna ciascuna delle radici uguali, ed n esprime il loro numero, e però $\overline{x \pm A^n}$ è il prodotto de' fattori semplici $x \pm A$: Il secondo poi è il prodotto delle radici ineguali, la di cui forma è $x^{n-1} + px^{n-2} + qx^{n-3} + rx^{n-4} + \dots + Q = 0$.

548. Lemma. Se si moltiplicheranno i termini di un binomio $x + A$ elevato a una qualunque potenza n per i termini della progressione aritmetica 0, 1, 2, 3, 4, 5 ec., il prodotto sarà lo stesso binomio $x + A$ elevato alla potenza $n-1$, e moltiplicato per nA .

549. Per assicurarsi della verità di questo Lemma, basta osservare ciò, che nasce dal moltiplicarsi i termini della potenza n del binomio $x + A$ nei termini della progressione 0, 1, 2, 3 ec. Eccone il Calcolo

$$\begin{array}{r} \overline{x+A^n} = x^n + nx^{n-1}A + \frac{n \times (n-1)}{1 \times 2} x^{n-2} A^2 + \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{1 \times 2 \times 3} x^{n-3} A^3 + \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)}{1 \times 2 \times 3 \times 4} x^{n-4} A^4 \text{ ec.} \\ \text{Progref.} \quad \quad \quad 0 \quad \quad 1 \quad \quad 2 \quad \quad 3 \quad \quad 4 \\ \hline \text{Prodotto} \quad nx^{n-1}A + n \times (n-1) x^{n-2} A^2 + \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{1 \times 2} x^{n-3} A^3 + \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)}{1 \times 2 \times 3} x^{n-4} A^4 \text{ ec.} \end{array}$$

Ora questa equazione è uguale alla seguente

$$nA \overline{x^{n-1} + (n-1) x^{n-2} A + \frac{n-1}{1} \frac{x^{n-2}}{2} x^{n-3} A^2 + \frac{n-1}{1} \frac{x^{n-2}}{2} \frac{x^{n-3}}{3} x^{n-4} A^3 \text{ ec.}}$$

la quale è uguale ad $nA \overline{x^{n-1} + A^{n-1}}$. Lo che dovevasi dimostrare.

550. Poichè la progressione 0, m , $2m$, $3m$, $4m$ ec. è uguale ad $m \overline{0, 1, 2, 3}$ ec., chiaramente si vede, che se si fossero moltiplicati i termini della potenza n del proposto binomio per i termini della progressione 0, m , $2m$, $3m$, $4m$ ec., il prodotto farebbe stato $mnA \overline{x^{n-1} + A^{n-1}}$.

551. Cae se si fossero moltiplicati per la progressione p , $p+m$, $p+2m$, $p+3m$ ec., il prodotto farebbe stato $px + pA + mnA \overline{x^{n-1} + A^{n-1}}$, poichè moltiplicare $\overline{x+A^n}$ per la progressione p , $p+m$, $p+2m$ ec., egli è lo stesso, che moltiplicarlo; prima per p , lo che dà $p \overline{x+A^n}$, o sia $p \overline{x+A} \overline{x^{n-1} + A^{n-1}}$, poscia moltiplicarlo per la progressione 0, m , $2m$ ec., lo che (pel num. 550.) dà $mnA \overline{x^{n-1} + A^{n-1}}$ quindi il prodotto di $\overline{x+A^n}$ nella progressione p , $p+m$, $p+2m$ ec. è

$$px + pA + mnA \overline{x^{n-1} + A^{n-1}}.$$

552. Teor. Se coi termini di una progressione aritmetica si moltiplicheranno ordinatamente i termini di una equazione, che abbia radici uguali, il prodotto farà un'equazione, che a riserva d'una avrà tutte le medesime radici uguali.

553. Dim. L'equazione, che ha radici uguali sia la seguente (giusta il num. 547.)

$$\overline{x \pm A^n} \overline{x^{n-1} + px^{n-2} + qx^{n-3} + rx^{n-4} \text{ ec.}} = 0, \text{ o sia sviluppano la potenza } \overline{x+A^n}, \text{ l'equazione farà}$$

$$\begin{aligned}
& n^m + n n^{m-1} A + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 2} \times x^{m-2} A^2 + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 3} \times x^{m-3} A^3 \text{ ec.} = x^{m-n} \times \overline{x+A}^n \\
& + p x^{m-1} + n p x^{m-2} A + \frac{n \times \overline{n-1}}{2} \times x^{m-3} A^2 \text{ ec.} = p x^{m-n-1} \times \overline{x+A}^n \\
& + q x^{m-2} + n q x^{m-3} A \text{ ec.} = q x^{m-n-2} \times \overline{x+A}^n \\
& + r x^{m-3} \text{ ec.} = r x^{m-n-3} \times \overline{x+A}^n
\end{aligned}$$

di cui moltiplicandosi per ordine i termini per i termini della progressione aritmetica $n, n+m, n+2m, n+3m$ ec., ciascuna linea verrà moltiplicata per una progressione aritmetica, la prima per l'intera progressione $n, n+m, n+2m$ ec., la seconda per $n+m, n+2m, n+3m$ ec., la terza per $n+2m, n+3m, n+4m$ ec.: Ora in ciascuna linea v' è la potenza $\overline{x+A}^n$, dunque (pel num. 548.) il prodotto di ciascuna linea per una progressione aritmetica farà la potenza $\overline{x+A}^{n-1}$ ne' fattori $x^{m-n}, p x^{m-n-1}, q x^{m-n-2}$ ec., i quali nulla alterano, conseguentemente tutta l'equazione moltiplicata per la progressione aritmetica farà

$$\overline{x+A}^{n-1} \times x^{m-n} + p x^{m-n-1} + q x^{m-n-2} + r x^{m-n-3} \text{ ec.} = 0. \text{ Lo che si doveva dimostrare.}$$

554. Prob. Data una equazione, che abbia radici uguali, si debba ritrovare il loro valore.

555. Risol. La data equazione si moltiplichi per una progressione aritmetica, quale per Esempio è quella, che viene formata dagli esponenti dell'incognita, indi di questa, e dell'equazione data si trovi il massimo comun divisore, (pel num. 216.) dal quale si estrarra la radice indicata dal massimo di lui esponente, e ciò, che ne verrà, darà il valore delle radici uguali cercate.

556. Dim. Pel num. 547. l'equazione proposta ha per fattore $\overline{x+A}^n$, e pel num. 548. l'equazione provenuta dalla moltiplicazione nella progressione aritmetica ha per fattore $\overline{x+A}^{n-1}$, dunque questo fattore $\overline{x+A}^{n-1}$ è comune a tutte due le equazioni, e però egli è il loro massimo comun divisore: Ma $\overline{x+A}^{n-1}$ è una potenza perfetta, la di cui radice $n-1$ esima è $\overline{x+A}$; quindi farà A il ricercato valore delle radici uguali. Lo che si doveva dimostrare.

557. Debbanfi per Esempio ritrovare le radici uguali, che ha questa equazione $x^6 + 5x^5 - 20x^4 - 150x^3 - 135x^2 + 513x + 810 = 0$. La moltiplico per la progressione aritmetica 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, che mi viene somministrata dagli esponenti dell'incognita, con che ho $6x^7 + 25x^6 - 80x^5 - 450x^4 - 270x^3 + 513x^2 = 0$, come segue

$$\begin{array}{rcccccccc}
 x^6 + 5x^5 - 20x^4 - 150x^3 - 135x^2 + 513x + 810 & \Rightarrow & & & & & & \\
 \hline
 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & \\
 \hline
 6x^5 + 25x^4 - 80x^3 - 450x^2 - 270x + 513 & \Rightarrow & & & & & &
 \end{array}$$

Ora di questa equazione, e dell'equazione data cerco il massimo comun divisore, che trovo essere $x^3 + 3x^2 + 27x + 27 = 0$, dal quale estraendo la radice cuba mi viene $x + 3 = 0$, e però $x = -3$, dunque -3 è il valore delle radici uguali, che ha l'equazione proposta: E perchè (pel num. 548.) l'equazione provenuta dalla moltiplicazione nella progressione aritmetica contiene le stesse radici uguali una meno, che l'equazione data, però oltre le radici uguali, che contiene il massimo comun divisore, ne resta ancor una, onde il numero delle cercate radici uguali è $3 + 1 = 4$. Adunque l'equazione proposta ha quattro radici uguali, ognuna delle quali è $= -3$.

A R T I C O L O V.

Modo di ritrovare le formole generali per la eliminazione di una, di due ec. incognite per mezzo di due, di tre ec. equazioni di qualsivoglia grado a due, a tre ec. incognite.

558. **C**olle lettere A, B, C, D... V si disegni qualunque funzione di una delle due incognite, per Esempio y (per funzione di una incognita si intende un complesso di termini, risultanti da quantità cognita, e da quella incognita) nella prima equazione, e colle lettere A', B', C', D'... V' si disegni qualunque funzione della stessa incognita nella seconda equazione: Per lo che la prima equazione sarà $Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + V = 0$, e la seconda $A'x^n + B'x^{n-1} + C'x^{n-2} + \dots + V' = 0$; che però se la prima delle proposte equazioni fosse $4x^3y^2 - abxy^2 + cdey^3 - exy + 3bx^2y^2 - 2x^4y^2 = 0$, farà $n=5$, $A=-cy$, $B=-2y^3$, $C=4y^2$, $D=3by^4$, $E=-aby^5$, $V=cdey^3$.

559. Mediante le assunte due equazioni ecumeniche si eliminerà l'incognita n con trovare in primo luogo tante equazioni del grado $n-1$, quante ne mostra l'esponente n , poscia considerando in queste equazioni come altrettante incognite le diverse potenze di x , eliminare col metodo esposto all'Articolo I. del Capo II. tutte queste potenze di x , con che si avrà finalmente una equazione, nella quale si troveranno le sole funzioni di y , e così resterà eliminata l'incognita x . Il motivo poi, per cui devonfi ritrovare primieramente tante equazioni, quante ne disegna l'esponente n si è, perchè il numero delle potenze di x da eliminarsi è $n-1$, e per eliminare un numero $n-1$ di quantità, vi vuole un numero n di equazioni.

560. Il modo poi di ritrovare per mezzo delle due proposte equazioni un numero n di equazioni del grado $n-1$ si è di moltiplicare primieramente la prima equazione per A', e dal prodotto sottrarne la seconda moltiplicata in A, con che si avrà la prima equazione del grado $n-1$. In secondo luogo si dovrà moltiplicare la prima equazione per A' x +B', e dal prodotto sottrarne la seconda moltiplicata in Ax+B, onde averne la seconda equazione del grado $n-1$. In terzo luogo bisognerà moltiplicare la prima equazione per A' x^2 +B' x +C', e dal prodotto sottrarne la seconda moltiplicata in Ax²+Bx+C, mentre il residuo darà la terza equazione del grado $n-1$.

$n-1$. Che se collo stesso ordine si continueranno le moltiplicazioni per un polinomio di un grado successivamente più alto, si avranno tutte le altre equazioni di grado $n-1$, il di cui numero sarà uguale all'esponente n .

561. Le dette moltiplicazioni sono ordinate e a rendere identici i termini Ax^n , $A'x^n$, onde mediante la sottrazione possano sparire; e a dare diversa espressione alle varie equazioni del grado $n-1$, che si trovano.

562. Applichiamo al caso particolare la dottrina esposta, e veniamo all'invenzione delle formole generali per la eliminazione dell'incognita x mediante due equazioni di secondo grado. Le equazioni siano le seguenti.

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad Ax^2 + Bx + C = 0 \\ \text{II} \quad A'x^2 + B'x + C' = 0 \end{array}$$

Poichè queste equazioni sono di secondo grado, e però nel caso presente si ha $n=2$, si dovranno trovare due equazioni di grado $n-1=1$, cioè di primo grado. A tale oggetto si moltiplichino la prima equazione per A' , e dal prodotto si sottragga la seconda moltiplicata in A , come segue

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equazione molt. in } A' & A'Ax^2 + A'Bx + A'C = 0 \\ \text{Seconda multipl. in } A & A'Ax^2 + ABx + AC = 0 \\ \hline \text{Residuo} & AB - A'B \quad x + A'C - AC = 0 \end{array}$$

che è la prima equazione di grado $2-1=1$. Di nuovo si moltiplichino la prima equazione per $A'x+B'$, e dal prodotto si sottragga la seconda moltiplicata in $Ax+B$, come segue

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equaz. molt. in } A'x+B' & A'Ax^2 + ABx + A'B'x + A'C + B'B'x + B'C = 0 \\ \text{Seconda multipl. in } Ax+B & A'Ax^2 + ABx + A'B'x + AC + BB'x + BC = 0 \\ \hline \text{Residuo} & AC - AC' \quad x + B'C - BC = 0 \end{array}$$

che è la seconda equazione di grado $2-1=1$.

563. Ora per eliminare l'incognita x mediante le due ritrovate equazioni di primo grado, moltiplico la prima per la indeterminata m , e dal prodotto sottraggo la seconda così

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equaz. multipl. per } m & ABm - A'Bm \quad x + m \quad AC - AC' = 0 \\ \text{Seconda equazione} & AC - AC' \quad x + B'C - BC = 0 \\ \hline \text{Residuo (r)} & ABm - A'Bm - AC + AC' \quad x + m \quad AC - AC' - B'C + BC = 0 \end{array}$$

In questa equazione faccio uguale a zero il coefficiente di x , con che ho $ABm - A'Bm - AC + AC' = 0$, da cui si ricava il valore dell'indeterminata m , che è

$$m =$$

$m = \frac{A'C - AC}{AB - AB'}$. Se questo ritrovato valore dell'indeterminata m si sostituirà nell'ultimo termine dell'equazione (Γ), si avrà $\frac{A'C - AC}{AB - AB'} \times \overline{A'C - AC - BC + BC} = 0$,

cioè a dire $\overline{A'C - AC - BC + BC} \times \overline{A'B - AB'} = 0$ che è la formola generale per la eliminazione della incognita x mediante due equazioni del secondo grado.

564. Che se si avesse voluto eliminare la incognita y , le equazioni generali da assumersi sarebbero state $Ay' + By + C = 0$; $A'y' + B'y + C' = 0$, dalle quali ugualmente ne sarebbe venuta la formola generale trovata: Ma qui si osservi, che queste due formole sono uguali soltanto in apparenza, in quanto che si è supposto, che le stesse lettere A, B, C ; A', B', C' rappresentino tanto le funzioni dell'incognita y , come dell'incognita x .

565. Quanto alle equazioni di terzo grado siano esse le due generali seguenti.

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0 \\ \text{II} \quad A'x^3 + B'x^2 + C'x + D' = 0 \end{array}$$

dalle quali devonfi ricavare tante equazioni di grado $3-1=2$. quante ne esprime l'esponente 3: Che però per avere la prima multiplico l'equazione I per A' , e dal prodotto sottraggo l'equazione II moltiplicata in A come segue

$$\begin{array}{l} \text{Equaz. I multipl. in } A' \quad A'Ax^3 + A'Bx^2 + A'Cx + A'D = 0 \\ \text{Equaz. II multipl. in } A \quad A'Ax^3 + ABx^2 + ACx + AD = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\Delta) \quad \overline{A'B - AB'} \times x^2 + \overline{A'C - AC} \times x + \overline{A'D - AD} = 0$$

che è la prima equazione di grado $3-1=2$. Per avere la seconda multiplico l'equazione I per $Ax+B$, e dal prodotto sottraggo l'equazione II moltiplicata in $Ax+B$, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Equaz. I multipl. in } Ax+B' \\ A'Ax^4 + \overline{AB + AB'} \times x^3 + \overline{A'C + BB'} \times x^2 + \overline{A'D + BC} \times x + BD = 0 \\ \text{Equaz. II multipl. in } Ax+B \end{array}$$

$$\overline{A'Ax^4 + \overline{AB + AB'} \times x^3 + \overline{A'C + BB'} \times x^2 + \overline{A'D + BC} \times x + BD} = 0$$

$$\text{Residuo } (\Theta) \quad \overline{A'C - AC} \times x^2 + \overline{A'D + BC - AD - BC} \times x + \overline{BD - BD} = 0$$

che è la seconda equazione di grado $3-1=2$. Finalmente per avere la terza equazione di grado $3-1=2$, multiplico l'equazione I per Ax^2+Bx+C , e dal prodotto sottraggo l'equazione II moltiplicata in Ax^2+Bx+C , come segue

Equaz.

Equaz. I multipl. in $Ax^3 + Bx + C$

$$\overline{A \cdot Ax^3 + A \cdot B + AB' \cdot x^3 + AC + BB' + AC' \cdot x^3 + AD + BC + BC' \cdot x^3 + BD + CC' \cdot x + CD = 0}$$

Equaz. II multipl. in $Ax^3 + Bx + C$

$$\overline{A \cdot Ax^3 + A \cdot B + AB' \cdot x^3 + AC + BB' + AC' \cdot x^3 + AD + BC + BC' \cdot x^3 + BD + CC' \cdot x + CD = 0}$$

$$\text{Residuo (A)} \quad \overline{AD - AD' \cdot x^3 + BD - BD' \cdot x + CD - CD' = 0}$$

che è la terza, e ultima equazione di grado $3-1=2$. Ora per mezzo di queste tre equazioni Δ , Θ , A si elimineranno le potenze x^3 , x , che devonfi considerare come due differenti incognite. Per ottenere ciò moltiplico la prima di queste tre equazioni colla indeterminata p , e la seconda colla indeterminata q , indi dalla loro somma sottraggo la terza, come segue

$$\text{Equaz. (A) multipl. in } p \quad p \cdot \overline{AB - AB' \cdot x^3 + p \cdot \overline{AC - AC' \cdot x + ADp - AD'p = 0}}$$

$$\text{Equaz. (B) multipl. in } q \quad q \cdot \overline{AC - AC' \cdot x^3 + q \cdot \overline{AD + BC - AD' - BC' \cdot x + BDq - BD'q = 0}}$$

$$\text{Somma} \quad p \cdot \overline{AB - AB' + q \cdot \overline{AC - AC' \cdot x^3 + p \cdot \overline{AC - AC' + q \cdot \overline{AD + BC - AD' - BC' \cdot x + ADp - AD'p + BDq - BD'q = 0}}$$

$$\text{Equaz. (A)} \quad \overline{AD - AD' \cdot x^3 + BD - BD' \cdot x + CD - CD' = 0}$$

$$\begin{aligned} \text{Residuo (B)} \quad & p \cdot \overline{AB - AB' + q \cdot \overline{AC - AC' + AD - AD' \cdot x^3}} \\ & + p \cdot \overline{AC - AC' + q \cdot \overline{AD + BC - AD' - BC' - BD + BD' \cdot x}} \\ & + ADp - AD'p + BDq - BD'q + CD - CD' = 0 \end{aligned}$$

Ora per eliminare le due potenze x^3 , x devonfi fare uguali a zero i loro coefficienti, così $p \cdot \overline{AB - AB' + q \cdot \overline{AC - AC' - AD + AD' = 0}}$, $p \cdot \overline{AC - AC' + q \cdot \overline{AD + BC - AD' - BC' - BD + BD' = 0}}$. Per avere mediante queste due equazioni i valori delle due indeterminate p , q , moltiplico la prima colla indeterminata r , e dal prodotto sottraggo la seconda come segue

$$\text{Equaz. multipl. in } r \quad r \cdot \overline{p \cdot \overline{AB - AB' + r \cdot \overline{q \cdot \overline{AC - AC' + r \cdot \overline{AD - AD' = 0}}}}$$

$$\text{seconda Equaz.} \quad \overline{r \cdot \overline{AC - AC' + q \cdot \overline{AD - AD' + BC - BC' + BD - BD' = 0}}}$$

$$\text{Residuo (II)} \quad \overline{r \cdot \overline{p \cdot \overline{AB - AB' + AC - AC' \cdot x + r \cdot \overline{AC - AC' + AD - AD' + BC - BC' \cdot x + r \cdot \overline{AD - AD' + BD - BD' = 0}}}}$$

in cui faccio primieramente uguale a zero il coefficiente di p , così $r \times \overline{AB-AB' + AC-AC'}$, onde si ha il valore di r , che è

$r = \frac{AC-AC'}{AB-AB'}$, il qual valore sostituito negli ultimi due termini dell' equazione (11)

da $\frac{AC-AC'}{AB-AB'} \times AC-AC' + AD-A'D + BC-BC' \times q + \frac{AC-AC'}{AB-AB'} \times AD-AD' + BD-BD' = 0$, mediante la quale equazione si ha il valore di q , che è $q =$

$\frac{AC-AC' \times AD-AD' + AB-AB' \times BD-BD'}{AC-AC' \times AD-AD' + AB-AB' \times AD-A'D + BC-BC'}$. Parimente per determinare il valore

di p faccio uguale a zero il coefficiente di q , così $r \times \overline{AC-AC' + AD-A'D + BC-BC'}$, onde si ha il valore di r , che è $r = \frac{AD-A'D + BC-BC'}{AC-AC'}$, il qual

valore sostituito nel primo, e nell' ultimo termine dell' equazione (11) dà

$\frac{AD-A'D + BC-BC'}{AC-AC'} \times \overline{AB-AB' + AC-AC'} \times p + \frac{AD-A'D + BC-BC'}{AC-AC'} \times \overline{AD-AD' + BD-BD'} = 0$, con che si ha il valore di p , che è $p =$

$\frac{AD-A'D + BC-BC' \times \overline{AD-AD' + AC-AC'} \times \overline{BD-BD'}}{AD-A'D + BC-BC' \times \overline{AB-AB' + AC-AC'} \times \overline{AC-AC'}}$. Si sostituiscano ora questi ritrovati valori di p, q nell' ultimo membro dell' equazione (11), e si avrà

$$\overline{AD-AD'} \times \frac{\overline{-AD+AD'-BC+BC} \times \overline{AD-AD' + AC-AC'} \times \overline{-BD+BD}}{\overline{-AD+AD'-BC+BC} \times \overline{AB-AB' + AC-AC'} \times \overline{-AC+AC}} +$$

$$\overline{BD-BD'} \times \frac{\overline{AC-AC' \times AD-AD' + AB-AB' \times BD-BD'}}{\overline{AC-AC' \times AD-AD' + AB-AB' \times AD-A'D + BC-BC'}} + \overline{CD-CD} = 0$$

e però togliendo i denominatori si avrà

$$\overline{AD-A'D + BC-BC'} \times \overline{AD-AD'} + \overline{AD-AD'} \times \overline{AC-AC'} \times \overline{BD-BD'} +$$

$$\overline{BD-BD'} \times \overline{AC-AC'} \times \overline{AD-AD'} + \overline{BD-BD'} \times \overline{AB-AB'} \times \overline{BD-BD'} +$$

$$\overline{CD-CD} \times \overline{AC-AC'} + \overline{CD-CD} \times \overline{AB-AB'} \times \overline{AD-A'D + BC-BC'} = 0,$$

che è la formola generale, con cui date due equazioni di terzo grado a due incognite, se ne elimina una.

566. Date pertanto due equazioni dello stesso grado, qualunque egli sia, collo esposto metodo operando si giungerà all' equazione ecumenica interveniente alla eliminazione di una delle loro incognite.

567. Che se le equazioni contenenti due incognite, delle quali una deve esser eliminata, non saranno dello stesso grado, come se una fosse $Vx^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} +$

+

$+Cx^{m-1} + \dots + Q=0$, e l'altra $Vx^n + A'x^{n-1} + B'x^{n-2} + C'x^{n-3} + \dots + Q'=0$, in cui $m > n$, si trovino primieramente tante equazioni di grado $m-1$, quante ne indica il numero n esponente massimo dell'equazione inferiore, lo che si otterrà con moltiplicare la prima equazione per V , e la seconda per Vx^{n-m} , indi dalla prima sottrar la seconda, il di cui residuo farà la prima equazione di grado $m-1$: Pofcia devesi moltiplicare la prima per $Vx+A'$, e dal prodotto sottrarne la seconda moltiplicata in $Vx^{n-m+1} + Ax^{n-m}$, ed il residuo farà la seconda equazione di grado $m-1$: Iteffamente continuando le moltiplicazioni per un polinomio sempre più alto, e facendo la sottrazione della seconda equazione dalla prima, si avranno le altre cercate equazioni di grado $m-1$, il di cui numero deve essere uguale al numero n . Mediante poi l'equazione di grado n , e la replicata di lei moltiplicazione per x , si trovino i valori delle fucceffive potestà di x cominciando da x^n fino ad x^m ; delle quali potestà si prendano per ordine i valori, e si fustituiscano in ciascuna delle ritrovate equazioni di grado $m-1$, con che si avrà un numero n di equazioni di grado $m-1$. Finalmente per mezzo di queste equazioni di grado $m-1$, in cui devonfi confiderare le diverfe potestà di x come altrettante differenti incognite di primo grado, si giungerà col metodo efposto all' Articolo I. del Capo II. alla formula generale, in cui non si ritroverà, che una fola incognita.

568. Ma veniamone all'attuale invenzione, e coll' Efempio rendiamo più palpabile l'efpofita dottrina. E primieramente fi avverta, che in due equazioni, una del primo grado, e l'altra del grado m , non cade il metodo; poichè bafia prendere il valore di x dalla propofita equazione di primo grado, indi formarne le corrispondenti potenze a quelle, che fono nell'altra equazione, e pofcia farne le fustituzioni, che così fi avrà l'equazione fenza x . Date fiano pertanto due equazioni; una del fecondo, e l'altra del terzo grado efpreffe generalmente così $Ax^2 + Bx + D=0$, $A'x^3 + B'x + C=0$. Si moltiplichì la prima in A' , e dal prodotto fi sottragga la feconda moltiplicata in $Ax^{3-2}=Ax$, come fegue

Prima equaz. multipl. in A'	$A'Ax^2 + A'Bx + A'Cx + AD=0$
Seconda multipl. in Ax	$A'Ax^3 + ABx^2 + ACx = 0$

Refiduo (Σ)	$AB - AB'x + AC - AC'x + AD=0$
----------------------	--------------------------------

che è la prima equazione di grado $3-1=2$. Di nuovo fi moltiplichì la prima equazione per $Ax+B$, e dal prodotto fi sottragga la feconda moltiplicata in $Ax^{3-2}+Bx^{3-2}$, cioè per Ax^2+Bx , come fegue

Pr.equ.molt. in $Ax+B$	$A'Ax^3 + A'Bx^2 + AB'x + AC + BB'x + AD + B'Cx + B'D=0$
Sec.molt. in Ax^2+Bx	$A'Ax^3 + ABx^2 + AB'x + AC + BB'x + BCx = 0$

Refiduo (Φ)	$AC - AC'x + AD + B'C - BC'x + B'D=0$
--------------------	---------------------------------------

che è l'altra equazione di grado $3-1=2$. Effendofi pertanto ritrovate due equazioni di grado $3-1$ corrispondentemente all'esponente 2 dell'equazione minore, fi prenda dalla fteffa feconda equazione il valore di x^2 , che è $x^2 = -\frac{Bx+C}{A}$, il quale

Tom. II.

Y

fi

si sostituisca nell'una, e nell'altra delle due ritrovate equazioni di grado $3-1$, dalla quale sostituzione si avranno due equazioni, in cui l'incognita x non monterà, che al primo grado, come segue

$$I \quad -\frac{Bx-C}{A} \times \overline{AB-AB'} + \overline{AC-AC'} \times x + AD = 0$$

$$II \quad -\frac{Bx-C}{A} \times \overline{AC-AC'} + \overline{AD+BC-BC'} \times x + BD = 0$$

dalla prima si ha $\overline{A'AC-AA'C-AB'B+AB'B'} \times x + \overline{A'AD+AB'C-A'BC} = 0$

dalla seconda si ha $\overline{A'AD-A'BC+ABC'} \times x + \overline{A'BD-A'CC+ACC'} = 0$

Ora per eliminare la x si moltiplichino la prima di queste due equazioni per la indeterminata p , e dal prodotto si sottragga la seconda, come segue

$$\text{Pr. eq. moltip. in } p \quad p \times \overline{A'AC-AA'C-AB'B+AB'B'} \times x + p \times \overline{A'AD+AB'C-A'BC} = 0$$

$$\text{Seconda equaz.} \quad \overline{A'AD-A'BC+ABC'} \times x + \overline{A'BD-A'CC+ACC'} = 0$$

$$\text{Residuo } (\Psi) \quad p \times \overline{A'AC-AA'C-AB'B+AB'B'} - \overline{A'AD+AB'C-A'BC} \times x \\ + p \times \overline{A'AD+ABC-A'BC-A'BD+A'CC-ACC'} = 0$$

in cui facendo uguale a zero il coefficiente di x , si avrà

$p \times \overline{A'AC-AA'C-AB'B+AB'B'} - \overline{A'AD+AB'C-A'BC} = 0$, da cui si ricava il valore di p , che è $p = \frac{\overline{A'AD-A'BC+ABC'}}{\overline{A'AC-AA'C-AB'B+AB'B'}}$, il qual valore sostituito nell'ultimo membro dell'equazione (Ψ) darà

$$\frac{\overline{A'AD-A'BC+ABC'}}{\overline{A'AC-AA'C-AB'B+AB'B'}} \times \overline{A'AD+ABC-A'BC-A'BD+A'CC-ACC'} = 0$$

e però $\overline{A'AD-A'BC+ABC'} \times \overline{A'AD+ABC-A'BC+A'AC-AA'C-AB'B+AB'B'} \times \overline{A'CC-A'BD-ACC'} = 0$, cioè $\overline{A'AD-A'BC+ABC'}^2$

$$+ \overline{A'AC-AA'C-AB'B+AB'B'} \times \overline{A'CC-A'BD-ACC'} = 0$$

che è la formola generale cercata per la eliminazione di una incognita mediante due equazioni, una del secondo, e l'altra del terzo grado.

559. Quantunque il già detto mostri abbastanza il metodo da tenersi per ritrovare le altre formole generali per la eliminazione di una incognita mediante due qua-

quali si siano equazioni, pure non estimo superfluo il proporre un altro Esempio per due equazioni d'inequal grado. Si debba pertanto ritrovare la formola generale per la eliminazione di una incognita per mezzo di due equazioni, una del terzo, e l'altra del quinto grado. Siano le equazioni generali $Ax^5+Bx^4+Cx^3+Dx^2+Ex+F=0$, $Ax^3+Bx^2+Cx+D=0$. Si moltiplichino la prima per A , e dal prodotto si sottragga la seconda moltiplicata in $Ax^3-1=Ax^3$, come segue

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equaz. moltip. in } A & A'Ax^5+A'Bx^4+A'Cx^3+A'Dx^2+A'Ex+A'F=0 \\ \text{Seconda moltip. in } Ax^3 & A'Ax^3+A'Bx^2+A'Cx+A'Dx & =0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\Omega) \quad A'B-A'B'Xx^4+A'C-AC'Xx^3+A'D-AD'Xx^2+A'Ex+A'F=0,$$

che è la prima equazione di grado $5-1=4$. Di nuovo si moltiplichino la prima equazione per Ax^2+B e dal prodotto si sottragga la seconda moltiplicata in Ax^3-1+Bx^3 , cioè Ax^3+Bx^3 , come segue

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima eq. moltip. in } Ax^2+B & A'Ax^7+A'Bx^6+A'B'Xx^5+A'C+BB'Xx^4+A'D+CB'Xx^3 \\ & +A'E+DB'Xx^2+AF+BE'Xx+BF=0 \\ \text{Second. moltip. in } Ax^3+Bx^3 & A'Ax^6+A'Bx^5+A'B'Xx^4+AC+BB'Xx^3+AD'+BC'Xx^2 \\ & +BDx'=0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\beta) \quad A'C-AC'Xx^3+A'D+CB-AD'-BC'Xx^2+A'E+BD-BD'Xx+AF+BE'Xx+BF=0$$

che è la seconda equazione di grado $5-1=4$. Finalmente si moltiplichino la prima equazione per Ax^2+Bx+C , e dal prodotto si sottragga la seconda moltiplicata in $Ax^3-1+Bx^3+Cx^3$, cioè $Ax^3+Bx^3+Cx^3$, come segue

$$\begin{array}{rcl} \text{Prima equaz. moltip. in } Ax^2+Bx+C & & \\ A'Ax^7+A'Bx^6+A'B'Xx^5+A'C+BB'Xx^4+A'D+BC+BC'Xx^3+A'E+BD+CC'Xx^2 \\ +AF+BE+CDXx+BF+CE'Xx+CF=0 \\ \text{Seconda moltip. in } Ax^3+Bx^3+Cx^3 & & \\ A'Ax^7+A'Bx^6+A'B'Xx^5+A'C+BB'Xx^4+A'D+BC+BC'Xx^3+A'E+BD+CC'Xx^2 \\ +CDx^2=0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\beta) \quad AD-AD'Xx^4+A'E+BD-BD'Xx^3+A'F+BE+CD-CD'Xx^2+BF+CE'Xx+CF=0$$

che è la terza equazione di grado $5-1=4$.

Si prenda adesso il valore di x^3 dalla seconda proposta equazione, che è

$$x^3 = -\frac{Bx^2-Cx-D'}{A'}$$

Y 2

in

in cui sostituendo il poc' anzi ritrovato valore di x^3 , si avrà

$$B' \chi \frac{-Bx^3 - Cx - D'}{A'} - Cx^3 - D'x$$

$$x^3 = - \frac{\quad}{A'}, \text{ cioè}$$

$$x^3 = \frac{BB'x^3 + BC'x + BD' - A'Cx^3 - A'D'x}{A'A'}, \text{ vale a dire}$$

$$\frac{BB - A'C \chi x^3 + BC - A'D' \chi x + BD'}{A'A'} = x^3. \text{ Che se si sostituiranno questi ritrovati}$$

valori di x^3 , x^4 in ciascuna delle ritrovate equazioni di grado $5-1$, la prima farà

$$AB - AB' \chi \frac{BB - A'C \chi x^3 + BC - A'D' \chi x + BD'}{A'A'} + AC - AC' \chi \frac{-Bx^3 - Cx - D'}{A'}$$

$$+ AD - AD' \chi x^3 + AE + AF = 0, \text{ cioè}$$

$$AB - AB' \chi BB - AC - B' \chi A' \chi AC - AC' + AA' \chi AD - AD' \chi x^3$$

$$+ AB - AB' \chi BC - AD' - C' \chi A' \chi AC - AC' + AA' AE \chi x$$

$$+ AB - AB' \chi BD' - AD' \chi AC - AC' + AA' AF = 0$$

$$\text{La seconda farà } AC - AC' \chi \frac{BB - A'C \chi x^3 + BC - A'D' \chi x + BD'}{A'A'}$$

$$+ AD + CB' - AD' - BC' \chi - \frac{Bx^3 - Cx - D'}{A'} + AE + BD - BD' \chi x^3 + AF + BE \chi x + BF = 0, \text{ cioè}$$

$$AC - AC' \chi BB - A'C - AB' \chi AD + CB - AD' - BC' + AA' \chi AE + BD - BD' \chi x^3$$

$$+ AC - AC' \chi BC - AD' - AC' \chi AD + CB - AD' - BC' + AA' \chi AF + BE \chi x$$

$$+ BD \chi AC - AC' - AD' \chi AD + CB - AD' - BC' + AA' BF = 0$$

$$\text{La terza farà } AD - AD' \chi \frac{BB - A'C \chi x^3 + BC - A'D' \chi x + BD'}{A'A'} + AE + BD - BD' \chi$$

$$- \frac{Bx^3 - Cx - D'}{A'} + AF + BE + CD - CD' \chi x^3 + BF + CE \chi x + CF = 0, \text{ cioè}$$

$$AD - AD' \chi BB - A'C - AB' \chi AE + BD - BD' + AA' \chi AF + BE + CD - CD' \chi x^3$$

$$+ AD - AD' \chi BC - AD' - AC' \chi AE + BD - BD' + AA' \chi BF + CE \chi x$$

$$+ BD \chi AD - AD' - AD' \chi AE + BD - BD' + AA' CF = 0$$

Fatto ciò passiamo all'eliminazione di x , x^2 , e per abbreviare il calcolo supponiamo uguale a P il coefficiente di x^2 , il coefficiente di x uguale a Q , e il membro cognito uguale a R nella prima equazione, onde per la seconda faranno P', Q', R' , per la terza P'', Q'', R'' , mentre poi fatto il calcolo si rimetteranno in luogo di queste lettere i loro valori. La prima equazione pertanto sarà $Px^2 + Qx + R = 0$; la seconda $P'x^2 + Q'x + R' = 0$, la terza $P''x^2 + Q''x + R'' = 0$. Ora per venire alla eliminazione, si moltiplichino la prima di queste equazioni per m , e la seconda per n , e dalla somma di questi due prodotti si sottragga la terza equazione, come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima equaz. multipl. per } m \quad mPx^2 + mQx + mR = 0 \\ \text{Seconda multipl. per } n \quad nP'x^2 + nQ'x + nR' = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Somma} \quad mP + nP' \times x^2 + mQ + nQ' \times x + mR + nR' = 0 \\ \text{Terza equaz.} \quad P'x^2 + Q'x + R' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\gamma) \quad mP + nP' - P' \times x^2 + mQ + nQ' - Q' \times x + mR + nR' - R' = 0$$

nella quale equazione si facciano uguali a zero i coefficienti di x , x^2 , con che si avrà $mP + nP' - P' = 0$, $mQ + nQ' - Q' = 0$, colle quali due equazioni devonfi determinare i valori delle due allunte indeterminate m , n . A tale oggetto moltiplico la prima per la indeterminata r , e dal prodotto sottraggo la seconda come segue

$$\begin{array}{l} \text{Prima equaz. multipl. per } r \quad mrP + mrP' + rP' = 0 \\ \text{Seconda equaz.} \quad mQ + nQ' - Q' = 0 \end{array}$$

$$\text{Residuo } (\lambda) \quad rP - Q \times m + rP' - Q' \times n - P' + Q' = 0$$

in cui facendo uguale a zero il coefficiente di m si avrà $r = \frac{Q}{P}$, il qual valore

sostituito negli altri due termini dell'equazione (λ) dà $\frac{PQ}{P} - Q' \times n - \frac{P'Q}{P}$

+ $Q' = 0$, e però $n = \frac{P'Q - PQ}{PQ - PQ}$. Indi fatto uguale a zero il coefficiente di n

si avrà $r = \frac{Q'}{P}$, il qual valore sostituito nel primo, e nell'ultimo termine dell'equazione (λ) dà $\frac{PQ}{P} - Q \times m - \frac{P'Q'}{P} + Q' = 0$, e però $m = \frac{PQ' - PQ}{PQ - PQ}$. Si sostituiscono ora questi ritrovati valori di m , n nell'ultimo membro dell'equazione (γ)

e si avrà $R \times \frac{PQ' - PQ}{PQ - PQ} + R' \times \frac{P'Q - PQ'}{PQ - PQ} - R' = 0$, e però

$PQ - PQ' \times R' + P'Q - PQ' \times R + P'Q' - R' \times Q = 0$. Che se si rimetteranno in luogo di ciascuna lettera P, Q, R eg. i suoi valori, si avrà finalmente l'equazione senza l'incognita x : Io ometto di fare queste sostituzioni per se ovvie a ciascuno a fine di non empire la pagina di lettere. Tralascio pure di applicare le ritrovate for-

formole al caso particolare, poichè ciò fece non porta difficoltà alcuna, tanto più, che un confimite Esempio si può vedere al num. 584.

570. Lo stesso metodo ha luogo per eliminare due, o più incognite per mezzo di tre, o più equazioni a tre, o più incognite, mentre se il numero delle incognite da eliminarsi sarà $=p$, il numero delle equazioni a ciò necessarie dovrà essere $=p+1$. Questa eliminazione poi si potrà ottenere tanto paragonando le equazioni a due a due, come paragonandole tutte insieme, ma diverso sarà il grado, a cui ascenderà l'equazione nata dalla eliminazione, secondo che il paragone si farà, o nel primo, o nel secondo modo: Se si farà il paragone delle equazioni a due a due, a molto maggior grado ascenderà l'equazione risultante, che col paragonarle tutte insieme; per lo che bisognerà attenerli a questa seconda maniera. Quando si elimina mediante il paragone di due equazioni, l'esponente di x nel primo termine del fattore massimo si è veduto fin' ora essere $n-1$ (supposto n l'esponente massimo delle equazioni), cioè è di questa forma $Ax^{n-1}+Bx^{n-2}$ ec., non così però egli è quando le equazioni si paragonano tutte insieme, ma questo massimo esponente per ciascun fattore devei prima determinare col calcolo. Cominciamo da tre equazioni, ciascuna a tre incognite, due delle quali debboni eliminare. Le equazioni sian le seguenti

$$\begin{aligned} Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \dots V &= 0 \\ A'x^{n'} + B'x^{n'-1} + C'x^{n'-2} + \dots V' &= 0 \\ A''x^{n''} + B''x^{n''-1} + C''x^{n''-2} + \dots V'' &= 0 \end{aligned}$$

Giusta il metodo finora praticato devei dedurre da queste tre equazioni un numero n di equazioni, ognuna del grado $n-1$, moltiplicando la prima per A , e dal prodotto sottraendo la seconda moltiplicata per A , poscia moltiplicando la prima per $Ax+B$, e dal prodotto sottraendo la seconda moltiplicata per $Ax+B$, e così in seguito finchè il moltiplicatore, che deve moltiplicare la prima sia $Ax^{m'}+Bx^{m'-1}+ec.$, e il moltiplicatore, che deve moltiplicare la seconda sia $Ax^{m''}+Bx^{m''-1}+ec.$ Questi due esponenti m, m' sono fino ad ora indeterminati, e li determinerò fra poco: due cose però si osservino, la prima che le accennate moltiplicazioni essendo alternative, il loro numero è uguale, e però tanto rispetto all'una, come rispetto all'altra il moltiplicatore deve ascendere allo stesso grado, onde sarà $m=m'$, la seconda che sarà $m+1$ (o sia $m'+1$ perchè $m=m'$) il numero delle equazioni di grado $n-1$ nate dalle dette operazioni. Devei in oltre moltiplicare la prima equazione per A' , e dal prodotto sottrarne la terza moltiplicata per A , indi moltiplicare la prima per $Ax+B'$, e dal prodotto sottrarne la terza moltiplicata per $Ax+B'$, e così in poi, finchè il moltiplicatore sia $A'x^{m''}+B'x^{m''-1}+ec.$, e qui parimente l'esponente m'' è ancora indeterminata, e or ora lo determinerò; il numero poi delle equazioni di grado $n-1$, che da queste operazioni risulta, trovasi essere $m'+1$: Dunque il numero totale delle equazioni di grado $n-1$, che dalle prime, e da queste seconde operazioni risulta è $m+1+m'+1$, cioè $m+m'+2$. Ma (pel num. 559.) il numero di queste equazioni deve essere $=n$, dunque si ha l'equazione $m+m'+2=n$, dalla quale si ricava $m=n-m'-2$; ed ecco, che qualora si avrà il valore di m' , con farne la sostituzione in questa equazione $m=n-m'-2$, si avrà il valore della indeterminata m , e conseguentemente di m' , poichè è $m=m'$.

Per avere il valore di m' servirà la seguente formola (S) $m' = \frac{n+n'+n''+1+t+t'}{2} - n - t' - 1$, o sia mediante la riduzione allo stesso denomina-

tore $m' = \frac{n+n'-n''+t+t'-t''-2}{2}$, la di cui dimostrazione non si può dare in questo

luogo, e però non posso esporre come tale formola si ricavi; ciò per altro nulla contribuisce all' ufo, che se ne deve fare. La lettera n rappresenta il massimo esponente della prima equazione, la n' della seconda, la n'' della terza; la lettera t esprime il numero delle dimensioni del coefficiente A della prima equazione, t' di A' , t'' di A'' .

Quattro sono le condizioni, che deve avere l'esponente m' , le quali sono per se stesse evidenti. La prima che questo esponente m' sia positivo, la seconda che egli sia un numero intero, la terza che sia $n+m > n'+m'$, o al più $n+m = n'+m'$, la quarta che sia $n'-2 > m'$, o al più $n'-2 = m'$, perchè (le equazioni si suppongono disposte secondo la grandezza de' loro esponenti massimi, così che in caso, che non siano tutti uguali, sia l'esponente n nella prima equazione maggiore dell'esponente n' nella seconda, e l'esponente n' nella seconda maggiore dell'esponente n'' nella terza) essendo $n=n'$, se si sostituirà n' in luogo di n nell'equazione $m=n-m'-2$, si avrà $m=n'-m'-2$, e però $m'+m=n'-2$, e dal primo membro levando la m , resterà $m' < n'-2$: Essendo poi $m > m'$, potrà essere al più $n'+m=n$, e però sostituendo questo valore di n nell'equazione $m=n'-m'-2$, si avrà $m=n'+m-m'-2$, conseguentemente $m'=n'-2$.

Ora per salvare le dette quattro condizioni nel valore di m' introdurrò nella formola (S) la indeterminata β così $m' = \frac{n+n'-n''+t+t'-t''-2-\beta}{2}$. Questa inde-

terminata β deve essere il più piccol numero, mercè cui salvare si possano le esposte condizioni. L'esempio metterà sotto gli occhi quanto ho detto. Dato: siano le tre seguenti equazioni I. $y^2zx^3 + y^2x^3x^3 + byz^3x + az^3z^3 = 0$, II. $zx^3 + y^2zx + y^2z = 0$, III. $yzx^3 + y^2x^3x + abyz = 0$. Per rendere la soluzione generale sostituirò in quelle equazioni in luogo dei coefficienti di x le lettere A, B, C , coa che le dette equazioni faranno

$$(A) \quad \begin{cases} Ax^3 + Bx^3 + Cx + D = 0 \\ A'x^3 + B'x + C' = 0 \\ A''x^3 + B'x + C' = 0 \end{cases}$$

Adunque essendo A di tre dimensioni, A' di una, A'' di due, sarà $t=3, t'=1, t''=2$, e in oltre perchè il massimo esponente della prima equazione è 3, della seconda è 2, della terza è 2, sarà $n=3, n'=2, n''=2$. Quindi la formola $m' =$

$\frac{n+n'-n''+t+t'-t''-2-\beta}{2}$ mediante le debite sostituzioni si cambia in $m' =$

$\frac{3-\beta}{2}$, il qual valore sostituito nell'equazione $m=n-m'-2$ dà $m = \frac{\beta-1}{2}$, e però

$m' = \frac{\beta-1}{2}$, poichè è $m=m'$, ed $m' = \frac{3-\beta}{2}$. Ora vediamo qual sia il numero

minore, che si possa dare a β , affinchè abbiano luogo le quattro dette condizioni; egli pertanto non può essere altro, che 3, onde nei precedenti valori sostituendosi 3 in luogo di β si ha $m'=0, m'=1, m'=1$. I valori di questi esponenti nascono dall'ordine, con cui si sono disposte le equazioni in (A); però mutiamo ordine alle equazioni come segue, mettendo in terzo luogo quella, che era in primo, e facendo prima la seconda

(T)

$$(r) \quad \begin{cases} A'x^3 + B'x + C = 0 \\ A''x^3 + B''x + C'' = 0 \\ Ax^3 + Bx + Cx + D = 0 \end{cases}$$

Poichè n rappresenta sempre il massimo esponente della prima equazione, n' della seconda, n'' della terza; e t dinota le dimensioni del coefficiente del primo termine nella prima equazione, t' del primo nella seconda, t'' del primo nella terza, farà $n=3$, $n'=2$, $n''=3$, $t=1$, $t'=2$, $t''=3$, quindi fatte le debite sostituzioni nella formola esprimente il valor di m'' , si avrà $m'' = -\frac{1-\beta}{2}$, e siccome per qualunque numero si sostituisca in luogo di β , si ha sempre un valor negativo, però ripugnando questo valor di m'' alla prima condizione, non potrà valere l'assunto ordine delle equazioni. Di nuovo si muti l'ordine alle equazioni facendo la terza quella, che era la seconda, e seconda quella, che era terza, così

$$(e) \quad \begin{cases} Ax^3 + Bx^3 + Cx + D = 0 \\ A'x^3 + B'x + C = 0 \\ A''x^3 + B''x + C'' = 0 \end{cases}$$

Stante tale disposizione trovasi essere $n=3$, $n'=2$, $n''=2$, $t=3$, $t'=2$, $t''=1$, onde il valore di m'' diventa $m'' = \frac{5-\beta}{2}$, e questo valore sostituito nell'equazione $m=n-m''=2$

dà $m = -\frac{3+\beta}{2}$, conseguentemente $m' = -\frac{3+\beta}{2}$. Il minor numero poi, che si possa assegnare a β a fine di salvare le necessarie condizioni è $\beta=5$, dalla quale sostituzione si ha $m'=0$, $m=1$, $m'=1$.

Veniamo adesso all'attuale eliminazione, e a tale oggetto prendiamo le equazioni secondo l'ordine posto in (A), e per rendere il massimo esponente uguale in tutte tre, moltiplichiamo la seconda, e la terza equazione per x , con che le equazioni saranno

$$(A) \quad \begin{cases} Ax^3 + Bx^3 + Cx + D = 0 \\ A'x^3 + B'x^3 + C''x = 0 \\ A''x^3 + B''x^3 + C'''x = 0 \end{cases}$$

Giusta la quale disposizione si è trovato, che il massimo esponente di x nel maggior fattore, che moltiplicar deve la prima, e la seconda equazione, ha da essere $m=m'=1$, e il massimo esponente di x nell'altro maggior fattore, che deve moltiplicare la prima, e la terza equazione, ha da essere $m''=0$. Comincio adunque con sottrarre la seconda equazione moltiplicata per A dalla prima moltiplicata per A' , con che ho

$$I. \quad AB - A'B'x^3 + AC - A'C''x + AD = 0$$

dalla prima moltiplicata per $A'x+B'$ sottraggo la seconda moltiplicata per $Ax+B$ lo che mi dà

$$II. \quad AC - A'C''x^3 + AD + BC - B'C''x + BD = 0$$

e questa operazione non deve più oltre continuare, perchè essendosi trovato

$m=m'=1$, l'ultimo ufato moltiplicatore $Ax+B$, o $A'x+B'$ è il massimo, conseguentemente devesi passare all'altra operazione, che è di moltiplicare la prima equazione per A' , e dal prodotto sottrarre la terza moltiplicata per x , onde nasce

$$\text{III. } \overline{AB-AB'}x^3 + \overline{AC-AC'}x + A'D=0$$

che è la sola moltiplicazione da farsi, perchè si è trovato $m'=0$ esponente di x nel fattore massimo. Si sono trovare adunque tre equazioni di grado 3—1 corrispondentemente al massimo esponente 3 delle equazioni (A). Mediante queste tre equazioni I, II, III (giusta il metodo del num 565.) si ritrovi l'equazione, che contenga le sole incognite y, z , che farà la seguente

$$(II) \overline{AD} \overline{AC-AC'} \overline{AC-AC'} x^2 + \overline{AB-AB'} +$$

$$\overline{BD} \overline{AC-AC'} \overline{AC-AC'} x^2 + \overline{AB-AB'} + \overline{AB-AB'} \overline{AC-AC'} = 0$$

$\overline{AD} \overline{AB-AB'} + \overline{AB-AB'} \overline{AD} + \overline{BC-BC'} + \overline{AC-AC'} \overline{AC-AC'} = 0$ la quale mediante la sostituzione dei valori di A, B, C ec. già fissati di sopra si cambia nella seguente ordinaria secondo l'incognita x .

$$(2) \overline{a^2y^2} - \overline{ay^2} x^2 + \overline{ay^2} + \overline{a^2ay^2} - \overline{a^2y^2} x^2 - \overline{ay^2} + \overline{aby^2} - \overline{a^2b^2y^2} x^2 = 0.$$

Bisogna adesso trovare un'altra equazione, nella quale enarino le sole incognite y, z , e a tale oggetto riprendo le stesse equazioni secondo l'ordine, con cui son poste in (Θ): Dalla prima pertanto moltiplicata in A' sottraggo la seconda moltiplicata in A , e ne viene

$$I. \overline{AB-AB'}x^2 + \overline{AC-AC'}x + A'D=0$$

Dalla prima moltiplicata per $A'x+B'$ sottraggo la seconda moltiplicata per $Ax+B$, con che ritrovo

$$II. \overline{AC-AC'}x^2 + \overline{AD} + \overline{BC-BC'}x + B'D=0$$

e questa moltiplicazione basta, perchè $m=m'=1$. Quindi passo a sottrarre la terza moltiplicata in A dalla prima moltiplicata in A' , con che ho

$$III. \overline{AB-AB'}x^2 + \overline{AC-AC'}x + A'D=0$$

Ora da queste tre equazioni, come ho fatto poc'anzi deduco l'equazione in y, z , che è (2) $\overline{AD} \overline{AC-AC'} \overline{AC-AC'} x^2 + \overline{AB-AB'} +$

$$\overline{BD} \overline{AC-AC'} \overline{AC-AC'} x^2 + \overline{AB-AB'} + \overline{AB-AB'} \overline{AC-AC'} = 0$$

$$\overline{AD} \overline{AC-AC'} + \overline{AB-AB'} \overline{AD} + \overline{BC-BC'} = 0, \text{ che colla sostituzione}$$

dei valori di A, B, C ec. trovasi essere

$$(2) \overline{aby^2} - \overline{a^2by^2} x^2 + \overline{a^2by^2} - \overline{aby^2} + \overline{a^2by^2} - \overline{aby^2} x^2 +$$

$$\overline{a^2by^2} - \overline{a^2by^2} - \overline{aby^2} + \overline{aby^2} + \overline{a^2b^2y^2} - 3\overline{a^2b^2y^2} + 2\overline{ab^2y^2} x^2 = 0$$

Tom. II.

Z

Col-

Colle ritrovate due equazioni ($\Sigma \Phi$) si eliminerà la z col metodo solito; che se si vorrà eliminare la y , bisognerà ordinarle per y così

$$(T) \quad az^2y^{11} + az^2 - az^2 \chi y^9 + a^2x^2 - a^2bz^2 - abz^2 \chi y^8 - a^2z^2y^7 + a^2b^2z^2y^6 = 0$$

$$(Y) \quad a^2bz^2y^{10} + a^2uz^2 - a^2bz^2 - abz^2 \chi y^9 - a^2bz^2 + a^2bz^2 - abz^2 + a^2b^2z^2 - abz^2 \chi y^8 + a^2uz^2 - abz^2 - 3a^2b^2z^2 \chi y^7 + 2ab^2z^2y^6 = 0$$

Eliminiamo pertanto la incognita z mediante le due equazioni ($\Sigma \Phi$), nelle quali per abbreviare il calcolo in vece de' coefficienti di z^2 , z^3 ec. pongo le lettere A , B , ec. così

$$I. \quad Az^9 + Bz^8 + Cz^7 = 0$$

$$II. \quad A'z^9 + B'z^8 + C'z^7 = 0$$

ma perchè queste equazioni sono divisibili per z^7 , perciò faranno

$$I. \quad Az^2 + Bz + C = 0$$

$$II. \quad A'z^2 + B'z + C' = 0$$

mediante le quali si eliminerà la incognita z giusta il num. 564., e l'equazione, che conterrà la sola y farà $A'C - AC' - B'C + BC' \chi A'B - AB' = 0$, nella quale rimettendo in vece delle lettere i corrispondenti valori, si avrà finalmente $5a^2y^{13} -$

$$\begin{aligned} & 4a^2 - 10a \chi y^{11} + 2a^2b - 3a^2 + 2a^2 + 8a + 5 \chi y^{10} \\ & - 2a^2b + 4a^2 - 17a^2b + 6a^2 - 4a - 4 \chi y^9 + a^2b - 6a^2b + a^2 - a^2b - 2a^2 + 11a^2b - 8a^2 + 26a^2b - 3a^2 + 2 \chi y^8 \\ & + 6a^2b - 3a^2 + 24a^2b - 3a^2 - 2a^2b^2 + 4a^2b + 4a^2 - 14a^2b + 4a - 116 \chi y^7 \\ & + a^2b^2 - 3a^2b^2 + 2a^2b^2 + 2a^2 - 2a^2b^2 - 21a^2b^2 + 6a^2b^2 + 10a^2b^2 - 32a^2b^2 + 3a^2 + 2ab^2 + 3ab - 2a^2 + 56 \chi y^6 \\ & + a^2b^2 - 3a^2b^2 - 3a^2b^2 + 16a^2b^2 - 8a^2b^2 + 2a^2b^2 - 2a^2b^2 - a^2b^2 - 4a^2 + 26a^2b^2 - 3a^2 - 20a^2b^2 + 14ab - a \chi y^5 \\ & + a^2b^2 - a^2b^2 - 3a^2b^2 + 12a^2b^2 - 5a^2b^2 - 31a^2b^2 + 8a^2b^2 - 2a^2b^2 + 2a^2b^2 + 2a^2 - 11ab + 96 \chi y^4 \\ & - 2a^2b^2 - 6a^2b^2 - a^2b^2 + 2a^2b^2 + a^2b^2 - 13a^2b^2 + 13a^2b^2 + 30a^2b^2 - 2a^2b^2 + ab \chi y^3 \\ & + a^2b^2 + 8a^2b^2 + 13a^2b^2 + 2a^2b^2 - a^2b^2 + a^2b^2 + 4a^2b^2 - 6a^2b^2 + 12ab \chi y^2 \\ & - 2a^2b^2 - 10a^2b^2 - 12a^2b^2 - a^2b^2 \chi y + a^2b^2 + 4a^2b^2 + 4a^2b^2 = 0 \end{aligned}$$

Eguale si opererà per giungere all'equazione data per x , o per u .

Se in tutti tre i diversi ordini, o disposizioni, che si possono dare alle tre equazioni (Δ), tali faranno i valori di n , n' , n'' , così che nella formola $m'' =$

$$n + n' - n'' + t + t' - t'' - 2 - \beta$$

fatte le debite sostituzioni di questi valori di n , n' , n'' , e dei valori di t , t' , t'' , si possa dare a β un tal valore, che salvi le quattro necessarie condizioni, in tal caso per avere le due equazioni (Σ , Φ) si dovranno prescegliere quei due valori di m'' , che nascono dal sostituirsi in luogo di β i mi-

ni

nimi numeri. Se mediante una sola disposizione delle equazioni (Δ) risulterà per m'' un valore, che soddisfi alle ricercate condizioni, si dovrà fare una sola volta la eliminazione colla comparazione di tutte le equazioni insieme, e la seconda volta si dovrà fare colla comparazione a due a due. Se poi in niuna delle tre diverse disposizioni si avrà per m'' un valore richiesto dalle quattro condizioni, la eliminazione si farà col paragonare le equazioni a due a due.

Brevemente dirò ancora come si debba operare su quattro equazioni a quattro incognite, delle quali tre si debbano eliminare, mentre ciò basterà per prender norma pel modo di regolarli su cinque, sei ec. equazioni a cinque, sei ec. incognite. Siano pertanto le quattro seguenti equazioni

$$\begin{aligned} (A) \quad & A x^n + B x^{n-1} + C x^{n-2} + D x^{n-3} + \dots + V = 0 \\ & A' x^{n'} + B' x^{n'-1} + C' x^{n'-2} + D' x^{n'-3} + \dots + V' = 0 \\ & A'' x^{n''} + B'' x^{n''-1} + C'' x^{n''-2} + D'' x^{n''-3} + \dots + V'' = 0 \\ & A''' x^{n'''} + B''' x^{n'''-1} + C''' x^{n'''-2} + D''' x^{n'''-3} + \dots + V''' = 0 \end{aligned}$$

Le dimensioni di A, A', A'', A''' siano espresse da s, s', s'', s''' , e siano m, m', m'', m''' gli esponenti maggiori de' massimi polinomj indeterminati, co' quali devonfi (giusta il metodo solito) moltiplicare le equazioni. Ragionando, come si è fatto di sopra, si troverà $n+m=n'+m'$, ed $n+m+1=m+1+m'+1+m''+1+m''' + 1$, donde si ricava $m=n'-m'-m''-3$. Ed ecco, che qualora si abbia il valore di m', m'', m''' , resta determinato il valore di m , e conseguentemente di m' . Le formole, che danno i valori di m' , e di m'' sono $m' = \frac{n+n'-2n'+n''+s+s'-2s'+s''-3}{3}$, ed $m'' = \frac{n+n'+n''-2n'+s+s'+s''-2s'-3}{3}$. Ma poichè questi valori di m', m'' devono es-

sere tali, che siano numeri interi, e positivi, che $n+m > 0 = n'+m'$, ed $n+m > 0 = n''+m''$, però a fine di salvare queste condizioni, s' introducano (come si è fatto di sopra) nelle dette due formole le quantità indeterminate, β, δ , così $m' = \frac{n+n'-2n'+n''+s+s'-2s'+s''-3-\beta}{3}$, $m'' = \frac{n+n'+n''-2n'+s+s'+s''-2s'-3-\delta}{3}$, poscia in luogo delle stesse β, δ si sostituiscano i numeri minori, che soddisfar possano alle dette condizioni. Si varj l'ordine delle equazioni (Ω), e fra i sei diversi modi co' quali si possono disporre, si scelgano quei tre, che danno per m', m'' i valori corrispondenti alle necessarie condizioni, e nel tempo stesso i numeri sostituiti in luogo di β, δ siano i minimi. Ciò ottenuto, dalle quattro equazioni (Ω) se ne deducano tre, che avranno tre sole incognite: Da queste tre equazioni, se ne ricavano due, come si è fatto poc'anzi, che contengano due incognite; e finalmente da queste due si passi all'equazione avente una sola incognita. Le operazioni da farsi sono sempre le stesse: Soltanto il massimo grado de' fattori viene prescritto dai valori di m, m', m'', m''' , che già si sono trovati. Collo stesso metodo si regoli sopra un numero p di equazioni aventi un numero p d'incognite, delle quali $p-1$ si debbano eliminare. Già le formole, che dovranno dare m', m'', m''' ec. chiaramente si deducono dalle cose dette.

ARTICOLO VI.

Della risoluzione delle equazioni di terzo grado.

571. **L** E equazioni del terzo grado si dividono in pure, e affette. Le pure sono quelle, che contengono il cubo dell'incognita, e il termine affatto cognito. Le affette sono quelle, che contengono tutti i termini convenienti al suo grado, o pure mancano soltanto del secondo termine.

572. Le equazioni pure del terzo grado cadono sotto a questa formola generale $x^3 \pm q = 0$, in cui la lettera q rappresenta qualunque quantità positiva, o negativa, a tenore di che si ha

$$\begin{array}{l} \text{I.} \quad x^3 + q = 0 \\ \text{II.} \quad x^3 - q = 0 \end{array}$$

573. Di questa forma è l'equazione $x^3 - 1 = 0$, che contiene le tre radici cubiche dell'unità: Per ritrovarle faccio primieramente $x^3 = 1$, poscia da un membro, e dall'altro estraggo la radice cuba, con che ho $x = \sqrt[3]{1}$ cioè $x = 1$. Ma qui inforge una difficoltà ed è, che una equazione di terzo grado deve avere (pel num. 461.) tre radici, ed ora risolvendola non se n'è trovata, che una. Quantunque mediante l'estrazione della radice cuba si sia ritrovata la sola radice 1 dell'equazione, non è per questo, che ella non inchioda ancora le altre due. Di fatto si divida l'equazione data $x^3 - 1 = 0$ per la radice trovata $x - 1$, come segue, e si avrà di quoziente $x^2 + x + 1 = 0$

Divisore	Dividendo	
$x - 1$	$x^3 - 1 = 0$	
	$\underline{x^3 - x^2}$	
Primo residuo	$+x^2 - 1$	
	$\underline{x^2 - x}$	
Secondo residuo	$+x - 1$	
	$\underline{+x - 1}$	
Ultimo residuo	$0 \quad 0$	

Quoz. $x^2 + x + 1 = 0$

Si risolva questa equazione di secondo grado $x^2 + x + 1 = 0$, che è venuta di quoziente, e le di lei due radici faranno le altre due radici dell'equazione $x^3 - 1 = 0$. Le radici poi dell'

equazione $x^2 + x + 1 = 0$ trovansi essere $-\frac{1}{2} \pm \sqrt{-1 + \frac{1}{4}}$, cioè $-\frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2}$.

Quindi le tre radici dell'equazione $x^3 - 1 = 0$ sono 1, $\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$, $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$

574. Qui poi si offervi, che le radici tanto reali, come immaginarie dell'unità hanno questa proprietà, che se di ciascuna di loro si formerà qualunque potenza più piaccia, tale potenza sarà uguale ad una delle stesse radici. Quanto alle potestà della radice 1 non v'è bisogno di prova, poichè l'unità è insieme qualunque potenza, e radice. Quanto alle altre radici, basterà formarne le loro potestà per rimanerne convinti. Di fatto si ha

$$\left(\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}\right)^2 = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2}; \left(\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}\right)^3 = 1; \left(\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}\right)^4 = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \text{ ec. Parimente } \left(\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}\right)^2 = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}; \left(\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}\right)^3 = 1; \left(\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}\right)^4 = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2} \text{ ec.}$$

575. Essendosi ritrovate le tre radici cube dell'unità, passiamo alla risoluzione della formola generale $x^3 \pm q = 0$ per le equazioni pure, la quale farà $x = \sqrt[3]{q}$. Ora per ritrovare le altre due radici, si divida l'equazione $x^3 \pm q = 0$ per la ritrovata radice $x \pm \sqrt[3]{q}$, e ne verrà di quoziente $x^2 \mp x \sqrt[3]{q} + \sqrt[3]{q^2} = 0$, che risolta col metodo delle quadratiche affette lascia per radici $x = \pm \frac{1}{2} \sqrt[3]{q} \pm$

$$\sqrt{-\sqrt[3]{q^2} + \frac{1}{4} \sqrt[3]{q^2}}, \text{ cioè } \pm \frac{1}{2} \sqrt[3]{q} \pm \frac{1}{2} \sqrt{-3 \sqrt[3]{q^2}}, \text{ o sia } \pm$$

$$\frac{\sqrt[3]{q} \pm \sqrt{-3} \sqrt[3]{q}}{2}, \text{ e però } \sqrt[3]{q} \frac{X \pm 1 \pm \sqrt{-3}}{2}.$$

576. Le tre radici cube adunque della equazione $x^3 \pm q = 0$ sono $\sqrt[3]{q}$; $\sqrt[3]{q} \frac{X \pm 1 + \sqrt{-3}}{2}$; $\sqrt[3]{q} \frac{X \pm 1 - \sqrt{-3}}{2}$. Conseguentemente le equazioni cubiche pure hanno una radice reale, e l'altre due immaginarie.

577. Ma consideriamo un poco queste tre ritrovate radici generali dell'equazione ecumenica $x^3 \pm q = 0$, e vedremo, che esse risultano dalla radice cubica di q moltiplicata nelle tre radici cubiche dell'unità: Che però per avere le tre radici di una equazione cubica pura, basterà prendere la di lei radice cubica, e moltiplicarla nelle tre radici cubiche dell'unità.

578. Per quanto spetta le equazioni affette di terzo grado; ne prenderò la formola generale mancante del secondo termine, giacchè si può egli da qualsivoglia equazione facilissimamente levare giusta il num. 496, che è la seguente $x^3 \mp px \pm q = 0$, la quale rispetto ai segni si risolverà in quelle quattro, in cui le lettere p , q esprimeranno qualsivoglia quantità.

$$\begin{array}{ll}
 \text{I} & x^3 + px + q = 0 \\
 \text{II} & x^3 + px - q = 0 \\
 \text{III} & x^3 - px + q = 0 \\
 \text{IV} & x^3 - px - q = 0
 \end{array}$$

579. Le equazioni, che si riferiscono alle due prime formole, in cui dopo il secondo termine mancante viene il terzo affetto dal segno +, hanno sempre due radici immaginarie, come si è dimostrato al num. 502. Le equazioni, che si riferiscono alle altre due formole possono avere o tutte le radici reali, o una reale, e due immaginarie.

580. Siccome (pel num. 472.) le equazioni di terzo grado hanno per lo meno una radice reale, e l'altre due, anche essendo immaginarie devono dare un prodotto reale, altrimenti l'equazione di terzo grado non potrebbe essere immune dai radicali, come si suppone; però qualunque equazione di terzo grado risulterà da due fattori reali, uno del primo, e l'altro del secondo grado, poichè il fattore di secondo grado allora avrà radici immaginarie, quando il di lui ultimo termine è positivo (pel num. 396.), però se nell'equazione di terzo grado l'ultimo termine sarà negativo, ella avrà per lo meno una radice reale, e positiva.

581. Prima di venire alla risoluzione di queste equazioni non farà male a proposito di determinare la forma, che possono avere le loro radici reali irrazionali in supposizione, che tali equazioni siano immuni da radicali: Siccome poi quelle quantità solamente possono essere radici di una equazione, che sostituite nella medesima in luogo dell'incognita la fanno verificare; quindi è, che basta osservare sotto qual forma cadano le quantità irrazionali, che sostituite nella equazione generale $x^3 + px + q = 0$ possono farla verificare, per venire in chiaro della forma, che possono avere le radici di queste equazioni. Se pertanto in questa equazione $x^3 + px + q = 0$

si porrà, o $x = \sqrt{a}$; o $x = \sqrt[3]{a}$; o $x = \sqrt{a} + \sqrt{b}$; o $x = \sqrt{a} + \sqrt[3]{b}$;

o $x = a + \sqrt[3]{b}$; o $x = a + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c}$ ec. non potrà ella mai verificarsi in quanto che non si potranno distruggere vicendevolmente i radicali; conseguentemente sotto a niuna di queste forme potranno cadere le radici della proposta equazione. Ma se si porrà $x = a + \sqrt{b}$, fatta la sostituzione nell'equazione generale, si avrà

$a^3 + 3ab + 3a^2\sqrt{b} + b\sqrt{b} + p\sqrt{b} + q = 0$, la quale si verificherà, qualora sia $p = -3a^2 - b$, e $q = -a^3 - 3ab - ap$, nel qual caso tutti i termini vanno a zero. Perchè poi col sostituirli nell'equazione $x^3 + px + q = 0$ questi valori di p , q , ne

viene l'equazione $x^3 - 3a^2\sqrt{b}x + 2a^3 - 2ab = 0$, la quale è divisibile per $x + 2a$, dalla cui divisione si ha di quoziente $x^2 - 2ax + a^2 - b = 0$, perciò una equazione di terzo grado non può avere per radice una quantità della forma $a + \sqrt{b}$, se non ha un'altra radice razionale $= -2a$. Parimente l'equazione $x^3 + px + q = 0$

si verificherà col porre $x = \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$, mentre mediante questa sostituzione l'equazione proposta si cambia in $a + 3\sqrt[3]{a^2b} + 3\sqrt[3]{ab^2} + b + p\sqrt[3]{a} + p\sqrt[3]{b} + q = 0$. in cui tutti i termini anderanno a zero, qualora sia $q = -a - b$, e $p\sqrt[3]{a} + p\sqrt[3]{b} = 0$.

$$p \times \sqrt[3]{a + \sqrt[3]{b}} = -3\sqrt[3]{a} - 3\sqrt[3]{ab^2}, \text{ cioè } p \times \sqrt[3]{a + \sqrt[3]{b}} =$$

$$\sqrt[3]{a + \sqrt[3]{b}} \times -3\sqrt[3]{ab}, \text{ conseguentemente } p = \frac{\sqrt[3]{a + \sqrt[3]{b}} \times -3\sqrt[3]{ab}}{\sqrt[3]{a + \sqrt[3]{b}}} = -$$

$3\sqrt[3]{ab}$. E poichè p è una quantità razionale, dovrà ancora $-3\sqrt[3]{ab}$, cui egli è uguale, essere una quantità razionale, e però la radice potrà avere questa forma $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$, ogni qual volta il prodotto ab sia un cubo perfetto, e la somma di a, b sia un numero razionale, poichè deve essere $q = -a - b$, e q è razionale.

§82. Le radici adunque irrazionali delle equazioni di terzo grado non possono avere, che una di queste due forme $x = a + \sqrt[3]{b}$, $x = \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$, lo che però deve intendersi, quando l'equazione di terzo grado non ammetta fra' suoi termini quantità irrazionali, mentre se fra i termini dell'equazione vi saranno degli irrazionali, le di lei radici irrazionali potranno avere altre forme. Generalmente poi le radici irrazionali non potranno mai essere di un grado maggiore del grado dell'equazione, poichè la loro sostituzione nell'equazione proposta non potrebbe mai farla in veruna supposizione verificare, ma sempre vi rimarrebbero delle quantità radicali, che non potrebbero sparire.

§83. Non solo poi la radice della forma $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$ fa verificare l'equazione generale di terzo grado, ma la fa verificare eziandio quand'anco uno di questi radicali sia moltiplicato per $\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$, e l'altro per $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$

così $\sqrt[3]{a} \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} + \sqrt[3]{b} \times \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$; e poichè qualunque quantità, che fa verificare una equazione è radice di tale equazione (pel num. 318.), e una equazione di terzo grado non può avere più di tre radici, però le tre radici dell'equazione faranno, la prima $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$, la seconda

$$\sqrt[3]{a} \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} + \sqrt[3]{b} \times \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}, \text{ la terza } \sqrt[3]{a} \times \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} +$$

$\sqrt[3]{b} \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$. Che poi queste radici facciano verificare l'equazione, basta farne la sostituzione per restarne convinti. Si sostituisca pertanto una di queste e di-

dici, per Esempio là seconda nell'equazione generale $x^3 + px + q = 0$, e si avrà $a +$

$$\sqrt[3]{a} \chi \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} + \sqrt[3]{b} \chi \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \chi \sqrt[3]{ab} + b + p \chi \sqrt[3]{a} \chi \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \\ + p \chi \sqrt[3]{b} \chi \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} + q = 0, \text{ la quale equazione si verificherà, qualora sia}$$

$p = -3\sqrt[3]{ab}$, e $q = -a - b$, come sopra al num. 581.

584. Ho osservato al num. 579, che le equazioni, le quali si riferiscono alla prima, e seconda formola generale hanno sempre due radici immaginarie, ma le equazioni, che si riferiscono alla terza, e quarta formola possono avere tutte le radici reali, ma ne possono avere ancora una reale, e due immaginarie. Per determinare i casi, in cui queste equazioni hanno, o tutte le radici reali, o una reale, e due immaginarie, bisogna osservare, che l'equazione di terzo grado risultando (giusta il num. 580.) da due fattori, uno del primo, e l'altro del secondo grado, ella avrà sempre due radici immaginarie, quando tali le abbia il fattore di secondo grado, e all'opposto le avrà tutte reali, quando il fattore di secondo grado abbia le sue due radici reali. Il fattore pertanto di secondo grado sia di questa forma $x^2 \pm 2ax + a^2 + c = 0$, il fattore di primo grado dovrà essere $x \mp 2a$, acciocchè dal loro prodotto risulti una equazione di terzo grado mancante del secondo termine. Ora acciò siano reali le radici di questa equazione di secondo grado, il termine c (giusta il num. 396.) deve essere affetto dal segno $-$, così $x^2 \pm 2ax + a^2 - c = 0$, ma se sarà affetto dal segno $+$, così $x^2 \pm 2ax + a^2 + c = 0$, le radici saranno immaginarie. Ciò posto si faccia il prodotto di questi due fattori, e si avrà, come segue

Fattore di secondo grado
Fattore di primo grado

$$x^2 \pm 2ax + a^2 + c = 0 \\ x \mp 2a$$

$$x^3 \pm 2ax^2 + a^2x + cx \\ \mp 2ax^2 - 4a^2x \mp 2a^3 \mp 2ac = 0$$

Prodotto

$$x^3 + c - 3a^2 \chi x \mp 2a^3 \mp 2ac = 0$$

di cui si paragonino i coefficienti coi coefficienti dell'equazione generale $x^3 + px + q = 0$, così $c - 3a^2 = -p$, $2a^3 + 2ac = q$. Mediante queste due equazioni si elimini la quantità a , lo che ottengo mediante la formola generale data al num. 568. per due equazioni, una del secondo, e l'altra del terzo grado, nella quale sostituendosi i valori di $A = 2$, $C = 2c$, $D = -q$, $A' = 3$, $C' = -c - p$, onde la formola si riduce ad $\overline{AAD} \chi \overline{AAD} + \overline{AAC} - \overline{AAC} \chi \overline{ACC} - \overline{ACC} = 0$. Fatte adunque le sostituzioni si ha $-9q \chi -9q + 18c + 6c + 6p \chi -6c^2 - 6cp - 2c^3 - 4p - 2p^3 = 0$, cioè $-9q \chi -9q + 24c + 6p \chi -8c^2 - 10cp - 2p^3$, e però fatte le debite mol-

ti-

riplicazioni ne viene $81q^3 - 192c^3 - 288c^2p - 108cp^2 - 12p^3 = 0$, che divisa per 3 è $27q^3 - 64c^3 - 96c^2p - 36cp^2 - 4p^3 = 0$, conseguentemente $27q^3 - 4p^3 = 64c^3 + 96c^2p + 36cp^2$. Ora in questa equazione, per essere di terzo grado, la quantità c spettante all'assunta equazione di secondo grado avrà un valore reale (pel num. 472.); che però basta esaminare il caso, nel quale questo valore di c è positivo, e il caso, in cui egli è negativo, per determinare nel tempo stesso il caso, in cui l'assunta equazione di secondo grado, e conseguentemente l'equazione del terzo grado ha due radici immaginarie, e il caso, in cui l'una, e l'altra ha tutte le radici reali. Tre casi poi in questa equazione devonfi distinguere. Il primo quando è $27q^3 >$

$4p^3$, o sia $\frac{1}{4}q^3 > \frac{1}{27}p^3$, cioè quando il quadrato della metà dell'ultimo termine della proposta equazione è maggiore del cubo della terza parte del coefficiente del terzo termine. Il secondo quando è $27q^3 < 4p^3$, o sia $\frac{1}{4}q^3 < \frac{1}{27}p^3$, cioè quando il quadrato della metà dell'ultimo termine è minore del cubo della terza parte del coefficiente del terzo termine. Il terzo quando è $27q^3 = 4p^3$, o sia $\frac{1}{4}q^3 =$

$\frac{1}{27}p^3$, cioè il quadrato della metà dell'ultimo termine è uguale al cubo della terza parte del coefficiente del terzo termine. Quanto al primo caso, in cui è $27q^3 > 4p^3$, sarà $27q^3 - 4p^3$ quantità positiva, e però quantità positiva sarà pure $64c^3 + 96c^2p + 36cp^2$, quindi il valore di c è positivo; ma quando il valore di c è positivo, l'equazione di secondo grado ha due radici immaginarie; dunque quando nella data equazione di terzo grado sarà $27q^3 > 4p^3$, ella avrà due radici immaginarie. Quanto al secondo caso, in cui è $27q^3 < 4p^3$, sarà $27q^3 - 4p^3$ quantità negativa, e quindi quantità negativa sarà pure $64c^3 + 96c^2p + 36cp^2$, conseguentemente sarà negativo il valore di c , perlochè l'assunta equazione di secondo grado avrà le sue radici reali, e tali ancora saranno le radici dell'equazione di terzo grado, in cui perciò si avrà $27q^3 < 4p^3$. Quanto al terzo caso essendo $27q^3 = 4p^3$, sarà $64c^3 + 96c^2p + 36cp^2 = 0$, in cui un valore di c è uguale a zero (pel num. 487.): Se pertanto questo valore

di $c = 0$ si sostituirà nell'equazione $c - 3a^2 = -p$, cioè $a = \pm \sqrt{\frac{c+p}{3}}$, nata

dalla paragone dei coefficienti dei terzi termini, si avrà $a = \pm \sqrt{\frac{p}{3}}$, il qual valore so-

stituito in ciascuno dei due fattori, renderà il primo $x \pm 2x \sqrt{\frac{p}{3}} + \frac{p}{3} = 0$, e il

secondo $x \mp 2x \sqrt{\frac{p}{3}}$. Ma le radici del primo fattore sono $x = \mp \sqrt{\frac{p}{3}}$, e la radice

del secondo è $x = \pm 2\sqrt{\frac{p}{3}}$. Dunque nel caso che sia $27q^3 = 4p^3$, l'equazione di terzo grado non solo avrà le sue tre radici reali, ma di queste tre radici due saran-

Tom. II.

A a

no

no uguali, e la terza uguaglierà la loro somma, e sarà affetta da segno contrario, cioè le radici faranno $x = +\sqrt[3]{\frac{p}{3}}$, $x = +\sqrt[3]{\frac{p}{3}}$, $x = -2\sqrt[3]{\frac{p}{3}}$, o pure $= -\sqrt[3]{\frac{p}{3}}$, $x = -\sqrt[3]{\frac{p}{3}}$, $x = +2\sqrt[3]{\frac{p}{3}}$.

585. Veniamo adesso alle formole ecumeniche, che danno le radici delle equazioni di terzo grado, e alle quali perciò si giunge mediante la loro risoluzione. Data l'equazione $x^3 + px + q = 0$, immune dal secondo termine, e tali le considereremo in avvenire, si supponga che una delle sue radici sia $x = m + n$, quale si inalzi al cubo, e si avrà $x^3 = m^3 + 3mn \times m + n^3$, e in vece di $m + n$ si scriva x , cui è uguale, onde si avrà $x^3 = m^3 + 3mnx + n^3$, e però $x^3 - 3mnx - m^3 - n^3 = 0$, di cui una radice è $x = m + n$. Si paragonino i coefficienti di questa equazione coi coefficienti della proposta equazione generale, e si avrà $p = -3mn$, e $q = -m^3 - n^3$: Dalla prima si prenda il valore di n , che è $+n = -\frac{p}{3m}$, e però $n^3 = -\frac{p^3}{27m^3}$, che

sostituito nella seconda equazione dà $q = -m^3 + \frac{p^3}{27m^3}$, cioè $27m^3q = -27m^6 + p^3$, e però $m^6 + m^3q = +\frac{p^3}{27}$, la quale se si risolva giusta il num. 411, darà $m^3 = -\frac{1}{2}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}$, e però $m = \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}}$, ed ecco ritrovato il valore di una parte della radice. Per avere il valore dell'altra parte della radice, cioè di n , si prenda l'equazione $q = -m^3 - n^3$, o sia $n^3 = -q - m^3$, e in luogo di m^3 si sostituiscia il suo ritrovato valore $-\frac{1}{2}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}$, con che si avrà $n^3 = -q + \frac{1}{2}q \mp \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}$, cioè $n^3 = -\frac{1}{2}q \mp \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}$, e però $n = \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q \mp \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}}$, che è l'altra parte della radice, e che non differisce dalla prima, se non nel segno prefisso alla quantità radicale. Le tre radici pertanto dell'equazione faranno

$$I. \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}};$$

$$II. \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} + \\ \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} \times \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2};$$

$$III. \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} + \\ \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

Dopo essersi ritrovata l'equazione $x^3 - 3mx - m^3 = 0$ si sono paragonati i coefficienti dei di lei termini coi rispettivi coefficienti dell'equazione $x^3 + px + q = 0$, e ben con ragione, imperocchè queste due equazioni avendo per ipotesi le stesse radici, o sia essendo identiche, ben si vede, che i loro corrispondenti coefficienti devono essere uguali, mentre (pel num. 477.) il coefficiente del secondo termine risultando dalla somma delle radici, il coefficiente del terzo dalla somma degli ambi ec., avendo tanto una, come l'altra le stesse radici, i coefficienti di una devono necessariamente essere uguali ai coefficienti dell'altra, avvegnachè risultanti dalle stesse quantità. Non farà necessario ogni volta, che si vorrà risolvere un'equazione cubica, di rinovare le operazioni pur ora praticate. Per evitare questo imbarazzo basta osservare in primo luogo, che le due parti della ritrovata radice non differiscono in altro, che nel segno prefisso al vinctolo quadrato, che in una è +, nell'altra è —:

In secondo luogo che la quantità $\frac{1}{2}q$, che immediatamente cade sotto il vinctolo cubo, non è altro, che la metà dell'ultimo termine dell'equazione presa col segno contrario, cioè positiva se l'ultimo termine è negativo, e negativa se egli è positivo: Sotto al vinctolo quadrato poi ritrovasi il cubo della terza parte del coefficiente del terzo termine dell'equazione, che nel presente caso, in cui si considerano le equazioni prive del secondo termine, diventa il secondo, quale cubo deve essere affetto dallo stesso segno del detto coefficiente, più il quadrato della metà dell'ultimo termine.

586. Quantunque considerando la formola $\sqrt[3]{-\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} +$

$\sqrt[3]{-\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}}$, che chiamasi Cardanica dal suo inventore Girolamo Cardano, sembri ella avere un sol valore, pure stante la combinazione dei segni ne può

A 2

può avere nove diversi. Di fatto facendosi $-\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3} = A$, si avrà $m^3 = A$, ed $m^3 - A = 0$, o sia $m^3 - 1 \times A = 0$, per lo che

$\sqrt[3]{-\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}}$ avrà, come abbiamo veduto tre diversi valori, de' quali

il primo è $1 \times A$, il secondo è $\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \times A$, il terzo è $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \times A$. E pa-

rimente dicendosi $-\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3} = B$, la formola $\sqrt[3]{-\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}}$

avrà tre diversi valori de' quali il primo è $1 \times B$, il secondo è $\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \times B$, il terzo è

$\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \times B$. Combinandosi poi ciascuno di questi tre valori con ciascuno degli

altri tre, ne risultano nove diversi valori. Ma di questi nove valori tre soli appartengono alla presente questione, e danno le tre radici dell'equazione, che sono, co-

me poc' anzi si è detto, $m+n$, $\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \times m + n \times \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$

$\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \times m + n \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$, avvegna che stante l'equazione $p = 3mn$, il pro-

dotto delle due parti m , n della radice debba essere $= \frac{1}{3}p$; cioè a dire sempre lo stesso, per lo che presi i due valori m , n , che hanno la forma reale, degli altri quelli solamente si devono insieme congiungere, che moltiplicati fra loro danno un va-

lore $= \frac{1}{3}p$: Ma siccome delle tre radici 1 ; $\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$; $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$ allora sol-

tanto, si ha lo stesso prodotto uguale ad 1 , quando si moltiplica o 1 per 1 , o

$\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$ per $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$, o $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$ per $\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$, perciò dei diver-

si modi, co' quali i detti due valori possono combinarsi, vagliono i soli tre dati al

num. 585.

587. Ho detto al num. 584, che quando è $\frac{1}{4}q^2 < \frac{1}{27}p^3$, l'equazione di terzo grado ha tutte tre le radici reali ineguali, e queste possono essere tutte tre razionali, e tali sono le radici dell'equazione $x^3 - 7x + 6 = 0$, delle quali la prima è $+1$, la seconda $+2$, la terza -3 ; o una razionale e due irrazionali, e tali sono le radici

dici dell'equazione $x^3 - 28x + 15 = 0$, delle quali la prima è 5, la seconda è $-2 + \sqrt{3}$, la terza è $-3 - \sqrt{3}$; o tutte tre irrazionali, e tali sono le radici dell'equazione $x^3 - 24x + 16 = 0$, delle quali la prima cade tra 0, ed 1, la seconda tra 4, e 5, la terza tra -5 , e -6 . E pure se si vorranno risolvere queste equazioni per mezzo della formola data al num. 585, la quantità radicale verrà negativa, e però la formola inchiuderà degli immaginari, lo che succederà sempre, ogniquale volta l'equazione da risolversi avrà questa forma $x^3 - px \pm q = 0$. Di fatto risolvendosi l'equazione $x^3 - 7x + 6 = 0$, fatte le debite sostituzioni nella formola generale

del num. 585, si ha $\sqrt[3]{-3 + \sqrt{-\frac{100}{27}}} + \sqrt[3]{-3 - \sqrt{-\frac{100}{27}}}$. Per l'equazione

$x^3 - 28x + 15 = 0$ si ha $\sqrt[3]{-\frac{15}{2} + \sqrt{-\frac{81733}{108}}} + \sqrt[3]{-\frac{15}{2} - \sqrt{-\frac{81733}{108}}}$. Per l'equa-

zione $x^3 - 24x + 16 = 0$ si ha $\sqrt[3]{-8 + \sqrt{-448}} + \sqrt[3]{-8 - \sqrt{-448}}$ ognuna delle quali radici inchiude degli immaginari, abbenchè le equazioni, dalle quali si ricavano, abbiano tutte tre le radici reali, e però esprimibili con formole algebriche. Ora questo inconveniente, che chiamasi il caso irriducibile, il quale ha dato tanto che fare agli Algebristi ne' passati tempi, nasce dalla maniera, con cui si risolvono queste equazioni.

588. Per dimostrare la verità di questa proposizione premetto ciò che ho osservato al num. 579, cioè che le equazioni, le quali si riferiscono a questa formola (A) $x^3 + px \pm q = 0$ hanno sempre due radici immaginarie, e le equazioni, che si riferiscono a questa formola (B) $x^3 - px \pm q = 0$ e possono avere due radici immaginarie, e possono avere tutte le radici reali; avranno due radici immaginarie se sarà $\frac{1}{4}q^2 > \frac{1}{27}p^3$, ma se sarà $\frac{1}{4}q^2 < \frac{1}{27}p^3$ le tre radici saranno reali, e ineguali. Sia pertanto da risolversi l'equazione $x^3 - 3ax \pm a^3 = 0$, che si riferisce alla formola (B). Fatto il paragone de' coefficienti de' corrispondenti termini si ha $3a^2 = p$, cioè

$a = \sqrt{\frac{1}{3}p}$, e $2a^3 = q$, vale a dire (fatta la sostituzione del ritrovato valore di a)

$e = \frac{2q}{2p}$. Che se sarà $a = e$, l'equazione proposta sarà $x^3 - 3a^2x - 2a^3 = 0$, le di cui radici sono $2a$, $-a$, $-a$, conseguentemente in questo caso la radice maggiore $2a$ è uguale a $\sqrt{\frac{4}{3}p}$; ma essendo $e > a$ l'equazione avrà due radici immaginarie, e

la radice maggiore sarà più grande di $2a$, o sia di $\sqrt{\frac{4}{3}p}$; essendo poi $e < a$, le tre radici dell'equazione saranno reali ineguali, e la radice maggiore sarà minore di $2a$, vale a dire di $\sqrt{\frac{4}{3}p}$. Ora quando giusta la regola Cardanica, fattasi la supposizione

ne

ne di $x = m + n$, si istituisce il paragone $3mn = \mp p$, ne nasce $n = \mp \frac{p}{3m}$, il qual valore sostituito in luogo di n nella supposizione di $x = m + n$, si avrà per le equazioni, che si riferiscono alla formola (A) $x = m - \frac{p}{3m}$; ed $x = m + \frac{p}{3m}$ per le equazioni, che si riferiscono alla formola (B). La prima espressione poi $m - \frac{p}{3m}$ può rappresentare qualunque grandezza reale, ma non già l'espressione $m + \frac{p}{3m}$, la quale non può esprimere le quantità minori di $\sqrt{\frac{4}{3}p}$. Di fatto sia x il valore corrispondente ad $m - \frac{p}{3m}$, da questa equazione $m - \frac{p}{3m} = x$, si ricavi il valore di m , e

si avrà $m = \frac{x \pm \sqrt{x^2 + \frac{4}{3}p}}{2}$, il qual radicale è sempre reale, qualunque sia il valore reale, che si assegna ad x , e però $m - \frac{p}{3m}$ può rappresentare qualunque quantità reale: Che se si farà $m + \frac{p}{3m} = x$, indi se ne deduca il valore di m , si avrà

$m = \frac{x \pm \sqrt{x^2 - \frac{4}{3}p}}{2}$ il qual radicale risultando immaginario allorchè è $x^2 < \frac{4}{3}p$, o sia $x < \sqrt{\frac{4}{3}p}$, ben si vede, che il valore di $x = m + \frac{p}{3m}$ non può essere qua-

lunque, ma egli deve essere o uguale, o maggiore di $\sqrt{\frac{4}{3}p}$. Allorchè pertanto giustifica la regola Cardanica si suppone $x = m + n$, vale a dire $x = m - \frac{p}{3m}$ relativamente alla formola (A), che ha sempre due radici immaginarie, questa supposizione è sempre possibile rispetto alla terza radice reale, mentre, come pur ora ho dimostrato questa espressione $x = m - \frac{p}{3m}$ può rappresentare qualunque quantità positiva, o negativa, e conseguentemente può rappresentare la radice reale dell'equazione, o sia questa supposizione deve portare a una formola reale, lo che pure ha da fare la supposizione di $x = m + \frac{p}{3m}$ rispetto all'equazione (B) allorchè ella ha due radici immaginarie, perchè in tal caso, come ho poc'anzi detto, la radice maggiore dell'equazione è sempre più grande di $\sqrt{\frac{4}{3}p}$, e l'espressione $m + \frac{p}{3m}$ può rappresenta-

re qualunque grandezza maggiore di $\sqrt{\frac{4}{3}p}$. Ma siccome nel caso, che le tre radici dell'equazione (B) sono reali, e disuguali, la radice maggiore dell'equazione (poichè l'equazione manca del secondo termine, ella ha una radice maggiore uguale alla somma dell'altre due, che devono essere affette da segno contrario) essendo sempre minore di $\sqrt{\frac{4}{3}p}$, e l'espressione $m + \frac{p}{3m}$ non potendo rappresentare un valore minore di $\sqrt{\frac{4}{3}p}$, chiaramente s'intende, che questa espressione non può rappresentare tale radice; onde è, che essendo impossibile l'ipotesi di $x = m + \frac{p}{3m}$, ella perciò deve dare per la radice cercata una formola impossibile, o sia immaginaria. Quando poi delle tre radici dell'equazione (B) due sono uguali, la supposizione $m + \frac{p}{3m}$ è pure possibile rispetto alla radice maggiore, poichè in questo caso la radice maggiore è uguale a $\sqrt{\frac{4}{3}p}$, il qual valore, come ho detto, può essere rappresentato da $m + \frac{p}{3m}$: Quindi essendo possibile l'ipotesi, sarà pure possibile la formola radicale, che da essa nasce, o sia tale formola nulla conterrà d'immaginario. Per discendere al caso pratico proporrò da risolverli il seguente Problema.

E S E M P I O.

589. Prob. Uno Sciabecco Turco avendo veduto in distanza di miglia 18 un Pinco Cristiano, si mette ad inseguirlo. La velocità dello Sciabecco sta alla velocità del Pinco, come il 4 accresciuto del viaggio fatto dal Pinco dal punto, in cui fu scoperto fino al punto, in cui è stato raggiunto, sta a 63 diviso pel viaggio in questo frattempo fatto dallo Sciabecco. Cercasi il numero delle miglia, dopo le quali lo Sciabecco raggiungerà il Pinco.

590. Risol. Il viaggio fatto dal Pinco si dica $= y$, il viaggio fatto dallo Sciabecco sarà $y + 18$. La velocità dello Sciabecco sarà $y + 2$, e quella del Pinco $= \frac{63}{y + 18}$. Poichè tanto lo Sciabecco, come il Pinco fanno il loro rispettivo viaggio nello stesso tempo, e lo spazio percorso diviso per la velocità è uguale al tempo, quindi si avrà tosto la ricercata equazione, che è $\frac{y + 18}{y + 2} = \frac{y}{\frac{63}{y + 18}}$, cioè

$\frac{y + 18}{y + 2} = \frac{y^2 + 18y}{63}$, e però $y^3 + 18 + 2 \times y^3 + 36 - 63 \times y - 1134 = 0$, vale a dire $y^3 + 20y^2 - 27y - 1134 = 0$. Si liberi questa equazione dal secondo termine con porre $y = z - \frac{20}{3}$, mediante la quale sostituzione si ha

y^3

$$\begin{array}{rcl}
 y^3 & = & x^3 - 20x^2 + \frac{400}{3}x - \frac{8000}{27} \\
 20y^2 & = & + 20x^2 - \frac{800}{3}x + \frac{8000}{9} \\
 -27y & = & - 27x + \frac{540}{3} \\
 -1134 & = & - 1134
 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} y^3 \\ 20y^2 \\ -27y \\ -1134 \end{array}} \right\} = 0$$

cioè $x^3 - \frac{481}{3}x - \frac{2718}{27} = 0$

591. Ora per risolvere questa equazione si prenda la formola del num. 585., che è $\sqrt[3]{-\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}}$. Dal paragone della nostra equazione coll' equazione generale $x^3 + px + q = 0$ si ha $p = -\frac{481}{3}$, e $q = -\frac{2718}{27}$; che però fatta la sostituzione di questi valori nella formola della radice, essa si cambierà nelle seguenti.

$$\sqrt[3]{\frac{4879}{27} + \sqrt{-\frac{87480000}{729}}} + \sqrt[3]{\frac{4879}{27} - \sqrt{-\frac{87480000}{729}}}$$

cioè $\sqrt[3]{\frac{4879 + 5400\sqrt{-3}}{3}} + \sqrt[3]{\frac{4879 - 5400\sqrt{-3}}{3}}$

Le altre due radici poi si avranno giusta il num. 585., le quali faranno $x =$

$$\begin{aligned}
 & \sqrt[3]{\frac{4879 + 5400\sqrt{-3}}{3}} \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} + \sqrt[3]{\frac{4879 - 5400\sqrt{-3}}{3}} \times \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \\
 \text{e } x = & \sqrt[3]{\frac{4879 + 5400\sqrt{-3}}{3}} \times \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} + \sqrt[3]{\frac{4879 - 5400\sqrt{-3}}{3}} \times \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}.
 \end{aligned}$$

Ma siccome l'equazione $y^3 + 20y^2 - 27y - 1134 = 0$ si è trasformata per liberarla dal secondo termine, e la trasformazione è stata fatta con accrescere le sue radici di $\frac{20}{3}$, quindi è, che le radici ora trovate devonfi diminuire di $\frac{20}{3}$, e però la prima

radice farà $x = \sqrt[3]{\frac{4879 + 5400\sqrt{-3}}{3}} + \sqrt[3]{\frac{4879 - 5400\sqrt{-3}}{3}} - \frac{20}{3}$, la seconda ec.

Ed

Ecco pertanto, che il proposto Problema avendo tre radici reali, la formola ce le esibisce sotto forma immaginaria. Ora per disimpegnare questa formola dagli immaginari, onde avere le cercate radici, bisognerebbe risolvere in serie (lo che inferirò più abbasso) i due di lei termini, nel qual modo vengonsi ad elidere i termini, che contengono quantità immaginarie, e vi restano i soli termini reali, che danno i valori cercati. Alle volte si può ancora ciò ottenere mediante l'estrazione della radice cuba da una parte, e dall'altra, come or ora dirò.

592. Si osservi intanto, che le radici della ritrovata equazione $y^3 + 20y^2 - 27y - 1134 = 0$ sono 7, -9, -18, (come vedremo fra poco, e al num. 707.), delle quali la prima 7, che è l'unico valore cercato, ci fa sapere, che il Pinco dopo avere fatte 7 miglia sarà raggiunto dallo Sciabecco. Ma siccome il Calcolo nella soluzione de' Problemi, come ho detto al num. 26, dà i valori per tutti i casi, ne quali può essere proposto il Problema, e nel presente tre cose potevansi supporre, la prima che il Pinco fuggisse lo Sciabecco, da cui fosse inseguito; la seconda, che il Pinco, e lo Sciabecco si venissero incontro; la terza che stando fermo lo Sciabecco, il Pinco venisse verso di lui; però la soluzione trovarà ci esibisce i valori per ciascuna di queste supposizioni. Per la prima ci dà la radice reale positiva 7, per la seconda ci dà la negativa -9, e finalmente per la terza ci dà l'altra negativa -18.

Potrebbe accadere, che nel levare il secondo termine da un'equazione di terzo grado (e lo stesso si dica di qualunque altra equazione) si ritrovasse un'equazione trasformata mancante di tutti i termini a riserva del primo, in cui l'incognita ascende alla massima potenza. Quando ciò succede egli è segno, che la quantità, di cui si sono accresciute, o diminuite (giusta il num. 496.) le radici dell'equazione proposta a fine di avere una trasformata mancante del secondo termine, è appunto la radice reale dell'equazione data. Ciò si veda nel seguente Esempio, in cui è proposto di levare il secondo termine dall'equazione $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0$. Per avere

la trasformata mancante del secondo termine bisogna fare $x = y + \frac{6}{3}$, cioè $x = y + 2$, indi procedere alle sostituzioni come segue

$$\left. \begin{array}{rcl} x^3 & = & y^3 + 6y^2 + 12y + 8 \\ - 6x^2 & = & - 6y^2 - 24y - 24 \\ + 12x & = & + 12y + 24 \\ - 8 & = & - 8 \end{array} \right\} = 0$$

Trasformata $y^3 = 0$

Ed ecco, che nella trasformata spariscono tutti i termini a riserva di y^3 , le di cui radici sono $y=0$, $y=0$, $y=0$. Ciò poi fa vedere, che il 2, di cui mediante la trasformazione si sono diminuite le radici dell'equazione $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0$, è la di lei radice, lo che è ben evidente, perchè le radici della nuova equazione trasformata non possono essere tutte uguali a zero, se non in caso, che la quantità, di cui sono state aumentate, o diminuite, come nel presente Esempio le radici dell'equazione da trasformarsi, sia loro uguale, onde mediante la contrarietà di segno le riduca a zero. Ciò poi non potrà succedere, se non in caso, che l'equazione proposta, o abbia una sola radice, o avendone più d'una, esse siano tutte uguali.

Abbiamo trovato, che la radice di una equazione cubica costa di due radicali di questa forma $\sqrt[3]{a+\sqrt{b}} + \sqrt[3]{a-\sqrt{b}}$, supponendosi $\frac{1}{2}q=a$, $\sqrt{\frac{1}{4}q^2+\frac{1}{27}p^3}=\sqrt{b}$. Ora molte volte dall' uno, e dall' altro di questi radicali cubici si può estrarre la radice cuba: darò pertanto il modo di farlo; e perchè uno di questi radicali, come $\sqrt[3]{a+\sqrt{b}}$ non differisce dall' altro $\sqrt[3]{a-\sqrt{b}}$, se non nel segno prefisso alla quantità $\sqrt{b}$, però basterà estrarre la radice da uno per avere ancora la radice dell' altro, che non gli differirà, se non nel segno prefisso alla seconda parte. Si debba adunque estrarre la radice cuba da $a+\sqrt{b}$, che si indica così $\sqrt[3]{a+\sqrt{b}}$. Suppongo, che essa sia $x+\sqrt{y}$;

si avrà perciò $\sqrt[3]{a+\sqrt{b}}=x+\sqrt{y}$. Si inalzi al cubo l' uno, e l' altro membro di questa equazione, e ne verrà $a+\sqrt{b}=x^3+3x^2\sqrt{y}+3xy+\sqrt{y}$. Si paragonino le quantità razionali alle razionali, e le irrazionali alle irrazionali, con che si otterranno le due seguenti equazioni $a=x^3+3xy$, e $\sqrt{b}=3x^2\sqrt{y}+\sqrt{y}$: E siccome si hanno due indeterminate x, y con due equazioni, però per mezzo loro si elimini una indeterminata, come y , e si ritrovi il valore dell' altra x , indi si passi a ritrovare il valore dell' altra indeterminata y come segue. Dall' una, e dall' altra delle precedenti equazioni si prenda il valore di y , che rispetto alla prima sarà $y=\frac{a-x^3}{3x^2}$, rispetto

alla seconda sarà $y=\frac{\sqrt{b}-3x^2\sqrt{y}}{\sqrt{y}}$, e paragonando questi due valori si avrà $\frac{a-x^3}{3x^2}=\frac{\sqrt{b}-3x^2\sqrt{y}}{\sqrt{y}}$, cioè $a\sqrt{y}-x^3\sqrt{y}=3x\sqrt{b}-9x^3\sqrt{y}$, e però $a\sqrt{y}+8x^3\sqrt{y}=3x\sqrt{b}$, conseguentemente $\sqrt{y}=\frac{3x\sqrt{b}}{a+8x^3}$, che inalzata al quadrato è $y=$

$\frac{9bx^2}{a^2+16ax^3+64x^6}$: Ma dalla prima equazione si è avuto $y=\frac{a-x^3}{3x^2}$. Si paragonino pertanto questi due valori, e si avrà finalmente l'equazione senza y , che è $\frac{9bx^2}{a^2+16ax^3+64x^6}=\frac{a-x^3}{3x^2}$, cioè $27bx^2=a^2+16a^2x^3+64ax^6-a^2x^3-16ax^6-54x^9$, vale a dire $64x^9-48ax^6-15a^2x^3+27bx^2-a^2=0$. Questa equazione poi quantunque di nono grado è derivativa del terzo, al quale si ridurrà, e insieme si libererà il massimo termine dal coefficiente con supporre $x^3=\frac{1}{8}z$, lo che

riduce l'equazione trovata alla seguente $\frac{1}{8}z^3-\frac{3}{4}az^2-\frac{15a^2+27b}{8}xz-a^2=0$, cioè $z^3-6az^2-15a^2+27bXz-8a^2=0$. Risolvendosi questa equazione, si avrà il valore di z , e conseguentemente quello di x , che farà $x=\frac{1}{2}\sqrt[3]{z}$, perchè si è supposto $x^3=\frac{1}{8}z$. Ma per facilitare questa risoluzione si offervi, che

l' indeterminata x rappresentando la prima parte della cercata radice, la quale prima parte deve essere razionale, farà razionale il valore di x , e però $x^3 = \frac{1}{8}z$,

cioè $8x^3 = z$ farà pure razionale; quindi essendo razionale il valore di x , farà eziandio razionale la radice cuba di z a motivo della stessa equazione $8x^3 = z$, perchè non può essere razionale la radice comunque n di un membro di una equazione, senza che sia parimente razionale la stessa radice dell' altro membro, altrimenti questi due membri non farebbero uguali. Essendo poi razionale la radice cuba di z , che dà il valore di $2x$, questo valore si dovrà prendere da quei soli divisori dell' ultimo termine $-8a^3$, dai quali si può estrarre la radice cuba; imperocchè essendo razionale il valore di z , devesi egli ritrovare tra i divisori dell' ultimo termine dell' equazione; dunque essendo razionale la radice cuba di z , il suo valore sarà somministrato dalla radice cuba di uno de' divisori dello stesso ultimo termine: E siccome la radice cuba dei divisori devesi trovare tra i divisori della radice cuba dell' ultimo termine, però il divisore, che deve essere il valore di $2x$, ha da essere un divisore di $2a$, o sia x un divisore di a : Che se tra i divisori dell' ultimo termine $8a^3$ niuno vi farà, che si assoggetti alla detta condizione, dal proposto radicale non si potrà estrarre la radice cuba, ciò che molte volte ancora succederà, benchè tra i divisori di $8a^3$ ve ne sieno di quelli, che si assoggettano alla detta legge. Ritro-

vato il valore di x , si troverà il valore di y mediante l' equazione $y = \frac{a-x^3}{3x}$ con sostituirci in luogo di x il suo ritrovato valore. Supposto pertanto, che la ritrovata radice sia $x + \sqrt{y}$, la radice dell' equazione sarà $x + \sqrt{y} + x - xy = 2x$. Si osservi, che se il radicale, da cui devesi estrarre la radice cuba avrà un divisore, all' assunta radice indeterminata devesi dare eziandio il suo conveniente divisore, che deve essere la radice cuba del denominatore del radicale dato, la quale farà sempre cognita: Per esempio dovendosi estrarre la radice cuba da $\frac{a + \sqrt{\pm b}}{c^3}$, si dovrà sup-

porre $\sqrt[3]{\frac{a + \sqrt{\pm b}}{c^3}} = \frac{x + \sqrt{\pm y}}{c}$. Vengo all' esempio, nel quale determinerò le radici dell' equazione $y^3 + 20y^2 - 27y - 1134 = 0$ trovata al numero 590. Dalla trasformazione di questa equazione si è avuta l' altra $x^3 - \frac{481}{3}x - \frac{9758}{27} = 0$, di cui una radice si è trovata essere

$$\sqrt[3]{\frac{4879}{27}} + \sqrt[3]{-\frac{87480000}{729}} + \sqrt[3]{\frac{4879}{27}} - \sqrt[3]{-\frac{87480000}{729}}. \text{ Poichè la radice cuba}$$

della prima parte di questa formola non differisce in altro dalla radice cuba della seconda parte, che nel segno prefisso al vincolo quadrato, però basterà estrarre la

$$\text{radice cuba dalla prima parte } \sqrt[3]{\frac{4879}{27}} + \sqrt[3]{-\frac{87480000}{729}}, \text{ o sia}$$

$\sqrt[3]{\frac{4879 + \sqrt{-87480000}}{27}}$, che fatta uguale a $\sqrt[3]{\frac{a+\sqrt{b}}{c^3}} = \frac{x+\sqrt{y}}{c}$, si ha

$a=4879$, $b=-87480000$, $c=3$. Si ometta per ora il divisore $c=3$, che si riasumerà dopo essersi trovata la radice $x+\sqrt{y}$. Si sostituiscano nell'equazione $x^3-6ax^2-15a^2x+27b \div x-8a^3=0$ i valori di a, b , con che essa si cambierà nella seguente $x^3-29274x^2-2719029615x-929142747512=0$. I divisori di quest'ultimo termine, da quali si può estrarre la radice cuba sono 343, che ha 7 per radice cuba, 68921, la di cui radice cuba è 41, e 39304, che ha 34 per radice cuba. Il primo divisore 343, e il terzo 39304 sostituiti affetti dal segno + in luogo di x nell'equazione non la fanno verificare, ma la fanno verificare sostituiti col segno -, il secondo divisore poi 68921 la fa verificare sostituito col segno +, dunque le tre radici di questa equazione sono $x=-343$, $x=$

68921 , $x=-39304$. Ma $x = \frac{1}{3}\sqrt[3]{z}$, però sarà $x = -\frac{7}{3}$, $x = \frac{41}{3}$, $x = -\frac{34}{3}$.

Per avere i valori di y si prenda l'equazione $y = \frac{a-x^3}{3x}$, e in luogo di x , ed x^3 si sostituisca $-\frac{7}{3}$, e il cubo di $-\frac{7}{3}$, con che si avrà $y = -\frac{1875}{4}$; poscia vi si sostituisca $\frac{41}{3}$, e il cubo di $\frac{41}{3}$, e ne verrà $y = \frac{243}{4}$, finalmente sostituendo il cubo di $-\frac{34}{3}$ in luogo di x^3 , e $-\frac{34}{3}$ in vece di x , si avrà $y = -\frac{768}{4}$. Quindi mettendo nella radice assunta $\frac{x+\sqrt{y}}{c}$ questi trovati valori di x, y , e il suo divisore

$c=3$, si avranno le tre seguenti radici del radicale $\sqrt[3]{\frac{4879 + \sqrt{-87480000}}{27}}$ che sono $-\frac{7}{6} + \sqrt[3]{-\frac{1875}{36}}$; $\frac{41}{6} + \sqrt[3]{\frac{243}{36}}$; $-\frac{34}{6} + \sqrt[3]{-\frac{768}{36}}$. Le stesse pure faranno

le radici del radicale $\sqrt[3]{\frac{4879 - \sqrt{-87480000}}{27}}$; se non che il segno prefisso al vincolo quadrato farà -; e però le radici espresse da questa formola

$$\sqrt[3]{\frac{4879 + \sqrt{-87480000}}{27}} + \sqrt[3]{\frac{4879 - \sqrt{-87480000}}{27}}$$

sono (A) $-\frac{7}{6} + \sqrt[3]{-\frac{1875}{36}} - \frac{7}{6} - \sqrt[3]{-\frac{1875}{36}}$; (B) $\frac{41}{6} + \sqrt[3]{\frac{243}{36}} + \frac{41}{6} - \sqrt[3]{\frac{243}{36}}$

$-\sqrt{\frac{24}{36}}$; (C) $-\frac{34}{6} + \sqrt{-\frac{768}{36}} = -\frac{34}{6} - \sqrt{-\frac{768}{36}}$, cioè (A) $-\frac{14}{6} = -\frac{7}{3}$, (B) $\frac{81}{6} = \frac{41}{2}$; (C) $-\frac{68}{6} = -\frac{34}{3}$. Ma da ciascuna di queste radici devonsi levare $\frac{27}{3}$, perchè coll'esserli trasformata l'equazione $y^3 + 20y^2 - 27y - 1134 = 0$ si è aumentata di $\frac{27}{3}$ ciascuna delle sue radici; dunque una delle radici di questa equazione è $-\frac{7}{3} - \frac{27}{3} = -\frac{34}{3} = -9$, la seconda è $\frac{41}{3} - \frac{27}{3} = \frac{14}{3} = 7$; e la terza è $-\frac{34}{3} - \frac{27}{3} = -\frac{61}{3} = -18$, che si dovevano trovare.

ARTICOLO VII.

Della risoluzione delle equazioni di quarto grado.

593. Per procedere ordinatamente comincerò dalla risoluzione delle equazioni di quarto grado pure, delle quali la formola generale è $x^4 \pm p = 0$. La risoluzione di queste equazioni si ottiene mediante la replicata estrazione della radice quadrata. Debbaasi risolvere l'equazione $x^4 \pm 1 = 0$, cioè $x^4 = \mp 1$. Si estraiga la radice quadrata dall'uno, e dall'altro membro dell'equazione, e si avrà $x^2 = \pm \sqrt{\mp 1}$, da cui levando di nuovo la radice quadrata, ne verrà

$x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{\mp 1}}$, che sono le quattro radici dell'equazione proposta, cioè

$x = \sqrt{+\sqrt{+1}}$, $x = -\sqrt{+\sqrt{+1}}$, $x = \sqrt{-\sqrt{-1}}$, $x = -\sqrt{-\sqrt{-1}}$. Se pertanto l'equazione data farà $x^4 + 1 = 0$, le di lei radici faranno tutte quattro immaginarie cioè $x = \sqrt{+\sqrt{-1}}$, $x = -\sqrt{+\sqrt{-1}}$, $x = \sqrt{-\sqrt{+1}}$, $x = -\sqrt{-\sqrt{+1}}$. Se poi l'equazione data farà $x^4 - 1 = 0$, ella avrà due radici reali, cioè $+1, -1$ e due immaginarie, che sono $\sqrt{-1}, -\sqrt{-1}$.

594. Nel punto diversa è la risoluzione dell'equazione $x^4 \pm p = 0$. Primieramente vi si estraiga la radice quadrata, e si avrà $x^2 = \pm \sqrt{\mp p}$; da cui levando pure la radice quadrata, ne verrà $x = \pm \sqrt{\pm \sqrt{\mp p}}$, in cui la diversa combinazione de' segni dà le quattro radici dell'equazione data $x^4 \pm p = 0$, la quale avrà tutte le radici immaginarie, qualora abbia luogo il segno superiore $+$, e le varrà il segno inferiore $-$, due faranno reali, una positiva, e l'altra negativa, cioè

$x = +\sqrt{+\sqrt{p}}$, $x = -\sqrt{+\sqrt{p}}$, e le altre due immaginarie.

595. Quanto alle equazioni di quarto grado di questa forma $x^4 \pm p x^2 + q = 0$, che chiamansi immuni da affezione cubica, già ne ho dato la risoluzione al num. 411. Per iscuoprire immediatamente la natura delle radici di questa equazione $x^4 + p x^2 + q = 0$, si faccia $x^2 = z$, e fatte le debite sostituzioni, l'equazione data si cambie-

bierà in quest' altra $x^4 + px + q = 0$, le di cui radici determineranno la natura di quelle della proposta; imperocchè se ella avrà due radici reali, e positive, le quattro radici dell' equazione $x^4 + px^2 + q = 0$ saranno parimente reali, ma due positive, e due negative: Se poi essendo reali le due radici dell' equazione $x^4 + px + q = 0$, una sarà positiva, e l'altra negativa, delle quattro radici dell' equazione $x^4 + px^2 + q = 0$ due saranno immaginarie, e due reali, una positiva, e l'altra negativa. Finalmente se le due radici dell' equazione $x^4 + px + q = 0$ saranno, o negative, o immaginarie, tutte quattro le radici dell' equazione $x^4 + px^2 + q = 0$ saranno immaginarie.

596. Veniamo adesso alle equazioni di quarto grado affette mancanti del secondo termine, giacchè (pel num. 496.) tali si possono sempre rendere, qualora non lo siano, delle quali la formola generale è $x^4 \pm px^2 \pm qx \pm r = 0$ in cui le lettere p, q, r esprimono qualsivoglia quantità positiva, o negativa. Riguardo poi ai segni ne nascono le seguenti otto formole

I	$x^4 + px^2 + qx + r = 0$
II	$x^4 + px^2 + qx - r = 0$
III	$x^4 + px^2 - qx - r = 0$
IV	$x^4 + px^2 - qx + r = 0$
V	$x^4 - px^2 + qx + r = 0$
VI	$x^4 - px^2 + qx - r = 0$
VII	$x^4 - px^2 - qx - r = 0$
VIII	$x^4 - px^2 - qx + r = 0$

597. Di queste formole la prima, la seconda, la terza, e l'ottava contengono due radici immaginarie giusta il num. 502, e però tutte le equazioni, che a loro si riferiranno avranno per lo meno due radici immaginarie.

598. Tutte le equazioni affette corrispondenti a qualcuna delle precedenti formole contengono affezione cubica; mentre la loro risoluzione dipende da una equazione di terzo grado, come fra poco vedremo. Esse poi cadranno nel caso irriducibile ogniquivolta hanno tutte le radici reali; poichè da loro derivano equazioni cubiche, che hanno parimente tutte le radici reali.

599. Osserviamo frattanto che forma possano avere le radici reali irrazionali di queste equazioni immuni da' radicali. Primieramente la loro forma non può essere questa $\sqrt{m}$, poichè col farsi $\sqrt{m} = x$, se si sostituirà questo valore nell' equazione $x^4 + px^2 + qx + r = 0$, si avrà $m^2 + pm + q\sqrt{m} + r = 0$, in cui il termine $q\sqrt{m}$ non potendo essere distrutto da alcun altro, perchè una quantità radicale può essere solamente distrutta da un'altra radicale uguale, e affetta da segno contrario: non potendosi adunque verificare l'equazione, le di lei radici non possono avere questa forma $\sqrt{m}$. Per la stessa ragione le di lei radici non possono avere questa

altra forma, $\sqrt[3]{m}$ nè $\sqrt[4]{m}$. Se si prenderà la radice della forma $\sqrt{n \pm \sqrt{m}}$, quale si sostituisca nella formola generale $x^4 + px^2 + qx + r = 0$, si avrà $n^2 + 2n\sqrt{m} + m$

+ $pn + p\sqrt{m} + q\sqrt{n + \sqrt{m}} + r = 0$, la quale equazione non può verificarsi, se non manca il termine qx , onde l'equazione abbia la forma seguente $x^4 + px^2 + r = 0$,
la

la quale appunto ha le radici della forma $\sqrt{n \pm \sqrt{m}}$, come si è veduto al num. 411, ove si è data la soluzione di queste equazioni, nel qual caso l'equazione risulta $n^2 + 2n\sqrt{m} + m + pn + p\sqrt{m} + r = 0$, per lo che deve essere $n = -\frac{1}{2}p$, che nasce da $2n\sqrt{m} = -p\sqrt{m}$, ed $m = \frac{1}{4}p^2 - r$, che nasce da $n^2 + m + pn + r = 0$, in cui si è sostituito in luogo di n il suo ritrovato valore $-\frac{1}{2}p$, i quali valori di m , n

sostituiti nella proposta radice $\sqrt{n + \sqrt{m}}$, danno $x = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - r}}$, lo che dà la risoluzione di queste equazioni, come si era ritrovata al num. 411. Parimente la radice non può avere questa forma $\sqrt{n + \sqrt{m}}$, o pure $\sqrt{m + \sqrt{n + \sqrt{t}}}$ ec., nè meno

$\sqrt{n + \sqrt[3]{m}}$, nè $\sqrt[3]{m + \sqrt[3]{n}}$. Ella può bensì essere $n + \sqrt{m}$, il qual valore sostituito in luogo di x nell'equazione $x^4 + px^2 + qx + r = 0$ dà $n^4 + 4n^3\sqrt{m} + 6n^2m + 4mn\sqrt{m} + m^2 + pn^2 + 2pn\sqrt{m} + pm + qn + q\sqrt{m} + r = 0$, in cui deve essere $4n^3 + 4mn + 2pn + q = 0$, ed $n^4 + 6n^2m + m^2 + pn^2 + pm + qn + r = 0$.

600. Le equazioni di quarto grado possono risultare, o da quattro fattori di primo grado, o da due fattori di secondo grado, o da due fattori uno del primo, e l'altro del terzo grado. Le loro radici possono essere o tutte quattro reali, o tutte quattro immaginarie, o due reali, e due immaginarie (pel num. 484.) Il modo di determinare se una data equazione di quarto grado include radici immaginarie, e quale è il loro numero, si ripeta dal num. 512.

601. Prima di venire alla risoluzione delle equazioni di quarto grado m' è d'uopo premettere il seguente

602. Lemma. In qualsivoglia quadrato costante di tre termini, e la di cui radice è un binomio, il prodotto dei due termini estremi è uguale al quadrato della metà del termine di mezzo, e *vice versa* se di un proposto trinomio il prodotto dei termini estremi farà uguale al quadrato della metà del termine di mezzo, tale trinomio sarà un quadrato, di cui si avrà la radice con prendere le radici dei termini estremi, e unirle insieme collo stesso segno, da cui è affetto il termine di mezzo.

603. Dim. Il trinomio sia $m \pm pq + n$, il quale essendo un quadrato, o acciò sia un quadrato, dovrà verificarsi $mn = \frac{1}{4}p^2q^2$, nel qual caso la radice quadrata del proposto trinomio è $\sqrt{m \pm \sqrt{n}}$. Di fatto si alzi al quadrato questa radice, e si avrà $\sqrt{m \pm \sqrt{n}}^2 = m \pm 2\sqrt{mn} + n$. Ma essendo $\frac{1}{4}p^2q^2 = mn$, farà $p^2q^2 = 4mn$, e però $\pm pq = 2\sqrt{mn}$, dunque fatta la sostituzione di questo valore, si avrà

$\sqrt{m \pm \sqrt{n}}^2 = m \pm pq + n$ trinomio dato. Lo che si doveva dimostrare.

604. Sia proposta da risolversi l'equazione $x^4 + xp^2 + qx + r = 0$ mancante del secondo termine, il che si può sempre ottenere mediante il num. 496, e in cui le lettere p, q, r rappresentino quali si siano quantità positive, o negative. Dispon-

go pertanto primieramente l'equazione così $x^4 + px^2 = -qx - r$, poscia, assunto una quantità indeterminata m da determinarsi poscia col calcolo, e moltiplicata in x^2 la aggiungo all'uno, e all'altro membro dell'equazione (lo che non turba l'eguaglianza pel num. 45. del I. Tomo.) in questo modo $x^4 + px^2 + mx^2 = mx^2 -$

$qx - r$, o sia $x^4 + \overline{p+m} x^2 = m X x^2 - \frac{q}{m} x - \frac{r}{m}$. Ora affinché il primo membro di questa equazione sia un quadrato perfetto bisogna aggiungerci (pel num. 395.) il quadrato della metà del coefficiente del secondo termine, con che si ha $x^4 +$

$$\overline{p+m} X x^2 + \frac{\overline{p+m}^2}{4} = m X x^2 - \frac{qx}{m} - \frac{r}{m} + \frac{\overline{p+m}^2}{4m} : \text{Quindi estraendo da ambi i}$$

membri la radice quadrata, ne viene $x^2 + \frac{\overline{p+m}}{2} = \sqrt{m X x^2 - \frac{qx}{m} - \frac{r}{m} + \frac{\overline{p+m}^2}{4m}}$.

Ma affinché anche il secondo membro sia un quadrato perfetto, bisogna che l'assunta quantità indeterminata m sia tale, che (pel num. 602.) il prodotto degli estremi di questo secondo membro sia uguale al quadrato della metà del termine di mezzo, cioè (omettendo la quantità m , che moltiplica tutto il secondo membro)

$$\frac{q^2 x^2}{4m^2} = x^2 X - \frac{r}{m} + \frac{\overline{p+m}^2}{4m}, \text{ cioè (fatta la divisione per } x^2) \frac{q^2}{4m^2} = -\frac{r}{m} + \frac{\overline{p+m}^2}{4m},$$

nel qual caso il secondo membro (fatta la sostituzione dell'anzidetto valore) farà

$$\sqrt{m X x^2 - \frac{qx}{m} + \frac{q^2}{4m^2}}, \text{ e però fatta l'attuale estrazione della radice } \sqrt{m} X x - \frac{q}{2m}.$$

Mediante adunque l'estrazione della radice quadrata da ambi i membri della prece-

dente equazione, si ha $x^2 + \frac{\overline{p+m}}{2} = \sqrt{m} X \pm x \mp \frac{q}{2m}$, conseguentemente $x^2 \mp x \sqrt{m}$

$$\pm \frac{q \sqrt{m}}{2m} + \frac{\overline{p+m}}{2} = 0; \text{ ma perchè } \frac{\sqrt{m}}{m} = \frac{1}{\sqrt{m}}, \text{ farà } x^2 \mp x \sqrt{m} \pm \frac{q}{2 \sqrt{m}} + \frac{\overline{p+m}}{2} = 0,$$

la quale equazione a motivo dell'ambiguità dei segni dà i due trinomj di secondo grado, ne quali si risolve la proposta equazione di quarto grado.

605. Di fatto moltiplicando fra loro questi due trinomj ne risulterà la data equazione di quarto grado. Ecco il calcolo.

$$x^2 - x\sqrt{m} + \frac{q}{2\sqrt{m}} + \frac{p+m}{2} = 0$$

$$x^2 + x\sqrt{m} - \frac{q}{2\sqrt{m}} + \frac{p+m}{2}$$

$$x^4 - m^2\sqrt{m} + \frac{qx^2}{2\sqrt{m}} + \frac{p+m}{2} \times x^3 + \frac{qx}{2} + \frac{p+m}{2} \times x\sqrt{m} - \frac{q^2}{4m} - \frac{q}{2\sqrt{m}} \times \frac{p+m}{2} + \frac{p+m}{4} = 0$$

$$+ x^2\sqrt{m} - \frac{mx^2}{2} + \frac{p+m}{2} \times x^2 + \frac{qx}{2} - \frac{p-m}{2} \times x\sqrt{m} - \frac{q}{2\sqrt{m}} \times \frac{p+m}{2} - \frac{qx^2}{2\sqrt{m}}$$

$$\text{cioè } x^4 - mx^3 + \frac{p+m}{2} \times x^3 + qx - \frac{q^2}{4m} + \frac{p-m}{4} = 0$$

in cui rimettendo in luogo di $\frac{q^2}{4m}$ il suo valore, che è $-\frac{r}{m} + \frac{p+m}{4m}$, si ha final-

mente $x^4 + \frac{p+m}{2} \times x^3 = mx^3 - qx - r$, che è l'equazione prefata a risolverfi. Si vede pertanto, che i due ritrovati trinomj sono le due equazioni di secondo grado componenti l'equazione del quarto. Una poi di queste due equazioni di secondo grado deve avere il secondo termine positivo, e l'altra negativo collo stesso coefficiente, perchè il loro prodotto deve dare una equazione di quarto grado priva del secondo termine.

606. Questo metodo serve ancora per le equazioni di quarto grado affette dal secondo termine, ma l'equazione, che serve a determinare il valore di m , e che fra poco verrò a trovare, risulta più complicata, e però torna più comodo toglierla prima, se v'è, il secondo termine.

607. Collo stesso metodo si risolvono le equazioni di questa forma $x^{4n} + px^{3n} + qx^{2n} + rx^n + s = 0$, qualunque sia il valore di n , poichè facendosi $y = x^n$ la propolita si riduce a $y^4 + py^3 + qy^2 + ry + s = 0$.

607. Passiamo adesso a determinare quale debba essere il valore dell'afflunta indeterminata m , affinchè i due ritrovati trinomj abbiano luogo: Per avere l'equazione, da cui ricavare il ricercato valore di m , riprendo la supposta equazione $\frac{q^2}{4m^2}$

$$= -\frac{r}{m} + \frac{p+m}{4m}, \text{ che moltiplico per } m, \text{ onde mi viene } \frac{q^2}{4m} = -r + \frac{p+m}{4},$$

che liberata dai denominatori è $q^2 = -4rm + m \times \frac{p+m}{4}$, e però $m^2 + 2pm^2$

Tom. II.

C c

$+p'm - q^2 = 0$. Questa equazione essendo di terzo grado ha per lo meno una ra-

dice reale (giusta il num. 472.), che però ritrovata essendosi questa radice reale, se ella si sostituirà in luogo di m ne due sovrapposti trinomj, niente altro più resterà per avere le cercate radici dell'equazione di quarto grado, che estrarre da ciascun di loro la radice quadrata: Che però supposto determinato il valore di m , si estra-

ga la radice quadrata dall'equazione $x^2 \mp x\sqrt{m} \pm \frac{q}{2\sqrt{m}} + \frac{p+m}{2} = 0$, e si avrà $x =$

$$\pm \frac{\sqrt{m}}{2} \pm \sqrt{\mp \frac{q}{2\sqrt{m}} - \frac{2p-m}{4}}, \text{ la qual formola stante l'ambiguità dei segni dà tutte}$$

quattro le cercate radici.

607. La data risoluzione dimostra abbastanza come qualunque equazione di quarto grado si possa risolvere in due trinomj di secondo grado: Siccome poi in questi trinomj entra la quantità $\sqrt{m}$, però essi saranno reali, quando la quantità m sia positiva, e pel contrario saranno immaginari, se m sarà negativa; e poichè il valore di m si ha da una equazione di terzo grado, però egli potrà sempre essere reale (pel num. 472.); in oltre l'equazione di terzo grado essendo $m^3 + 2pm^2 + p'm -$

$q^2 = 0$, cioè avendo sempre l'ultimo termine negativo, mentre qualunque sia q positivo, o negativo il valore di q , il suo quadrato è sempre positivo, ella ha (pei num. 479, 580) per lo meno una radice positiva; quindi è, che i detti trinomj saranno sempre reali, comunque le radici dell'equazione di quarto grado siano reali, o immaginarie, dal che ognuno scorge, che le radici immaginarie di quarto grado possono essere espresse da radici immaginarie di secondo grado.

609. Qualunque equazione poi di grado pari sarà sempre risolubile in fattori reali di secondo grado; e se l'equazione sarà di grado dispari, poichè in tal caso ella ha un numero dispari di radici reali, se col prodotto di queste radici reali si dividerà l'equazione, ne verrà di quoziente una equazione di grado pari risolubile in fattori reali di secondo grado. E perchè quando questi fattori hanno radici immaginarie, il loro ultimo termine è positivo, però qualunque equazione di grado impari, che abbia l'ultimo termine negativo, avrà per lo meno una radice reale, e positiva.

610. Quando l'equazione di quarto grado sia di questa forma $x^4 + px^3 + rx = 0$, nel qual caso il coefficiente $q = 0$, nell'equazione data per m mancherà l'ultimo termine, cioè a dire sarà $m^3 + 2pm^2 + \frac{p^2-4r}{4}m = 0$, in cui è (pel num. 481.) $m = 0$. Cioè essendo divisa per m l'equazione detta, ella diverrà di secondo grado così $m^2 + 2pm + \frac{p^2-4r}{4} = 0$, la quale si risolva al modo delle quadratiche affette, e si avrà il valore di m , che è $m = -p \pm \sqrt{4r}$, il qual valore nei trinomj sostituito

dà $x^2 \pm x\sqrt{-p \pm \sqrt{4r}} + \frac{1}{2}\sqrt{4r}$, $x^2 \pm x\sqrt{-p - \sqrt{4r}} - \frac{1}{2}\sqrt{4r}$, ne quali manca

il termine $\frac{q}{2\sqrt{m}}$, poichè $q = 0$. Ometto l'applicazione di questi trinomj, perchè è evidente per se stessa.

611. Qualora l'equazione data per m , mediante la quale deve determinarsi il valore dell'assunta indeterminata m , avrà tutte le radici reali, e non si abbia altro modo di determinarle, che mediante la formola data al num. 585, si caderà nel caso irriducibile, cui in tale circostanza sono sempre soggette le equazioni di quarto grado. Soggiungerò un Problema, acciò si veda l'applicazione del metodo al caso particolare.

E S E M P I O.

612. Prob. Dati due mobili A, B, che partendo da due opposti luoghi si vengono incontro con questa legge, che il primo nella prima ora percorre lo spazio di un passo, nella seconda percorre lo spazio di due, nella terza di tre, e così successivamente secondo la progressione naturale; il secondo nella prim'ora di un passo, nella seconda di otto, nella terza di 27, e così in poi secondo i cubi dei termini della progressione naturale. La distanza dei detti due luoghi è di passi 2070. Cercasi dopo quante ore s'incontreranno.

613. Risol. Il numero delle ore cercate si dica $= x$. Pel num. 1023. del I. Tomo il viaggio fatto dal primo in tale tempo farà $x \times \frac{x+1}{2}$: Il viaggio fatto dal se-

condo nello stesso tempo farà (pel num. 1339. del I. Tomo) $x \times \frac{x+1}{4}$: Ma il viaggio fatto da questi due mobili è uguale allo spazio 2070, quindi si ha immediatamente l'equazione cercata, che è $x \times \frac{x+1}{2} + x \times \frac{x+1}{4} = 2070$, cioè

$2x \times \frac{x+1}{2} + x \times \frac{x+1}{4} = 8280$, conseguentemente $x^2 + 2x^2 + 3x^2 + 2x - 8280 = 0$ equazione cercata, quale a fine di risolvere, si liberi primieramente dal secondo termine, facendo pel num. 496. $x = y - \frac{1}{2}$, dalla sostituzione del qual valore ne nasce giusta il num. 522.

$$\left. \begin{array}{rcl} x^2 & = & y^2 - 2y + \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{16} \\ 2x^2 & = & + 2y^2 - 3y + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{4} \\ 3x^2 & = & + 3y^2 - 3y + \frac{3}{4} \\ 2x & = & + 2y - \frac{1}{2} \\ - 8280 & = & - 8280 \end{array} \right\} = 0$$

cioè $y^2 + \frac{3}{2}y^2 - \frac{112487}{16} = 0$

la quale equazione col porfi $y^3 = x$, diventa $x^3 + \frac{3}{2}x - \frac{132487}{16} = 0$, che però si risolve come le quadratiche affette così $x = -\frac{3}{4} \pm \sqrt{\frac{132487}{16} + \frac{9}{16}}$, cioè $x = -\frac{3 \pm \sqrt{132493}}{4}$, ed estraendo la radice quadrata farà $x = -\frac{3 \pm 364}{4}$, vale a dire $x = \frac{361}{4}$, e $x = -\frac{367}{4}$, ma perchè si è supposta $x = y^3$, però farà $y^3 = \frac{361}{4}$, e $y^3 = -\frac{367}{4}$, ed estraendo finalmente da queste due equazioni la radice quadrata, si avrà rispetto alla prima $y = \pm \sqrt[3]{\frac{361}{4}}$, e però $y = \pm \frac{19}{2}$, e rispetto alla seconda

$y = \pm \sqrt[3]{-\frac{367}{4}}$, le quali due radici sono immaginarie, e solamente sono reali quelle della prima formola $y = \pm \frac{19}{2}$. Siccome poi per levare il secondo termine all'equazione $x^3 + 2x^2 + 3x - 8280 = 0$ si sono dovute accrescere le sue radici di $\frac{1}{2}$, quindi è, che le poc'anzi ritrovate radici $\pm \frac{19}{2}$ si dovranno diminuire di $\frac{1}{2}$, con che si avrà $x = \pm \frac{19}{2} - \frac{1}{2}$: Onde una radice farà $x = +\frac{19}{2} - \frac{1}{2} = \frac{18}{2} = 9$, e la seconda farà $x = -\frac{19}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{20}{2} = -10$, che sono le radici cercate. I due mobili adunque s'incontreranno dopo 9 ore. La radice negativa -10 non è di alcun uso.

614. Per risolvere l'equazione $y^4 + \frac{3}{2}y^3 - \frac{132487}{16} = 0$ chi avesse voluto far uso de' trinomi, avrebbe bisognato adoprare quelli del num. 610., ma fatte le debite sostituzioni essi farebbero risultati immaginari, come si può facilmente vedere sostituendo $\frac{3}{2}$ in luogo di p , e $-\frac{132487}{16}$ in luogo di r .

A R T I C O L O VIII.

Dei metodi finora trovati per la risoluzione delle equazioni superiori.

615. **I** E risoluzioni complete, e generali, che fino ad ora vanta l'Analisi non si estendono al di là delle equazioni di quarto grado. I metodi, che di quando in quando sono stati scoperti per le altre superiori equazioni, o non godono della generalità di estendersi a tutte; o all'incoostante prova di tentare si appoggiano; o per gli immensi calcoli, che esigono, rendono impraticabili; o solamente danno le radici per approssimazione. Io li anderò brevemente accennando, acciocchè nulla rimanga a desiderarsi in questa materia.

ME-

M E T O D O I.

Per mezzo dei divisori semplici, e composti.

616. **A** Bbiamo veduto al num. 479. che l'ultimo termine di qualsivoglia equazione risulta dal prodotto delle sue radici; che però qualunque radice dell'equazione sarà un di lui divisore. L'equazione pertanto, essendo libera dalle frazioni, se avrà radici razionali, esse saranno numeri interi (pel num. 491.); nel qual caso per determinare quali siano le radici dell'equazione, basterà prendere tutti i divisori dell'ultimo termine (pel num. 191. del 1. Tomo, e pel num. 213. di questo), indi sostituire ciascun di loro tanto positivo, come negativo, nell'equazione in luogo di x , e quelli, che la saranno verificare, cioè a dire che faranno andare a zero tutti i di lei termini, saranno (pel num. 318.) le cercate radici. O pure coll'incongnita prima accresciuta, poscia diminuita di ciascuno di loro dovraasi tentare la divisione dell'equazione, mentre qualora essa succederà esattamente, noi faremo sicuri (pel num. 451.) di avere in tal caso nel secondo termine del divisore una radice dell'equazione.

617. Il metodo per altro, benchè proceda tentando ci porterà con facilità allo scopo bramato ogni qual volta l'ultimo termine dell'equazione ammetta pochi divisori. Ma se l'ultimo termine abbonderà di divisori, potrà il numero de' tentativi crescere a segno di stancare anche i più pazienti, e coll'inutile profissità annoiare chiechessia: Che però in tal caso, o bisognerà trasformare (giusta il num. 530.) la data equazione in un'altra, il di cui ultimo termine ammetta un numero minore di divisori, o bisognerà trovare una maniera di scoprire addirittura i divisori inutili, onde diminuire in tal modo il numero delle operazioni da farsi, lo che è stato pienamente trattato dal Signor Clairaut.

618. Il modo pertanto di distinguere i divisori utili dagli inutili farà il seguente. Primieramente osservo, che se vi sarà una equazione qualunque $x^n + ax^{n-1} + bx^{n-2} + \dots + A = 0$, di cui una radice sia m , siccome in supposizione di $x=0$, va a zero tutta l'equazione a riserva dell'ultimo termine, che è divisibile per m , così non supposta $x=0$, l'equazione è divisibile per $x+m$, però se in vece di x si supporrà una qualunque quantità p , poichè questa quantità p si sostituisce tanto nell'equazione, come nel divisore $x+m$, se la divisione da prima si faceva, ella deve succedere anche dopo la fatta sostituzione, mentre mediante questa sostituzione non si fa altro, che assegnare ad x uno degli infiniti valori, che arbitrariamente se gli possono dare: Per lo che fatta $x=1$, l'equazione sarà divisibile per $1+m$; fatta $x=2$, l'equazione sarà divisibile per $2+m$ ec.; parimente fatta $x=-1$, l'equazione sarà divisibile per $-1+m$; fatta $x=-2$, l'equazione sarà divisibile per $-2+m$ ec. Ciò posto si osservi, che essendo m un divisore dell'ultimo termine in supposizione di $x=0$; $1+m$ un divisore dell'equazione in supposizione di $x=1$; $-1+m$ un divisore dell'equazione in supposizione di $x=-1$ ec., questi numeri $1+m$, m , $-1+m$ vicendevolmente si superano di una unità, onde è, che niuno dei divisori, che nascono dalla supposizione di $x=0$, cioè niuno dei divisori dell'ultimo termine può essere radice dell'equazione, se egli non supera di una unità qualcuno dei divisori nati dalla supposizione di $x=-1$, e nel tempo stesso non venga superato di una unità da qualcuno dei divisori nati dalla supposizione di $x=1$.

Que-

Questa osservazione potrà bastare per escludere come inutili molti divisori dell'ultimo termine. Vediamone l'Esempio, nell'equazione $x^5 - 11x^4 + 38x^3 - 42x^2 = 0$, di cui si vogliano trovare le radici fra i divisori dell'ultimo termine. Suppongo per x prima 1, poi 0, indi -1 e queste supposizioni le scrivo in A. Passo a prendere gli aggregati dei termini dell'equazione nati da queste supposizioni, che sono -12 nella supposizione di $x=1$, -42 nella supposizione di $x=0$, -90 nella supposizione di $x=-1$, quali scrivo in B. Scrivo in C i divisori di 12, in D i divisori di 42, in E i divisori di 90. Poichè i divisori possono essere tanto positivi, come negativi, devonfi considerare le serie tanto crescenti dall'alto al basso, come dal basso all'alto: Per lo che nel presente caso considero primieramente fra i divisori scritti in D quelli, che superano di una unità qualcuno de' divisori posti in C, e trovo, che v'è il 2 fra i divisori posti in D, in cui si adempie la ricercata condizione, mentre fra i divisori posti in C v'è il 3, e i divisori posti in E v'è l'1, ed ecco trovata la serie 1, 2, 3 crescente dal basso all'alto, oltre la quale non ve n'è alcun' altra, che proceda dal basso all'alto: Ma considerando le progressioni crescenti dall'alto al basso, si trovano le tre seguenti 1, 2, 3; 3, 4, 5; 4, 5, 6, le quali somministrano le tre radici dell'equazione proposta, che sono 2, 4, 5.

A	B	C	1.	2.	3.	4.	6.	12.
1.	12.	D	1.	2.	4.	5.	8.	10.
0.	42.	E	1.	2.	3.	5.	6.	9.
-1.	90.							

619. Una cosa si noti, che fra i divisori posti in D ve ne possono essere molti inutili, abbenchè godano delle accennate condizioni, e di ciò sarà facile accorgersene ogni qual volta se ne trovi un numero maggiore del grado dell'equazione. Ora per potere anche in questo caso ravvisare i divisori inutili da rigettarli, si osservi, che siccome nell'equazione $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + cx^{m-3} + \dots + A = 0$, di cui una radice è m , col porre $x=0$, con che l'equazione si riduce al solo ultimo termine, deve essere la quantità m un di lui divisore, e con porre $x=1$, o $x=-1$, l'aggregato dei termini risultante da tale supposizione deve essere divisibile nel primo caso per $1+m$, e nel secondo per $-1+m$, così continuandosi le supposizioni di $x=2$, $x=-2$, $x=3$, $x=-3$ ec., gli aggregati de' termini dell'equazione, che quindi ne risultano, devono essere divisibili per $2+m$, $-2+m$, $3+m$, $-3+m$ ec.: Per lo che ciascun dei valori dell'equazione, che nascono per ordine dalle supposizioni fatte di x successivamente superanteli di una unità, deve contenere fra' suoi divisori di quelle quantità $-3+m$, $-2+m$, $-1+m$, m , $1+m$, $2+m$, $3+m$ ec. quella, che giusta la fatta supposizione gli corrisponde, cioè fra i divisori della quantità proveniente dalla supposizione di $x=0$ vi sarà m , e fra i divisori della quantità nata dalla supposizione di $x=1$, vi deve essere $1+m$, fra i divisori della quantità nata dalla supposizione di $x=2$, vi deve essere $2+m$, fra quelli della supposizione di $x=3$ vi deve essere $3+m$ ec.; parimente fra i divisori della quantità nata dalla supposizione di $x=-1$ vi deve essere $-1+m$, fra i divisori della quantità nata dalla supposizione di $x=-2$ vi deve essere $-2+m$ ec. Fatte adunque le accennate supposizioni, e dei provenienti valori dell'

dell'equazioni trovati i divisori, si offervi fra i divisori dell'ultimo termine dell'equazione quali si assoggettino alle proposte condizioni, così che in ciascuna superiore serie dei divisori ve ne sia uno, che vada l'altro continuamente superando di una unità, e nelle serie inferiori vada gradatamente calando di una unità, e que' divisori dell'ultimo termine, rispetto ai quali si verificherà tal legge, dovranno provare tanto presi col segno +, come col segno —, se fanno verificare l'equazione, onde accertarli, che sieno le cercate radici.

620. Trovata la maniera di scuoprre quali fra i divisori dell'ultimo termine dell'equazione possano essere di lei radici, e però quai possano esserle i di lei divisori semplici, passiamo a vedere come si possano ritrovare i di lei divisori razionali esatti di secondo grado, mentre qualora s'abbia il modo di trovarli, niun fastidio farà per dare la risoluzione dell'equazione.

621. Data una equazione qualunque $x^n + ax^{n-1} + bx^{n-2} \dots + A = 0$, di cui l'equazione di secondo grado $x^2 + mx + b = 0$ sia un divisore, io dico che farà pure la quantità b un divisore esatto di A . La verità di questa proposizione è evidente, poichè essendo per ipotesi $x^2 + mx + b = 0$ un divisore di $x^n + ax^{n-1} + bx^{n-2} \dots + A = 0$, questa equazione risulterà dal prodotto di $x^2 + mx + b = 0$ in $x^{n-2} + px^{n-3} + qx^{n-4} \dots + B$, dalla quale moltiplicazione nasce bb per ultimo termine, il quale deve essere uguale ad A ; ma bb è divisibile per b , dunque lo deve essere anche A . Ciò posto vengo immediatamente al metodo, che anacò esponendo con applicarlo primieramente alle equazioni di quarto grado.

622. Sia proposta l'equazione di quarto grado $x^4 + px^3 + qx^2 + rx + s = 0$: Suppongo pertanto, che ella risulti dalle due equazioni componenti $x^2 + mx + b = 0$, $x^2 + ax + b$. Si moltiplichino fra loro queste due equazioni, con che si avrà

$x^4 + a + m \times x^3 + b + b + am \times x^2 + ab + bm \times x + bb = 0$ equazione per ipotesi identica alla data equazione, onde si paragonino i coefficienti di una coi coefficienti dell'altra, e si avrà $p = a + m$, $q = b + b + am$, $r = ab + bm$, $s = bb$. Mediante queste equazioni si trovi una equazione, in cui entrino le sole quantità m , b , e i coefficienti dell'equazione data, così. Dall'equazione $p = a + m$ prendo il valore di a , che è $a = p - m$: Ne faccio la moltiplicazione per b , e mi viene $ab = pb - mb$: Dalla sostituzione di questo valore di ab nell'equazione $r = ab + bm$ si ha $r = pb - mb + bm$, da cui resta soltanto a toglierli la quantità b ; si prenda pertanto il valore di b dall'equazione $s = bb$, e si avrà $b = \frac{s}{b}$, e fattane la sostituzione nell'equazione $r =$

$pb - mb + bm$, si avrà finalmente $r = pb - mb + \frac{ms}{b}$, cioè $br = pb^2 - mb^2 + ms$, da cui si

ricava il valore di m , che è $m = \frac{br - pb^2}{s - b^2}$. Ma poichè b è un divisore dell'ultimo termine s dell'equazione data, si cerchi il suo valore fra i divisori di s , dalla di cui sostituzione nella precedente equazione resterà determinato il valore di m : Si sostituiscano pertanto questi valori di m , b nell'assunta equazione di secondo grado $x^2 + mx + b = 0$, indi colla medesima si tenti la divisione dell'equazione proposta, e se ella succederà, sarà $x^2 + mx + b = 0$ il ricercato divisore di secondo grado, e il quoziente sarà l'altro divisore pure di secondo grado.

623. Lo stesso metodo serve per le altre equazioni. Sia data l'equazione $x^4 + px^3 + qx^2 + rx + s = 0$, di cui le componenti si suppongano essere $x^2 + mx + b = 0$,

$b=0$, x^3+ax^2+bx+c , le quali insieme moltiplicate danno $x^3+\overline{a+m}x^2+\overline{b+b+am}x+\overline{c+bm+ab}x+bc=0$, che deve essere identica alla proposta, e però si ha $p=a+m$, $q=b+b+am$, $r=c+bm+ab$, $s=bb+cm$, $t=cb$. Dal primo paragone ne viene $a=p-m$, che moltiplicato per m è $am=mp-m^2$, e questo valore sostituito nella seconda equazione $q=b+b+am$ in luogo di am dà $q=b+b+mp-m^2$, cioè $b=q-b-mp+m^2$, che moltiplicata per b diviene $bb=qb-b^2-mbp+m^2b$: Se pertanto questo valore di bb si sostituirà nella quarta equazione, ne verrà $s=qb-b^2-mbp+m^2b+cm$. Finalmente si sostituisce in

quest'ultima equazione in luogo di c il suo valore $=\frac{t}{b}$ preso dall'equazione $t=$

cb , e si avrà $s=qb-b^2-mbp+m^2b+\frac{tm}{b}$, o sia $sb=qb^2-b^3-mb^2p+m^2b^2+tm$, la

quale ordinata secondo la lettera m è $m^2-mp+\frac{mt}{b^2}+q-b-\frac{t}{b}=0$, la quale do-

po fatta la sostituzione del valore di b preso fra i divisori dell'ultimo termine t dell'equazione data, risolvendosi nella maniera delle quadratiche affette, ci fornirà il valore di m . Questi valori di m , b sostituiti nell'equazione $x^3+mx+b=0$, poscia con questa equazione si provi la divisione dell'equazione proposta, la quale succedendo mostrerà essere questo il divisore cercato. Il quoziente poi farà una equazione di terzo grado, che o si risolverà giusta il num. 585., o pure vi si applicherà di nuovo il presente metodo. Colla stessa maniera si proceda a trovare i fattori di secondo grado per le altre equazioni più alte.

624. Una sola cosa può fare difficoltà, ed è, che quando l'ultimo termine dell'equazione data abbia molti divisori, sarà cosa troppo molesta il dovere tentare quale fra tanti s'abbia a sostituire in luogo di b l'ultimo termine dell'assunta equazione di secondo grado. Si osservi pertanto, che essendo per ipotesi $x+mx+b=0$ un divisore esatto dell'equazione $x^3+ax^2+bx^2+...+A=0$, lo sarà pure qualunque sia il valore, che nell'una, e nell'altra si supponga in vece di x , e però fatta per x qualsiasi supposizione, il risultante valore dell'equazione x^3+mx+b deve ritrovarsi fra i divisori, che in questa supposizione ammette il valore dell'equazione proposta: Ma siccome i valori dell'equazione $x^3+mx+b=0$, che nascono dalle supposizioni $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$, $x=2$ ec. sono in progressione aritmetica, qualora si trascuri ciò che compete al primo termine x^3 , essendo essi nate fatte supposizioni $-2m+b$, $-m+b$, b , $m+b$, $2m+b$, le quali quantità, come ognuno vede, sono in progressione aritmetica, e se ne può fare la prova con sommare gli equidistanti da quel di mezzo, però se ad ognuno dei divisori, che nascono dai valori dell'equazione da risolverli in ciascuna supposizione, si leverà ciò che compete ad x^3 nella formula x^3+mx+b , come ai di lei valori si è fatto, si dovranno ritrovare nelle serie degli accennati divisori i mutilati valori di $x^3+mx+b=0$ corrispondenti a ciascuna supposizione. Quindi si ha un indizio per conoscere se un qualsiasi divisore dell'ultimo termine dell'equazione proposta potrà servire d'ultimo termine all'assunta equazione componente $x^3+mx+b=0$. Nell'equazione data si faccia no le supposizioni di $x=-3$, $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$, $x=2$, $x=3$ ec., e dei risultanti valori si trovino tutti i divisori, ognuno de' quali preso sì positivo, che negativo si mutili colla seguente legge. Ognuno dei divisori del valore dell'equazione nato dalla supposizione tanto di $x=1$, come di $x=-1$, si mutili di 1, perchè in queste supposizioni è $x^3=1$: Ognuno dei divisori del valore dell'equa-

equazione nato dalla supposizione tanto di $x=2$, come di $x=-2$, si mutili di 4, perchè in queste supposizioni è $x^2=4$: Così ognuno dei divisori del valore dell'equazione nato dalla supposizione tanto di $x=3$, come di $x=-3$, si mutili di 9, perchè in queste supposizioni è $x^2=9$. Ciò fatto si veda se prendendo un divisore dell'ultimo termine dell'equazione da risolversi, si possa avere in ciascuna dell'altre serie dei divisori corrispondentemente alle varie supposizioni un tal termine, che poi considerando fra loro tutti questi termini si trovino essere in progressione aritmetica naturale. Se ciò succederà, il divisore preso si potrà sostituire per ultimo termine nell'affunta equazione componente, se non succederà, dovrà esser rigettato come inutile. Sia per Esempio l'equazione $x^4-14x^3+71x^2-154x+120=0$, in cui si suppongano in vece di x i numeri posti in A. Da queste supposizioni nasceranno dall'equazione i valori posti in B. Di ciascuno di questi valori si prendano i suoi divisori scritti in C. Finalmente si diminuisca ciascuno di questi divisori presi tanto positivi, come negativi del quadrato di quel numero, dalla di cui supposizione derivano, e così mutilati si scrivano in E, come segue

$$\text{Equazione } x^4 - 14x^3 + 71x^2 - 154x + 120 = 0$$

A	B	C									
2	0	del zero qualunque numero può essere divisore									
1	24	1.	2.	3.	4.	6.	8.	12.	24.		
0	120	1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	10.	15.	cc
-1	360	1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	
-2	840	1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	10.	12.	

Divisori negativi

Divisori positivi

-24, -12, -8, -6, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +6, +8, +12, +24
 -10, -8, -6, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8, +10
 -9, -8, -6, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8, +9
 -10, -8, -7, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +7, +8, +10

Divisori positivi, e negativi mutilati

-25, -13, -9, -7, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +7, +11, +23
 -10, -8, -6, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8, +10
 -10, -9, -7, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +7, +8
 -14, -12, -11, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6

In questi divisori mutilati ritrovo sei progressioni aritmetiche, la prima dei numeri segnati ', la seconda dei numeri segnati ", la terza dei numeri segnati ~, la quarta dei numeri segnati ^, la quinta dei numeri segnati ^, la sesta dei numeri segnati ^.
 Nella prima progressione il numero della seconda orizzontale fila dei divisori, che sono i divisori dell'ultimo termine dell'equazione data, è -6; nella seconda egli è -5; nella terza egli è -4; nella quarta egli è -3; e nella quinta egli è -1, nella sesta è +6. I cinque primi sono inutili, ma l'ultimo +6 è appunto quello, che deve servire d'ultimo termine nell'equazione componente $x^3+mx+b=0$, che perciò diventerà $x^3+mx+6=0$, in cui resta a determinarsi il valore di m , lo che

Tomo II.

D d

per

per fare prendo l'equazione $m = \frac{br - pb^2}{s - b^2}$ trovata al num. 622., in cui sostituisco i valori di b, r, p, s , che sono $b=6, p=-14, r=-154, s=120$, con che ho $m = -\frac{924+504}{120-36}$, cioè $m=-5$, dalla sostituzione del qual valore l'equazione anzidetta diventa $x^3-5x+6=0$, colla quale dividendo l'equazione proposta $x^4-14x^3+71x^2-154x+120=0$, poichè la divisione riesce esatta, venendone di quoziente $x^2-9x+20$, perciò $x^3-5x+6=0$ è quello che si cercava. Se ora si risolveranno queste due trovate equazioni di secondo grado, si avranno le quattro radici dell'equazione data, che sono 2, 3, 4, 5.

625. Una cosa devesi avvertire, ed è, che qualora, essendo proposta da risolverli una equazione di grado pari, si vorranno prendere per le di lei equazioni componenti altrettante equazioni di secondo grado, quante se ne richiedono per montare al grado dell'equazione data, se ognuna, o due sole di queste equazioni avrà per ultimo termine la stessa quantità, nel ricercare il valore di m per l'equazione $x^2+mx+b=0$, che vuoltì determinare, si giungerà a una espressione indeterminata di questa forma $m=\frac{g}{g}$ avvegnachè l'equazione $x^2+mx+b=0$ propenda in ciascuna dell'altre componenti, non essendovi maggior motivo, per cui si converrà piuttosto in una, che nell'altra: Per Esempio dovendoli risolvere l'equazione $x^4-11x^3+34x^2-33x+9=0$ prendo l'equazione $x^2+mx+b=0$, e sostituisco in luogo di b il 3, che è il conveniente divisore dell'ultimo termine 9, onde essa risulta $x^2+mx+3=0$. Resta da determinarti la

quantità m , e a tale oggetto prendo l'equazione $m = \frac{br - pb^2}{s - b^2}$ del num. 622, nella quale sostituendo i valori di b, r, p, s , che sono $b=3, r=-33, p=-11, s=9$, si ha $m = -\frac{99+99}{9-9}$, cioè $m = \frac{0}{0}$, e ciò nasce a motivo, che essendo questa

componente $x^2-4x+3=0$, l'altra è $x^2-7x+3=0$, delle quali l'una, e l'altra ha il 3 per ultimo termine. Ora in tal caso devesi ricercare il valore di m per mezzo di una tale equazione, il di cui grado corrispondendo al numero delle assunte equazioni di secondo grado, possa perciò ella somministrare le quantità necessarie da darsi per coefficiente a ciascuna dei loro secondi termini: Onde per determinare in tal modo la quantità m relativamente all'esempio poc' anzi addotto, prendo dal num. 622. le equazioni $p=a+m, q=b+b+am, r=ab+bm, s=bb$, e mediante la seconda, e la quarta elimino il b , onde mi viene $r=qb-b^2-abm$; per mezzo poi di questa equazione, e della prima $p=a+m$ elimino la quantità a , con che ho $r=qb-b^2-abm+bm^2$, la quale ordinata secondo la lettera m è $m^2-pm-b+q=\frac{r}{b}$, in

cui sostituendo il valore di b preso nel modo detto al num. 624. tra i divisori dell'ultimo termine dell'equazione da risolverli, si risolva essa per ultimo al modo delle quadratiche affette, e si avranno i due ricercati valori di m , da darsi per coefficienti ai secondi termini delle due assunte equazioni di secondo grado. La risoluzione di

questa equazione è $m = \frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{r}{b} - qb + \frac{1}{4}p^2}$, ove hanfi a sostituire i valori di p, q, s, b , che presi dall'equazione $x^4-11x^3+34x^2-33x+9=0$ sono $p=-11, q=34, s=9, b=3$, de' quali fatta la sostituzione si ha

m

$m = -\frac{11}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{3} - 34 + 3 + \frac{121}{4}}$, cioè $m = -\frac{11}{2} \pm \frac{\sqrt{12 - 132 + 12 + 121}}{2}$, e però $m = -\frac{11 \pm \sqrt{9}}{2}$, conseguentemente $m = -\frac{11 \pm 3}{2}$. I due valori adunque di m sono -4 , e -7 , per lo che le due equazioni componenti faranno $x^2 - 4x + 3 = 0$, $x^2 - 7x + 3 = 0$.

626. Lo stesso metodo si offerì per determinare le equazioni componenti di secondo grado, allorchè le equazioni da risolversi sono letterali. Sia proposta l'equazione $x^2 - a^2x^2 + 2a^2bx - a^2b^2$, di cui una componente si supponga $x^2 + mx + b = 0$, farà b uno dei divisori dell'ultimo termine $-a^2b^2$, di cui i divisori sono ab, a^2, b^2 (poichè essendo omogenei i termini dell'equazione devonfi tentare i divisori di due dimensioni). Si ponga pertanto ab in vece di b , e perchè è $p=0$, $r=2a^2b$, $s=-a^2b^2$, farà $m = \frac{rb - pb^2}{s - b^2}$, cioè $m = \frac{2a^2b \times ab}{-a^2b^2 - a^2b^2}$, e però $m = \frac{2a^2b^2}{-2a^2b^2}$, conseguentemente $m = -a$, con che l'equazione $x^2 + mx + b = 0$ diventa $x^2 - ax + ab = 0$, mediante la quale si divide esattamente l'equazione data $x^2 - a^2x^2 + 2a^2bx - a^2b^2 = 0$, e il quoziente è $x^2 + ax - ab$. Dunque le due ricercate equazioni componenti sono $x^2 - ax + ab = 0$, $x^2 + ax - ab = 0$. Collo stesso metodo si proceda alle equazioni più alte, delle quali si avrà la soluzione con determinare primieramente un fattore di secondo grado, col quale farassi la divisione dell'equazione data, poscia si passerà a determinare un pari divisor del quoziente, e così in seguito.

627. Finora abbiamo avuto in vista i soli divisori razionali, e semplici, e di secondo grado: ora passeremo alla risoluzione delle equazioni per mezzo dei fattori di qualsivoglia grado, ed anche irrazionali. Il modo di determinare questi divisori, che devono essere i fattori dell'equazione, si è di assumerli indeterminati, poscia moltiplicarli fra loro, e mediante il paragone dei termini di questo prodotto coi termini dell'equazione data determinare il valore, che deve competere alle asfunte indeterminate, onde determinare con ciò i fattori cercati. Due Esempj renderanno chiaro il metodo.

628. Data l'equazione $x^5 + 3ax^4 + 2b^2 + 2a^2 \times x^3 + 3ab^2 - d^2 \times x^2 + b^4 - 2ad^2 \times x - b^2d^2 = 0$ cercansi i fattori uno di secondo, e l'altro di terzo grado, da quali essa risulta. Si ponga che essi siano $x^2 + mx + b = 0$, $x^3 + nx^2 + px + q$; dalla moltiplicazione de' quali si avrà

$$\left. \begin{array}{l} x^5 + mx^4 + bx^3 + nbx^2 + pbx + qb \\ + nx^4 + mnx^3 + pmx^2 + mqx \\ + px^3 + qx^2 \end{array} \right\} = 0$$

Si paragonino i termini di questa equazione coi termini dell'equazione data, con che si avranno le seguenti cinque equazioni $m+n=3a$; $b+mn+p=2b^2+2a^2$; $nb+pm+q=3ab^2-d^2$; $pb+mq=b^4-2ad^2$; $qb=-b^2d^2$. Dalla prima di queste equazioni si prenda il valore di n , che è $n=3a-m$; dall'ultima si prenda il valore di q così $q=-\frac{b^2d^2}{b}$, mediante il quale si vede, che b deve essere un divisore dell'ultimo termine b^2d^2 , di cui i divisori sono b^2, d^2 (poichè delle equazioni asfun-

sunte una è di secondo, e l'altra di terzo grado, non fervono che i divisori di due, o di tre dimensioni), e però o farà $b=b^2$, o pure $b=d^2$; dalla quarta equazione si prenda il valore di p , che è $p = \frac{b^2-2ad^2-mq}{b}$, in cui si sostituisca in

luogo di q il suo poc' anzi ritrovato valore, e si avrà $p = \frac{b^2-2ad^2}{b} + \frac{mb^2d^2}{b^2}$. Si sostituiscono per ultimo questi ritrovati valori di n, p nella seconda equazione, con che si avrà $b+3am-m^2+\frac{b^2-2ad^2}{b} + \frac{mb^2d^2}{b^2} = 2b^2+2a^2$. Si ordini questa equazione secondo la lettera m , e si avrà $m^2 - \frac{2ab^2-b^2d^2}{b^2} \times m = b + \frac{b^2-2ad^2}{b} - 2b^2 - 2a^2$.

E poichè abbiamo veduto, che la b deve essere o $=b^2$, o $=d^2$, però si supponga $b=b^2$, e questo valore si collochi nell'ultimamente trovata equazione, che diverrà $m^2 - \frac{3ab^2-d^2}{b^2} = -\frac{2ad^2-2a^2b^2}{b^2}$, dalla risoluzione della quale ne

viene $m = \frac{3ab^2+d^2}{2b^2} \pm \sqrt{-\frac{2ad^2-2a^2b^2}{b^2} + \frac{a^2b^2+(-2ad^2+d^2)+a^2}{4b^4}}$, cioè $m =$

$\frac{3ab^2+d^2}{2b^2} \pm \frac{\sqrt{a^2b^2-2ab^2d^2+d^6}}{2b^2}$, e però $m = \frac{3ab^2+d^2}{2b^2} \pm \left(\frac{ab^2-d^2}{2b^2} \right)$, onde va-

lendo il segno $+$ farà $m=2a$, e valendo il segno $-$ farà $m=a+\frac{d^2}{b^2}$. Per conoscere quale dei due ritrovati valori di m sia il legittimo, si sostituisca ciascun di loro nelle equazioni $n=3a-m; p = \frac{b^2-2ad^2+md^2}{b^2}$, poscia questi valori di n, p , ed i q ,

che è $q=d^2$ si collochino nella terza equazione $nb+pm+q=3ab^2-d^2$, mentre se mediante tale sostituzione ella risulterà identica, tale valore di m farà il ricercato, se non risulterà identica, egli sarà inutile. Prendo pertanto il valore di

$m=a+\frac{d^2}{b^2}$, con cui fatte le accennate sostituzioni si ha $n=2a-\frac{d^2}{b^2}, p=b^2-\frac{ad^2}{b^2} + \frac{d^4}{b^2}$, e questi valori messi nella terza equazione, di cui fino ad ora non si è fat-

to alcun uso, daranno $2ab^2-d^2+ab^2-\frac{a^2d^2}{b^2}+\frac{ad^5}{b^4}+d^2-\frac{ad^6}{b^4}-d^2+\frac{d^9}{b^2}=3ab^2-d^2$, la quale equazione non è identica, e però deve esser rigettata come inutile il valore di $m=a+\frac{d^2}{b^2}$. Si prenda l'altro valore di m , che si è trovato essere $2a$, con cui fatte

le debite sostituzioni si ha $n=a, p=b^2-\frac{2ad^2}{b^2}+\frac{2ad^2}{b^2}$, cioè $p=b^2$, e $q=d^2$.

Fatte adunque queste sostituzioni nella terza equazione, ella diverrà $ab^2+2ab^2-d^2=3ab^2-d^2$, cioè $3ab^2-d^2=3ab^2-d^2$, che essendo identica fa conoscere, che questo valore di m è il ricercato. Ora si mettano nei due affissi fattori questi valori di m ,

m, b, n, p, q , con che diverranno $x^3 + 2ax + b^2 = 0$, $x^3 + ax^2 + b^2x - a^3$, che sono appunto i fattori dell'equazione proposta, lo che si renderà evidente col farne la moltiplicazione, mentre ne verrà la detta equazione.

629. Prendo l'altro Esempio dall'equazione $x^6 + 2ax^5 + 2b^2x^4 + a^3x^3 + b^4x^2 - a^2b^2x - a^3b^2 = 0$, di cui si vogliono determinare i due fattori di terzo grado, che suppongo essere $x^3 + mx^2 + nx + b = 0$, $x^3 + px^2 + qx + t$, dalla moltiplicazione de' quali si ha

$$\left. \begin{array}{l} x^6 + mx^5 + nx^4 - bx^3 + bp x^2 + bq x + tb \\ + px^5 + mp x^4 + np x^3 + nq x^2 + nt x \\ + qx^3 + mq x^2 + mt x \\ + tx^3 \end{array} \right\} = 0$$

dal paragone dei coefficienti di questa coi coefficienti della proposta si ha $m + p = 2a$, $n + mp + q = 2b^2 + a^2$; $b + np + mq + t = 2ab^2$; $bp + nq + mt = b^3$; $bq + nt = 0$; $tb = -a^3b$.

Dalla prima di queste equazioni si ha $p = 2a - m$, e dall'ultima $t = -\frac{a^3b}{b}$, dalla quale si scorge, che la quantità b deve essere uno dei divisori dell'ultimo termine dell'equazione proposta, e però, siccome i divisori dell'ultimo termine sono a^3 , a^2b , $a^1\sqrt{ab}$ (poichè devono essere di tre dimensioni, mentre b è l'ultimo termine di un fattore di terzo grado), farà uguale ad uno di questi. Si sostituisca il ritrovato valore di t nella quinta equazione, e si avrà $q = \frac{a^2bn}{b^3}$: Nella seconda si mettano i

valori di p, q , e ne verrà $n = \frac{2b^3b^3 + a^3b^3 + m^3b^3 - 2ab^3m}{a^3b + b^3}$. Finalmente se nella terza equazione si collocheranno questi valori di n, p, q, t , si avrà

$$2a^4b^3b^3 + a^{10}b^3b + 2ab^5b^3 - b^5 = 4a^4b^3b^3 - 2b^3b^3m + 2a^4b^3b^3m + 2a^4b^3b^3 - a^3b^4m + a^2bb^3m + 2ab^4m^2 - b^5m^3 + a^3bb^3m^3 - 4a^4b^4m + 2ab^4m^2 + 2a^4bb^3m^2,$$

cioè dividendola per b e ordinandola per m

$$a^3bb^3 - b^5 \times m^3 + 4ab^3 - 2a^3bb^3 \times m^2 + a^2bb^3 - 4a^4b^3 + 2a^4b^3b - 2b^3b^3 \times m + 2ab^3b^3 + 2a^3b^3 + b^5 - a^{10}b^3 - 2a^4b^3b = 0. \text{ Ora si supponga } b = a^2\sqrt{ab} \text{ uno dei divisori, e sostituendo questo valore nella poc' anzi trovata equazione, si avrà } a^2b\sqrt{ab} - a^2b\sqrt{ab} \times m^3$$

+ $4a^4b\sqrt{ab} - 2a^4b\sqrt{ab} \times m^2 + a^2b\sqrt{ab} - 4a^4b\sqrt{ab} + 2a^4b\sqrt{ab} - 2a^4b\sqrt{ab} \times m + 2a^4b\sqrt{ab} + 2a^4b\sqrt{ab} + a^{10}b^3 - a^{10}b^3 - 2a^4b^3\sqrt{ab} = 0$, la quale con togliere i termini, che si elidono, e con dividerla per $\sqrt{ab}$ si riduce a $2a^4bm^2 - 4a^4bm + 2a^{10}b = 0$, che divisa per $2a^4b$ è finalmente $m^2 - 2am + a^2 = 0$, e però $m = \pm a$. Si prende pertanto questo valore di m , e si sostituisca nei valori di n, p, q, t , lo

che fatto si avrà $n = \frac{2a^2b + a^2b + a^2b - 2a^2b}{2a^3b}$, cioè $n = b^3$; $p = a$, $q = b^3$; $t = -\frac{a^3b}{a^2\sqrt{ab}}$, cioè (dividendo $-a^3b$ per $a^2\sqrt{ab}$) $t = -a^2\sqrt{ab}$. Si sostituiscono per ul-

ti-

timo questi ritrovarsi valori nella quarta equazione $bp + nq + mt = b^4$, che non ha avuto luogo nelle fatte determinazioni, e si avrà $a^3 \sqrt[3]{ab} + b^4 - a^3 \sqrt[3]{ab} = b^4$, cioè $0 = 0$ equazione identica, la quale fa vedere, che l'assunto valore di b , e il ritrovato di m sono quelli, che si cercano; che però se questi valori si collicheranno nelle due assunte equazioni di terzo grado, si avrà $x^3 + ax^2 + b^3x + a^3 \sqrt[3]{ab} = 0$, $x^3 + ax^2 + b^3x - a^3 \sqrt[3]{ab} = 0$, che sono le due componenti, dalle quali risulterà l'equazione data, e mediante la di cui soluzione si hanno le cercate radici dell'equazione $x^6 + 2ax^3 + 2b^3 + a^3 \sqrt[3]{ab} \times x^3 + 2ab^3x^2 + b^3x^3 - a^3b = 0$.

630. Se pel valore di b si fosse preso uno degli altri due divisori a^3 , a^2b , non si sarebbe ottenuto il fine desiderato, il che fa vedere, che sono inutili.

631. Si renderà più breve il calcolo, e però si giungerà più facilmente col presente metodo alla risoluzione delle equazioni con considerarle libere dal secondo termine. Che se le equazioni saranno convertibili più speditamente si arriverà a scuoprirne le radici con risolverle in trinomi di secondo grado.

632. Le equazioni convertibili sono di grado pari, in cui perciò il numero de' termini è impari: I termini ugualmente distanti dal termine di mezzo devono essere affetti dallo stesso segno, e dallo stesso coefficiente, non computando per coefficiente quella quantità, che, essendo un divisore dell'ultimo termine, serve in alcuni termini a compiere il numero delle dimensioni, o sia a rendere i termini omogenei. Il primo termine deve essere formato dalla sola incognita x , e l'ultimo deve essere affatto cognito, l'uno e l'altro poi deve essere elevato alla stessa potestà; per lo che cominciando l'equazione dal termine positivo x^n deve procedere in modo, che ne' seguenti successivi termini l'esponente di x vada continuamente decrescendo di una unità, finchè si giunga al termine cognito a^n , che deve essere positivo: Una equazione pertanto convertibile sarà $x^{10} + bx^9 - acx^8 - a^3dx^7 + a^3ex^6 + ab^3x^5 + a^3ex^4 - a^3dx^3 - a^3cx^2 + a^3bx + a^{10} = 0$, la quale, trascurate le potestà di a , che conservano l'omogeneità dei termini, è $x^{10} + bx^9 - cx^8 - dx^7 + ex^6 + b^3x^5 + ex^4 - dx^3 - cx^2 + bx + a^{10} = 0$, in cui i termini ugualmente distanti da quel di mezzo sono affetti dallo stesso segno, e dallo stesso coefficiente.

633. Il modo di risolvere in trinomi di secondo grado queste equazioni è il seguente. Si prenda una equazione convertibile di secondo grado, come $x^3 + mx + a^3$, in cui il coefficiente del secondo termine è una quantità indeterminata, e da determinarsi col calcolo, l'ultimo termine poi deve essere il quadrato della radice dell'ultimo termine dell'equazione proposta; questa equazione si moltiplichi in un'altra equazione convertibile presa ad arbitrio coi coefficienti indeterminati, a riserva dell'ultimo termine, che deve essere lo stesso, che quello della proposta, e soltanto di due gradi inferiore, cioè $a^6 - x^3$, il di cui massimo esponente deve essere minore di due unità dell'esponente massimo dell'equazione data. Da questa moltiplicazione ne verrà una equazione parimente convertibile, che sarà dello stesso grado dell'equazione data, da risolverla, e a cui deve esser supporta identica. Stante questa identità si paragonino i coefficienti di una coi coefficienti dell'altra, cioè il secondo al secondo, il terzo al terzo ec., fino ai termini di mezzo inclusivamente, essendo superflui gli ulteriori paragoni, poichè rendono le stesse equazioni: Mediante queste equazioni si eliminino tutte le assunte indeterminate a riserva della m , da cui è affetto il secondo termine del trinomio di secondo grado, onde, che ne verrà una equazione data per m , e per le costanti: Si risolva questa equazione coi soliti metodi a fine di avere i valori di m , che per ora suppongo A , B , C ec. de' quali il numero sarà

$\frac{n}{2}$, e questi valori si collochino nel trinomio $x^2 + mx + a^2 = 0$, con che si avranno i trinomi $x^2 + Ax + a^2 = 0$; $x^2 + Bx + a^2$; $x^2 + Cx + a^2$ ec. che appunto faranno i ricercati trinomi di secondo grado, ne quali si risolve la proposta equazione convertibile.

634. Si debba per Esempio risolvere in trinomi di secondo grado l'equazione convertibile $x^3 + acx^2 + d^2x^2 + a^2(x^2 + a^2) = 0$. Prendo il trinomio di secondo grado $x^2 + mx + a^2 = 0$, e lo moltiplico nell'equazione pure convertibile $x^3 + nx^2 + p^2x^2 + a^2nx + a^4$, con che mi viene

$$\begin{aligned} x^6 + mx^5 + a^2x^4 + a^2nx^3 \\ + nx^5 + mnx^4 + mp^2x^3 \text{ ec. } = 0 \\ + p^2x^4 + a^2nx^3 \end{aligned}$$

Paragono i coefficienti indeterminati di questa coi coefficienti della proposta, con che ho le seguenti equazioni $m+n=0$; $a^2+mn+p^2=ac$; $a^2n+mp^2+a^2n=d^2$. Prendo dalla prima il valore di n , che è $n=-m$; poscia dalla seconda prendo il valore di p^2 , e lo metto nella terza, onde ella risulta $2a^2n+acm-m^2n-a^2m=d^2$, la quale mediante la sostituzione del valore di n si cambia in $-2a^2m+acm+m^2-a^2m=d^2$, cioè

$m^2+ac-3a^2 \times m-d^2=0$, dalla di cui risoluzione (giusta il num. 585.) si hanno i tre seguenti valori di m , cioè

$$m = \sqrt[3]{\frac{d^2}{2}} + \sqrt[3]{\frac{a^6 + 17a^3c^2 - 9a^2c^3 + 27a^3c - 27a^6}{27}} +$$

$$\sqrt[3]{\frac{d^2}{2}} - \sqrt[3]{\frac{a^6 + 17a^3c^2 - 9a^2c^3 + 27a^3c - 27a^6}{27}}, \text{ e gli altri due che sono}$$

gli stessi di questo, ma moltiplicati nelle due radici cubiche immaginarie dell'unità. Se pertanto la prima di queste radici si dirà $=b$, la seconda $=i$, la terza $=k$, i tre trinomi di secondo grado, da quali risulta l'equazione presa da risolverli, saranno $x^2 + bx + a^2 = 0$; $x^2 + ix + a^2$; $x^2 + kx + a^2$, lo che dovevasi ritrovare.

635. Poichè nelle equazioni convertibili i termini ugualmente distanti dal termine di mezzo devono essere affetti dallo stesso segno, e coefficiente, se in una equazione convertibile mancherà un termine, dovrà mancare ancora l'altro suo corrispondente, come nella precedente equazione del num. 634. perchè manca il secondo, manca ancora il penultimo: Onde è, che non solo faranno convertibili queste equazioni mancanti di qualche termine, ma ancora la presente $x^3 \pm a^3 = 0$, in cui si possono supporre tutti i termini intermedi, ma moltiplicati in zero. Debba pertanto risolvere ne' suoi trinomi di secondo grado questa equazione $x^3 + a^3 = 0$, di cui per maggior chiarezza determino l'esponente così $x^3 + a^3 = 0$. Prendo le due equazioni convertibili $x^3 + mx + a^3 = 0$, $x^3 + px^2 + qx^2 + ix^2 + ux^2 + vx + z$, e le moltiplico fra loro, con che mi viene

$$\begin{aligned}
 & x^8 + mx^7 + a^2 x^6 + a^2 p x^5 + a^2 q x^4 \\
 & + p x^7 + m p x^6 + m q x^5 + m t x^4 \text{ ec.} = 0 \\
 & + q x^6 + t x^5
 \end{aligned}$$

Dal paragone de' coefficienti di questa colla proposta si ha $m+p=0$, $a^2+mp+q=0$; $a^2p+mq+t=0$. La prima dà $p=-m$, che messo nella seconda diventa essa $q=-m^2-a^2$, e questo valore collocato nella terza insieme col valore di p la cambia in $t=2a^2m-m^3$. Finalmente sostituiti nella quarta i valori di q , t , ne viene $m^3-3a^2m^2+a^4=0$, le

$$\begin{aligned}
 & \text{di cui quattro radici sono } m = \sqrt[3]{\frac{3a^3+a^2\sqrt{5}}{2}}; m = \sqrt[3]{\frac{3a^3-a^2\sqrt{5}}{2}}; m = - \\
 & \sqrt[3]{\frac{3a^3+a^2\sqrt{5}}{2}}; m = -\sqrt[3]{\frac{3a^3-a^2\sqrt{5}}{2}}, \text{ o sia } m = a \sqrt[3]{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}; m = \\
 & a \sqrt[3]{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}; m = -a \sqrt[3]{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}; m = -a \sqrt[3]{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}. \text{ Si sostituiscano questi quattro}
 \end{aligned}$$

valori di m nel trinomio $x^2+mx+a^2=0$, e si avranno i quattro seguenti trinomi da quali risulta l'equazione $x^4+a^4=0$, cioè

$$\begin{aligned}
 & x^2+x\sqrt[3]{\frac{3a^3+a^2\sqrt{5}}{2}}+a^2; x^2+x\sqrt[3]{\frac{3a^3-a^2\sqrt{5}}{2}}+a^2; x^2-x\sqrt[3]{\frac{3a^3+a^2\sqrt{5}}{2}}+a^2; \\
 & x^2-x\sqrt[3]{\frac{3a^3-a^2\sqrt{5}}{2}}+a^2.
 \end{aligned}$$

636. Ho detto al num. 632., che le equazioni sono di grado pari; in questa però $x^n \pm a^n = 0$ l'esponente può essere ancora un numero impari. Quanto all'equazione $x^n + a^n = 0$ essendo n un numero impari, ella farà il prodotto del binomio $x+a$ moltiplicato in una equazione convertibile della forma seguente $x^{n-1}-ax^{n-2}+a^2x^{n-3}-a^3x^{n-4}$ ec. ... $+a^{n-1}$, la quale risolvendosi nel modo detto ne' suoi trinomi di secondo grado, si verrà pure a risolvere parte in trinomi, parte nel binomio $x+a$ la data equazione $x^n+a^n=0$. La equazione convertibile poi, che si deve assumere da moltiplicarsi nel trinomio $x^2+mx+a^2=0$, a fine di risolvere in trinomi l'equazione $x^{n-1}-ax^{n-2}+a^2x^{n-3}$ ec., deve avere per primo termine x^{n-1} . Parimente l'equazione $x^n-a^n=0$, essendo n un numero impari, è il prodotto di $x-a$ in $x^{n-1}+ax^{n-2}+a^2x^{n-3}+a^3x^{n-4}$ ec. ... $+a^{n-1}$, e però circa essa si opererà come si è detto della precedente $x^n+a^n=0$.

637. Resta a parlare dell'equazione $x^n-a^n=0$ quando l'esponente n è un numero pari: In tal caso ella si risolve primieramente in $x^{\frac{n}{2}}+a^{\frac{n}{2}}$, $x^{\frac{n}{2}}-a^{\frac{n}{2}}$, poichè $x^n-a^n = x^{\frac{n}{2}+\frac{n}{2}} - a^{\frac{n}{2}+\frac{n}{2}} = (x^{\frac{n}{2}}+a^{\frac{n}{2}})(x^{\frac{n}{2}}-a^{\frac{n}{2}})$. Di questi due binomi il primo $x^{\frac{n}{2}}+a^{\frac{n}{2}}$ si tratta come si è detto al num. 635. quando $\frac{n}{2}$ è numero pari, e giusta il num. 636. quando

do $\frac{n}{2}$ è un numero impari. Il secondo $x^{\frac{n}{2}} - a^{\frac{n}{2}}$ si risolve ne' due binomj $x^{\frac{n}{4}} + a^{\frac{n}{4}}$,

$x^{\frac{n}{4}} - a^{\frac{n}{4}}$, de' quali il primo si tratta come pur ora si è detto, comunque $\frac{n}{4}$ sia numero pari, o impari, ma il secondo $x^{\frac{n}{4}} - a^{\frac{n}{4}}$ si risolve ne' due $x^{\frac{n}{8}} + a^{\frac{n}{8}}$,

$x^{\frac{n}{8}} - a^{\frac{n}{8}}$, e così di seguito, finchè l'esponente di $x - a$ sia un numero impari, e allora egli si risolverà ne' suoi trinomj giusta il num. 636.

Anche indipendentemente dai divisori dell'ultimo termine si potrà risolvere una data equazione nei suoi fattori di secondo grado. La maniera è la seguente. Sia proposta l'equazione (A) $x^n + ax^{n-1} + bx^{n-2} + cx^{n-3} + \dots + Q = 0$, per risolvere la quale ne' suoi fattori di secondo grado, si prendano due equazioni a coefficienti indeterminati, la prima di secondo grado, che sarà (B) $x^2 + mx + p = 0$; la seconda di due gradi inferiore alla proposta (onde dal prodotto di quelle due ne possa risultare un'equazione di grado n eguale al grado dell'equazione (A), cui deve essere identica), che però sarà (D) $x^{n-1} + qx^{n-2} + rx^{n-3} + \dots + R = 0$. Si moltiplichino insieme queste due equazioni (B, D), e dell'equazione, che ne verrà si paragonino i coefficienti coi coefficienti dell'equazione (A), e per mezzo di queste peculiari equazioni, che saranno tante, quanti sono gli asunti coefficienti indeterminati, si eliminino coi metodi dati tutte queste indeterminate a riserva della m , che è il coefficiente del secondo termine del fattore (B), onde ne verrà un'equazione data per m , e per i coefficienti cogniti dell'equazione (A). Nell'equazione (B) si sostituisca poscia in luogo di p il suo valore dato per m , e ritrovato per mezzo del paragone de' coefficienti; indi si risolva la precedente equazione provenuta dalla eliminazione di tutte le indeterminate, a riserva della m , e i valori di m , che dalla medesima si otterranno, si sostituiscono nel fattore (B). Quanti poi saranno questi valori di m , in altrettanti fattori di secondo grado si cambierà il fattore indeterminato $x^2 + mx + p = 0$; e questi saranno i fattori, ne' quali sarà risolubile la data equazione (A).

Ben è vero però, che l'equazione in m sarà completa, e d'un grado maggiore alla proposta, conseguentemente più difficile da risolversi. Se però in certi casi si avrà il modo di scoprirne le radici, si consegnerà il fine bramato. Ma per sapere di qual grado dovrà essere questa equazione data per m , si osservi, che essendosi supposto $x^2 + mx + p = 0$ un fattore dell'equazione (A), egli perciò, in quanto che di secondo grado, dovrà contenere due delle di lei radici; e siccome il coefficiente del secondo termine (pel num. 477.) non è altro, che la somma delle radici dell'equazione, perciò la lettera m , che esprime la somma delle radici dell'equazione (B), rappresenterà due radici dell'equazione (A). Ma poichè nulla v'ha, che determini la lettera m a rappresentare piuttosto un paio delle di lei radici, che l'altro, quindi ella dovrà rappresentare nel tempo stesso tutti gli ambi, che dal numero delle radici dell'equazione (A) possono formarsi. La questione adunque circa il grado, cui ascenderà l'equazione in m , si riduce a questo solo di trovare il numero degli ambi, che ammette un dato esponente. Se adunque l'esponente esprime

mente il grado dell'equazione data sarà $=n$, il numero degli ambi, che da esso si possono formare sarà (pel num. 1357. del Tomo I.) $n \times \frac{n-1}{2}$. Ma n (pel num. 461.) esprime il numero delle radici; dunque dovendo la lettera m esprimere il numero degli ambi, che si possono formare da queste radici, dovrà sempre l'equazione in m ascendere al grado indicato da $n \times \frac{n-1}{2}$. Ma veniamo al caso particolare.

Debba si risolvere ne' suoi fattori di secondo grado l'equazione $x^4 - 3x^3 - x^2 - 3x + 18 = 0$. Prendo le due equazioni indeterminate $x^2 + mx + q = 0$; $x^2 + qx + t = 0$, dalla moltiplicazione delle quali si ha

$$\begin{array}{r} x^2 + mx + p = 0 \\ x^2 + qx + t = 0 \\ \hline x^4 + mx^3 + px^2 + pqx + pt \\ + qx^3 + mqx^2 + mtx \\ + tx^2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{r} x^2 + mx + p = 0 \\ x^2 + qx + t = 0 \\ \hline x^4 + mx^3 + px^2 + pqx + pt \\ + qx^3 + mqx^2 + mtx \\ + tx^2 \end{array}} \right\} = 0$$

Si faccia il paragone de' coefficienti di questa coi coefficienti della proposta, e si avrà $m+q=-3$; $p+mq+t=-1$; $pq+nt=-3$; $pt=18$. Primieramente si trovi il valore di p dato per m , quale si otterrà mediante la seconda, e la terza equazione. Dalla seconda si ha $t=-1-mq-p$, dalla terza $t=-\frac{3-pq}{m}$, le quali para-

gonate insieme danno $-1-mq-p=-\frac{3-pq}{m}$, cioè $-m-m^2q-mp=-3-pq$, in cui sostituendosi il valore di q preso dalla prima equazione, che è $q=-3-m$, si ha $-m+3m^2+m^3-mp=-3+3p+pm$, conseguentemente $p=\frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m}$, il qual valore di p sostituito nel fattore (B), lo cambia in $x^2 + mx + \frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} = 0$. Ciò fatto si passi alla eliminazione di tutte le indeterminate

a riserva della m , o sia a trovare l'equazione in m , lo che si farà con sostituire nella seconda equazione il valore trovato di p , il valore di q preso dalla prima, e il valore di t preso dalla quarta, con che si avrà $\frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} + m \times \frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} - m = 0$.

Ciò fatto si passi alla eliminazione di tutte le indeterminate a riserva della m , o sia a trovare l'equazione in m , lo che si farà con sostituire nella seconda equazione il valore trovato di p , il valore di q preso dalla prima, e il valore di t preso dalla quarta, con che si avrà $\frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} + m \times \frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} - m = 0$. Ciò fatto si passi alla eliminazione di tutte le indeterminate a riserva della m , o sia a trovare l'equazione in m , lo che si farà con sostituire nella seconda equazione il valore trovato di p , il valore di q preso dalla prima, e il valore di t preso dalla quarta, con che si avrà $\frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} + m \times \frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} - m = 0$.

Ciò fatto si passi alla eliminazione di tutte le indeterminate a riserva della m , o sia a trovare l'equazione in m , lo che si farà con sostituire nella seconda equazione il valore trovato di p , il valore di q preso dalla prima, e il valore di t preso dalla quarta, con che si avrà $\frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} + m \times \frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} - m = 0$.

Ciò fatto si passi alla eliminazione di tutte le indeterminate a riserva della m , o sia a trovare l'equazione in m , lo che si farà con sostituire nella seconda equazione il valore trovato di p , il valore di q preso dalla prima, e il valore di t preso dalla quarta, con che si avrà $\frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} + m \times \frac{m^3+3m^2-m+3}{3+2m} - m = 0$.

Collo stesso metodo si potrà risolvere qualsivoglia equazione in due fattori comunque; ma poichè l'equazione in m , che ricavasi dalle eliminazioni, ascende a un grado molto maggiore della proposta, e però include una difficoltà assai maggiore, quindi è, che il metodo non è servibile al bisogno; ed io ne ho parlato soltanto, acciò si veda l'uso, che si può fare del calcolo.

M E T O D O II.

Mediante il supporre una radice dell'equazione di questa forma $x=m+n+p$ ec., in cui il numero delle lettere m, n ec. deve essere uguale al grado dell'equazione da risolversi diminuito di una unità.

638. Il presente metodo di cui siamo debitori al Sig. Varignon esige, che dalle equazioni da risolversi sia levato il secondo termine. Egli consiste in supporre una radice x dell'equazione uguale alla somma di tante lettere indeterminate quante ne esprime il massimo esponente dell'equazione diminuito di una unità, onde si farà

Per le equazioni di terzo grado	$x = m + n$
Per quelle del quarto	$x = m + n + p$
del quinto	$x = m + n + p + q$
del sesto	$x = m + n + p + q + r$
del settimo	$x =$ ec.

Fatta questa supposizione si alzi l'uno, e l'altro membro della supposta equazione al grado dell'equazione da risolversi, che sia per Esempio 5, indi nella potestà $m+n+p$ ec., che forma il secondo membro della presente equazione, si distinguano i fattori $m+n+p$ ec.; $m+n+p$ ec.; $m+n+p$ ec.; ec., che corrispondono ad x^5 ; x^4 ; x^3 ; ec., e in vece di quelle quantità si sostituiscono queste, che gli sono uguali, lo che fatto si avrà una equazione, che deve essere identica alla proposta, stante che ella risulta dall'aggregato dell'incognita, e di una quantità, che per l'ipotesi è una radice dell'equazione da risolversi, elevato al medesimo grado: Per lo che facendo il paragone dei coefficienti di una coi coefficienti dell'altra, si verranno a scuoprire i valori delle assunte indeterminate m, n, p ec.; e però ad avere la radice cercata. L'Esempio metterà sotto gli occhi, e renderà evidente quanto ho detto.

639. E primieramente nelle equazioni di secondo grado questo metodo non ha luogo, poichè supponendo egli le equazioni prive del secondo termine, in tal caso le equazioni di secondo grado diventano pure, e però non esigono per la loro risoluzione alcun artificio. Quanto alle equazioni di terzo grado si veda egli messo in pratica al num. 585., in cui per la loro risoluzione ne ho fatto uso: Sicchè passiamo ad applicarlo alle equazioni di quarto grado, rispetto alle quali si dovrà supporre $x=m+n+p$. Prima però n'è necessario premettere il seguente

640. Prob. Nel quadrato-quadrato di $m+n+p$ si debba ritrovare ciò, che moltiplica $m+n+p$, cioè, che moltiplica $m+n+p$, e ciò, che si può chiamare l'omogeneo di comparazione.

E c 2

641.

641. Rifol. Pel num. 263, è $\overline{m+n+p}^4 = \overline{m+n}^4 + 4p \overline{X \overline{m+n}}^3 + 2p^2 \overline{X \overline{m+n}}^2 + 4p^3 \overline{X \overline{m+n}} + 4p^4$: Ma (per lo stesso num.) si ha $\overline{m+n+p}^3 = \overline{m+n}^3 + 2p \overline{X \overline{m+n}}^2 + p^2$, mediante la quale equazione si ha il valore di $\overline{m+n}^3$, che è $\overline{m+n}^3 = \overline{m+n+p}^3 - 2p \overline{X \overline{m+n}}^2 - p^2$, il quale sostituito nella precedente equazione nel termine $2p^2 \overline{X \overline{m+n}}^2$, la trasforma nella seguente

$$\overline{m+n+p}^4 = \overline{m+n}^4 + 4p \overline{X \overline{m+n}}^3 + 2p^2 \overline{X \overline{m+n+p}}^2 - 4p^2 \overline{X \overline{m+n}}^2 - 2p^4 + 4p^3 \overline{X \overline{m+n}}^2 + 4p^3 \overline{X \overline{m+n}} + p,$$

cioè con togliere i termini, che si elidono.

(A) $\overline{m+n+p}^4 = \overline{m+n}^4 + 4p \overline{X \overline{m+n}}^3 + 2p^2 \overline{X \overline{m+n+p}}^2 + 4p^3 \overline{X \overline{m+n}}^2 - p^4$. Ora essendo $\overline{m+n}^4 = m^4 + 4m^3n + 6m^2n^2 + 4mn^3 + n^4$, cioè $\overline{m+n}^4 = 4mn \overline{X \overline{m+n}}^3 - 2m^3n^2 + m^4 + n^4$, in cui sostituendo il valore di $\overline{m+n}^3$ poc'anzi trovato, si cambia ella in $\overline{m+n}^4 = 4mn \overline{X \overline{m+n+p}}^2 - 8mnp \overline{X \overline{m+n}}^3 - 4mnp^2 - 2m^3n^2 + m^4 + n^4$. Si collochi pertanto questo valore di $\overline{m+n}^4$ nell'equazione (A) e si avrà $\overline{m+n+p}^4 = 4mn + 2p^2 \overline{X \overline{m+n+p}}^2 - 8mnp \overline{X \overline{m+n}}^3 - 4mnp^2 - 2m^3n^2 + m^4 + n^4 + 4p \overline{X \overline{m+n}}^3 + 4p^3 \overline{X \overline{m+n}}^2 - p^4$, la quale con fare gli attuali prodotti di $-8mnp \overline{X \overline{m+n}}^3 + 4p \overline{X \overline{m+n}}^3$, $4p^3 \overline{X \overline{m+n}}^2$, trovasi essere

$$\overline{m+n+p}^4 = 4mn + 2p^2 \overline{X \overline{m+n+p}}^2 - 2m^3n^2 + m^4 + n^4 - p^4 + 4p \overline{X \overline{m^2p+m^3+n^3+mn^2+n^2p+m^2n+mn^2p}}.$$

E poichè $m^2p+m^3+n^3+mn^2+n^2p+m^2n+mn^2p = \overline{m^2+n^2} \overline{X \overline{m+n+p}} + mnp$, come costa dal dividere la detta quantità per $m+n+p$, però fatta la sostituzione di questo valore, si avrà finalmente $\overline{m+n+p}^4$

$$= 4mn + 2p^2 \overline{X \overline{m+n+p}}^2 + 4m^2p + 4n^2p \overline{X \overline{m+n+p}} + 4mnp^2 - 2m^3n^2 + m^4 + n^4 - p^4,$$

lo che si doveva trovare.

642. Veniamo adesso alla risoluzione delle equazioni quadrato-quadrate. A tale oggetto prendo l'equazione nella precedente soluzione trovata, e vi sostituisco x^2 in luogo di $\overline{m+n+p}^4$; x^2 in luogo di $\overline{m+n+p}^3$, ed n in luogo di $m+n+p$, con che essa diventa $x^4 - 4mn - 2p^2 \overline{X x^2} - 4m^2p - 4n^2p \overline{X x} - 4mnp^2 + 2m^3n^2 - m^4 - n^4$.

$n^4 + p^4 = 0$. Di questa equazione poscia mi servo per fare i necessarij paragoni coi termini dell'equazione da risolversi.

643. Sia proposta da risolversi l'equazione $x^4 - a^2 x^3 - ab^2 x + a^2 b^2 = 0$. Dal paragone dei coefficienti di questa coi coefficienti della precedente si ha $4mn + 2p^2 = a^2$; $4m^2 p + 4b^2 p = ab^2$; $-4mnp^2 + 2m^2 n^2 - m^4 - n^4 + p^4 = a^2 b^2$. Dalla prima si ha tanto $4mn = a^2 - 2p^2$, come $2mn = \frac{a^2}{2} - p^2$, che elevata al quadrato è $4m^2 n^2 = \frac{a^4}{4}$

$- a^2 p^2 + p^4$. Dalla seconda equazione si ha $m^2 + n^2 = \frac{ab^2}{4p}$, che alzata al quadrato

è $m^4 + 2m^2 n^2 + n^4 = \frac{a^2 b^4}{16p^2}$. La terza equazione si disponga così $-4mnp^2 + p^4 =$

$a^2 b^2 + m^4 - 2m^2 n^2 + n^4$, di cui all'uno, e all'altro membro si aggiunga $4m^2 n^2$, e si avrà $4m^2 n^2 - 4mnp^2 + p^4 = a^2 b^2 + m^4 + 2m^2 n^2 + n^4$. In questa equazione si sostituiscano i poc'anzi ritrovati valori di $4mn$, di $4m^2 n^2$, e di $m^4 + 2m^2 n^2 + n^4$, ed ella si cambierà nella seguente $\frac{a^2}{4} - a^2 p^2 + p^4 - a^2 p^2 + 2p^4 + p^4 = a^2 b^2 + \frac{a^2 b^4}{16p^2}$, cioè $\frac{a^2}{4} - 2a^2 p^2 +$

$4p^4 = a^2 b^2 + \frac{a^2 b^4}{16p^2}$, e togliendo il denominatore p^2 , ordinando l'equazione per p ,

e liberando la massima potestà di p dal coefficiente, si avrà finalmente $p^4 - \frac{1}{2} a^2 p^2$

$- \frac{1}{4} a^2 b^2 p^2 + \frac{1}{16} a^2 p^2 - \frac{1}{64} a^2 b^4 = 0$. Questa è un'equazione derivativa del terzo

grado, mediante la quale si ha il valore di p , che deve essere reale (pel num. 580.), e che presentemente io chiamerò $= A$. Si collochi questo valore di p nelle due prime equazioni $4mn + 2p^2 = a^2$; $4m^2 p + 4n^2 p = ab^2$, e si avrà $4mn + 2A^2 = a^2$;

$4Am^2 + 4An^2 = ab^2$. Dalla prima si prenda il valore di n , che è $\frac{a - 2A^2}{4m} = n$, il

di cui quadrato è $n^2 = \frac{a^2 - 2A^2}{16m^2}$, e questo valore di n^2 si ponga nella seconda

equazione, con che ella diverrà $4Am^2 + 4A \times \frac{a^2 - 2A^2}{16m^2} = ab^2$, la quale con togliere il divisore m^2 , con ordinarla per m , e liberare dal coefficiente la massima

potestà di m , diventa $m^4 - \frac{ab^2 m^2}{4A} + \frac{a^2 - 2A^2}{16} = 0$. Mediante questa equazione,

che è derivativa del secondo grado si ottiene il valore di m , che suppongo $= B$. Si mettano per ultimo i ritrovati valori di m , p nella prima equazione $4mn + 2p^2$

$= a^2$, e si avrà il valore di n . Fatte le sostituzioni ne viene $4Bn + 2A^2 = a^2$, e però $n = \frac{a^2 - 2A^2}{4B}$, quale si chiami $= C$. La cercata radice adunque della proposta

equazione è $x = A + B + C$, che si doveva trovare.

644. Io mi contenterò di questo solo Esempio, perchè, quantunque questo metodo sia cattolico, è però nel tempo stesso laboriosissimo, ed esige calcoli molto penosi, ond'è, che meritamente viene posposto ad altri metodi molto più semplici.

plici, e facili. Ho stimato bene esporlo succintamente a fine di nulla lasciare di quanto su questo punto hanno tentato gli Analisti.

645. Le difficoltà, che seco porta questo metodo sono due. La prima si incontra nello sciogliere il problema, con cui devonfi trovare le quantità (essendo t il grado dell'equazione), che moltiplicano la supposta radice $m+n+p$ ec. elevata alle potestà $t-2$, $t-3$, $t-4$ ec.; mentre per le equazioni di quinto grado nella quinta potestà di $m+n+p+q$ si deve distinguere ciò, che moltiplica

$m+n+p+q$, ciò, che moltiplica $m+n+p+q^2$, $m+n+p+q$, e ciò, che può chiamarsi l'omogeneo di comparazione. Per la risoluzione delle equazioni di sesto grado nella sesta potestà di $m+n+p+q+r$ deve si distinguere ciò, che moltiplica $m+n+p+q+r^2$, ciò, che moltiplica $m+n+p+q+r$, ciò, che moltiplica $m+n+p+q+r^2$, ciò, che moltiplica $m+n+p+q+r$, e ciò, che si può chiamare l'omogeneo di comparazione ec. Questi Problemi poi si scioglieranno in un modo analogo a quello, che ho tenuto nel num. 641.

646. La seconda difficoltà riguarda la determinazione dei valori di m , n , p , q ec., poichè questi valori non si possono avere senza risolvere altrettante equazioni, quante sono le indeterminate m , n , p ec., cioè quante ne mostra il massimo esponente t dell'equazione da risolversi diminuito di una unità; per lo che per avere la radice $m+n+p+q$ ec. di una equazione di quinto grado si dovrà risolvere una equazione del quarto, una del terzo, una del secondo, e una del primo, e generalmente per determinare la radice di una equazione del grado t , bisognerà risolvere tutte le equazioni dei seguenti gradi $t-1$, $t-2$, $t-3$, $t-4$ ec.

M E T O D O III.

Per tutte le equazioni, che ammettono una radice della forma

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2}m} + \sqrt{\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{27}p^n} + \sqrt[n]{\frac{1}{2}m - \sqrt{\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{27}p^n}}$$

647. **A**bbiamo veduto al num. 585, che le equazioni cubiche ricevono una radice della forma precedente. Essi però non sono le sole equazioni, che ammettono per radice reale la somma di due radicali del di lei medesimo grado, come per mezzo delle serie ricorrenti ce ne rese avvertiti il Sig. Moivre. Prima di tutto però bisogna determinare quali siano queste equazioni, lo che si otterrà con iscuoprirla la legge, che fra se osservano i loro coefficienti. Per farlo intanto prendo l'equazione ecumenica $x^n + px^{n-1} + qx^{n-2} + rx^{n-3} + dx^{n-4} + ex^{n-5} + fx^{n-6}$

ec. ... + A=0, e poichè deve essere $x = \sqrt[n]{R} + \sqrt[n]{S}$; o sia per maggiore facilità del calcolo $x = r + s$ (supponendosi $\sqrt[n]{R} = r$, $\sqrt[n]{S} = s$), si sostituiscano nella precedente equazione in luogo di x^n , x^{n-1} , x^{n-2} ec. le quantità $r^n + s^n$, $r^{n-1} + s^{n-1}$, $r^{n-2} + s^{n-2}$ ec. Perchè poi $r+s$ è (per ipotesi) radice dell'equazione, mediante la di lei sostituzione l'equazione stessa deve verificarsi (pel num. 318.); cioè deve andare a ze-

ro l'aggregato dei di lei termini, lo che non potendo succedere senza che scambievolmente si distruggano tutti i radicali, conveniva che osservino fra loro i coefficienti dell'equazione una tale relazione, mediante cui ciò si effettui. Tentiamo adunque di determinare questo rapporto. Faccio pertanto le accennate sostituzioni, e ne ho

l'equazione $\overline{r+s}^{n-1} + a\overline{r+s}^{n-2} + b\overline{r+s}^{n-3} + c\overline{r+s}^{n-4} + d\overline{r+s}^{n-5} + e\overline{r+s}^{n-6} + \text{ec....} + A=0$, la quale con fare le attuali potenze di $r+s$ (giusta il num. 256.) si cambia nella seguente.

Primo termine $r^n + nr^{n-1}s + n\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}r^{n-2}s^2 + n\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}r^{n-3}s^3 + n\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}\overline{X}^{\frac{n-3}{4}}r^{n-4}s^4 + \text{ec....} + s^n$.

Secondo termine $ar^{n-1} + a\overline{X}^{n-1}r^{n-2}s + a\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}r^{n-3}s^2 + a\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}\overline{X}^{\frac{n-3}{4}}r^{n-4}s^3 + a\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}\overline{X}^{\frac{n-3}{4}}\overline{X}^{\frac{n-4}{5}}r^{n-5}s^4 + \text{ec....} + as^{n-1}$.

Terzo termine $br^{n-2} + b\overline{X}^{n-2}r^{n-3}s + b\overline{X}^{\frac{n-2}{2}}\overline{X}^{\frac{n-3}{3}}r^{n-4}s^2 + b\overline{X}^{\frac{n-2}{2}}\overline{X}^{\frac{n-3}{3}}\overline{X}^{\frac{n-4}{4}}r^{n-5}s^3 + b\overline{X}^{\frac{n-2}{2}}\overline{X}^{\frac{n-3}{3}}\overline{X}^{\frac{n-4}{4}}\overline{X}^{\frac{n-5}{5}}r^{n-6}s^4 + \text{ec....} + bs^{n-2}$.

Quarto termine $cr^{n-3} + c\overline{X}^{n-3}r^{n-4}s + c\overline{X}^{\frac{n-3}{2}}\overline{X}^{\frac{n-4}{3}}r^{n-5}s^2 + c\overline{X}^{\frac{n-3}{2}}\overline{X}^{\frac{n-4}{3}}\overline{X}^{\frac{n-5}{4}}r^{n-6}s^3 + c\overline{X}^{\frac{n-3}{2}}\overline{X}^{\frac{n-4}{3}}\overline{X}^{\frac{n-5}{4}}\overline{X}^{\frac{n-6}{5}}r^{n-7}s^4 + \text{ec....} + cs^{n-3}$.

Quinto termine $dr^{n-4} + d\overline{X}^{n-4}r^{n-5}s + d\overline{X}^{\frac{n-4}{2}}\overline{X}^{\frac{n-5}{3}}r^{n-6}s^2 + d\overline{X}^{\frac{n-4}{2}}\overline{X}^{\frac{n-5}{3}}\overline{X}^{\frac{n-6}{4}}r^{n-7}s^3 + d\overline{X}^{\frac{n-4}{2}}\overline{X}^{\frac{n-5}{3}}\overline{X}^{\frac{n-6}{4}}\overline{X}^{\frac{n-7}{5}}r^{n-8}s^4 + \text{ec....} + ds^{n-4}$.

Collo stesso metodo si continui a trovare gli altri susseguenti termini dell'equazione. I già ritrovati termini si dispongano per maggiore comodità così.

Primo termine $r^n + s^n + nr\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}r^{n-2} + s^{n-2} + n\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}r^{n-2}s^2 + s^{n-4} + \text{ec....}$
 $+ n\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}r^3s^3 + \overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}s^{n-6} + n\overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}\overline{X}^{\frac{n-3}{4}}r^4s^4 + \overline{X}^{\frac{n-1}{2}}\overline{X}^{\frac{n-2}{3}}\overline{X}^{\frac{n-3}{4}}s^{n-9} + \text{ec....}$

Se-

Secondo termine $ar^{n-1} + as^{n-1} + a \times \frac{n-1}{2} \times rs \times r^{n-2} + s^{n-2} +$
 $a \times \frac{n-1}{2} \times \frac{n-2}{2} r^2 s^2 \times r^{n-3} + s^{n-3} + a \times \frac{n-1}{2} \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{2} r^3 s^3 \times r^{n-4} + s^{n-4} +$
 $a \times \frac{n-1}{2} \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{2} \times \frac{n-4}{2} r^4 s^4 \times r^{n-5} + s^{n-5} \text{ ec.}$

Terzo termine $br^{n-2} + bs^{n-2} + b \times \frac{n-2}{2} \times rs \times r^{n-3} + s^{n-3} +$
 $b \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{2} r^2 s^2 \times r^{n-4} + s^{n-4} + b \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{2} \times \frac{n-4}{2} r^3 s^3 \times r^{n-5} + s^{n-5} +$
 $b \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{2} \times \frac{n-4}{2} \times \frac{n-5}{2} r^4 s^4 \times r^{n-6} + s^{n-6}$

Quarto termine $cr^{n-3} + cs^{n-3} + c \times \frac{n-3}{2} \times rs \times r^{n-4} + s^{n-4} +$
 $c \times \frac{n-3}{2} \times \frac{n-4}{2} r^2 s^2 \times r^{n-5} + s^{n-5} + c \times \frac{n-3}{2} \times \frac{n-4}{2} \times \frac{n-5}{2} r^3 s^3 \times r^{n-6} + s^{n-6}$

Quinto termine $dr^{n-4} + ds^{n-4} + d \times \frac{n-4}{2} \times rs \times r^{n-5} + s^{n-5} +$
 $d \times \frac{n-4}{2} \times \frac{n-5}{2} r^2 s^2 \times r^{n-6} + s^{n-6} + d \times \frac{n-4}{2} \times \frac{n-5}{2} \times \frac{n-6}{2} r^3 s^3 \times r^{n-7} + s^{n-7}$

648. Chi osserverà i precedenti termini scorderà, che due soli sono razionali, cioè r^n , s^n , e gli altri tutti sono irrazionali, dei quali i simili coi simili si dovranno

vicendevolmente distruggere, affinchè si verifichi, che $r+s$, o sia $\sqrt[n]{R} + \sqrt[n]{S}$ sia una radice dell'equazione. Cominciamo adunque a paragonare fra loro i termini simili, quelli cioè, che hanno lo stesso esponente, a fine di scuoprire la relazione, che deve passare fra i coefficienti, acciocchè i termini simili si distruggano fra loro. Si paragonino pertanto i termini $nr^{n-1} + ns^{n-1}$, che si trovano nel valore di x^n , coi termini $ar^{n-1} + as^{n-1}$, che si trovano nel valore di x^{n-1} , e si avrà $nr^{n-1} + ns^{n-1} = ar^{n-1} + as^{n-1}$. Ora acciò si elidano i due termini nr^{n-1} , ar^{n-1} deve essere $a = nr$, ed affinchè svaniscano i due termini ns^{n-1} , as^{n-1} , deve essere $a = ns$; ma ciò non può essere, perchè a non può essere nel tempo stesso uguale a due diverse quantità, onde qualunque sia il valore di a non si potranno mai elidere i termini $nr^{n-1} + ns^{n-1}$, $ar^{n-1} + as^{n-1}$. Ma se farà $a=0$, in tal caso spariranno i termini $ar^{n-1} + as^{n-1}$, e gli altri due si ridurranno alla forma $nr \times r^{n-1} + s^{n-1}$, che non cadono sotto al presente paragone. Se adunque l'equazione da risolversi non è priva del secondo termine, ella non si può verificare mediante una radice della forma $\sqrt[n]{R} + \sqrt[n]{S}$.

649. Quanto ai termini, ne' quali entra r^{n-3} , s^{n-3} ricerchiamo cosa si riciegga, affinchè si elidano. Dal loro paragone si ha $-nr \times r^{n-3} + s^{n-3} = br^{n-3} + br^{n-3}$, da cui si ricava $b = -nr$, cioè a dire si elideranno questi termini ogni qual volta sia $b = -nr$.

650. Il paragone dei termini, ne' quali entra r^{n-3} , s^{n-3} , dà

$-n \times \frac{n-1}{2} \times \frac{n-2}{3} r^{n-3} s + r^1 s^{n-3} = b \times \frac{n-2}{2} \times r^{n-3} s + r s^{n-3} + cr^{n-3} + cs^{n-3}$, in cui dopo essersi sostituito il poc' anzi trovato valore di b , si scuopre non poterli in modo alcuno verificare; se però sarà $c=0$, spariranno i due termini $cr^{n-3} + cs^{n-3}$, e gli altri si ridurranno alla seguente forma

$n \times \frac{n-1}{2} \times \frac{n-2}{3} r^1 s^1 \times r^{n-4} + s^{n-4} + b \times \frac{n-2}{2} \times r s \times r^{n-4} + s^{n-4}$, onde non spettano al presente paragone. Acciò dunque l'equazione si verifichi deve mancare ancora il quarto termine.

651. Passiamo adesso a paragonare i termini ne' quali entra r^{n-4} , s^{n-4} , dal

qual paragone si ha $-n \times \frac{n-1}{2} \times r^1 s^1 \times r^{n-4} + s^{n-4} = b \times \frac{n-2}{2} \times r s \times r^{n-4} + s^{n-4} + dr^{n-4} + ds^{n-4}$, da cui col sostituirsi il valore trovato di b , ne viene

$$d = n \times \frac{n-3}{2} r^1 s^1.$$

652. Paragonandosi i termini, ne' quali entra r^{n-5} , s^{n-5} , si trova, che in niuna maniera si possono elidere, e però acciò si verifichi l'equazione deve mancare ancora il sesto termine, e lo stesso si troverà rispetto all'ottavo, al decimo, e a tutti gli altri in posto pari.

653. Svaniranno i termini, in cui entra r^{n-6} , s^{n-6} , ogni qual volta sia

$$f = -n \times \frac{n-4}{2} \times \frac{n-5}{3} r^1 s^1, \text{ lo che ricavasi dall'equazione}$$

$-n \times \frac{n-1}{2} \times \frac{n-2}{3} r^1 s^1 = b \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{3} r^1 s^1 + d \times \frac{n-4}{2} \times r s + f$. Nella stessa maniera si determineranno i valori degli altri coefficienti dei termini in posto impari.

654. Siccome poi i coefficienti dell'equazione da risolversi sono razionali, e nei determinati valori dei coefficienti b , d , f ec. si trovano le quantità rs , $r^1 s^1$ ec., quindi ognun vede, che deve essere rs una quantità razionale, il che succederà ogni qual volta le due parti della radice cercata siano tali, che dal loro prodotto si possa levare la radice indicata dal grado dell'equazione.

655. Le equazioni adunque, che possono avere una radice della forma Cardanica devono primieramente essere prive dei termini esistenti in posto pari; in secondo luogo i coefficienti numerici convenienti a ciascun termine devono essere i seguenti.

$$\begin{aligned}
 \text{I} &= n; \\
 \text{II} &= n \times \frac{n-3}{2}; \\
 \text{III} &= n \times \frac{n-4 \times n-5}{2 \times 3}; \\
 \text{IV} &= n \times \frac{n-5 \times n-6 \times n-7}{2 \times 3 \times 4}; \\
 \text{V} &= n \times \frac{n-6 \times n-7 \times n-8 \times n-9}{2 \times 3 \times 4 \times 5}; \\
 \text{VI} &= n \times \frac{n-7 \times n-8 \times n-9 \times n-10 \times n-11}{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6}; \\
 \text{VII} &= n \times \frac{n-8 \times n-9 \times n-10 \times n-11 \times n-12 \times n-13}{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7} \text{ ec.}
 \end{aligned}$$

656. Che se in questi coefficienti indeterminati si sostituiranno successivamente i numeri 2, 3, 4, 5, 6 ec. indicanti i gradi delle equazioni, si avranno i coefficienti numerici, che convengono a ciascun termine di tali equazioni, come si può vedere nella seguente Tavola, in cui i numeri romani della prima colonna verticale esprimono i gradi delle equazioni, e i numeri arabi della prima fila orizzontale esprimono l'ordine di ciascun termine: Le altre file poi orizzontali esibiscono i coefficienti numerici, che devono avere i termini dell'equazione indicata dal corrispondente numero romano.

T A V O L A.

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II	2									
III	3									
IV	4	2								
V	5	5								
VI	6	9	2							
VII	7	14	7							
VIII	8	20	16	2						
IX	9	27	30	9						
X	10	35	50	25	2					
XI	11	44	77	55	11					
XII	12	54	112	105	36	2				
XIII	13	65	156	182	91	13				
XIV	14	77	210	294	196	49	2			
XV	15	90	275	450	378	140	15			
XVI	16	104	352	660	672	336	64	2		
XVII	17	119	442	935	1122	714	204	17		
XVIII	18	135	546	1287	1782	1386	540	81	2	
XIX	19	152	665	1729	2717	2508	1254	285	19	
XX	20	170	800	2275	4004	4290	2640	825	100	2

657. Già abbastanza ognun vede con che legge procedono i ritrovati coefficienti numerici, onde poterne prolungare la serie a piacere, e così proseguire la precedente Tavola.

658. Mediante i coefficienti, che devono convenire ai termini dell'equazione, ritrovati ai num. 649, 651, 653, si può formare l'equazione ecumenica rappresentante tutte le equazioni, che ammettono una radice della forma Cardanica, quale

$$\text{farà la seguente } x^n - nr x^{n-2} + n \chi \frac{n-3}{2} r^2 s^2 x^{n-4} - n \chi \frac{n-4}{2} \chi \frac{n-5}{2} r^2 s^2 x^{n-6} + \\ n \chi \frac{n-5}{2} \chi \frac{n-6}{2} \chi \frac{n-7}{2} r^2 s^2 x^{n-8} - n \chi \frac{n-6}{2} \chi \frac{n-7}{2} \chi \frac{n-8}{2} \chi \frac{n-9}{2} r^2 s^2 x^{n-10} + \text{ec....}$$

— $r^n - s^n = 0$. Qualora pertanto debbasi risolvere una equazione, che abbia le già scoperte condizioni, basterà paragonare il coefficiente del secondo termine, e l'ultimo termine dell'equazione data con i corrispondenti di questa equazione generale, e per mezzo di un tal paragone determinare i valori di r , s , mentre se questi valori si sostituiranno nella supposta radice $x = r + s$, si otterrà la radice cercata.

659. Si debba per Esempio trovare la radice Cardanica, che ha l'equazione $x^6 - 6bx^4 + 9b^2 x^2 - 2d = 0$. Si paragonino il coefficiente del secondo, e il di lei ultimo termine col coefficiente del secondo, e coll'ultimo termine dell'equazione generale, e si avrà $6b = 6rs$, o sia $b = rs$, e $2d = r^6 + s^6$. Dalla prima equazione si ha

Ff 2

r =

$r = \frac{b}{s}$, che elevata alla sesta potestà è $r^6 = \frac{b^6}{s^6}$. Sostituendosi questo valore di r^6 nella seconda equazione, ne verrà $2d = \frac{b^6}{s^6} + s^6$, che ordinata è $s^{12} - 2ds^6 + b^6 = 0$, in cui facendosi $s^6 = y$, si cambierà essa nella seguente $y^2 - 2dy + b^6 = 0$, che risolta è $y = d \pm \sqrt{d^2 - b^6}$, cioè (con rimetterfi s^6 in luogo di y) $s^6 = d \pm \sqrt{d^2 - b^6}$, e però $s = \sqrt[6]{d \pm \sqrt{d^2 - b^6}}$. Nello stesso modo operando si troverà

$r = \sqrt[6]{d \mp \sqrt{d^2 - b^6}}$: Quindi la cercata radice è

$$x = \sqrt[6]{d \pm \sqrt{d^2 - b^6}} + \sqrt[6]{d \mp \sqrt{d^2 - b^6}}.$$

660. Ritrovata una radice, si avranno le altre con moltiplicare la radice trovata in tutte le radici d' egual grado dell'unità, relativamente alla maniera praticata al num. 585, cioè a dire, se la radice trovata è del grado n , in tutte le radici dell'equazione $y^n - 1 = 0$: Ma siccome questa equazione $y^n - 1 = 0$ ha una sola radice reale, se l' esponente n è un numero impari, e due se n è un numero pari, e tutte l' altre sono immaginarie, perciò tali pure devono essere le radici dell'equazione proposta da risolversi; che se ella avrà tutte le radici reali, la soluzione esposta involverà il caso irriducibile.

661. Quantunque il modo di determinare i valori di r , s , e così avere la radice cercata, mediante l' accennato paragone de' termini goda di tutta la semplicità, e facilità, pure mi sembra non dovrà essere discaro, che qui soggiunga, come ciò ancora ottenere si possa per mezzo delle due seguenti equazioni generali A, B, o sia di una equazione in due diverse maniere espressa.

$$(A) \quad 2ym^{n-1} = x + \sqrt[n]{xx - mm} + x - \sqrt[n]{xx - mm}$$

$$(B) \quad 2xm^{\frac{1}{n}-1} = y + \sqrt[n]{yy - mm} + y - \sqrt[n]{yy - mm}$$

Prima però è mestiere dimostrare, che valendo una di queste equazioni, vale anche l'altra; Di fatto si alzi al quadrato l'equazione (A), e si avrà $4y^2m^{2n-2} =$

$$x^2 + \sqrt[n]{xx - mm} + 2m^{1/n} + x - \sqrt[n]{xx - mm}, \text{ e sottraendo } 4m^{1/n} \text{ dall'uno, e dall'altro}$$

$$\text{membro di questa equazione si avrà } 4y^2m^{1/n-2} - 4m^{1/n} = x + \sqrt[n]{xx - mm}$$

$$+ 2m^{1/n} - 4m^{1/n} + x - \sqrt[n]{xx - mm}, \text{ cioè } 4m^{1/n-2} \sqrt[n]{y^2 - m^2} = x + \sqrt[n]{xx - mm}$$

$$- 2m^{1/n} + x - \sqrt[n]{xx - mm}, \text{ da cui levando la radice quadrata si ha (D) } 2m^{1/n-1} \sqrt{y^2 - m^2} =$$

$= \pm x + \sqrt{xx - mm} \mp x - \sqrt{xx - mm}$, la quale (secondo che in lei ha luogo il segno superiore, o inferiore) si aggiunga all'equazione [A], o della medesima si sot-

tragga, e si avrà $2ym^{n-1} + 2m^{n-1}\sqrt{y^2 - m^2} = 2 \times x + \sqrt{xx - mm}$,

cioè $m^{n-1} \times y \pm \sqrt{y^2 - m^2} = x + \sqrt{xx - mm}$, dalla quale si levi la radice n , così

$m^{\frac{1}{n}-1} \times y \pm \sqrt{y^2 - m^2}^{\frac{1}{n}} = x + \sqrt{xx - mm}$, ma perchè $m^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{m^{\frac{1}{n}-1}}$, però essa

farà $\frac{1}{m^{\frac{1}{n}-1}} \times y \pm \sqrt{y^2 - m^2}^{\frac{1}{n}} = x + \sqrt{xx - mm}$, cioè [E] $m^{\frac{1}{n}-1} \times x + \sqrt{xx - mm} =$

$y \pm \sqrt{y^2 - m^2}^{\frac{1}{n}}$. Di nuovo si sottragga l'equazione (D) dall'equazione (A), o vi si ag-

giunga (secondo che nell'equazione (D) ha luogo il segno superiore, o inferiore), e

si avrà $2m^{n-1} \times y \mp \sqrt{y^2 - m^2} = 2 \times x - \sqrt{xx - mm}$, cioè (coll'estrarci la radice n)

$m^{\frac{1}{n}-1} \times y \mp \sqrt{y^2 - m^2}^{\frac{1}{n}} = x - \sqrt{xx - mm}$, e però per la ragione poc' anzi detta

$m^{\frac{1}{n}-1} \times x - \sqrt{xx - mm} = y \mp \sqrt{y^2 - m^2}^{\frac{1}{n}}$. Si sommi adesso questa equazione coll'e-

quazione [E], e ne verrà $2xm^{\frac{1}{n}-1} = y + \sqrt{y^2 - m^2}^{\frac{1}{n}} + y - \sqrt{y^2 - m^2}^{\frac{1}{n}}$, che è la stes-

sa equazione (B); quindi posta l'equazione (A) fusiste anche la (B). Nella stessa maniera operando dall'equazione (B) si passerà all'equazione (A).

652. Si offervi, che nell'equazione (D) si deve far uso del segno superiore +, quando l'esponente n è positivo, ma se l'esponente n farà negativo, si dovrà far uso del segno inferiore -, affinchè il di lei secondo membro sia positivo.

653. Ciò posto veniamo al modo di usare queste due formole generali per avere la radice cardanica delle equazioni, di cui ora si tratta. Primieramente adunque si sostituisca nell'equazione [A] in luogo dell'esponente indeterminato n l'esponente dell'equazione da risolverli, indi alla potenza indicata da questo esponente si alzino

le quantità m^{n-1} , $x + \sqrt{xx - mm}$, $x - \sqrt{xx - mm}$, poscia si ordini per x l'equazione. Fatto ciò si paragonino i coefficienti di questa equazione coi coefficienti dell'equazione da risolverli, e si determini il valore di m , e di ym , e dello sue potestà,

che entrano nell'equazione [B], in cui pure in luogo dell'esponente $\frac{1}{n}$ si deve porre quello, che gli conviene, e fatte le debite sostituzioni in questa equazione [B], nella quale dev'essere lasciata la x sola da una parte del segno d' egualità,

darà essa la radice cercata. Proporrò un solo Esempio per non diffondermi in una cosa tanto chiara.

654. Debbaſi ritrovare la radice dell'equazione $x^5 - 5cx^4 + 5c^2x^3 - b = 0$. A queſto fine prendo l'equazione A, e in luogo di n vi pongo 5, onde eſſa farà $2ym^4 =$

$\sqrt[5]{x + \sqrt{xx - mm}} + x - \sqrt{xx - mm}$. Alzo alla quinta poteſtà le due quantità $x + \sqrt{xx - mm}$, $x - \sqrt{xx - mm}$, indi ordino l'equazione per x , e mi viene $x^5 - \frac{5}{4}m^2x^3 + \frac{5}{16}m^4x - \frac{1}{16}ym^4 = 0$. Paragono i coefficienti di queſta coi coefficienti dell'equazione propoſta, e ne ho $m^2 = 4c$, e però $m^4 = 16c^2$, e $ym^4 = 16b$. Prendo adeſſo l'equazione B, e vi ſoſtituiſco $\frac{1}{5}$ in luogo di $\frac{1}{n}$, con che eſſa diventa

$$2xm^{\frac{1}{5}} - \frac{4}{5}, \text{ o ſia } 2xm^{\frac{1}{5}} - \frac{4}{5}, \text{ e però } \frac{2x}{m^{\frac{1}{5}}} = \sqrt[5]{y + \sqrt{yy - mm}} + \sqrt[5]{y - \sqrt{yy - mm}},$$

conſequentemente $x = \frac{1}{2}\sqrt[5]{ym^4 + \sqrt{yy m^4 - m^{10}}} + \frac{1}{2}\sqrt[5]{ym^4 - \sqrt{yy m^4 - m^{10}}}$. In queſta eſpreſſione ſoſtituiſco per ultimo i valori di ym^4 , ym^8 , m^{10} , e ne ho finalmente

$$\text{la radice cercata, che è } x = \frac{1}{2}\sqrt[5]{16b + \sqrt{256b^2 - 1024c^2}} + \frac{1}{2}\sqrt[5]{16b - \sqrt{256b^2 - 1024c^2}}, \text{ cioè } x = \frac{1}{2}\sqrt[5]{16b + 16\sqrt{\frac{b^2}{4} - c^2}} + \frac{1}{2}\sqrt[5]{16b - 16\sqrt{\frac{b^2}{4} - c^2}}$$

M E T O D O IV.

Mediante il ritrovare i limiti, fra' quali cadono le radici dell'equazione.

655. **D**iconſi limiti di una qualunque radice quelle quantità, fra le quali eſſa eſſe: Come ſe una radice non farà maggiore di 7, nè minore di 6, queſti due numeri 7, 6 faranno i di lei limiti. Circa la maniera poi di ritrovare queſti limiti verſa il preſente merodo, laſciaroci dal Sig. Newton.

656. Abbiamo veduto ai num. 505., 511., che ſe una equazione avrà tutte le radici reali, con moltiplicarſi ciaſcun di lei termine per l'eſponente, che in tal termine ha l'incognita, ne verrà un'equazione inferiore di un grado, le di cui radici faranno reali, e contenute fra le radici dell'equazione propoſta. Lo ſteſſo ſuccederà all'equazione, che naſcerà dal moltiplicarſi i termini di queſta equazione trovata negli eſponenti dell'incognita, e così in ſeguito. Data pertanto un'equazione, delle di cui radici ſi vogliano trovare i limiti, ſi moltiplichino primieramente i di lei ter-

mi-

mini nei corrispondenti esponenti dell'incognita, lo stesso si faccia coll'equazione, che ne nasce, e così successivamente rispetto alle altre, finchè si giunga ad una equazione di primo grado. Ciò fatto si comincino a determinare i limiti della massima, e della minima radice dell'equazione proposta, cioè a dire si determini il numero, che è maggiore della massima, e il numero, che è minore della minima di lei radice, e ciò si otterrà con prendere il minimo numero positivo, il quale sostituito in tutte le accennate equazioni rende in ciascuna positivo l'aggregato di tutti i termini, mentre questo numero sarà maggiore della massima radice dell'equazione proposta; indi prendere il minimo numero negativo, il quale nelle dette equazioni sostituito fa alternare da positivi a negativi, e da negativi a positivi gli aggregati di tutti i termini di ciascuna equazione, e tale numero sarà minore della minima radice dell'equazione data.

667. Che poi il minimo numero positivo, il quale sostituito nelle ritrovate equazioni rende in ciascuna positivo l'aggregato di tutti i termini, sia maggiore della massima radice dell'equazione proposta, siccome il minimo numero negativo, che ne fa passare gli aggregati da positivi a negativi alternativamente, sia minore della di lei minima radice, io dimostro così: E quanto al primo, poichè questo numero rende positivo l'aggregato dei termini dell'equazione di primo grado, egli deve essere maggiore della sua radice, la quale o è negativa, e in tal caso egli, che è positivo n'è maggiore, o ella è positiva, e in tal caso essendo essa unita all'incognita col segno —, perchè l'equazione è uguagliata a zero, non può rendere positivo questo aggregato, se non è maggiore della stessa radice. Siccome poi la radice di questa equazione di primo grado cade fra le due radici della seguente equazione di secondo grado, però una di esse è minore di questa, onde il di lei aggregato con l'incognita supposta uguale al detto numero è necessariamente positivo: Ma poichè l'equazione, essendo di secondo grado, risulta da due fattori semplici, se uno di questi è positivo, come pur ora abbiamo veduto esserne uno, dovrà pure essere positivo anche l'altro, altrimenti non farebbe positivo il loro prodotto, e conseguentemente non farebbe positivo (contro l'ipotesi) l'aggregato dei termini di questa equazione di secondo grado. Per la stessa ragione delle tre radici della seguente equazione di terzo grado due essendo minori della massima radice dell'equazione del secondo grado, il loro aggregato coll'incognita, sempre supposta uguale al già detto numero positivo, deve essere positivo, e però positivo sarà il loro prodotto; dunque perchè l'aggregato dei termini di questa equazione di terzo grado è positivo per l'ipotesi, cioè a dire è positivo il prodotto de' suoi fattori, essendo positivi due, deve essere positivo anche il terzo; ma ciò non può essere, se il numero sostituito in luogo dell'incognita non è maggiore anche della terza radice, che è la più grande delle altre, dunque il numero sostituito è maggiore di ciascuna delle di lei radici. Estendendosi lo stesso discorso alle seguenti equazioni di quarto, di quinto grado ecc., si dimostrerà, che l'assunto numero è maggiore di ciascuna delle loro radici. Dunque il minimo numero positivo, che, sostituito in tutte le equazioni dei limiti, rende positivo in ciascuna l'aggregato di tutti i termini, è maggiore della massima radice dell'equazione proposta.

668. Da ciò necessariamente ne segue, che se il numero sostituito renderà in qualche equazione negativo l'aggregato di tutti i termini, tale numero sarà minore della massima radice dell'equazione proposta.

669. Quanto al secondo il discorso è pure lo stesso, e primieramente supponiamo, che tutte le radici dell'equazione siano negative, nel qual caso esse si uniranno all'incognita col segno +, a fine di formare i fattori semplici. Il numero negati-

rivo sostituito in luogo di x nell'ultima equazione dei limiti, che è di primo grado, dovendo rendere un aggregato negativo dovrà essere maggiore nell'espressione della radice di tale equazione, ma in sostanza minore della medesima (pel num. 52.); e siccome la radice di questa equazione cade tra le due radici della seguente equazione di secondo grado, delle quali perciò una deve essere di questa radice maggiore, perciò il numero sostituito deve in sostanza essere di lei minore, mentre è minore della radice dell'equazione di primo grado, che della stessa è minore: Essendo pertanto minore in sostanza, e maggiore in apparenza, con che risulta un fattore negativo, deve pure essere in sostanza minore anche dell'altra radice, perchè il prodotto di questi due fattori essendo per ipotesi positivo, non può essere negativo un fattore, se non lo è anche l'altro, dunque necessariamente il numero sostituito deve essere maggiore in apparenza, ma minore in sostanza dell'una, e dell'altra delle due radici: Nella stessa maniera continuando il discorso si dimostrerà, che il numero sostituito deve essere minore di ciascuna delle radici delle seguenti superiori equazioni, e però della proposta. Che se egli è minore di ciascuna radice quando tutte sono negative, egli è ben chiaro, che molto più lo è quando o tutte sono positive, o parte positive, e parte negative. Quel numero adunque negativo, che sostituito in ciascuna equazione dei limiti ne rende gli aggregati di tutti i termini alternativamente positivi, e negativi, è minore della minima radice dell'equazione proposta. Lo che dovevasi dimostrare.

670. Quindi se il numero sostituito non farà alternare i segni agli aggregati di tutti i termini delle equazioni dei limiti, egli farà maggiore della minima radice dell'equazione data.

671. Prendo l'esempio dall'equazione $x^4 + 2x^3 - 18x^2 - 30x + 81x + 72x - 108 = 0$, la quale scrivo qui sotto insieme colle provenienti equazioni dei limiti.

$$I \quad x^4 + 2x^3 - 18x^2 - 30x + 81x + 72x - 108 = 0$$

$$II \quad x^3 + \frac{2}{3}x^2 - 12x^2 - 15x^2 + 27x + 12 = 0$$

$$III \quad x^2 + \frac{4}{3}x - 7\frac{1}{3}x^2 - 6x + 5\frac{2}{3} = 0$$

$$IV \quad x + x - 3\frac{2}{3}x - \frac{3}{2} = 0$$

$$V \quad x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{6}{5} = 0$$

$$VI \quad x + \frac{1}{3} = 0$$

In ciascuna di queste equazioni sostituendo il numero 4 in luogo di x , gli aggregati de'loro termini risultano tutti positivi, come si vede in (A). Dunque se la proposta equazione ha tutte le radici reali, farà la sua massima radice positiva minore di 4, e maggiore di 3. Ma in luogo di x sostituendo -4 nelle suddette equazioni, gli aggregati de'loro termini passano alternativamente da positivi a negativi, come si può vedere in (B). Dunque se la data equazione avrà tutte le radici reali, la sua minima radice negativa farà minore di -3 , e maggiore di -4 . La condizione poi, che le radici dell'equazione siano reali è indispensabile, perchè quando le radici so-

no

no immaginarie non vi si può applicare il presente metodo dei limiti (pel num. 471.), il quale esige, che l'aggregato de' termini possa passare dal positivo al negativo.

A

- I $4^6 + 2 \times 4^5 - 18 \times 4^4 - 30 \times 4^3 + 81 \times 4^2 + 72 \times 4 - 108 = +1092$
 II $4^5 + \frac{2}{3} \times 4^4 - 12 \times 4^3 - 15 \times 4^2 + 27 \times 4 + 12 = +562 \frac{2}{3}$
 III $4^4 + \frac{4}{3} \times 4^3 - 7 \frac{2}{3} \times 4^2 - 6 \times 4 + 5 \frac{2}{3} = +207 \frac{4}{3}$
 IV $4^3 + 4^2 - 3 \frac{2}{3} \times 4 - \frac{2}{3} = +64 \frac{1}{10}$
 V $4^2 + \frac{2}{3} \times 4 - \frac{6}{3} = +17 \frac{2}{15}$
 VI $4 + \frac{1}{3} = +4 \frac{1}{3}$

B

- I $4^6 + 2 \times \sqrt{-4^5} - 18 \times 4^4 - 30 \times \sqrt{-4^3} + 81 \times 4^2 + 72 \times \sqrt{-4} - 108 = 160$
 II $-4^5 + \frac{2}{3} \times 4^4 - 12 \times \sqrt{-4^3} - 15 \times 4^2 + 27 \times \sqrt{-4} + 12 = -165 \frac{1}{3}$
 III $4^4 + \frac{4}{3} \times \sqrt{-4^3} - 7 \frac{2}{3} \times 4^2 - 6 \times \sqrt{-4} + 5 \frac{2}{3} = 85 \frac{2}{15}$
 IV $-4^3 + 4^2 - 3 \frac{2}{3} \times \sqrt{-4} - \frac{2}{3} = -35 \frac{1}{10}$
 V $4^2 + \frac{2}{3} \times \sqrt{-4} - \frac{6}{3} = 12 \frac{2}{15}$
 VI $-4 + \frac{1}{3} = -3 \frac{2}{3}$

672. Trovato il modo di conoscere il minimo numero positivo, che è maggiore della massima radice positiva di una qualsivoglia equazione, e il minimo numero negativo, che è minore della minima di lei radice, passiamo a indagare la maniera di scuoprire i numeri, che servono di limiti a tutte le di lei radici. Data una equazione, delle di cui radici si vogliano ritrovare i limiti, si risolva essa nel modo esposto in tutte le inferiori equazioni fino all'ultima di primo grado, e ciò mediante la replicata moltiplicazione dei termini di ciascuna negli esponenti dell'incognita. Dell'ultima per essere di primo grado si ha facilissimamente la radice, che per ora supponerò = M. Mediante quest'ultima equazione di primo grado, e la penultima del secondo, si determini (giusta il num. 655.) il minimo numero positivo e, che è maggiore della massima radice positiva dell'equazione di secondo grado, e il minimo numero negativo f, che è minore della minima di lei radice, con che si avranno i limiti delle due radici dell'equazione di secondo grado, delle quali una caderà

Tom. II.

G g

fra

fra e , ed M , e l'altra fra M , ed f . Con questi limiti si trovino le vere, o quasi vere radici dell'equazione di secondo grado nella maniera, che darò in appresso al num. 675., e quelle radici siano H , K (ho cominciato dall'equazione di primo grado in grazia dell'ordine; per altro siccome le radici di una equazione di secondo grado li hanno con tutta facilità, e speditezza, però si può dalla medesima cominciare). Fatto ciò, con prevalersi delle equazioni del primo, del secondo, e del terzo grado, si trovi il minimo numero positivo e , che è maggiore della massima radice della stessa equazione di terzo grado, e il minimo numero negativo d , che è minore della minima di lei radice, e con ciò si faranno trovar i limiti delle tre radici dell'equazione di terzo grado, delle quali una caderà tra e , ed H , la seconda tra H , e K , la terza tra K , e d . Avuti questi limiti, si trovino le vere, o quasi vere radici E , F , G dell'equazione di terzo grado (pel seguente num. 675.). Dopo ciò si passi per mezzo delle equazioni di primo, secondo, terzo, e quarto grado a trovare il minimo numero positivo a , che è maggiore della massima radice positiva della stessa equazione di quarto grado, e il minimo numero negativo b , che è minore della di lei minima radice, e con ciò si avranno tutti i limiti delle radici dell'equazione di quarto grado, delle quali una medierà fra a , ed E , la seconda tra E , ed F , la terza tra F , e G , e la quarta tra G , e b . Collo stesso metodo proseguendo si troveranno i limiti di tutte le radici delle altre equazioni superiori. Ben è vero però che il metodo è lungo, e noioso.

a	A	B	C	D	b
	c	E	F	G	d
	e	H	K	f	
		M			

673. Accadendo che due limiti di una radice siano fra loro molto distanti, e volendoli restringere finchè differiscano di una sola unità a motivo di avere il prossimo valore della radice, si faccia così: Si diminuisca tanto il maggiore, e si accresca tanto il minore, finchè, sostituendo e l'uno, e l'altro nell'equazione in luogo dell'incognita, quello che rendeva positivo l'aggregato di tutti i termini dell'equazione, ve lo renda tuttavia, e quello, che dava negativo l'aggregato di tutti i termini dell'equazione, continui a somministrarlo negativo. La ragione poi di ciò si ripete dal num. 470., in cui si è osservato, che se si sostituiranno in una equazione in luogo dell'incognita due quantità, delle quali una sia maggiore, e l'altra minore di una delle sue radici, gli aggregati de' termini, che risulteranno da queste sostituzioni faranno affetti da diverso segno, quando però tra le due dette quantità non cadesse un numero pari di radici. Per lo che se, sostituendosi gradatamente diverse quantità in luogo dell'incognita, gli aggregati, che da queste sostituzioni risulteranno, faranno affetti dallo stesso segno, tali quantità faranno o tutte maggiori, o tutte minori di una stessa radice.

674. Per altro si possono determinare ancora algebricamente i limiti della massima radice di una equazione. Ne foggiungerò l'esempio nella formola generale delle equazioni di terzo grado mancanti del secondo termine. Sia pertanto l'equazione $x^3 - qx + r = 0$, o sia $x^3 + r = qx$. Sarà adunque $x^3 < qx$, cioè $x^2 < q$, e x però $x < \sqrt{q}$. Parimente sarà $qx > r$, ed $x > \frac{r}{q}$. La massima radice adunque di

que

questa equazione cade tra $\sqrt{q}$, ed $\frac{r}{q}$. Se l'equazione sarà $x^3 + qx - r = 0$, cioè $x^3 + qx = r$, si avrà $qx < r$, ed $x < \frac{r}{q}$. Di nuovo sia $r > x^3$, quindi $\sqrt[3]{r} > x$, o sia $\sqrt[3]{r^3} > x^3$, conseguentemente $x \sqrt[3]{r^3} > x^3$, ed aggiungendo a una parte, e all'altra qx , si avrà $x \sqrt[3]{r^3} + qx > x^3 + qx$; ma $x^3 + qx$ è uguale ad r , dunque sostituendo r in luogo di $x^3 + qx$, ne verrà $x \sqrt[3]{r^3} + qx > r$, e finalmente $x > \frac{r}{\sqrt[3]{r^3} + q}$. Quindi la massima radice cade tra $\frac{r}{q}$, ed $\frac{r}{\sqrt[3]{r^3} + q}$. Consimili artifizi si usino per trovare i limiti della massima radice nell'altre equazioni.

675. Ritrovati i limiti delle radici resteranno per ultimo da ritrovarsi i veri, o quasi veri loro valori. Se le radici saranno razionali, se ne avranno i veri valori, ma se saranno irrazionali bisognerà contentarsi del prossimamente vero valore. Il modo di approssimarsi al vero valore di una radice, dati essendo i di lei limiti è il seguente: Sia l'equazione $x^3 - 2x - 6 = 0$, la di cui massima radice ha per limiti i numeri 3, 4, cioè ella è maggiore di 3, ma minore di 4. Si supponga pertanto, che ella sia $3 + y$, così che la y sia ciò, che manca al 3 per somministrare la radice cercata. Qui adunque si tratta di determinare quale esser debba il valore di y . Per ritrovarlo si trasformi (pel num. 526.) l'equazione proposta $x^3 - 2x - 6 = 0$ facendo $x = 3 + y$, con che ne verrà una equazione data per y , mediante la quale si avrà il ricercato valore di y . Ecco il calcolo

$$\begin{array}{r} x^3 = 9 + 6y + y^3 \\ - 2x = - 6 - 2y \\ \hline - 6 = - 6 \end{array}$$

Equaz. trasfor. $-3 + 4y + y^3 = 0$

Ora in questa equazione $y^3 + 4y - 3 = 0$ dovendo essere il valore di y una quantità assai piccola, e una frazione essendo tanto più piccola, quanto maggiore è la potenza a cui è inalzata, però sarà y^3 assai più piccola di y , e siccome si cerca il quasi vero valore, quindi al confronto di y si potrà trascurare y^3 , con che l'equazione si ridurrà a $4y = 3$, da cui si ha il valore di y , che è $y = \frac{3}{4}$, o sia, con ridurlo alla frazione decimale, $y = 0.75$, conseguentemente la radice cercata sarà 3.75. Qualora non si sia contento dell'espressione trovata, si voglia accostare ancora al vero valore, bisognerà trasformare di nuovo l'equazione data, supponendo $x = 3.75 + y$ con che si avrà

$$\begin{array}{r} x^3 = 14.0625 + 7.50y + y^3 \\ -2x = 7.50 - 2y \\ -6 = 0 \end{array}$$

Equaz. trasfor. $+ 0.5625 + 5.50y + y^3 = 0$

la quale equazione con trascurarsi y^3 è, $5.50y = -0.5625$, e però $y = -0.102272$. La cercata radice adunque è $3.75 - 0.102272$, cioè 3.647728 . Quando piaccia si potrà accostare ancora al vero valore di questa radice, con trasformare di nuovo l'equazione data, supponendo $x = 3.647728 + y$, e proseguendo l'operazione nella maniera pur ora osservata.

676. In vece di prevalersi delle trasformazioni a fine di ritrovare il valore di quella piccola quantità, di cui devesi aumentare il limite minore, o di cui devesi diminuire il limite maggiore, per avere il vero, o quasi vero valore della radice cercata, si può far uso della seguente formola canonica

$$\left(\frac{m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} + cm^{n-3} + dm^{n-4} \text{ ec.}}{nm^{n-1} + n-1 \times am^{n-2} + n-2 \times bm^{n-3} + n-3 \times cm^{n-4} \text{ ec.}} \right)$$

in cui la lettera m rappresenta il limite minore della cercata radice, ed n esprime l'esponente dell'equazione da risolversi: Per lo che la di lei radice cercata farà $x = m -$

$$\left(\frac{m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} \text{ ec.}}{nm^{n-1} + n-1 \times am^{n-2} \text{ ec.}} \right).$$

Se dopo essersi avuto mediante questa formola il va-

lore di cui devesi accrescere il limite m , si vorrà approssimare sempre più al vero valore della radice, bisognerà in tal caso supporre $m =$

$$\left(\frac{m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} \text{ ec.}}{nm^{n-1} + n-1 \times am^{n-2} \text{ ec.}} \right) = p,$$

con che si avrà la seguente formola generale,

che darà il valore anche più prossimo cercato $x = p -$

$$\left(\frac{p^n + ap^{n-1} + bp^{n-2} + cp^{n-3} \text{ ec.}}{np^{n-1} + n-1 \times ap^{n-2} + n-2 \times bp^{n-3} \text{ ec.}} \right).$$

Idesttamente seguitando a sostituire nella prima formola i nuovi ritrovati valori si potrà accostare quanto si vorrà alla vera radice,

677. Ecco poi come si trovi, e insieme si dimostri codesta formola d'approssimazione. Sia l'equazione ecumenica (A) $x^n + ax^{n-1} + bx^{n-2} + cx^{n-3} + dx^{n-4} \text{ ec.} = 0$, di cui una radice da determinarsi abbia per limite prossimo minore la quantità m . Sarà adunque $x = m$ un tal fattore, la di cui seconda parte farà la radice dell'equazione mancante dalla vera. Si divida pertanto l'equazione

$$(A) \text{ per questo fattore } x - m, \text{ e ne verrà il quoziente } (B) \ x^{n-1} + m + a \times x^{n-2} + m^2 + am + b \times x^{n-3} + m^2 + am^2 + bm + c \times x^{n-4} \text{ ec. col residuo } (C) \ m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} + cm^{n-3} \text{ ec. Collo stesso fattore } x - m \text{ si passi a dividere il ritrovato quoziente } (B), \text{ lo che fatto si avrà di quoziente } (D) \ x^{n-2} +$$

$\overline{2m+a} \times x^{n-1} + \overline{3m^2+2am+b} \times x^{n-2} + \overline{4m^3+3am^2+2bm+c} \times x^{n-3}$ ec., e di residuo (E) $m^{n-1} + \overline{m+a} \times m^{n-2} + \overline{m^2+am+b} \times m^{n-3} +$

$\overline{m^3+am^2+bm+c} \times m^{n-4}$ ec. Si divida parimente col fattore $x-m$ il provenuto quoziente (D), e il quoziente farà (F) $x^{n-1} + \overline{3m+a} \times x^{n-2} +$

$\overline{6m^2+3am+b} \times x^{n-3} + \overline{10m^3+6am^2+3bm+c} \times x^{n-4}$ ec. col residuo (G) $m^{n-1} + \overline{2m+a} \times m^{n-2} + \overline{3m^2+2am+b} \times m^{n-3} + \overline{4m^3+3am^2+2bm+c} \times m^{n-4}$ ec. Iteffamente col fattore $x-m$ si divida questo quoziente (F), con che ne verrà di quoziente [H] $x^{n-2} + \overline{4m+a} \times x^{n-3} + \overline{10m^2+4am+b} \times x^{n-4} +$

$\overline{20m^3+10am^2+4bm+c} \times x^{n-5}$ ec., e di residuo [I] $m^{n-1} + \overline{3m+a} \times m^{n-2} + \overline{6m^2+3am+b} \times m^{n-3} + \overline{10m^3+6am^2+3bm+c} \times m^{n-4}$ ec. Colla stessa maniera si divida per $x-m$ questo quoziente [H], e così si divida quello, che ne nasce, e di poi tutti gli altri finchè si arrivi ad un quoziente, che sia uguale all'unità. L'equazione pertanto (A) farà (P) =

$\frac{x-m}{bm^{n-3}} \times [B] x^{n-1} + \frac{m+a}{bm^{n-3}} \times x^{n-2} + \frac{m^2+am+b}{bm^{n-3}} \times x^{n-3}$ ec. + [C] $m^n + am^{n-1} +$
ec. Il quoziente (B) farà =

$\frac{x-m}{m+a} \times [D] x^{n-1} + \frac{2m+a}{m+a} \times x^{n-2} + \frac{3m^2+2am+b}{m+a} \times x^{n-3}$ ec. + [E] $m^{n-1} +$
 $\frac{m+a}{m+a} \times m^{n-2} + \frac{m^2+am+b}{m+a} \times m^{n-3}$ ec. Il quoziente (D) farà =

$\frac{x+m}{2m+a} \times [F] x^{n-1} + \frac{3m+a}{2m+a} \times x^{n-2} + \frac{6m^2+3am+b}{2m+a} \times x^{n-3}$ ec. + [G] $m^{n-1} +$
 $\frac{2m+a}{2m+a} \times m^{n-2} + \frac{3m^2+2am+b}{2m+a} \times m^{n-3}$ ec. Il quoziente F farà =

$\frac{x-m}{x-m} \times [H] x^{n-2} + \frac{4m+a}{x-m} \times x^{n-3} + \frac{10m^2+4am+b}{x-m} \times x^{n-4}$ ec. +

[I] $m^{n-1} + \frac{3m+a}{x-m} \times m^{n-2} + \frac{6m^2+3am+b}{x-m} \times m^{n-3}$ ec. Iteffamente si trovi il valore dei seguenti quozienti. Ora nell'equazione [P] si sostituisca il ritrovato valore di [B], e si avrà [Q] $A = [C] m^n + am^{n-1} + bm^{n-2}$ ec. +

$\frac{x-m}{x-m} \times [D] x^{n-1} + \frac{2m+a}{x-m} \times x^{n-2} + \frac{3m^2+2am+b}{x-m} \times x^{n-3}$ ec. +

$\frac{x-m}{x-m} \times [E] m^{n-1} + \frac{m+a}{x-m} \times m^{n-2} + \frac{m^2+am+b}{x-m} \times m^{n-3}$. In questa equazione [Q] si sostituisca il poc' anzi trovato valore di [D], ond' essa diverrà [R] $A = [C] m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} + cm^{n-3}$ ec. (A rappresenta l'equazione data)

$\frac{x-m}{x-m} \times [E] m^{n-1} + \frac{m+a}{x-m} \times m^{n-2} + \frac{m^2+am+b}{x-m} \times m^{n-3}$ ec. +

$\frac{x-m}{x-m} \times [F] x^{n-1} + \frac{3m+a}{x-m} \times x^{n-2} + \frac{6m^2+3am+b}{x-m} \times x^{n-3} + [G]$
x—

$\overline{x-m} \times m^{n-1} + \overline{2m+a} \times m^{n-2} + \overline{3m^2+2am+b} \times m^{n-3}$ ec. di nuovo in questa equazione [R] si sostituisce il ritrovato valore di $\overline{F}$, e con ciò ella si cambierà nella seguente (S) $A = (C) m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} + cm^{n-3}$ ec. +

$$\overline{x-m} \times (E) m^{n-1} + \overline{m+a} \times m^{n-2} + \overline{m^2+am+b} \times m^{n-3} +$$

$$\overline{x-m^2} \times (H) x^{n-4} + \overline{4m+a} \times x^{n-5} + \overline{10m^2+4am+b} \times x^{n-6}$$
 ec. +

$\overline{x-m^3} \times (I) m^{n-3} + \overline{3m+a} \times m^{n-4} + \overline{6m^2+3am+b} \times m^{n-5}$ ec. Qui pure in questa equazione (S) si collochi il valore di (H), e così in seguito. Siccome poi la quantità m si suppone essere un valore assai prossimo alla radice x , così che la loro differenza sia assai piccola, quindi è, che a paragone di $x-m$ le quantità

$\overline{x-m^2}$, $\overline{x-m^3}$ ec. sono tanto piccole, che si possono trascurare senza scrupolo. Trascurate pertanto nell'equazione (S), essa si ridurrà alla seguente $A = m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} + cm^{n-3}$ ec. +

$\overline{x-m} \times m^{n-2} + \overline{m+a} \times m^{n-3} + \overline{m^2+am+b} \times m^{n-4}$ ec. Ma essendo l'equazione $A = 0$, farà pure $m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} + cm^{n-3}$ ec. +

$\overline{x-m} \times m^{n-1} + \overline{m+a} \times m^{n-2} + \overline{m^2+am+b} \times m^{n-3} = 0$. Da questa equazione prendendo il valore di x , si ha finalmente $x = m -$

$$\left(\frac{m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} + cm^{n-3} \text{ ec.}}{m^{n-1} + \overline{m+a} \times m^{n-2} + \overline{m^2+am+b} \times m^{n-3} \text{ ec.}} \right).$$

Il denominatore poi di questa frazione è uguale ad $nm^{n-2} + \overline{n-1} \times am^{n-3} + \overline{n-2} \times bm^{n-4}$ ec. mediante l'attuale moltiplicazione; dunque sarà $x = m -$

$$\left(\frac{m^n + am^{n-1} + bm^{n-2} + cm^{n-3} \text{ ec.}}{nm^{n-2} + \overline{n-1} \times am^{n-3} + \overline{n-2} \times bm^{n-4} \text{ ec.}} \right).$$

Ed ecco trovata, e nel tempo stesso dimostrata la formola d'approssimazione.

678. Proporrò un esempio, acciò se ne veda l'uso. Essendo proposta l'equazione $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 6x + 12 = 0$, di cui una radice cade fra il 3, e il 4, cercafi di approssimarli al vero valore di questa radice. Sarà adunque $m=3$, perlochè sostituito questo valore nella formola d'approssimazione, e in vece dei coefficienti indeterminati sostituiti i loro valori presi dall'equazione proposta coi convenienti segni si avrà $x = 3 -$

$$\left(\frac{3^4 - 2 \times 3^3 - 7 \times 3^2 + 6 \times 3 + 12}{4 \times 3^3 - 6 \times 3^2 - 14 \times 3 + 6} \right),$$

cioè $x=3 + \frac{1}{3}$. Volendo poi approssimarli ancora al vero valore, si ponga $3 + \frac{1}{3} = p$, e si prevalga della

$$\text{formola } x = p - \left(\frac{p^n + ap^{n-1} \text{ ec.}}{np^{n-1} + \overline{n-1} \times ap^{n-2} \text{ ec.}} \right)$$

M E T O D O V.

Mediante il considerare l'equazione da risolversi come il risultato di due equazioni a due incognite, delle quali una è stata eliminata.

679. Il metodo, che ora sono per esporre, e che è del Sig. Bezout, coincide con quello, che ho dato al num. 638., anzi a rigore non è, che lo stesso, cui è stata cambiata faccia con metterlo sotto un altro punto di vista. Come quello, così questo inchiede la difficoltà di dover risolvere tutte le equazioni dei gradi inferiori alla proposta, e non meno l'uno, che l'altro seco porta indispensabilmente i paragoni dei coefficienti dell'equazione indeterminata coi coefficienti dell'equazione da risolversi a fine di determinarne i loro valori, e il numero di questi paragoni, e conseguentemente dei calcoli necessarj a farli, si fa maggiore a misura, che cresce il grado dell'equazione fino a divenire ben presto impraticabili. Veramente il presente metodo va libero dalla difficoltà marcata al num. 645., ma seco ne porta un'altra, che è di dovere mediante le due assunte equazioni a due incognite eliminarne una, e in tal modo trovare un'equazione data per l'altra incognita; e quantunque il calcolo, che se ne richiede, non sia tanto laborioso, come nell'altro caso, non lascia però rispetto alle equazioni de' gradi superiori d'essere anch' egli prolisso, e in conseguenza molesto.

680. Il metodo pertanto consiste in prendere due equazioni arbitrarie a due incognite, alle quali devonfi dare per esponenti i fattori dell'esponente dell'equazione da risolversi, cioè uno di questi fattori per esponente alla y nella prima equazione, cui pure nella seconda equazione devesi dare lo stesso esponente, ma diminuito di una unità nel primo termine, di due unità nel secondo termine ec. L'altro fattore devesi dare colle stesse leggi alla seconda incognita x , la quale deve avere soltanto luogo nella seconda equazione. Se l'esponente dell'equazione data sarà un numero composto, egli sarà risolubile in due fattori; ma se sarà un numero primo, bisognerà prendere l'unità per uno de' suoi fattori, e per l'altro fattore lo stesso esponente. Supposto che i due fattori dell'esponente dell'equazione da risolversi siano r , t , le due equazioni indeterminate da assumersi potranno essere

$$I. y^r - 1 = 0$$

$$II. \frac{y^{r-1} \times ax^{r-1} + bx^{r-2} + cx^{r-3} \text{ ec.} \dots + P + y^{r-1} \times ax^{r-1} + bx^{r-2} \text{ ec.} \dots + P}{+ y^{r-1} \times ax^{r-1} + bx^{r-2} \text{ ec.} \dots + P + + x^r + Ax^{r-1} + Bx^{r-2} \text{ ec.} \dots + Q} = 0.$$

681. Qualora adunque sia data un'equazione da risolversi, la quale deve essere immune dal secondo termine, si prendano i fattori del di lei massimo esponente nel modo detto, comunque egli sia un numero primo, o composto, e uno di questi fattori si faccia $=r$, l'altro $=t$, con che verrassi a determinare il grado di ciascuna delle due assunte equazioni indeterminate, e nel tempo stesso a limitare il numero de' termini della seconda. Fatto ciò, per mezzo di queste due equazioni si elimini coi soliti metodi l'incognita y , onde si abbia una equazione tutta in x a coef.

coefficienti indeterminati, che ascenderà allo stesso grado dell'equazione proposta. Si paragonino i coefficienti di questa col coefficienti dell'equazione data, a fine di ottenere i rispettivi valori dei coefficienti indeterminati, de quali la somma moltiplicata in tutte le radici dell'equazione $y^m - 1 = 0$ (supposto che m esprima il grado dell'equazione proposta) somministrerà tutte le radici dell'equazione da risolvere.

632. Per amore della brevità mi contenterò di dichiarare l'esposta dottrina con due soli Esempi, nel primo de' quali l'esponente dell'equazione sarà un numero primo, e nel secondo un numero composto; e per maggiore facilità, e chiarezza il primo verterà su le equazioni del terzo grado, il secondo su quelle del quarto, giacchè quando il grado dell'equazione comincia a farsi maggiore i calcoli riescono assai spinosi, e intricatissimi, qualora non si facciano alcune supposizioni arbitrarie, che tolgono la generalità al metodo, limitandolo a soli casi particolari. Debbonsi ritrovare le radici dell'equazione $x^3 + mx + n = 0$. Poichè i fattori di 3 sono 1, e 3, si faccia $x = z$, $z = 1$, con che l'equazione I diverrà $y^3 - 1 = 0$, e l'equazione II si cambierà in $ay^3 + ay + x = 0$. Per eliminare mediante queste due equazioni l'incognita y , moltiplico la seconda per y , e mi viene $ay^4 + ay^2 + xy = 0$, in cui sostituisco in luogo di y^3 il suo valore 1 preso dall'equazione $y^3 - 1 = 0$, onde ho $ay^2 + xy + a = 0$: Di nuovo moltiplico questa per y , lo che mi dà $ay^3 + ay^2 + xy = 0$, nella quale colloco il valore di y , come ho fatto precedentemente, e me ne risulta l'equazione $xy^2 + ay + a = 0$. Si hanno adunque le tre seguenti equazioni.

$$\begin{aligned} \text{I. } ay^3 + ay + x &= 0 \\ \text{II. } ay^2 + xy + a &= 0 \\ \text{III. } xy^2 + ay + a &= 0 \end{aligned}$$

Per mezzo di due qualsivoglia di queste tre equazioni, per Esempio delle due prime, prendo i valori di y^3 , e di y (giusta il num. 339.) de' quali il primo è

$$y^3 = \frac{a'x - x^3}{ax - a'a'}, \text{ e il secondo è } y = \frac{a^3 - a'x}{a'a' - ax}, \text{ e li sostituisco nella terza equazione,}$$

con che mi viene $\frac{a'a'x - x^3}{ax - a'a'} + \frac{a^3 - a'a'x}{a'a' - ax} + a' = 0$, cioè $-aa'x + a^3 + a^3 - aa'x + a'a'a' - aa'x = 0$, e però $x^3 - 3aa'x + a^3 + a'a'a' = 0$. Paragono i coefficienti di questa coi coefficienti dell'equazione proposta $x^3 + mx + n = 0$, e ne ho $m = -3aa'$, $n = a^3 + a'^3$:

Dalla prima di queste due equazioni prendo $-\frac{m}{3a} = a'$, il di cui cubo è

$$-\frac{m^3}{27a^3} = a'^3, \text{ che sostituito nella seconda la cambia in } a^6 - a^3n - \frac{m^3}{27} = 0, \text{ la qua-}$$

le è derivativa del secondo grado. Una radice poi di questa equaz. di sesto grado la chiamerò $= A$. Nella stessa maniera giungo all'equazione data per a' , che sarà

$$a'^6 - a'^3n - \frac{m^3}{27} = 0, \text{ che è parimente derivativa del secondo grado e simi-}$$

mente una radice di questa equazione dico $= B$. Si prendano adesso le tre radici dell'equazione $y^3 - 1 = 0$, e moltiplicandole nella radice trovata $x = A - B$, si avranno le tre radici dell'equazione proposta $x^3 + mx + n = 0$, che sono $x = A - B$;

==

$$x = -A \sqrt{\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}} - B \sqrt{\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}}; x = -A \sqrt{\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}} - B \sqrt{\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}}$$

la prima radice poi è $x = -A - B$, perchè nell'equazione I. fatta $y = 1$ si ha $a + a' + x = 0$, e però $x = -a - a'$.

683. Debboni in secondo luogo determinare le radici dell'equazione $x^4 + mx^2 + nx + p = 0$. I fattori del massimo esponente 4 possono essere tanto 1, e 4, come 2, e 2. Se si prendessero i due fattori 1, 4, con fare $r = 4$, $t = 1$, le due equazioni cattoliche I, II diventerebbero $y^4 - 1 = 0$, $ay^3 + a'y + a'x + x = 0$, che si tratterebbero come si è fatto nel precedente Esempio. Ora prendendo i due fattori 2, 2, farà $r = 2$, $t = 2$, e però l'equazione I. diventerà $y^2 - 1 = 0$, e l'equazione II. si cambierà in $y \sqrt{ax + b} + a'x + B = 0$. Moltiplico questa equazione per y , e ne ho $y^2 \sqrt{ax + b} + y \sqrt{a'x^2 + B} = 0$, in cui sostituisco in luogo di y^2 il suo valore preso dall'equazione $y^2 - 1 = 0$, con che ne viene $y \sqrt{ax + b} + a'x + B = 0$. Si hanno adunque le due seguenti equazioni

$$\text{I} \quad y \sqrt{ax + b} + x^2 + B = 0$$

$$\text{II} \quad y \sqrt{a'x^2 + B} + ax + b = 0$$

mediante le quali elimino la y , onde ne nasce l'equazione $\sqrt{x^2 + B} = -ax - b$, e però $x^2 + 2B - a^2 \sqrt{x^2 + B} - 2abx + B^2 - b^2 = 0$. Paragonando pertanto i coefficienti di questa equazione coi coefficienti della proposta, si ha $2B - a^2 = m$, $-2ab = n$, $B^2 - b^2 = p$. Dalla prima prendo il valore di B , così $B = \frac{m + a^2}{2}$, il di cui quadrato è $B^2 = \frac{m + a^2}{4}$; dalla se-

conda prendo il valore di b , che è $b = -\frac{n}{2a}$, il di cui quadrato è $b^2 = \frac{n^2}{4a^2}$.

Nella terza sostituisco questi valori di B^2 , b^2 , con che ella si cambia in $\frac{m + a^2}{4} - \frac{n^2}{4a^2} = p$, cioè $a^4 + 2a^2 m + m^2 - 4p \sqrt{a^2 - n^2} = 0$, la quale è derivativa del terzo grado. Una radice poi di questa equazione la chiamo $= A$. Questo valore A si metta in luogo di a nella prima equazione, ed ella si cambierà nella seguente $2B - A^2 = m$, e però $B = \frac{m + A^2}{2}$, il di cui quadrato sostituito nella

terza equazione la rende $\frac{m + A^2}{4} - b^2 = p$, conseguentemente

$b = \pm \sqrt{\frac{m + A^2}{4} - p}$, che dico $= C$. Per evitare la confusione delle lettere farò $B = \frac{m + A^2}{2} = D$. La radice adunque dell'equazione proposta $x^4 + mx^2 + nx + p = 0$ è $x = -A - C - D$, la quale moltiplicata nelle radici dell'equazione

$y^4-1=0$ dà le quattro cercate radici, che sono $x=-A-C-D$; $x=A+C+D$;
 $x=A\sqrt{-1}-C-D\sqrt{-1}$; $x=A\sqrt{-1}+C+D\sqrt{-1}$.

684. Chi rifletterà a questo Esempio osserverà facilmente, che quando l'esponente dell'equazione proposta è un numero composto si viene di molto ad abbreviare il calcolo supponendo r uguale ad un fattore, e t uguale all'altro, di quello egli risulterebbe se si supponesse r uguale al dato esponente, e t uguale all'unità. Di fatto se in quest'ultimo Esempio si fosse fatto $r=4$, $t=1$, l'equazione I. farebbe stata $y^4-1=0$, e l'equazione II. si farebbe cambiata in $ay^4+ay^3+a'y+x=0$, dalla quale mediante la successiva moltiplicazione per y , e la sostituzione del valore di y^4 preso dall'equazione $y^4-1=0$; si hanno le quattro seguenti equazioni

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad ay^4 + ay^3 + a'y + x = 0 \\ \text{II} \quad ay^4 + ay^3 + xy + a = 0 \\ \text{III} \quad ay^4 + xy^3 + ay + a' = 0 \\ \text{IV} \quad xy^4 + ay^3 + ay + a' = 0 \end{array}$$

per mezzo di tre delle quali, come delle tre prime prendendo i valori di y^3, y^2, y e sostituendoli nella terza, si avrà la bramata equazione data per x , che è

$x^4-4aa'-2a'a''x^3+4a^2a'+4a'a''a''x-a^4-a^4+a^4+2a^2a''-4aa'a''=0$ simile a quella del num. 642, di cui si paragonino i coefficienti coi coefficienti dell'equazione proposta, così $-4aa'-2a''=m$; $4a^2a'+4a'a''=n$; $-a^4-a^4+a^4+2a^2a''-4aa'a''=p$. Se pertanto si opererà, come si è fatto al num. 643, si avrà una equazione data per a' , la seconda data per a'' , e la terza data per a' , colle quali si otterranno i valori di questi coefficienti indeterminati, e conseguentemente nel modo già detto si avranno le radici cercate.

685. Questo modo di determinare tutte le radici di una data equazione suppone, che essa abbia una sola radice reale, se è di grado impari, e due quando è di grado pari; ciò poi non sarà sempre vero, mentre e potrà averne di più, ed averne anche tutte reali.

M E T O D O VI.

In cui si suppone la radice reale, che ha sempre un'equazione di grado impari espresso da n , sia della forma $p\sqrt[n]{u}+q\sqrt[n]{u^2}+\dots+t\sqrt[n]{u^{n-1}}$

686. **B**revemente io qui darò un'idea di questo metodo più a riflesso di erudizione, che a motivo di proporre la pratica. Egli è parto del celebre Sig. Eulero, il quale ha pensato, che relativamente alla forma delle radici immaginarie delle equazioni di terzo grado, che è $x=b\sqrt[3]{m}+i\sqrt[3]{n}$, $x=i\sqrt[3]{m}+b\sqrt[3]{n}$ (supposte b, i le radici cubiche immaginarie dell'unità), la radice reale eziandio per le equazioni di terzo grado sia $x=p\sqrt[3]{u}+q\sqrt[3]{u^2}$; così la radice reale per le equazioni di quinto grado sia $x=p\sqrt[5]{u}+q\sqrt[5]{u^2}+r\sqrt[5]{u^3}+s\sqrt[5]{u^4}$, per quelle del settimo $x=p\sqrt[7]{u}+q\sqrt[7]{u^2}+r\sqrt[7]{u^3}+s\sqrt[7]{u^4}+t\sqrt[7]{u^5}+v\sqrt[7]{u^6}$ ec. Le altre radici poi di queste equazioni faranno questa

stef.

stessa radice moltiplicata nelle radici immaginarie dell'unità dello stesso grado. In questa formola generale $p\sqrt[n]{u}+q\sqrt[n]{u^2}+r\sqrt[n]{u^3}$ ec. le lettere p, q, u, r ec. sono quantità indeterminate da determinarsi poscia col calcolo.

687. Il metodo pertanto consiste in supporre, che la radice reale dell'equazione ne da risolversi sia $x=p\sqrt[n]{u}+q\sqrt[n]{u^2}$ ec. L'uno, e l'altro membro di questa equazione deve esser elevato alla potenza n , e alle altre potestà inferiori, cui nella proposta equazione ascende la x , indi nella equazione data in luogo di x , e delle sue potestà sostituire i suoi valori pur ora trovati; lo che fatto si prendano i rapporti, che nascono dal supporre verificata l'equazione, e quali saranno questi rapporti, altrettante faranno le equazioni, che dovranno servire alla eliminazione delle indeterminate u, p, q ec., e nel tempo stesso a scuoprirne separatamente i loro valori. Siccome poi il numero delle equazioni sarà sempre minore di una unità del numero delle indeterminate, così una di queste resterà sempre da assumersi ad arbitrio.

688. Debba si trovare la radice reale dell'equazione $x^3+mx+n=0$. Si supponga, che essa sia $x=p\sqrt[3]{u}+q\sqrt[3]{u^2}$. Si inalzi al cubo l'uno, e l'altro membro di questa equazione, e si avrà $x^3=p^3u+3p^2qu\sqrt[3]{u}+3pq^2u\sqrt[3]{u^2}+q^3u^2$. Nell'equazione $x^3+mx+n=0$ si sostituiscano questi valori di x, x^3 , ed ella si cambierà nella seguente, $p^3u+3p^2qu\sqrt[3]{u}+3pq^2u\sqrt[3]{u^2}+q^3u^2+mp\sqrt[3]{u}+mq\sqrt[3]{u^2}+n=0$. Ora es-

sendo $p\sqrt[3]{u}+q\sqrt[3]{u^2}$ radice dell'equazione proposta, dovrà essa farla verificare, conseguentemente dovranno vicendevolmente distruggerli tutti i termini dell'equazione nata dalla precedente sostituzione. Ciò poi succede ogniquale volta sia $m=-3pq$, ed $n=-p^3u-q^3u^2$. Qui pertanto si hanno due equazioni con tre indeterminate, che sono p, q, u , delle quali una si determini ad arbitrio, e sia per Esempio $p=1$, con che le due precedenti equazioni diverranno $m=-3qu, n=-u-q^3u^2$. Dalla prima

si ha $q=-\frac{m}{3u}$, il di cui cubo sostituito nella seconda in luogo di q^3 la rende $n=-u+\frac{m^3}{27u}$, cioè $u^2+un-\frac{m^3}{27}=0$, dalla quale si ottiene

$u=-\frac{n}{2}\pm\sqrt{\frac{n^2}{4}+\frac{m^3}{27}}$, e questo valore sostituito in luogo di u nell'equazione

$q=-\frac{m}{3u}$ ci dà il valore di q , che trovasi essere $q=$

$-\frac{m}{3\left(-\frac{n}{2}\pm\sqrt{\frac{n^2}{4}+\frac{m^3}{27}}\right)}$. Essendosi trovati i valori delle tre indeterminate p, q, u ,
 $3X=-\frac{n}{2}\pm\sqrt{\frac{n^2}{4}+\frac{m^3}{27}}$

resta ancora determinato il valore della radice $x=p\sqrt[3]{u}+q\sqrt[3]{u^2}$, dalla di cui moltiplicazione nelle due radici cubiche immaginarie dell'unità, si hanno le altre due radici ancora della proposta equazione.

689. Nel mentre che stavano per istamparsi i fogli contenenti il presente metodo mi fu trasmesso dal dottissimo Sig. Giovanni de' Malfatti, della cui pregiabilissima

fima amicizia da molto tempo ho l'onore di godere, un suo Opuscolo inferito nel IV. Tomo degli Atti dell' Accademia di Siena, nel quale prende ad esaminare la risoluzione delle equazioni di quinto grado mediante il supporre le radici di questa

forma $x + m\sqrt[5]{f} + p\sqrt[5]{f^2} + q\sqrt[5]{f^3} + n\sqrt[5]{f^4} = 0$. Egli conduce tutto il suo calcolo ad una equazione di sesto grado, colla quale ottiene la bramata soluzione ogniquale volta essa sia divisibile per qualche divisore o di primo, o di secondo, o di terzo grado, i di cui termini siano razionali, o anche misti di radicali quadratici. Comincia

pertanto dal far sparire i radicali dalla formola (A) $x + m\sqrt[5]{f} + p\sqrt[5]{f^2} + q\sqrt[5]{f^3} + n\sqrt[5]{f^4} = 0$, con che si ritrova la seguente equazione

$$\left. \begin{array}{l} x^5 - 5mnx^3 + 5m^2qx^2 - 5m^2px + 5mn - 5pq \times \frac{mq^3 + np^3 - m^4q - n^4p}{+m^5} \\ - 5pqx^3 + 5n^4px^2 - 5n^4qx \\ + 5mp^3x^2 - 5mq^3x \\ + 5nq^3x^2 - 5np^3x \\ + 5m^2n^2x \\ - 5mnpqx \\ + 5p^3q^3x \end{array} \right\} = 0$$

Per abbreviare il calcolo si faccia (B) $mn=q$; (C) $pq=u$; (D) $m^2q + n^2p=r$; (E) $mp^3 + nq^3=s$; Se si moltiplicherà l'equazione (A) coll'equazione (E), si avrà $m^3p^3q + mn^3p^3 + m^2nq^3 + n^3pq^3 = r$, cioè $m^3p^3q + n^3pq^3 = r - mn^3p^3 - m^2nq^3$, vale a dire (A) $m^3p + n^3q = \frac{r - y \times \frac{mq^3 + np^3}{u}}{u}$. Si moltiplichino l'uno, e l'altro membro di

questa equazione per $mq^3 + np^3$, e si avrà $\frac{m^3p + n^3q}{u} \times \frac{mq^3 + np^3}{u} = \frac{m^4pq^3 + mn^4q^3 + m^3np^3 + n^4p^3q}{u^2}$; ma questo secondo membro è uguale al quadrato di (E) moltiplicato in (D), più il quadrato di (E) moltiplicato in (B), la qual somma sia diminuita di $4m^2n^3p^3q^3 = 4u^2y^2$, però sarà (A) $\frac{m^3p + n^3q}{u} \times \frac{mq^3 + np^3}{u} = \frac{r^2u + t^2y - 4u^2y^2}{u^2}$. Di questa equazione si moltiplichino l'uno, e l'altro membro per $-4uy$, e vi si aggiunga r^2t^2 , lo che darà $\frac{m^3p + n^3q}{u} \times \frac{mq^3 + np^3}{u} \times \frac{-4uy + r^2t^2}{u} = \frac{r^2t^2 - 4r^2u^2y}{u^3} - 4t^2uy^2 + 16u^2y^3$. Ma $\frac{m^3p + n^3q}{u} \times \frac{mq^3 + np^3}{u} \times \frac{-4uy + r^2t^2}{u} = \frac{2um^3p + 2un^3q - rt^2}{u^2}$ per lo che sostituendosi nel primo membro della precedente equazione questo suo valore, indi estraendolo da ambi i membri la radice quadrata, si avrà

$$(A) m^3p + n^3q = \frac{rt + \sqrt{r^2t^2 - 4r^2u^2y - 4t^2uy^2 + 16u^2y^3}}{2u}. \text{ Parimente di una maniera}$$

$$\text{confimile si troverà (B) } mq^3 + np^3 = \frac{rt - \sqrt{r^2t^2 - 4r^2u^2y - 4t^2uy^2 + 16u^2y^3}}{2y}. \text{ In oltre}$$

si moltiplichino l'equazione (A) per l'equazione (E), e ne verrà

$$\frac{m^5 + n^5}{u} \times \frac{pq + m^2n^2}{u} \times \frac{mq^3 + np^3}{u} = \frac{r^2t + r\sqrt{r^2t^2 - 4r^2u^2y - 4t^2uy^2 + 16u^2y^3}}{2u}, \text{ cioè}$$

(C)

(C) $m^2 + n^2 = \frac{r^2 t - 2t u^2 y + r \sqrt{r^2 t - 4r^2 u^2 y - 4t^2 u y + 16u^2 y^2}}{2u^2}$. Così pure con molti-

plicare l'equazione (B) per l'equazione (C) si avrà

$$(D) p^2 + q^2 = \frac{r^2 t - 2r u^2 y - t \sqrt{r^2 t - 4r^2 u^2 y - 4t^2 u y + 16u^2 y^2}}{2y^2}.$$

L'equazione data da risolversi sia $x^5 - \zeta a x^2 + \zeta b x + \zeta c x + d = 0$. Si paragonino i coefficienti di questa equazione coi coefficienti dell'equazione provenuta dalla supposta radice (Ω), con che si avranno le seguenti equazioni I. $y + u = a$;

II. $r + t = b$; III. $-m^2 p - n^2 q - m q^2 - n p^2 + m^2 n^2 - m n p q + p^2 q^2 = c$, cioè

$$\frac{r t \sqrt{y + u + u - y} \sqrt{r^2 t - 4r^2 u^2 y - 4t^2 u y + 16u^2 y^2}}{2u y} + y^2 - u y + u^2 = c;$$

IV. $m^2 + n^2 + p^2 + q^2 + \zeta y - \zeta u \sqrt{t - r} = d$, cioè

$$V. \frac{r^2 t y^2 + r t^2 u^2 - 2r t y u - 2r y u^2 + r y^2 - t u^2 \sqrt{r^2 t - 4r^2 u^2 y - 4t^2 u y + 16u^2 y^2}}{2u y^2}$$

+ $\frac{\zeta y - \zeta u \sqrt{t - r}}{2} = d$ dall'equazione III. si ricava (E) $\sqrt{r^2 t - 4r^2 u^2 y - 4t^2 u y + 16u^2 y^2}$

$= \frac{r t \sqrt{y + u - 2u y^2 + 2u^2 y^2 - 2u^2 y + 2u y}}{u - y}$. Ora se l'equazione I si disporrà così

$y - a = -u$, poscia si moltiplichi per y , indi si risolva al modo delle quadratiche af-

fette, si avrà (F) $y = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4u y}}{2}$; ed essendo $u = a - y$, col sostituire il ritrovato valore

di y , farà (G) $u = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4u y}}{2}$. Se pertanto si inalzerà al quadrato l'equazione

(E), e vi si sostituirà in luogo di t il suo valore $b - r$ preso dall'equazione II, e in luogo di u, y i loro valori presi dalle equazioni (F, G), e per ultimo dopo averla espurgata si ordinerà secondo le dimensioni della lettera r , si avrà finalmente

l'equazione (F) $r^4 - 2b r^3 - \frac{7a u y + 2a^2 - a c + b^2}{2} \sqrt{r^2}$

$$+ 7a b u y - 2a^2 b + a b c + 4b u y - a b \sqrt{a^2 - 4u y} \sqrt{r^2 + 2\zeta u^2 y^2 - 10a^2 u^2 y + 6c u^2 y^2 + a^4 u y}$$

$$- 2a^2 c u y + a^2 u y + 2a b^2 u y + \frac{a^2 b^2}{2} - 2b^2 u y + \frac{a^2 b^2}{2} \sqrt{a^2 - 4u y} = 0. \text{ Parimente se nell'}$$

equazione V. si sostituirà in vece della quantità radicale il suo valore razionale preso dall'equazione (E), indi si faccia quanto si è praticato nel trovare la precedente equazione, si giugnerà all'equazione seguente (G)

$a r^3$

$$ar^3 - 3ab + b\sqrt{a^3 - 4uy} \chi r^3 + 50u^3 r^3 - 20a^2 u^3 \chi + 2cuy + 2a^4 - ac^2 + \frac{ab^3 - b^3}{2} \chi \sqrt{a^3 - 4uy} \chi r \\ + 25bu^3 y^3 + 10a^3 buy - bcuy - a^4 b + \frac{a^2 bc}{2} - \frac{2du^3 y - abc}{2} \chi \sqrt{a^3 - 4uy} = 0.$$

Mediante queste due equazioni (F, G) si facciano sparire tutte le potenze superiori della lettera r , a riserva della prima, a fine di avere il valore di r , che trove-

raffi essere (H) $r = \frac{b}{2} + \sqrt{a^3 - 4uy} \chi \frac{625u^3 y^3 ab \chi ab - 2d}{-02500u y^3 +}$ ec. (ometto gli altri seguenti termini di questa frazione per essere assai lunga): Se pertanto si farà uguale ad b questa frazione, che moltiplica la quantità $\sqrt{a^3 - 4uy}$, farà $(\gamma) r = \frac{b}{2} + b \sqrt{a^3 - 4uy}$; onde nell'equazion II. $t = b - r$ sostituendo questo ritrovato valore di r , si avrà ancora il va-

lore di t , che è $(\xi) t = \frac{b}{2} - b \sqrt{a^3 - 4uy}$. Finalmente coll' ajuto delle due equazioni (F, G) eliminando affatto col metodo dato di eliminazione la lettera r , si giungerà ad una equazione di sesto grado, nella quale entreranno le sole quantità a, b, c, d, uy , essendo uy la sola incognita. Se pertanto i coefficienti a, b, c, d dell'equazione proposta da risolversi avranno fra loro tale relazione, che la ritrovata equazione di sesto grado stante la loro sostituzione ammetta un divisore o lineare, o di secondo, o di terzo grado, e questo o affatto razionale, o misto di radicali quadratici, siccome questi divisori ci forniranno il valore dell'incognita uy , così pure si otterrà la risoluzione della detta equazione di sesto grado: Per lo che essendo cognito il valore di uy , mediante la di lui sostituzione nelle equazioni (C, D, H), si faranno cogniti i valori di $r, t, m^3 + n^3, p^3 + q^3$.

Poichè le equazioni (C, D) con fare $uy = 0$, cioè u , ovvero $y = 0$ danno o la frazione $\frac{0}{0}$, o una quantità infinita, perciò bisogna ritrovare altre espressioni dei valori di $m^3 + n^3, p^3 + q^3$, che siano libere da questo incomodo. Nelle equazioni (π, τ) si faccia per maggiore brevità $a^3 - 4uy = x$, con che si cambieranno in (θ) $y = \frac{a + \sqrt{x}}{2}, u = \frac{a - \sqrt{x}}{2}$, e così pure le equazioni (γ, ξ) diverranno $r = \frac{b}{2} + b\sqrt{x}, t = \frac{b}{2} - b\sqrt{x}$. Sostituendosi nell'equazione IV. questi valori di y, u, r, t , si cambierà nella seguente (M) $m^3 + n^3 + p^3 + q^3 - 5 \chi x bz = d$. Si moltiplichi l'equazione (A) per $2u^3$, indi in luogo della quantità radicale vi si sostituiscia il suo valore prefo dall'equazione (C), e ne verrà $m^3 p + n^3 q = \frac{u \chi m^3 + n^3 + y^3 t}{r} =$

$\frac{4a-4\sqrt{z} \times \overline{m^2+n^2+a+\sqrt{z}} \times \overline{b-2b\sqrt{z}}}{4 \times \overline{b+2b\sqrt{z}}}$. Analogamente operando, cioè moltiplicando l'equazione (B) per $2yr$, e sostituendo il valore della quantità radicale preso dall'

equazione (D), si avrà $mq^2+np^2 = \frac{y \times \overline{p^2+q^2+u^2r}}{r} =$

$\frac{4u+4\sqrt{z} \times \overline{p+q^2+a-\sqrt{z}} \times \overline{b+2b\sqrt{z}}}{4 \times \overline{b-2b\sqrt{z}}}$. Si sostituiscano questi valori di mq^2+np^2 , m^2p+n^2q nell'equazione III, con che essa si cambierà nella seguente

$-4ab-8bz \times \overline{m^2+n^2+p^2+q^2+4b\sqrt{z}+8ab\sqrt{z}} \times \overline{m^2+n^2-p^2-q^2-2ob^2z-12a^2b^2z} + 16cb^2z+16abbbz+b^2z-a^2b^2-4b^2c=0$. Per mezzo di questa equazione, e dell'equazione (M) si troveranno le due seguenti

$$\begin{aligned} m^2+n^2 &= \frac{10bz+d}{2} + \\ &+ \sqrt{z} \times \frac{100b^2z^2+12a^2b^2z-16cb^2z+24abbbz+8dbz-b^2z+a^2b^2+4b^2c+4abd}{8z \times \overline{2ab+b}} \\ p^2+q^2 &= \frac{10bz+d}{2} - \\ &- \sqrt{z} \times \frac{100b^2z^2+12a^2b^2z-16cb^2z+24abbbz+8dbz-b^2z+a^2b^2+4b^2c+4abd}{8z \times \overline{2ab+b}} \end{aligned}$$

Per rendere più brevi queste formole si faccia $\frac{10bz+d}{2} = A$, ed eguale a B la quantità, che moltiplica il radicale $\sqrt{z}$, e si avrà (N), $m^2+n^2=A+B\sqrt{z}$ (P), $p^2+q^2=A-B\sqrt{z}$. Queste quantità A, B sono cognite, poichè sono funzioni di a, b, c, d , e della quantità uy , che suppongo già trovata mediante l'anzidetta equazione di sesto grado. Ciò posto essendo (*) $y=mn=\frac{a+\sqrt{z}}{2}$, farà $n^2=\frac{a+\sqrt{z}}{32m^2}$, il qual va-

lore sostituito nell'equazione (N) la cambia in $m^{10}-m^2 \times \overline{A+B\sqrt{z}} + \frac{a+\sqrt{z}}{32} = 0$

dalla quale si ricava $m^2 = \frac{A+B\sqrt{z}}{2} + \sqrt{\frac{A+B\sqrt{z}}{4} - \frac{a+\sqrt{z}}{32}}$, e però

$m =$

$$m = \sqrt[5]{\frac{A+B\sqrt{z}}{2}} + \sqrt[5]{\frac{A+B\sqrt{z^3}}{4} - \frac{a+\sqrt{z}}{3^2}}. \text{ Egualmente operando si troverà}$$

$$n = \sqrt[5]{\frac{A+B\sqrt{z}}{2}} - \sqrt[5]{\frac{A+B\sqrt{z^3}}{4} - \frac{a+\sqrt{z}}{3^2}},$$

$$p = \sqrt[5]{\frac{A-B\sqrt{z}}{2}} + \sqrt[5]{\frac{A-B\sqrt{z^3}}{4} - \frac{a-\sqrt{z}}{3^2}}$$

$$q = \sqrt[5]{\frac{A-B\sqrt{z}}{2}} - \sqrt[5]{\frac{A-B\sqrt{z^3}}{4} - \frac{a-\sqrt{z}}{3^2}}. \text{ Ora questi valori uniti in una somma danno la cercata radice della proposta equazione di quinto grado. Per avere le altre radici dell'equazione bisognerà moltiplicare ciascuno di questi ritrovati valori di } m, n, p, q \text{ nelle cinque radici quinte dell'unità, che sono } 1;$$

$$\frac{-\sqrt{5}-1+\sqrt{-10+2\sqrt{5}}}{4}; \frac{-\sqrt{5}-1-\sqrt{-10+2\sqrt{5}}}{4}; \frac{\sqrt{5}-1+\sqrt{-10-2\sqrt{5}}}{4};$$

$$\frac{\sqrt{5}-1-\sqrt{-10-2\sqrt{5}}}{4}; \text{ e di questi prodotti quelli varranno, che salvano i prodotti}$$

$$mn+pq, m^2q+n^2p+mp^2+nq^2.$$

Le altre cose, che succedono alla risoluzione del dotto Autore, non hanno qui luogo.

ARTICOLO IX.

Metodo generale, e facile di trovare tutte le radici di qualsivoglia equazione.

690. **I** Metodi, che nel precedente Articolo ho esposti, o procedono tentando, come il primo; o non sono generali per qualunque equazione, come il terzo; o non servono in qualunque caso, come il quarto, il quale non ha luogo quando le radici sono immaginarie; o pure quanto sono piani, e facili per le equazioni di terzo, ed anche di quarto grado, come gli altri, de' quali per queste non abbiamo di bisogno, altrettanto sono laboriosi, e impraticabili quando si tratta delle equazioni superiori, in grazia delle quali sono stati dai loro Autori meditati. Siccome però in tutte le cose devesi preferire la semplicità, e agevolezza, con cui si ottiene il fine bramato, perciò mi sembra, che il seguente metodo debba per questo titolo meritamente godere il vantaggio d'essere preferito agli altri. Ci fu egli comunicato fino dall'anno 1728 dal Sig. Maier nel Tomo III. de' Commentari di Pietroburgo, ma d'indi in poi è stato comunemente negletto, nè io trovo, che alcuno lo abbia nemmeno indicato, non che abbia pensato a farne uso, se si eccettua il celebre Sig. de la Grange, che né ha brevemente parlato nel Tomo 23. del-

della Reale Accademia di Berlino. Un metodo così piano, facile, e universale non meritava certamente d'essere fino ad ora trascurato: Che però ho io procurato di darci tutta quella estensione, di cui l'ho giudicato suscettibile, lo che farò molto più in seguito nel IV. Tomo, che comprenderà l'Algebra applicata alla Geometria, ove me ne preleverò per la costruzione generale di qualsivoglia equazione determinata; per la descrizione delle curve; pe' massimi, e minimi; pe' punti multipli ec.

691. Abbiamo veduto al num. 1335. del I. Tomo, che dall'innalzarsi ad una qualche potestà i numeri della serie naturale ne nasce una serie di quantità, le di cui differenze formano una seconda serie inferiore, e le differenze dei termini di questa serie danno una terza serie inferiore, e così in poi, finchè si giunge ad una serie, che è una progressione aritmetica, dei cui termini le differenze sono una quantità costante. Il numero di queste serie, compresi quella delle quantità costanti viene espresso da $n+1$ (supposto, che n sia l'esponente della potestà). La quantità costante è sempre uguale al prodotto dell'esponente della potestà proposta in tutti gli esponenti delle potestà inferiori fino all'unità, cioè a dire farà uguale

ad $n \times n-1 \times n-2 \times \dots \times 1$. Tutto ciò si comprende sotto questa semplicissima espressione x^n , in cui supponendosi $n=2$, $n=3$, $n=4$ ec., essa si cambierà in x^2 , x^3 , x^4 , x^5 ec.: In ciascuna di queste poi col supporli successivamente in vece di x , i numeri della serie naturale, si avranno le seguenti serie.

Esempio primo, in cui è proposta l'espressione x^2

Numeri delle supposizioni fatte per x	$\begin{matrix} - & 3 & - & 2 & - & 1 & & 0 & & 1 & & 2 & & 3 \end{matrix}$	
Serie delle quantità costanti	$\begin{matrix} & 2 & & 2 & & 2 & & 2 & & 2 & & 2 & & 2 \end{matrix}$	
Progressione Aritmetica	$\begin{matrix} - & 7 & - & 5 & - & 3 & - & 1 & + & 1 & + & 3 & + & 5 \end{matrix}$	} ec.
Serie nata da x^2	$\begin{matrix} + & 9 & + & 4 & + & 1 & & 0 & + & 1 & + & 4 & + & 9 \end{matrix}$	

Esempio secondo, in cui è proposta l'espressione x^3

Numeri delle suppos. fatte per x	$\begin{matrix} - & 3 & - & 2 & - & 1 & & 0 & & 1 & & 2 & & 3 \end{matrix}$	
Serie delle quantità costanti	$\begin{matrix} & 6 & & 6 & & 6 & & 6 & & 6 & & 6 & & 6 \end{matrix}$	
Progressione Aritmetica	$\begin{matrix} - & 24 & - & 18 & - & 12 & - & 6 & & 0 & + & 6 & + & 12 \end{matrix}$	} ec.
Prima serie generata	$\begin{matrix} + & 37 & + & 19 & + & 7 & + & 1 & + & 1 & + & 7 & + & 19 \end{matrix}$	
Serie nata da x^3	$\begin{matrix} - & 27 & - & 8 & - & 1 & & 0 & + & 1 & + & 8 & + & 27 \end{matrix}$	

Esempio terzo, in cui è proposta l'espressione x^4

Numeri delle suppos. fatte per x	$\begin{matrix} - & 3 & - & 2 & - & 1 & & 0 & & 1 & & 2 & & 3 \end{matrix}$	
Serie delle quantità costanti	$\begin{matrix} & 24 & & 24 & & 24 & & 42 & & 24 & & 24 & & 24 \end{matrix}$	
Progressione Aritmetica	$\begin{matrix} - & 108 & - & 84 & - & 60 & - & 36 & - & 12 & + & 12 & + & 36 \end{matrix}$	} ec.
Seconda serie generata	$\begin{matrix} + & 194 & + & 110 & + & 50 & + & 14 & + & 2 & + & 14 & + & 50 \end{matrix}$	
Prima serie generata	$\begin{matrix} - & 175 & - & 65 & - & 15 & - & 1 & + & 1 & + & 15 & + & 65 \end{matrix}$	
Serie nata da x^4	$\begin{matrix} + & 81 & + & 16 & + & 1 & & 0 & + & 1 & + & 16 & + & 81 \end{matrix}$	

692. Che poi la quantità costante in queste serie sia sempre uguale al prodotto dell'esponente della potestà in tutti gli esponenti delle potestà inferiori, si può osservare nei precedenti esempi, mentre quando la potestà proposta è il quadrato, la

quantità costante è $\equiv 2X^1$: Quando è il cubo, ella è $\equiv 3X^2X^1$: Quando è il quadrato-quadrato, ella è $\equiv 4X^3X^2X^1$: Quando è la quinta potenza, ella è $\equiv 5X^4X^3X^2X^1$ ec.

693. Quanto ho osservato circa l'espressione generale x^n , vale ancora per qualsivoglia equazione, mentre qualunque equazione non è altro, che x^n accresciuta, o diminuita di alcune altre quantità, le quali secondo le diverse supposizioni fatte pel valore di x^n crescono, e calano relativamente all'aumento, e diminuzione, che subisce la stessa x^n . Ciò si può intanto osservare nei due seguenti Esempi.

Esempio primo, in cui è proposta l'equazione $x^3 - 9x - 36 = 0$

Numeri delle supposizioni fatte per x	3	2	1	0	1	2	3
Serie delle quantità costanti	2	2	2	2	2	2	2
Progressione Aritmetica	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4
Serie nata dall'equaz. $x^3 - 9x - 36 = 0$	0	14	-26	-36	-44	-50	-54

Esempio secondo, in cui è proposta l'equazione $x^3 - 2x^2 - 5x + 10 = 0$

Numeri delle supposizioni fatte per x	3	2	1	0	1	2	3
Serie delle quantità costanti	6	6	6	6	6	6	6
Progressione Aritmetica	-28	-22	-16	-10	-4	2	8
Prima serie generata	+46	+24	+8	2	-6	-4	+4
Serie nata dall'equaz. $x^3 - 2x^2 - 5x + 10 = 0$	-20	+4	+12	+10	+4	0	+4

694. La serie, che nasce dall'equazione proposta col supposti $x=0$, $x=1$, $x=2$, $x=3$ ec. è quella, che propriamente io chiamo serie dell'equazione. Ora questa serie è quella appunto, che dà le cercate radici dell'equazione, come dimostrerò in appresso: Essa poi nascendo dalle successive supposizioni di $x=0$, $x=1$, $x=2$ ec., ognuno vede, che se i termini di questa serie si dovessero trovare mediante l'attuale sostituzione nell'equazione dei supposti valori di x , l'operazione riuscirebbe talmente lunga, e noiosa da stancare qualunque più paziente Analista. Il metodo adunque, che io qui sono per dare tutto si restringe a trovare con facilità, e speditezza questa serie, la qual deve somministrare le radici dell'equazione.

695. Ella pertanto si ottiene così. Primieramente devesi supporre $x=0$, $x=1$, $x=2$ ec., e mediante l'attuale sostituzione di questi valori in luogo di x ritrovare gli aggregati de' termini dell'equazione, che nascono da queste supposizioni, mentre essi faranno altrettanti termini della serie. Tanti poi di questi termini colle attuali sostituzioni si devono trovare, quanti ne mostra il grado dell'equazione accresciuto di una unità, cioè quanti ne indica $n+1$ (supposto che sia n il massimo esponente dell'equazione). Ritrovato questo numero $n+1$ di termini della serie corrispondenti alle fatte supposizioni pel valore di x , si sottragga da ciascuno di loro il suo antecedente, quello cioè, che è nato dalla prossima minore supposizione, o sia che gli sta a sinistra, e se ne scriva il residuo sopra il termine, da cui si è fatta la sottrazione, con che si verrà a formare sopra questa prima serie un'altra serie d'ordine prossimamente minore; e colla stessa maniera operando sopra questa seconda serie se ne formi una terza, indi una quarta ec., finché si giunga alla differenza costante: Siccome poi fa di mestieri il ritrovare colle attuali sostituzioni tanti termini della serie dell'equazione, quanti ne mostra $n+1$, così sarà $n+1$ il numero delle serie
oti-

orizzontali da trovarsi, inchiusavi però quella (che per altro non è propriamente serie), la quale ha per termini la differenza costante. Fatto ciò col solo sommare, o sottrarre un termine dall'altro secondo i loro segni, si continueranno a piacere tanto a destra, come a sinistra tutte queste serie, e però con somma facilità si otterrà la serie dell'equazione. L'esempio renderà ancor più chiaro, e facile il metodo.

696. Si debba ritrovare la serie, che nasce dall'equazione $x^3 - x_3 - 10 = 0$, onde poterne determinare le sue radici. Poichè l'esponente di questa equazione è 2, il numero de' termini da ritrovarsi colla materiale somma sarà $2 + 1 = 3$, e così pure faranno $2 + 1 = 3$ le serie orizzontali da formarsi compresavi la serie delle quantità costanti. Si supponga pertanto in primo luogo $x = 0$ (se ne veda l'esempio qui sotto), quale zero si collochi in (A), poscia sotto a questo zero in una distanza tale, che vi possano cadere tre serie orizzontali, come in (B) si collochi la somma di tutti i termini dell'equazione, la quale nasce dall'ipotesi di $x = 0$, e che sarà $= -10$. Dopo ciò si supponga $x = 1$, e questa unità si scriva dopo il zero nella fila orizzontale (R, C,) e perchè da questa supposizione si ha -12 per la somma di tutti i termini dell'equazione, questa somma -12 si collochi in (H) dopo il -10 nella fila orizzontale (T, D). Finalmente si supponga $x = 2$, e questo 2 si metta dopo l'1 nella fila orizzontale (R, C), nella qual fila avranno luogo i numeri naturali, positivi, e negativi, che si vanno supponendo pel valore d' x , e fra' quali perciò si troveranno le cercate radici; e poichè dal supposto $x = 2$, si ha -12 per la somma di tutti i termini dell'equazione, questa somma -12 si ponga in (M) dopo l'altra -12 nella fila orizzontale (T, D), e questa serie, continuata che sia, sarà la cercata serie dell'equazione.

697. Ora, che coll'attuale sostituzione de' numeri 0, 1, 2 della serie naturale in luogo di x si sono trovate tante somme dell'equazione proposta $x^3 - x_3 - 10 = 0$, quante ne indica $2 + 1$, dalla somma -12 (H) si sottragga la precedente -10 (B), e il residuo -2 si scriva sopra il -12 (H); indi dalla terza -12 (M) si sottragga la precedente -12 (H), e il residuo zero si scriva sopra il -12 (M), nel qual modo si faranno trovati due termini della serie orizzontale (S, E). Che se da questo secondo termine zero si sottrarrà il precedente -2 , il residuo (che sarà la differenza costante) sarà $+2$, il quale dovrà si scrivere sopra il zero. Questa differenza costante occupa la fila orizzontale (V, G) al di sotto della serie naturale. I termini poi finora trovati, per ciascuna serie ci somministrano quanto basta per continuare colla sola somma, e sottrazione tutte le serie tanto a destra, quanto a sinistra; poichè sotto a ciascun numero naturale scrivendoli la ritrovata differenza costante, se si sommerà l'ultimo trovato termine zero della fila orizzontale (S, E) colla differenza costante, la somma $+2$ farà il susseguente termine della stessa fila orizzontale (S, E); che se questo termine $+2$ si sommerà di nuovo colla differenza costante, se si avrà il susseguente termine $+4$, e in questo modo replicando l'operazione si continuerà a destra la fila orizzontale (S, E). Se poi questa fila si vorrà continuare a sinistra, dal primo termine trovato -2 si sottragga la differenza costante, e il residuo -4 si scriva dopo il -2 ; indi dal -4 sottraendo di nuovo la differenza costante si avrà di residuo -6 da scriversi dopo il -4 , col qual metodo continuando, si avranno quanti si vogliono termini nella fila orizzontale (S, E) verso la parte sinistra.

698. Questa fila orizzontale (S, E) come si vede è una progressione aritmetica, il di cui esponente è segnato nella fila orizzontale (V, G).

699. Resta adesso da continuarfi tanto a destra, come a sinistra la serie (T, D) dell'equazione, che è lo scopo principale, e in grazia della quale si sono determinate le precedenti file orizzontali. Il modo però di ritrovare tutti i di lei termini non è punto differente dalla maniera, che si è tenuta per continuare la fila orizzontale (S, E); mentre se si sommerà l'ultimo trovato termine -12 (M) col $+2$, che nella fila (S, E) sta immediatamente sopra al susseguente termine da trovarsi, si avrà lo stesso susseguente termine, che è -10 scritto in (F); poscia sommando il -10 col $+4$, si ha il -6 (X), e in questo modo operando si continuerà a destra la serie dell'equazione. Per continuarla poscia a sinistra si farà così: Dal termine -10 (B) si sottragga il -4 , che gli sta sopra nella fila orizzontale (S, E), e il residuo -6 si scriva in (P) dopo il -10 ; indi da questo -6 (P) si sottragga il -6 , che gli sta sopra, e il residuo zero si scriva in (Q) dopo il -6 , e in questo modo si potrà continuare a sinistra quanto porta il bisogno la serie dell'equazione.

700. Ognuno vede, che in tanto colla materiale somma si sono trovati tanti termini della serie dell'equazione quanti ne indica $2+1$, per potere arrivare alla differenza costante, per giungere alla quale bisogna passare per tante serie orizzontali, quante ne indica $n+1$ compresavi però la stessa serie costante.

701. Nè sembra strano, che qui si prescriva di giungere alla differenza costante quando per altro ella si fa immediatamente trovare (giusta il num. 692.), poichè ciò serve per ritrovare i necessari termini delle serie intermedie, e per iscoprire, se nelle operazioni è accaduto alcuno sbaglio, mentre sapendosi per l'accennato numero quale debba essere la differenza costante, se il termine trovato nella fila orizzontale $n+1$, non sarà qual deve essere la differenza costante, ciò sarà segno evidente, che in qualcuna delle fatte operazioni si è commesso errore.

Esempio, in cui è proposta l'equazione $x^3-3x-10=0$

	A								
R	-2	-1	0	1	2	3	4	5	C
V	2	2	2	2	2	2	2	2	G
S	-18	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	E
T	0	-6	-10	-12	-12	-10	-6	0	D
	Q	P	B	H	M	F	X		

702. Due cose si devono qui osservare di passaggio circa la differenza costante; la prima, che ella sarà positiva qualora il massimo termine dell'incognita sarà positivo; ma se egli sarà negativo, ancora la differenza costante sarà affetta da segno negativo, come si può vedere nel seguente esempio, in cui è proposta l'equazione

$$-x^3+39x-90=0$$

$$\begin{array}{cccccccc} - & 3 & - & 2 & - & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ - & 0 & - & 6 & - & 6 & - & 6 & - & 6 & - & 6 & - & 6 \\ + & 24 & + & 18 & + & 12 & + & 6 & 0 & - & 6 & - & 12 & - & 18 & - & 24 \\ + & 2 & + & 20 & + & 32 & + & 38 & + & 38 & + & 32 & + & 20 & + & 2 & - & 22 \\ - & 180 & - & 160 & - & 128 & - & 90 & - & 52 & - & 20 & 0 & + & 2 & - & 20 \end{array}$$

La seconda si è, che se il massimo termine dell'equazione avrà coefficiente, la differenza costante trovarla nel modo detto dovrà essere moltiplicata in questo coefficiente: come se l'equazione proposta fosse $ax^n+bx^{n-1}+cx^{n-2}$ ec., la differenza costante sarebbe $a \times n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3}$ ec., come si può vedere nel seguente esempio, in cui la differenza costante è $15 \times 1 \times 2$

Esempio, in cui è proposta l'equazione $15x^3-109x+182=0$

$$\begin{array}{cccccccc} - & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 \\ - & 154 & - & 124 & - & 94 & - & 64 & - & 34 & - & 4 & + & 26 \\ + & 300 & + & 182 & + & 88 & + & 24 & - & 10 & - & 14 & + & 12 \end{array}$$

703. Lo stesso modo di operare, che si è pur ora accennato si osservi nelle altre equazioni di grado più alto, le quali avranno bensì più file orizzontali a misura, che il grado dell'equazione è maggiore; ma questo maggior numero di file, quantunque prolunghi un poco l'operazione non altererà punto la maniera di giugnere a determinare la serie dell'equazione, come si può vedere negli esempi della Tavola V.

704. Esposto il modo di ritrovare la serie dell'equazione, vediamo ora come essa ce ne dia le radici, le quali (poichè fin'ora abbiamo supposta l'equazione libera dalle frazioni a riserva dell'es. precedente) saranno o razionali intere, o irrazionali, o immaginarie. Dico pertanto, che se le radici saranno razionali, esse ci verranno indicate da quei termini della serie, che sono zero, e in tal caso le radici dell'equazione saranno quei numeri della serie naturale, dalla di cui supposizione pel valore di x sono nati questi zeri. Le radici irrazionali ci verranno indicate dal cambiamento di segno, da cui saranno affetti due termini consecutivi, e allora le radici irrazionali cadranno fra i due numeri della serie naturale corrispondenti ai due termini della serie dell'equazione affetti da segno contrario. Le radici immaginarie ci verranno indicate dalla serie, qualora andrà ella continuando a destra, e a sinistra con termini crescenti all'infinito, onde non ci sia speranza di passaggio pel zero, o pure dal positivo al negativo, e *vice versa*, come si può vedere nel seguente esempio, in cui la serie dopo averci data una radice $=2$, procede con termini sempre crescenti a destra, e a sinistra all'infinito. Si conoscerà poi essere vana la speranza di passaggio pel zero, o da segno positivo a negativo, e *vice versa*, ma che i termini a destra anderanno continuamente crescendo all'infinito, ogniquale volta tutti i termini di una colonna verticale sono positivi, se la differenza costante è positiva;

o

tutti negativi, se la differenza costante è negativa, poichè i termini della serie dell'equazione risultando dalla somma de' corrispondenti termini dell'altre serie, se questi termini saranno tutti positivi, le loro somme andranno continuamente crescendo, e così cresceranno i termini della serie dell'equazione: Dalla parte sinistra poi andranno pure crescendo all'infinito i termini della serie, ogniquale volta i termini verticali saranno affetti da segni alternanti, del che la ragione si è, perchè ciascun termine risultando dal sottrarre dal suo precedente il termine, che gli sta di sopra, e col sottrarsi da una quantità positiva una negativa, si accresce (pel num. 54.) la positiva nella sua posizione, siccome sottraendosi da una negativa una positiva, si accresce la negativa nella sua negazione, essendo per ipotesi i termini delle serie orizzontali affetti da segni alternanti, dovranno continuamente crescere tanto le serie risultanti da termini negativi, come le serie risultanti da termini positivi.

Esempio, in cui è proposta l'equazione $x^3 - 8 = 0$

$$\begin{array}{r}
 -2-101234 \\
 6666666 \\
 -18-12-60+6+12+18 \\
 +19+7+1+1+7+19+37 \\
 -16-9-8-70+19+56
 \end{array}$$

705. Se pertanto la data equazione avrà radici parte reali, e parte immaginarie, la serie dell'equazione dopo avere esibito le radici reali procederà tosto crescendo a destra, e a sinistra col segno pur ora accennato; lo che pure farà dopo avere dato tutte le radici reali qualora tali siano tutte le di lei radici. Se poi l'equazione avrà sole radici immaginarie, in tal caso la serie, dal termine nato dalla supposizione di $x=0$ andrà tosto crescendo da una parte, e dall'altra all'infinito, facendosi immediatamente vedere il poc'anzi indicato carattere, come si può osservare nel seguente

Esempio, in cui è proposta l'equazione $x^3 + 2x + 7 = 0$

$$\begin{array}{r}
 -3-2-10123 \\
 2222222 \\
 -5-3-1+1+3+5+7 \\
 +10+7+6+7+10+15+22
 \end{array}$$

706. Debbo adesso far vedere, che con gli esposti indizii la serie ci esibisce le radici dell'equazione proposta. E primieramente che i zeri della serie indichino per radice dell'equazione il corrispondente numero della serie naturale, s'intende abbastanza dal num. 318., poichè solamente col sostituirsi in luogo di x nell'equazione una di lei radice l'aggregato de' termini va a zero; siccome adunque il zero della serie nasce dal sostituirsi nell'equazione in luogo di x il corrispondente numero naturale, quindi è, che egli deve essere radice dell'equazione, e deve essere indicato dal zero della serie. In secondo luogo che le radici irrazionali siano indicate da cambiamento di segno, ogniquale volta l'equazione è immune da frazioni, costa dal num. 470; per lo che qualora s'incontreranno nella serie due termini affetti da

segno contrario, ciò vorrà dire, che qui cade una radice irrazionale, i di cui limiti sono i numeri della serie naturale, dalle di cui supposizioni pel valore di x sono nati questi due termini affetti da segno contrario. Di fatto, che il valore intermedio ai due termini della serie affetti da segno contrario corrisponda ad un valore di x intermedio ai due corrispondenti numeri della serie naturale, è questa una legge, che accompagna la mutazione dei valori dell'equazione relativamente alla mutazione dei valori di x , la quale essendo continua, cioè facendosi senza salto per tutti i gradi della quantità, continua pure per tutti i corrispondenti gradi deve essere anche quella. Finalmente, che la serie dopo averci dato alcune radici, se l'azione ne ha di reali, col procedere crescendo a destra, e a sinistra all'infinito, ci mostri, che le rimanenti radici sono immaginarie, si raccoglie dal num. 471. poichè le radici immaginarie non potendo far cambiare l'aggregato de' termini dell'equazione da positivo a negativo, o *vice versa*, deve perciò la serie dopo aver dato le radici reali procedere collo stesso segno crescendo all'infinito.

707. Vengo ora ad applicare il presente metodo all'equazione, che si è trovata nel risolvere il problema proposto al num. 779. Se ne veda pertanto la soluzione nella Tavola V. all'Esempio I. Parimente all'esempio II. della stessa Tavola si veda applicato il metodo all'equazione provenuta dalla soluzione del Problema dato al num. 612.

708. Ho detto, che quando la serie, dopo avere o date, o indicate alcune radici, procederà a destra, e a sinistra col carattere indicato al num. 704, cioè farà segno, che le rimanenti radici sono immaginarie. Tale dottrina però deve si intendere con limitazione, mentre non sempre, che la serie ci esibirà minor numero di radici di quello porti il grado dell'equazione dovrasse precipitosamente concludere, che le rimanenti radici sono immaginarie; poichè potrà succedere, che ciò nasca o dall'aver le equazioni delle radici eguali in numero pari, oppure dall'aver delle radici irrazionali parimente in numero pari o eguali, o comprese fra i medesimi limiti, ne quali due casi lo stesso carattere indicherà più d'una radice.

709. Per conoscere poi ad un tratto queste radici eguali in numero pari, si osservi, che qualora l'equazione avrà più radici reali ineguali, se si porrà in luogo di x un valore positivo assai grande, il valore della formola sarà pure positivo, e assai grande, indi continuamente andrà decrescendo fino all'appulso del valore di x alla prima radice, dopo di che il valore della formola passerà in negativo, e andrà crescendo finchè necessariamente dovrà mutare l'incremento in decremento, dovendo dopo l'appulso alla seconda radice passare di nuovo in positivo, e così successivamente: Ma se i valori di due radici si accosteranno vicendevolmente si diminuirà l'intervallo, in cui il valore della formola tra una radice, e l'altra da prima cresce, e poi cala, e però unendosi le due radici così che l'equazione abbia due radici eguali, quell'intervallo si elide totalmente; e in caso, che l'equazione abbia due radici irrazionali comprese tra due numeri naturali supposti pel valore di x , quantunque quell'intervallo non sia nullo in se stesso, comparisce nullo relativamente ai due numeri naturali. E però nel primo caso di un numero pari di radici uguali il valore della formola nell'appulso di x alle radici eguali non passa il zero, ma dal zero ritorna addietro affetto dal medesimo segno, e le radici eguali essendo irrazionali, il valore della formola non passa da un segno all'altro, ma continua collo stesso segno, lo che pure osservasi quando le radici irrazionali in numero pari sono comprese fra due numeri naturali consecutivi. Che se faranno tre le
ra-

radici razionali, o le irrazionali eguali, o le irrazionali comprese fra due numeri naturali consecutivi, nel primo caso il valore della formola passerà pel zero, e muterà segno; nel secondo, e terzo caso non si farà zero, perchè non può, ma muterà segno. E generalmente se le radici eguali, o le irrazionali comprese fra due numeri naturali consecutivi faranno in numero pari, nel valor della formola si avrà regresso; se faranno in numero impari, si avrà transito.

710. Ciò premesso, se nella serie tanto il termine, che precede, quanto quello, che segue qualche zero sarà affetto dallo stesso segno, ciò sarà argomento sicuro, che quel zero ci dà uno, o più paia di radici razionali eguali, lo che si veda nel seguente esempio, la di cui equazione ha quattro radici, due eguali a -3 , e due eguali a 2

Esempio, in cui è proposta l'Equazione $x^4 + 2x^3 - 11x^2 - 12x + 36 = 0$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\
 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 \\
 -120 & -96 & -72 & -48 & -24 & 0 & +24 & +48 \\
 +220 & +124 & +52 & +4 & -20 & -20 & +4 & +52 \\
 -160 & -36 & +16 & +20 & 0 & -20 & -16 & +36 \\
 +36 & 0 & +16 & +36 & +36 & +16 & 0 & +36
 \end{array}$$

711. L'indizio poi per conoscere, che l'equazione ha radici irrazionali eguali in numero pari, o comprese tra due numeri naturali consecutivi (supposto, che sianvi queste sole nell'equazione, al qual termine devesi giungere finalmente) sarà, che la serie andrà crescendo, e calando, e solamente dopo un certo numero di termini vedrassi comparire il segnale additato al num. 704., quando (giusta il num. 705.) egli dovrebbe tosto far vedere, se le radici fossero immaginarie: Queste radici irrazionali poi cadranno vicino ai numeri naturali, dalla supposizione dei quali pel valore di x nascono i termini minimi della serie. Ciò si osservi nell'esempio seguente, la di cui equazione ha quattro radici irrazionali, delle quali due cadono fra 3 , e 4 , l'altre due fra -3 , e -4

Esempio, in cui è proposta l'equazione $x^4 - 25x^2 + 154 = 0$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 \\
 -156 & -132 & -108 & -84 & -60 & 36 & 12 & +12 & +36 & +60 & +84 \\
 +374 & +242 & +144 & +60 & 0 & 36 & 48 & -36 & 0 & +60 & +144 \\
 -386 & -144 & 0 & +60 & +60 & +24 & -24 & -60 & -60 & 0 & +144 \\
 +154 & +10 & +10 & +70 & +130 & +154 & +130 & +70 & +10 & +10 & +154
 \end{array}$$

712. Da questi due indizj pertanto si potrà prender norma in caso, che le accennate radici sian in numero pari, onde sicuramente affermare se sian reali, o immaginarie le radici, che mancano. Che se tali radici faranno in numero impari, in tal caso poichè si dà transito da un segno all'altro, non avranno luogo i due indicati indizj; per altro dal numero delle radici, che mancano, e dal sapere, che le

-ra-

radici immaginarie non possono essere, che in numero pari, sarà facile il determinare, se le radici, che mancano, sian, o non sian immaginarie.

713. Ogniqualvolta adunque s'abbiano indizi, oppure s'abbia solamente sospetto, che vi sian radici eguali, oppure radici irrazionali comprese tra due numeri naturali consecutivi, la regola generale da usarsi si è, che dopo avere applicato alla data equazione il metodo, ed averne ritrovate alcune radici, si divida tale equazione pel prodotto di queste radici, indi all'equazione residua si applichi nuovamente il metodo, mentre le radici, che non apparivano nella serie o per essere eguali, o per essere irrazionali comprese fra due numeri naturali consecutivi, saranno rappresentate dalla nuova serie. Se ne veda l'esempio III. della Tavola V., in cui è proposta l'equazione $x^4 + x^3 - 22x^2 - 18x + 109x^3 + 5x - 100 = 0$.

714. Ora per quest'equazione la serie mi dà due radici, che sono -1 , e 4 ; e perchè dopo il zero nato dalla supposizione di -1 non ho tolto il segnale del num. 704., come lo dovei avere giusta il num. 705.; però sono sicuro, che l'e-

quazione ha qualche altra radice. Divido pertanto tale equazione per $x+1 \times x-4$, e mi viene di quoziente l'equazione $x^2 + 4x^3 - 6x^2 - 20x + 25 = 0$, alla quale applico il metodo per indagarne le radici, come segue

Esempio, in cui è proposta l'equazione $x^2 + 4x^3 - 6x^2 - 20x + 25 = 0$

-4	-3	-2	-1	0	1	2
24	24	24	24	24	24	24
-108	-84	-60	-36	-12	-12	+36
+170	+86	+26	-10	-22	-10	+26
-91	-5	+21	+11	-11	-21	+5
+9	+4	+25	+36	+25	+4	+9

Scorgo pertanto, che ella ha quattro radici irrazionali, le quali cadono vicino ai numeri naturali, dai quali sono nati i due termini della serie $+4$, e -4 .

715. Si avrà poi il prossimo vero valore di queste radici irrazionali, giacchè avere non si possono altrimenti, con ricercare i più ristretti limiti, fra i quali cadono, nella maniera, che esporrò in appresso, o pure giusta il num. 675, o 676.

716. Intanto si offervi, rispetto alle radici irrazionali, che supponendo per x valori infinitamente piccoli, quando si giungerà a quella supposizione, che è infinitamente prossima alla vera radice, il corrispondente termine della serie differirà dal zero di una quantità infinitamente piccola: Se poi vi saranno più radici irrazionali comprese fra due numeri naturali consecutivi, col fare le poc'anzi accennate supposizioni, ogni qual volta si arriverà ai prossimi valori delle radici, si avrà nei corrispondenti termini della serie cambiamento di segno, poichè col sostituirsi nell'equazione in luogo dell'incognita due numeri, de' quali uno sia maggiore, e l'altro minore di una delle di lei radici reali, e nel tempo stesso questi due numeri differiscano l'uno dall'altro di una quantità minore della differenza, che passa fra questa, e ciascuna dell'altre radici reali dell'equazione, queste due sostituzioni danno necessariamente due risultati affetti da segni contrari, come or ora dimostrerò: Ma per ipotesi i valori sostituiti in luogo di x sono quantità infinitamente piccole, e conseguen-

temente la loro differenza è minore della differenza, che passa tra la radice in questione, e qualunque altra delle radici reali dell'equazione; dunque i risultati delle sostituzioni de' suddetti due numeri in luogo di x devono essere affetti da segni contrarij. Che poi col sostituirsi due numeri uno maggiore, e l'altro minore di una radice dell'equazione, e de' quali la differenza sia minore della differenza, che passa tra questa radice, e tutte le altre dell'equazione, ne debbano risultare due numeri affetti da segni contrarij, la cosa è bene evidente; mentre sia m una radice dell'equazione, della quale sia a maggiore, e b minore, cioè $a > m$, $b < m$, e le altre radici dell'equazione siano n , p ec.. Sia g la più piccola delle differenze, che passano fra la radice m , e ciascuna delle altre radici n , p ec.. Essendo per ipotesi $a - b < g$, ciascuna delle quantità $a - n$, $a - p$ ec. sarà affetta dallo stesso segno, che la sua corrispondente $b - n$, $b - p$, e solamente le quantità $a - m$, $b - m$ saranno affette da' segni contrarij, perchè le $a - n$, $a - p$ ec., e $b - n$, $b - p$ ec. avessero diverso segno, bisognerebbe, che la quantità n , o la quantità p fosse compresa tra a , b , che non la può essere stante la fatta ipotesi di $a - b < g$. Le due quantità adunque

$$\begin{array}{l} \overline{a-m} \times \overline{a-n} \times \overline{a-p} \text{ ec.} \\ \overline{b-m} \times \overline{b-n} \times \overline{b-p} \text{ ec.} \end{array}$$

devono essere affette da diverso segno.

717. Prima di passare avanti ultimo necessario di sciogliere una difficoltà, che potrebb'esser mossa, ed è, che dovendosi risolvere equazioni, le di cui radici sian numeri molto alti, dovrebbsi in tal caso per determinar tali radici protrarre a lungo per moltissimi termini la serie, e però l'operazione riuscirebbe soverchiamente lunga, e noiosa. Adunque ogni qual volta s'abbia a trattare un'equazione, che abbia radici molto alte, lo che si scorgerà facilmente dall'ultimo termine dell'equazione, come pure dall'andamento de' termini della serie, si abbrevierà l'operazione cercando prima in qual migliajo, in qual centinajo, in quale decina de' valori di x cadano le radici, che si cercano, e ciò si otterrà trasformando prima l'equazione proposta con supporre $x=10y$; $x=100y$, $x=1000y$ ec., indi applicando il metodo all'equazione così trasformata: Vale a dire, che avendo per esempio un'equazione, le di cui radici cadano tra 1000, e 10000, bisognerà primieramente trasformare l'equazione data con supporre $x=1000y$; poi assoggettando al metodo l'equazione trasformata, si osservi dove o la serie si fa zero, o muta segno: se la serie si farà zero per esempio nel 4, ciò indicherà, che una radice è 4000 (quello, che dico d'una radice s'intenda delle altre); ma se la serie dopo il 4 de' numeri naturali muterà segno, ciò darà a vedere, che la radice cade tra il 4000, e il 5000: Si trasformi adunque di nuovo la da prima proposta equazione con porre $x=4000+100z$, e alla trasformata si applichi il metodo, onde potere scorgere in qual centinajo tra il 4000, e il 5000 cade questa radice, e trovandosi per esempio, che al 7 de' numeri naturali il corrispondente termine della serie si fa zero, ciò vorrà dire, che la radice cercata è 4700: Se in vece di farsi zero il segno da positivo a negativo, o vice versa, ciò sarebbe indizio, che la radice cade tra il 4700, e il 4800: Si trasformi pertanto nuovamente l'equazione già data facendo $x=4700+10w$, e colla stessa maniera si prosiegua l'operazione. L'esempio ne farà vedere la facilità: Si debbano determinare le radici dell'equazione $x^3-467x+2310=0$, di cui le radici, come si scorge dall'ultimo termine sono molto alte. La trasformo pertanto

pri-

primieramente con porre $x=100y$, con che si ha l'equazione $1000y^3-4670y+231=0$, a cui applico il metodo come qui si vede.

Esempio, in cui è proposta l'equazione $1000y^3-4670y+231=0$

0.	1.	2.	3.	4.	5.
1000	1000	1000	1000	1000	1000
-5670	-3670	-1670	+330	+2330	+4330
+231	-3439	-5109	-4779	-2449	+1881

Ritrovo adunque che una radice sola cade tra il 100, e il 1000, ed è 400 più qualche cosa; l'altra cade tra il 0, e il 100; mi appiglio pertanto a ritrovar la prima determinando in qual decina tra il 400, e il 500 ella cade, e a quest'effetto trasformo l'equazione $x^3-467x+2310=0$ con porre $x=400+10z$, e mi viene $10z^3+333z-2449=0$, alla quale applicando il metodo, come si vede nel seguente

Esempio, in cui è proposta l'equazione $10z^3+333z-2449=0$

0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10	10	10	10	10	10	10	10
+323	+343	+363	+383	+403	+423	+443	+463
-2449	-2106	-1743	-1360	-957	-534	-91	+369

trovo, che la radice cade tra il 60, e il 70, e però ella è 460 più qualche cosa.

718. Per sapere finalmente cosa sia questo di più, trasformo per ultimo l'equazione $x^3-467x+2310=0$ facendo $x=460+u$, e mi viene $u^3+453u-910=0$, che assoggetto al metodo, come qui si vede:

Esempio, in cui è proposta l'equazione $u^3+453u-910=0$

0.	1.	2.	3.
1.	2.	2.	2.
+452	+454	+456	+458
-910	-456	0	+458

Onde vengo in fine a scoprire che questa radice è 462. Se dividerò pertanto la data equazione $x^3-467x+2310=0$ per $x-462$, troverò l'altra radice, che è 5.

719. Il modo di operare, che in quest'esempio abbiamo osservato per le equazioni di secondo grado, vale egualmente con pari facilità nelle altre equazioni più alte.

720. Questo metodo stesso somministra il modo di approssimarsi al vero valore delle radici. Essendosi pertanto ritrovati i limiti fra' quali cadono le irrazionali, come farebbe nel seguente

Esempio, in cui è proposta l'equazione $x^3 + 2x - 5 = 0$

-4.	-3.	-2.	-1.	0.	1.	2.
2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
+7	-5	-3	-1	+1	+3	+5
+3	-2	-5	-6	-5	-2	+3

In cui una radice cade fra 1, e 2, l'altra tra -3, e -4, si trasformi la data equazione facendo $x = a + \frac{y}{10}$ (intendo per a uno dei limiti della radice cercata, quello cioè, che ne è il minore), onde si avrà

$$\begin{aligned}
 x^3 &= a^3 + \frac{3ay}{10} + \frac{y^3}{100} \\
 2x &= 2a + \frac{2y}{10} \\
 -5 &= -5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+100a^3 + 20ay + y^3 \\
 &+200a + 20y \\
 &-500
 \end{aligned}$$

E sostituendo in luogo di a il suo valore, che è 1 (supposto, che si voglia approssimare alla vera radice, che cade fra 1, e 2), l'equazione sarà $y^3 + 40y - 200 = 0$ quale si affoggetti al metodo, e si avrà

Esempio, in cui è proposta l'equazione $y^3 + 40y - 200 = 0$

0.	1.	2.	3.	4.	5.
2.	2.	2.	2.	2.	2.
+39	+41	+43	+45	+47	+49
-200	-159	-116	-71	-24	+25

che dà $\frac{4}{10}$, e però questa radice sarà 1. 4.

721. Che se nella precedente trasformata si sostituirà in vece di a il -3 limite dell'altra radice, essa diverrà $y^3 - 40y - 200 = 0$, a cui applico in metodo come qui si vede.

Esempio, in cui è proposta l'equazione $y^3 - 40y - 200 = 0$

-5.	-4.	-3.	-2.	-1.	0.
2.	2.	2.	2.	2.	2.
-51	-49	-47	-45	-43	-41
+25	-24	-71	-116	-159	-200

e ne ricavo $\frac{4}{10}$, e però l'altra radice è 3. 4.

722. Si accosterà anche di più ai veri cercati valori trasformando di nuovo quest' equazione $y^3 + 40y - 200 = 0$ con fare $y = x + \frac{y}{10}$, mentre nella formola $x = a + \frac{y}{10}$ posto in luogo di a il limite della radice minore, e formata in seguito l'equazione di y , se si prolungherà la serie quanto porta il bisogno verranno a determinare i limiti più ristretti di tutte le radici irrazionali; ma il più delle volte sarà necessario prolungare molto la serie, lo che può esser noioso.

723. Per avere il più prossimo valore delle vere radici, si poteva fare a drittura $x = a + \frac{y}{1000}$ ec.: ma siccome in tal caso o bisognerebbe assoggettarli a un' operazione molto lunga, o pure farebbe di mestieri determinar prima (giusta il num. 717.) fra quali decine, centinaja ec. cade il valore cercato, però torna più comodo il ripetere le operazioni, supponendo $x = a + \frac{y}{10}$.

724. Per altro si potrà accostare più speditamente al vero valore delle cercate radici come si è accennato al num. 715.

725. Fin'ora ho supposto le equazioni libere da frazioni, e però ho considerato solamente le equazioni, che hanno radici intere. Il metodo per altro è applicabile ancora alle equazioni fratte, come si può vedere nella seguente equazione, le di cui

radici sono $2\frac{3}{5}$, $4\frac{2}{3}$

Esempio, in cui è proposta l'equazione $x^5 - \frac{109}{15}x + \frac{182}{15} = 0$

$$\begin{array}{rcccccc}
 -1. & 0. & 1. & 2. & 3. & 4. & 5. \\
 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 \\
 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 \\
 -154 & -124 & -94 & -64 & -34 & -4 & +26 \\
 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 \\
 +306 & +182 & +88 & +24 & -10 & -14 & +12 \\
 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15
 \end{array}$$

726. Con ridurre poi l'equazione a questa forma $15x^5 - 109x + 182 = 0$ si avrà la medesima serie, ma senza frazioni, e però più facile da calcolarsi, come qui si vede

Esempio, in cui è proposta l'equazione $15x^5 - 109x + 182 = 0$

$$\begin{array}{rcccccc}
 -1. & 0. & 1. & 2. & 3. & 4. & 5. \\
 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 \\
 -154 & -124 & -94 & -64 & -34 & -4 & +26 \\
 +306 & +182 & +88 & +24 & -10 & -14 & +12
 \end{array}$$

Poichè in questi casi, ne quali l'equazione ha frazioni, o pure il di lei massimo termine ha coefficiente, la serie indica due numeri della serie naturale per limiti di ciascuna radice, siccome fa pure quando le radici sono irrazionali, però potrebbe nascer dubbio, se le di lei radici siano puramente fratte, ovver anche irrazionali. Per togliere questo dubbio si trasformi l'equazione in un'altra, che, essendo immune da frazioni, abbia il massimo termine libero da coefficiente. Alla trasformata si applichi il metodo, e se la serie darà le radici razionali, ciò sarà segno, che le radici della prima equazione sono numeri fratti: Se poi dà i limiti, ciò basta per iscorgere, che le radici della prima equazione sono irrazionali. Prendiamone l'esempio da questa precedente equazione $15x^5 - 109x + 182 = 0$. Per trasformarla in un'altra, il di cui massimo termine abbia la sola unità per coefficiente, faccio (giusta il num. 537.)

$x = \frac{y}{15}$, e fatte le debite sostituzioni, mi nasce l'equazione $y^5 - 109y + 273 = 0$.

Poichè l'ultimo termine è un numero alto, m'accorgo, che le radici di questa equazione saranno parimente numeri alti, però determino prima (giusta il num. 717.) fra quali decine cadono queste radici, e trovo, che una cade fra 30, e 40, e l'altra è 70. Per ritrovare la prima applico il metodo a questa equazione, cominciando le supposizioni dal numero 30, come segue

Equa-

Equazione proposta $x^3 - 109x + 2730 = 0$

30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.
2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
-50	-48	-46	-44	-42	-40	-38	-36	-34	-32
+360	+312	+266	+222	+180	+140	+102	+66	+32	0

Una radice adunque è 39, e l'altra è 70. Restano ora a determinarsi le radici dell'equazione da prima proposta: Ma siccome per trasformare tale equazione si è fatto $x = \frac{y}{15}$, lo che rende le radici dell'equazione trasformata uguali alle radici dell'equazione proposta moltiplicate per 15, quindi per avere tali radici basterà dividere per 15 le ritrovate radici dell'equazione trasformata. Le radici adunque dell'equazione $15x^3 - 109x + 182 = 0$ sono $\frac{39}{15}$, e $\frac{70}{15}$, cioè $2\frac{3}{5}$, e $4\frac{2}{3}$.

727. In qualsivoglia equazione il termine cognito è una quantità costante indipendente da x , e però i soli termini, ne quali entra l'incognita x formano la funzione, che è il termine generale della serie, come si può vedere nel seguente esempio, in cui si considerano i soli primi termini dell'equazione $x^3 - 12x^2 + 44x - 48 = 0$ in cui entra la x , e ne nasce una serie dello stesso ordine, che viene indicato dal massimo esponente dell'incognita

Esempio, in cui è proposta l'equazione $x^3 - 12x^2 + 44x - 48 = 0$, al di cui primo membro soltanto si applica il metodo

-1.	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
-36	-30	-24	-18	-12	-6	0	6	+12
+87	+57	+33	+15	+3	-3	-3	+3	+15
-57	0	+33	+48	+51	+48	+45	+48	+63

728. Due cose poi devonfi osservare in questa serie; la prima si è, che ella dà le radici dell'equazione $x^3 - 12x^2 + 44x$, della quale una è zero, e l'altre due sono le radici dell'equazione $x^3 - 12x + 44 = 0$: la seconda è, che i termini della serie, i quali corrispondono ai numeri naturali, ch'erano le radici dell'equazione non privata del termine cognito, risultano eguali allo stesso termine cognito, e ciò nasce dall'eguaglianza de' due membri, quale eguaglianza non ha luogo se non in caso, che in luogo di x si pongano le radici dell'equazione.

729. Tutto ciò avrà luogo, ancorchè con un fattore del termine cognito si divida l'uno, e l'altro membro, poi si applichi il metodo al primo membro, come qui si vede

Esem-

Esempio, in cui è proposta l'equazione $\frac{x^3 - 12x^2 + 44x}{3} = 16$

—1.	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
—12	—10	—8	—6	—4	—2	0	+2	+4
+29	+19	+11	+5	+1	—1	—1	+1	+5
—19	0	+11	+16	+17	+16	+15	+16	+21

In questo caso poi la differenza costante è il quoziente, che nasce dal dividerli la differenza costante, che compete all'equazione (giusta il num. 692.) per quella quantità, che divide la formola, come qui il 3.

730. Si vede pertanto, che un'equazione qualunque ella sia non ha radici, che col presente metodo non siano determinabili. Per rendere più facili le operazioni nel ritrovare colla materiale somma i necessarij termini della serie dell'equazione, tornerà comodo servirsi della Tavola delle potestà data al num. 1000. del primo Tomo.

Quantunque a varie equazioni abbia applicato il presente metodo, onde se ne possa veder l'uso, soggiugnerò nulladimeno un Problema dalla di cui risoluzione ne nasce un'equazione di decimo grado, le di cui radici col presente metodo facilmente si determineranno. Egli è il seguente.

731. Prob. Avvi una vasca, che getta acqua per un numero n di luci di differenti diametri cogniti, e delle quali è data la posizione al di sotto della superficie dell'acqua. Cercasi la posizione, che deve esser data ad una nuova luce, la di cui distanza dalla superficie dell'acqua sia al suo diametro, come a : b , cosicchè l'acqua, che esce da questa luce sia all'acqua, che esce dalle altre luci, come p : q .

Ris. Il numero n delle luci cognite sia $=4$. Il raggio della prima delle predette luci sia $=d$, l'altezza della superficie dell'acqua sopra il di lei centro sia $=e$. Giusta il Guglielmini alla prop. 10. del lib. 2. della misura delle acque correnti la quantità d'acqua, che sortirà da questa luce, verrà determinata dal prodotto, che nasce con moltiplicarsi la velocità media nel quadrato del di lei diametro. La velocità media poi per la prop. 8. dello stesso lib. viene espressa da due terzi della differenza, che passa tra il prodotto dell'altezza dell'acqua sopra l'infimo punto della luce nella radice quadrata di tale altezza, e il prodotto dell'altezza dell'acqua sopra il punto superiore della luce nella radice quadrata di quest'altezza, la quale quantità deve esser divisa pel diametro della luce; che però giusta le fatte denominazioni del diametro della luce, e dell'altezza, la velocità media di questa luce

verrà espressa dalla seguente formola $\frac{\frac{2}{3} \times \sqrt{e+d} - \frac{2}{3} \times \sqrt{e-d}}{2d}$, vale a di-

re da $\frac{2}{3d} \times \sqrt{e+d} - \sqrt{e-d}$. Se adunque si moltiplicherà questa velocità media per $4d^2$ quadrato del diametro di questa luce, si avrà la quantità d'acqua, che sorte dalla prima luce, cioè $\frac{4}{3} d \times \sqrt{e+d} - \sqrt{e-d}$. Il raggio della seconda

lu-

luce sia $=c$, e l'altezza $=b$; la velocità media della seconda luce farà

$\frac{2}{3}c \times \sqrt{b+c^2} - \sqrt{b-c^2}$, e però $\frac{4}{3}c \times \sqrt{b+c^2} - \sqrt{b-c^2}$ farà la quantità d'acqua, che forte da questa seconda luce. Per la terza luce il raggio sia $=m$, e l'al-

tezza $=n$; la velocità media pertanto farà $\frac{2}{3}m \times \sqrt{n+m^2} - \sqrt{n-m^2}$, e l'acqua,

che esce da questa luce sarà espressa da $\frac{4}{3}m \times \sqrt{n+m^2} - \sqrt{n-m^2}$. Finalmente il raggio della quarta luce sia $=l$, e l'altezza $=k$; la velocità media perciò

farà $\frac{2}{3}l \times \sqrt{k+l^2} - \sqrt{k-l^2}$, conseguentemente $\frac{4}{3}l \times \sqrt{k+l^2} - \sqrt{k-l^2}$

la quantità d'acqua, che escirà da questa luce. Se si supporrà dunque, che il raggio della luce, che deve farfi sia $=y$, e l'altezza $=x$; la velocità media farà

$\frac{2}{3}y \times \sqrt{x+y^2} - \sqrt{x-y^2}$, e l'acqua, che sortirà da questa nuova luce dovrà ef-

ferre $\frac{4}{3}y \times \sqrt{x+y^2} - \sqrt{x-y^2}$. Ma l'altezza della superficie dell'acqua sopra

il centro della luce deve stare al suo diametro come $a:b$: Dunque $x:2y::a:b$. L'acqua poi, che deve uscire da questa luce sta all'acqua, che esce dalle luci date

come $p:q$ Dunque $\frac{4}{3}y \times \sqrt{x+y^2} - \sqrt{x-y^2} : \frac{4}{3}d \times \sqrt{e+d^2} - \sqrt{e-d^2}$

$+ \frac{4}{3}c \times \sqrt{b+c^2} - \sqrt{b-c^2} + \frac{4}{3}m \times \sqrt{n+m^2} - \sqrt{n-m^2}$

$+ \frac{4}{3}l \times \sqrt{k+l^2} - \sqrt{k-l^2} : p:q$; e moltiplicando fra loro gli estremi, e i me-

di, e dividendo per $\frac{4}{3}qy$, nascerà la seguente equazione $\sqrt{x+y^2} - \sqrt{x-y^2} =$

$\frac{p}{qy} \times d \times \sqrt{e+d^2} - \sqrt{e-d^2} + c \times \sqrt{b+c^2} - \sqrt{b-c^2} + m \times \sqrt{n+m^2} - \sqrt{n-m^2}$

$+ l \times \sqrt{k+l^2} - \sqrt{k-l^2}$. Si determinino ora le indeterminate $a, b, p, q, c, d, b, e, n, m, k, l$,

così $a=2$, $b=1$, $p=1$, $q=4$, $e=10$, $d=5$, $b=17$, $c=8$, $n=26$, $m=10$, $k=37$, $l=12$, i quali valori sostituiti nell'equazione la cambiano nella seguente

$$\sqrt{x+y^3} - \sqrt{x-y^3} = \frac{1}{4y} \sqrt{6\sqrt{56}+8\sqrt{98}+10\sqrt{152}+12\sqrt{218}} = \frac{1}{4y} \sqrt{5256}.$$

Si inalzi al quadrato quest'equazione $\sqrt{x+y^3} - \sqrt{x-y^3} = \frac{5256}{4y}$, onde togliere i

radicali, e si avrà $\sqrt{x+y^3} - 2\sqrt{\frac{5256}{y}} + \sqrt{x-y^3} = \frac{27625536}{16y^2}$, vale a dire,

inalzando al cubo le quantità $x+y$, e $x-y$, trasportandole nel secondo membro,

e dividendo per 2, $x^3 + 3xy^3 - \frac{13812768}{16y^2} = \sqrt{x+y^3} \sqrt{x-y^3}$. Si inalzi di nuo-

vo quest'ultima equazione al quadrato, e si avrà la seguente libera dai radicali

$$x^6 + 6x^4y^3 - \frac{27625536}{16y^2}x^3 + 9x^2y^6 - \frac{82876508}{16y^2}xy^3 + \frac{190792550821824}{256y^4} =$$

$\frac{27625536}{16y^2} \sqrt{x-y^3} = x^3 - 3x^2y^3 + 3xy^6 - y^9$, la quale eguagliata a zero, e tolte le frazioni si riduce a

$256y^{10} + 1536x^4y^6 + 2304x^4y^6 - 442008576x^3y^3 - 1326025728xy^3 + 190792550821824 = 0$ che divisa per 256 diventa

$$y^{10} + 6x^4y^6 + 9x^4y^6 - 1726596x^3y^3 - 5179788xy^3 + 745283439205 = 0.$$

Si sostituisca ora in quest'equazione il valore di x , dato dalla proporzione $x:2y::2:1$; cioè $x=4y$, e si avrà un'equazione di decimo grado, che conterrà la sola y ; cioè $2401y^{10} - 131221296y^6 + 745283439205 = 0$, risolta la quale giusta il presente metodo, come si vede nella Tavola V all'Esempio IV, si trova, che essa ha due sole radici reali, ma delle quali una cade fra 5, e 6, e l'altra fra 8, e 9. Ritrovato così il valore di y cioè il diametro, si troverà quello di x , cioè l'altezza della superficie dell'acqua sopra il centro di questa nuova luce prendendo il quadruplo del trovato diametro, come indica l'equazione $x=4y$. Mediante la formula del num. 676. si accosterà al vero valore delle ritrovate radici. La serie di questa equazione trovata nel IV. esempio ha per termini de' numeri assai alti a motivo, che tale è pure il termine cognito dell'equazione. Volendo rendere l'operazione più facile bisognerebbe trasformare giusta il num. 530. la proposta equazione in modo, che il di lei ultimo termine cognito fosse un numero più basso, nel qual caso più bassi pure risulterebbero i termini della serie, e tanto più, quanto più basso fosse il termine cognito dell'equazione.

732. Prima di terminare questo articolo darò il modo di far passaggio dalle serie già trattate alle equazioni, dalle quali esse sono nate. Per ottenere ciò non è necessario, che sia data tutta la serie: basta che ne siano dati tanti termini, quanti ne mostra il numero delle file orizzontali fino alla fila delle differenze costanti esclusivamente; in oltre devono essere dati i numeri della serie naturale, dalla di cui

cui supposizione pel valore di x sono nati questi termini, e deve essere cognita pure la differenza costante della serie. Con questi dati si proceda alla risoluzione del presente problema così. Si assuma una equazione indeterminata, e da determinarsi col calcolo, per esempio $A+Bx+Cx^2+Dx^3 \dots + M^n x^n$. Abbiamo veduto al num. 691., che la differenza costante è sempre eguale al prodotto di tanti termini della serie naturale principiante dall'unità, quanti ne mostra il massimo esponente n dell'equazione moltiplicato nel coefficiente del massimo termine; che però la serie, che nascerebbe dalla precedente equazione generale avrebbe per differenza costante $M^n \times 1 \times 2 \times 3 \dots \times n$; dunque poichè per l'ipotesi è data la differenza costante, le ella si chiamerà $=X$, sarà $X=M^n \times 1 \times 2 \times 3 \dots \times n$, conseguentemente sarà $\frac{X}{1 \times 2 \times 3 \dots \times n} = M^n$, ed ecco, che si è già determinato il coefficiente del massimo termine dell'assunta equazione indeterminata. Restano a determinarsi gli altri coefficienti A, B, C ec. I termini dati della serie siano $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Sigma$, ec., e i corrispondenti numeri della serie naturale siano espressi da a, b, c, d, e ec. Per mezzo di queste quantità si formino le seguenti equazioni, che sono tante, quanti sono i coefficienti indeterminati A, B, C ec., e però quante bastano per poterli eliminare.

$$A + aB + a^2C + a^3D \dots + \frac{X}{1 \times 2 \times 3 \dots \times n} a^n = \Gamma$$

$$A + bB + b^2C + b^3D \dots + \frac{X}{1 \times 2 \times 3 \dots \times n} b^n = \Delta$$

$$A + cB + c^2C + c^3D \dots + \frac{X}{1 \times 2 \times 3 \dots \times n} c^n = \Theta$$

$$A + dB + d^2C + d^3D \dots + \frac{X}{1 \times 2 \times 3 \dots \times n} d^n = \Lambda \text{ ec.}$$

Con queste equazioni si ritrovino i valori de' coefficienti indeterminati A, B, C ec., i quali valori sostituiti nell'assunta equazione generale $A+Bx+Cx^2 + \text{ec.}$, daranno finalmente l'equazione cercata. Facilmente poi si avranno i valori di A, B, C ec. mediante la sottrazione di una equazione dall'altra, come si vede praticato nei seguenti esempj

E S E M P I O I.

Essendo dati i due termini $+24, +12$, il primo de' quali corrisponde al 2 il secondo al 5 della serie naturale, che sono due termini della serie trovata al num. 726. la quale ha le seconde differenze costanti uguali a 30, cercasi l'equazione, da cui è nata questa serie. Si prendano le due seguenti equazioni

$$\begin{array}{rcl}
 A + 2B + \frac{20}{1.2} \times 2^1 = 24 & & A + 2B + 60 = 24 \\
 & \text{cioè} & \\
 A + 5B + \frac{20}{1.2} \times 5^1 = 12 & & A + 5B + 375 = 12
 \end{array}$$

Si sottragga la prima dalla seconda, e si avrà $3B + 315 = -12$, cioè $B = -\frac{327}{3} = -109$. Si sostituisca questo valore di B nella prima equazione, che ha cambierà in $A - 218 + 60 = 24$, cioè $A = 180$. Ma $\frac{30}{1.2} = 15$ è il coefficiente del massimo termine dell'equazione cercata, B è il coefficiente del secondo termine, e la quantità A esprime il termine cognito. Dunque l'equazione, che si cerca è $15x^2 - 109x + 181 = 0$.

E S E M P I O II.

Della serie trovata al num. 727, che ha le terze differenze costanti uguali a 6 essendo dati i tre seguenti termini $+33$, $+48$, $+63$, al primo de' quali corrisponde 1, al secondo 4, al terzo 7 della serie naturale, cercasi l'equazione, dalla quale è nata tale serie. Si prendano le tre seguenti equazioni

$$\begin{array}{rcl}
 A + B + C + \frac{6}{1.2.3} = 33 & & A + B + C + 1 = 33 \\
 A + 4B + 4^2C + \frac{6}{1.2.3} \times 4^3 = 48 & \text{cioè} & A + 4B + 16C + 64 = 48 \\
 A + 7B + 7^2C + \frac{6}{1.2.3} \times 7^3 = 63 & & A + 7B + 49C + 343 = 63
 \end{array}$$

Si sottragga la prima dalla seconda, e si avrà (II) $3B + 15C + 63 = 15$. Si sottragga la seconda dalla terza, e ne verrà (Σ) $3B + 33C + 279 = 15$. Si sottragga ora l'equazione (II) dall'equazione (Σ), con che si otterrà $18C + 216 = 0$, e però $C = -12$. Si sostituisca questo valore di C nell'equazione (II), e si avrà $3B - 180 + 63 = 15$, cioè $B = 44$. Finalmente si avrà il valore di A con sostituire nella prima equazione $A + B + C + 1 = 33$ i ritrovati valori di B, C, così $A + 44 - 12 + 1 = 33$, cioè $A = 0$. La cercata equazione adunque, da cui nasce la serie del num. 727. è $x^3 - 12x^2 + 44x = 0$.

E S E M P I O III.

Della serie trovata al num. 711, che ha le quarte differenze costanti uguali a 24, essendo dati i quattro seguenti termini $+154$, $+70$, $+130$, $+10$, al primo de' quali corrisponde -5 , al secondo -2 , al terzo 1, e al quarto 4 della serie naturale, cercasi l'equazione, dalla quale è nata tale serie. Si formino le seguenti quattro equazioni

A—

$$A-5B+5^1C-5^1D+\frac{24}{1.2.3.4}X5^1=154 \quad A-5B+25C-125D+625=154$$

$$A-2B+2^1C-2^1D+\frac{24}{1.2.3.4}X2^1=70 \quad A-2B+4C-8D+16=70$$

cioè

$$A+B+C+D+\frac{24}{1.2.3.4}X1=130 \quad A+B+C+D+1=130$$

$$A+4B+4^1C+4^1D+\frac{24}{1.2.3.4}X4^1=10 \quad A+4B+16C+64D+256=10$$

Si sottragga la prima dalla seconda, poi la seconda dalla terza, indi la terza dalla quarta, e si avranno le tre seguenti equazioni

$$(\Phi) \quad \begin{aligned} 3B-21C+117D-609 &= -84 \\ 3B-3C+9D-15 &= 60 \\ 3B+15C+63D+255 &= -120 \end{aligned}$$

Si sottragga la prima di queste tre trovate equazioni dalla seconda, poscia la seconda dalla terza, e ne verranno le due seguenti equazioni

$$(\Omega) \quad \begin{aligned} 18C-108D+594 &= 144 \\ 18C+54D+270 &= -180 \end{aligned}$$

Di nuovo si sottragga la prima di queste due dalla seconda, e si avrà $162D-324=-324$, cioè $D=0$. Si sostituisca questo valore di D in una delle precedenti equazioni segnate (Ω) , per esempio nella prima, e ne verrà $18C+594=144$, e però $C=-25$. Questi due trovati valori di C , D si sostituiscono in una delle equazioni segnate (Φ) per esempio nella prima, e si avrà $3B+525C-609=-84$, conseguentemente $B=0$. Finalmente si sostituiscono questi valori di B , C , D in una delle assunte equazioni, per esempio nella prima, con che si otterrà $A-625+625=154$, cioè $A=154$. L'equazione adunque cercata è $x^4-25x^3+154x^2=0$.

Dovrei per ultimo render ragione del perchè si debbano assumere le equazioni indeterminate $A+aB+a^1C+a^1D+\frac{x}{1.2.3\dots n}a^n=(\Gamma)$, ma la cosa è tanto chiara, che sembra superfluo farne parola, poichè mentre ho l'equazione per esempio $-100+5x+109x^2-18x^3-22x^4+x^5+x^6$, in cui i coefficienti numerici $-100, +5, +109$ ec. corrispondono ai coefficienti indeterminati A, B, C ec. per avere un termine (Γ) della serie, il quale nasce dalla supposizione di un numero $=a$ della serie naturale, bisogna che sostituisca a , e le sue successive potestà nell'equazione in luogo di x , e delle sue potestà, facendo $-100+5a+109a^2-18a^3-22a^4+a^5+a^6$, vale a dire (mediante i coefficienti indeterminati) $A+aB+a^1C+a^1D+a^1E+a^1F+a^1G$, come appunto abbiamo sempre supposto.

ARTICOLO X.

Modo di trovare di qualsivoglia equazione la massima radice positiva, e la massima radice negativa.

733. **N**El mentre che si rivedevano gli scritti per consegnarli allo Stampatore, riflettendo l'Editore alla natura delle equazioni, osservò poterne ottenere la risoluzione col seguente metodo, il quale non può essere più facile, e semplice, essendo egli appoggiato alla sola regola dell'estrazione delle radici. Veramente le formole sotto cui cade sembrano a prima vista intralciate, e laboriose, ma il caso pratico ne toglie tutto il difficile, e l'uso ne appiana. Comincerò dalle equazioni di secondo grado, e con pochi esempi l'esporrò insieme, e ne mostrerò la generalità.

Debbasi trovare la massima radice positiva dell'equazione $x^2 - ax - b = 0$. Si disponga l'equazione così $x^2 = ax + b$: si estraiga da un membro, e dall'altro la radice quadrata, e si avrà $x = \sqrt{ax + b}$: In luogo della x , che è sotto al vincolo si

sostituiscia il suo ritrovato valore, lo che darà $x = \sqrt{a\sqrt{ax + b} + b}$: Di nuovo si sostituiscia in luogo della x , che è sotto al vincolo questo suo ultimo valore, e si

avrà $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{ax + b} + b} + b} + b}$, e così in poi. Riflettendo a questa formola si scorge primieramente, che sotto a molti vincoli restando la x assai piccola, si può supporre il suo valore $= 1$, onde avere la seguente espressione

$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{ax + b} + b} + b} + b}$: In secondo luogo, che dalla somma del coefficiente del secondo termine coll'ultimo, cioè da $a + b$ devesi estrarre la prossima radice quadrata, poscia questa radice devesi moltiplicare in a coefficiente del secondo termine, e al prodotto aggiungervi l'ultimo termine b , e da questo aggregato estrarre la prossima radice quadrata, e colla stessa regola devesi continuare l'operazione fin tanto, che si arrivi ad una quantità, che moltiplicata nel coefficiente del secondo termine dia un tale prodotto, che accresciuto dell'ultimo termine sia un quadrato perfetto, la di cui radice sarà la ricercata radice massima dell'equazione, purchè sia la medesima che la quantità ultimamente sostituita in luogo di x . Le indicate estrazioni delle radici prossime devonfi fare alternativamente delle radici prossime minori, e delle radici prossime maggiori. Si debba trovare per esempio la radice prossima maggiore dell'equazione $x^2 - 2x - 8 = 0$: Si disponga essa così $x^2 = 2x + 8$, indi si estraiga da ambi i membri la radice quadrata, che è

$x = \sqrt{2x + 8}$. Si supponga $= t$ la x , che è sotto al vincolo, e si avrà

$x = \sqrt{2 + 8} = \sqrt{10}$, la di cui radice prossima minore è 3, quale si sostituiscia in luogo di x nell'espressione $\sqrt{2x + 8}$, e si avrà $\sqrt{6 + 8} = \sqrt{14}$. Di questo radicale $\sqrt{14}$ si prenda la radice prossima maggiore $= 4$. Si sostituiscia questo 4 in luogo di x nell'espressione $\sqrt{2x + 8}$, e ne verrà $\sqrt{8 + 8} = \sqrt{16} = 4$, e però la radice cercata è 4.

Pri-

Prima di passare all'altre equazioni voglio avvertire, che l'operazione riuscirà più breve, se si assumeranno le equazioni libere dal secondo termine. La formola pertanto per le equazioni di terzo grado di questa forma

$x^3 - ax - b = 0$ è $\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{a} \sqrt[3]{a} \sqrt[3]{ax + b + b + b + b}$, che deve si continuare secondo il bisogno. Per le equazioni di quarto grado di questa forma $x^4 - ax^2 - bx - c = 0$ si determinano i valori di x , e di x^2 così

$x = \sqrt[4]{ax^2 + bx + c}$, e $x^2 = \sqrt[4]{ax^2 + bx + c^2}$, onde la formola farà $x =$

$$\sqrt[4]{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{ax^2 + bx + c} + \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{ax^2 + bx + c} + \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{ax^2 + bx + c} + \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[4]{ax^2 + bx + c}$$

Fatta $x=1$ deve si estrarre da $a+b+c$ la radice quarta, e moltiplicarla in b , indi dal quadrato di $a+b+c$ si deve estrarre la radice quarta, e moltiplicarla in a , dal quadrato della somma di questi due prodotti più c si ha da estrarre la radice quarta, e moltiplicarla in b . Questo prodotto lo chiamo $=A$. Pofcia da $a+b+c$ si estrarra la radice quarta, che si moltiplich in b ; quindi dal quadrato di $a+b+c$ si estrarra la radice quarta, e si moltiplich in a : dal quadrato della somma di questi due prodotti più c si estrarra la radice quarta, che si moltiplich in a , e questo prodotto sia $=B$. Finalmente da $A+B+c$ si estrarra la radice quarta. In questo modo si continuino le estrazioni fintanto che si giunga ad una quantità, che sia un quadrato-quadrato perfetto, la di cui radice farà la cercata radice massima dell'equazione, quando la medesima non sia diversa dal valore sostituito in luogo di x .

Per le equazioni di quinto grado bisognerà prima determinare i valori di x , x^2 , x^3 , indi farne le debite sostituzioni sotto al vincolo; come essendo l'equazione

$$x^5 - ax^3 - bx^2 - cx - d = 0, \text{ farà } x = \sqrt[5]{ax^3 + bx^2 + cx + d}, x^2 = \sqrt[5]{ax^3 + bx^2 + cx + d^2},$$

$x^3 = \sqrt[5]{ax^3 + bx^2 + cx + d^3}$ valori da sostituirsi in luogo di x nel secondo membro della seguente equazione $x = \sqrt[5]{ax^3 + bx^2 + cx + d}$. Ma quanto ho detto fin' ora mostra abbastanza il progresso del metodo.

Questo metodo esige, che tutti i termini dell'equazione, eccettuazione il primo, sian affetti dal segno — nelle equazioni di grado pari, quando però la somma dei coefficienti dei termini positivi tanto nella prima, che nelle susseguenti sostituzioni dei valori di x , non sia maggiore della somma dei coefficienti dei termini negativi, lo che non succedendo, siccome sotto al vincolo d'esponente pari resterebbe una quantità negativa, e perciò l'espressione risulterebbe immaginaria, bisognerà trasformare prima l'equazione in un'altra, che abbia i termini dotati delle necessarie indicate condizioni.

Ognuno poi vede abbastanza il semplicissimo principio, che regola il presente metodo, quale si è, che il primo termine x^n di una qualunque equazione figurando una potenza perfetta, tale pure deve essere l'aggregato di tutti gli altri termini.

Basterà un solo esempio, che prenderò dall'equazione $x^4 - 11x^2 - 18x - 8 = 0$,
cioè

cioè $x^3 = 11x^2 + 18x + 8$, e però $x = \sqrt[4]{11x^2 + 18x + 8}$. Si faccia la x , che è sotto al vincolo $= 1$, e si avrà $x = \sqrt[4]{37}$, la di cui radice quadrato-quadrata prossima minore è 2. Si sostituisca in luogo di x^2 , e di x questo suo ritrovato valore 2 nell' espressione $\sqrt[4]{11x^2 + 18x + 8}$, e verrà $x = \sqrt[4]{88}$, la di cui radice quadrato-quadrata prossima maggiore è 4. Si sostituisca nell' espressione $\sqrt[4]{11x^2 + 18x + 8}$ in luogo di x^2 , e di x questo suo valore 4, e si avrà $x = \sqrt[4]{256}$, e perchè questo è un quadrato-quadrato perfetto, la di cui radice è 4, eccoci giunti a ciò, che si bramava, e però il 4 è la massima radice positiva della proposta equazione $x^3 - 11x^2 - 18x - 8 = 0$.

Certamente non si saprebbe con altro metodo trovare più speditamente quello che si cerca. Giacchè adunque nel caso particolare si ottiene con tanta facilità la massima radice di una proposta equazione, atteniamoci allo spirito del metodo, o sia alla legge, che egli prescrive, e omettiamo le date formole, le quali hanno servito a darne un prospetto.

La stessa è la maniera per trovare la massima radice negativa, se non che dopo avere estratta da una data espressione la prossima radice, ella dev'essere sostituita nella stessa espressione in luogo di x affetta dal segno — il valore poi cercato, che ne risulterà, sarà di questa forma $\pm \sqrt[n]{a^n}$, essendo n un numero pari, in cui deve valere il segno inferiore; e sarà di questa forma $\sqrt[n]{-a^n}$, essendo n un numero impari. Rispetto all'equazione $x^3 - ax - b = 0$ l'espressione della massima radice nega-

tiva sarà $x = \sqrt[3]{-a\sqrt{-a}\sqrt{-a+b+b}+b}$. Si debba per esempio trovare la massima radice negativa dell'equazione $x^3 - 19x - 30 = 0$. Si faccia $x = \sqrt[3]{19x + 30}$, indi si supponga $x = -1$, e fattane la sostituzione si avrà $x = \sqrt[3]{11}$, la di cui radice cuba prossima minore è 2. Nell' espressione $\sqrt[3]{19x + 30}$ si sostituisca -2 in luogo di x , e ne verrà $x = \sqrt[3]{-8} = -2$, e però -2 è la ricercata massima radice negativa della proposta equazione $x^3 - 19x - 30 = 0$.

Questo metodo pertanto serve a trovare tutte le radici di qualsivoglia equazione, o sia a risolvere qualunque equazione; poichè dopo essersi trovata la massima radice positiva, e negativa di una equazione, si divida essa pel loro prodotto, poscia al quoziente si applichi il metodo, e così si continui finchè si siano trovate tutte le radici.

Fin' ora ho parlato delle radici razionali, ora dirò brevemente quanto basta per le irrazionali. Qualora dopo varie sostituzioni non caderà sotto al vincolo una potestà perfetta del di lui esponente, ciò farà segno, che la massima radice dell'equazione è irrazionale, della quale dopo varie sostituzioni si avranno i limiti con prendere i due valori, che per quante sostituzioni si facciano ritorneranno sempre gli stessi, de' quali uno sarà maggiore, e l'altro minore del giusto, e differiranno di una sola unità. Quantunque la dottrina abbia tutta l'evidenza dalle cose dette, ne

fa-

farò non ostante l'applicazione ad un'esempio. Si debba trovare la massima radice positiva dell'equazione $x^5 - 14x^3 - 32x^2 - 27x - 8 = 0$, che dispongo così

$x^5 = 14x^3 + 32x^2 + 27x + 8$, da cui si ha $x = \sqrt[5]{14x^3 + 32x^2 + 27x + 8}$. Sostituisco x invece di x , e ne ho $x = \sqrt[5]{85}$, la di cui radice quinta prossima minore è 2. Nell'espressione $\sqrt[5]{14x^3 + 32x^2 + 27x + 8}$ sostituisco in luogo di x^3 , x^2 , e x questo suo ritrovato valore 2, e ne nasce $\sqrt[5]{302}$, la di cui radice quinta prossima maggiore è 4. Nella stessa espressione sostituisco questo 4 in luogo di x , e sue potestà, con che ritrovo $\sqrt[5]{1524}$, la di cui radice quinta prossima minore è 4. Sostituisco di nuovo questo 4 in vece di x , e ritorna $\sqrt[5]{1524}$, la di cui radice prossima maggiore è 5, e perchè continuando le sostituzioni ritornerebbero sempre gli stessi valori 4, 5, però essi sono i limiti della cercata massima radice della proposta equazione. La stessa maniera d'operare si osservi per trovare i limiti della massima radice negativa. Se poi trovati questi limiti si vorrà accettare di più al vero valore si opererà giusta il num. 675, o pure si farà uso della formola data al num. 676.

ARTICOLO XI.

Modo di estrarre da qualsivoglia radicale complesso una qualunque radice.

734. **D**Opo aver data la Teoria delle equazioni, e la loro risoluzione, resta a parlare della maniera di estrarre una qualsivoglia radice dai radicali complessi (per radicale complesso intendo un aggregato di quantità o puramente radicali, o miste di radicali, e razionali) lo che viene il più delle volte al bisogno per potere sbarazzare dalle formole radicali le radici provenute dalla risoluzione delle equazioni. Siccome pertanto questi radicali nascono dalla risoluzione delle equazioni, o sia non altro sono, che la radice di una equazione, io qui suppongo cognita l'equazione, dalla di cui risoluzione si è avuto il proposto radicale; Che se fosse dato il radicale, e non fosse cognita l'equazione da cui è nato, basterà per scuoprirla prendere una equazione a coefficienti indeterminati dello stesso grado del radicale dato, indi paragonare (come or ora mostrerò coll'esempio) la formola radicale di questa equazione indeterminata col proposto radicale a fine di venire in cognizione dei valori corrispondenti ai coefficienti indeterminati, con che si otterrà la bramata equazione.

735. Essendo $= x$ il radicale, di cui si vuole la radice n , sia $= y$ questa radice, farà adunque $y = \sqrt[n]{x}$, e però $y^n = x$: ed essendo $x^n + ax^{n-1} + bx^{n-2} + cx^{n-3} + \dots + A = 0$ l'equazione, dalla di cui risoluzione è venuto il radicale $= x$, se in questa equazione si sostituirà y^n in luogo di x , si avrà la nuova equazione $y^{n^2} + ay^{n(n-1)} + by^{n(n-2)} + cy^{n(n-3)} + \dots + A = 0$, le di cui radici somministreranno le cercate radici del proposto radicale. Ma per facilitare la risoluzione di questa equazione; e nel tempo stesso poter determinare i valori di y nella stessa forma, che quelli di x , bisognerà risolvere l'equazione $y^{n^2} + ay^{n(n-1)} + by^{n(n-2)} + \dots + A = 0$ ec. in altrettante equazioni del grado m . quante unità contiene l'esponente n ; ciò poi si effettuerà facilmente come segue: Poichè in que-

sta equazione $y^n + ay^{n-1} + by^{n-2}$ ec. tutti gli esponenti di y sono divisibili per n , se y è radice di questa equazione, faranno pure radice della medesima an-

che tutti i valori contenuti in $\sqrt[n]{y^n}$, ma i valori di $\sqrt[n]{y^n}$ si hanno, come già si è detto di sopra, con moltiplicarli y in tutte le radici dell'equazione $x^n - 1 = 0$, vale a dire in tutte le radici n dell'unità, dunque se una delle ricercate equazioni, in cui si risolve la precedente è per Esempio $y^n + py^{n-1} + qy^{n-2} + ry^{n-3}$ ec., che per ora è indeterminata, le altre faranno quella stessa, i di cui coefficienti siano moltiplicati nelle radici n dell'unità. Ritrovato questo numero n di equazioni del grado m , si moltiplichino fra loro, e dell'equazione, che ne verrà si paragonino i coefficienti coi coefficienti dell'equazione cognita $y^n + ay^{n-1} + by^{n-2}$ ec. a motivo di ritrovare i valori delle indeterminate p, q, r ec. e così d'indeterminata rendere determinata l'equazione $y^n + py^{n-1} + qy^{n-2}$ ec., dalla di cui risoluzione si ha una parte delle cercate radici di x , di cui le altre si ricavano dalle rimanenti equazioni di grado m . Questo metodo chiaro per se stesso farà reso anche più chiaro dalle seguenti applicazioni. Comincerò dai binomj quadrati.

736. Si debba estrarre la radice quadrata dal binomio $3 \pm \sqrt{8}$. Poichè non mi è data l'equazione, da cui è provenuto questo binomio, suppongo che egli si abbia da questa equazione dello stesso di lui grado a coefficienti indeterminati $x^2 + ax$

$+ b = 0$, le di cui radici sono $x = -\frac{a \pm \sqrt{-4b + a^2}}{2}$. Di questo radicale pertanto

paragono la parte razionale colla razionale, e la radicale colla radicale del binomio

dato $3 \pm \sqrt{8}$, con che ho $-\frac{a}{2} = 3$, cioè $a = -6$, e $\sqrt{8} = \frac{\sqrt{-4b + a^2}}{2}$ e però

$2\sqrt{8} = \sqrt{-4b + a^2}$, ed elevando l'uno, e l'altro membro al quadrato, ne viene $32 = -4b + a^2$, che col rimettere in luogo di a^2 il suo valore diviene $32 = -4b +$

36 , da cui si ricava il valore di b , che è $b = \frac{36 - 32}{4}$, cioè $b = 1$. Si sostituisca

no questi ritrovati valori di a, b , nell'equazione $x^2 + ax + b = 0$, con che ella diverrà (A) $x^2 - 6x + 1 = 0$, che è quella appunto, dalla di cui risoluzione nasce il dato binomio $3 \pm \sqrt{8}$. Dovendosi estrarre la radice quadrata da questo binomio $3 \pm \sqrt{8}$, che suppongo $= x$, poichè egli è radice dell'equazione (A), sia $= y$ la sua radice quadrata, farà $y = \sqrt{x}$, e $y^2 = x$. Si sostituisca questo valore di x nell'equazione (A), lo che fatto essa si cambierà nella seguente [B] $y^4 - 6y^2 + 1 = 0$. Questa equazione [B] si risolva ne' suoi due fattori di secondo grado, de' quali se uno li supponrà $y^2 + py + q = 0$, l'altro farà $y^2 - py + q = 0$, perchè dell'equazione $x^2 - 1 = 0$ le due radici sono $+1$, e -1 , delle quali la prima moltiplica il coefficiente del secondo termine del primo fattore, e la seconda moltiplica il coefficiente del secondo termine del secondo fattore. Si moltiplichino fra loro questi due fattori a fine di avere l'equazione da paragonarsi coll'equazione [B], onde poter determinare i coefficienti indeterminati p, q . Si faccia pertanto.

$$\left. \begin{array}{l} y^2 + py + q \\ y^2 - py + q \end{array} \right\} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} y^4 + py^3 + qy^2 - py^3 - p^2y^2 + pqy \\ + qy^2 \end{array} \right\} = 0$$

$$y^4 + 2q - p^2 \times y^2 + q^2 = 0$$

Ora paragonando i coefficienti di quest'equazione coi coefficienti dell'equazione [B] mi viene $2q - p^2 = -6$, e $q^2 = 1$, cioè $q = 1$, il qual valore sostituito nella precedente equazione $2q - p^2 = -6$ la rende $2 - p^2 = -6$, da cui si ricava il valore di p , che è $p = \pm \sqrt{8}$. Si sostituiscano questi valori di p , q nei due affretti fattori indeterminati, ed essi diverranno $y^2 + \sqrt{8} + 1 = 0$, $y^2 - \sqrt{8} + 1 = 0$. Del

primo le radici sono $y = -\frac{\sqrt{8}}{2} \pm \sqrt{-1 + \frac{8}{4}}$, cioè $y = -\frac{2\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{-4+8}}{2}$, e pe-

rò $y = \pm 1 - \sqrt{2}$, che sono le due radici del binomio $3 - \sqrt{8}$. Il secondo fattore

ha per radici $y = \frac{\sqrt{8}}{2} \pm \sqrt{-1 + \frac{8}{4}}$, cioè $y = \frac{2\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{-4+8}}{2}$, e però $y = \pm 1$

$+ \sqrt{2}$, che sono le radici dell'altro binomio $3 + \sqrt{8}$. Essendosi adunque dovuto estrarre la radice quadrata dal binomio $3 \pm \sqrt{8}$ si sono trovate quattro radici, perchè il binomio $3 \pm \sqrt{8}$ corrisponde a questi due $3 - \sqrt{8}$, $3 + \sqrt{8}$, e da ciascuno, siccome da qualunque quantità [pel num. 382.] si estrapla doppia radice, che perciò debbono essere quattro.

737. Il metodo è generale per estrarre qualsivoglia radice. Proporrò pertanto un altro esempio, in cui debbasi estrarre la radice quadrato-quadrata da un binomio radicale quadrato. Sia dato il binomio $376 \pm 168\sqrt{5}$, da cui si voglia estrarre la radice quarta. Non essendo data l'equazione, dalla di cui risoluzione, è nato questo radicale, si supponga che ella sia questa indeterminata $x^4 + ax + b = 0$, che risolta

dà $x = \frac{-a \pm \sqrt{-4b + a^2}}{2}$. Per determinare i coefficienti indeterminati a , b , si pa-

ragoni la parte razionale colla razionale, e la radicale colla radicale di questo radicale, e del proposto binomio, con che si avrà $-\frac{a}{2} = 376$, e però $a = -752$,

poichè $\frac{\sqrt{-4b + a^2}}{2} = 168\sqrt{5}$, cioè $\sqrt{-4b + a^2} = 336\sqrt{5}$, ed elevando l'uno, e

l'altro membro al quadrato ne verrà $-4b + a^2 = 554480$, e sostituendo in luogo di a^2 il suo valore, si avrà $-4b + 565504 = 554480$, da cui si ricava il valore di b , che è $b = 256$. Che però se si sostituiranno questi ritrovati valori di a , b nell'equazione $x^4 + ax + b = 0$, essa diverrà [A] $x^4 - 752x + 256 = 0$, che è quella appunto, dalla di cui risoluzione nasce il proposto radicale $376 \pm 168\sqrt{5}$. Di questo radi-

cale, che è uguale all'incognita x dell'equazione (A), la radice quarta sia $=y$, farà $y = \sqrt[4]{x}$, e però $y^4 = x$. Si sostituiscia questo valore di x nell'equazione (A), ed essa si cambierà nella seguente (B) $y^8 - 752y^4 + 256 = 0$. Questa equazione si deve risolvere in quattro fattori di secondo grado, de' quali, supposto che il primo sia questo indeterminato $y^4 + py + q = 0$, gli altri tre si formeranno da questo stesso mediante il moltiplicare il coefficiente del secondo termine nelle radici di questa equazione $x^4 - 1 = 0$, che sono le quattro seguenti $+1, -1, +\sqrt{-1}, -\sqrt{-1}$, e però i quattro fattori cercati sono $y^4 + py + q = 0$, $y^4 - py + q = 0$, $y^4 + p\sqrt{-1}\chi y - q = 0$, $y^4 - p\sqrt{-1}\chi y - q = 0$. Si moltiplichino fra loro come segue

$$\begin{array}{r}
 \text{I. } y^4 + p\sqrt{-1}\chi y - q \\
 \text{II. } y^4 - p\sqrt{-1}\chi y - q \\
 \hline
 \left. \begin{array}{l} y^4 + p\sqrt{-1}\chi y^4 - qy^4 + pq\sqrt{-1}\chi y + q^4 \\ - p\sqrt{-1}\chi y^4 + p^2y^4 - pq\sqrt{-1}\chi y \\ - qy^4 \end{array} \right\} = 0 \\
 \hline
 \text{V. } y^4 - 2q + p^2\chi y^4 + q^4 = 0 \\
 \\
 \text{III. } y^4 + py + q \\
 \text{IV. } y^4 - py + q \\
 \hline
 \left. \begin{array}{l} y^4 + py^4 + qy^4 - pqy + q^4 \\ - py^4 - p^2y^4 + pqy \\ + qy^4 \end{array} \right\} = 0 \\
 \hline
 \text{VI. } y^4 + 2q - p^2\chi y^4 + q^4 = 0
 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{VI. } y^4 + \frac{2q-p^2}{2q+p^2} \chi y^2 + q^2 \\ \text{V. } y^4 - \frac{2q+p^2}{2q-p^2} \chi y^2 + q^2 \end{array} \right\} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} y^4 + \frac{2q-p^2}{2q+p^2} \chi y^2 + q^2 y^4 - \frac{2q+p^2}{2q-p^2} \chi y^2 + q^2 y^4 \\ - \frac{2q+p^2}{2q-p^2} \chi y^2 + q^2 y^4 \end{array} \right\} = 0$$

$$y^8 - \frac{2q^2+4p^2q-p^4}{2q^2+4p^2q-p^4} \chi y^4 + q^4 = 0$$

Paragono adesso i coefficienti di questa equazione coi coefficienti dell'equazione (B), e trovo $-2q^2+4p^2q-p^4=-752$, e $q^4=256$, da cui si ha $q=4$, e questo valore sostituito nella precedente equazione $-2q^2+4p^2q-p^4=-752$ la cambia in $-32+16p^2-p^4=-752$, cioè $p^4-16p^2=720$, le di cui radici sono $p^2=8 \pm \sqrt{784}$, e però $p = \pm \sqrt{8 \pm \sqrt{784}}$, e perchè $\sqrt{784}=28$, i quattro valori di p sono $+6$, -6 , $+2\sqrt{-5}$, $-2\sqrt{-5}$. Ne' sopradetti quattro fattori si sostituiscano questi ritrovati valori di p , q , e si avrà I. $y^4+6y+4=0$, II. $y^4-6y+4=0$, III. $y^4+2\sqrt{-5} \chi y-4=0$, IV. $y^4-2\sqrt{-5} \chi y-4=0$. Del primo le radici sono I. $y=-3 \pm \sqrt{-4+9}$, cioè $y=-3 \pm \sqrt{5}$, del secondo II. $y=3 \pm \sqrt{-4+9}$, cioè $y=3 \pm \sqrt{5}$; del terzo sono III. $y=-\sqrt{5} \pm \sqrt{4+5}$, cioè $y=-\sqrt{5} \pm 3$, e finalmente del quarto sono IV. $y=\sqrt{5} \pm \sqrt{4+5}$, cioè $y=\sqrt{5} \pm 3$, vale a dire le otto radici dell'equazione (B) sono $-3+\sqrt{5}$, $-3-\sqrt{5}$, $+3+\sqrt{5}$, $+3-\sqrt{5}$, $-\sqrt{5}+3$, $-\sqrt{5}-3$, $+\sqrt{5}+3$, $+\sqrt{5}-3$, ma siccome le quattro prime non sono differenti dalle quattro ultime, quindi è che al bisogno soddisfanno i due primi fattori. Intanto poi nel voler estrarre la radice quarta dal binomio $376 \pm 168\sqrt{5}$ si sono trovate otto radici quarte dello stesso binomio, che poscia si sono ridotte a quattro, perchè il suddetto binomio si compone da questi due $376 \pm 168\sqrt{5}$, $376-168\sqrt{5}$, da ciascun de' quali, mediante l'estrazione della radice quarta, devonli ricavare quattro radici, lo che è manifesto per le cose già dette.

738. Nella stessa maniera si proceda per estrarre qualsivoglia altra radice da un binomio radicale quadrato: Come volendosi la radice n del binomio $17 \pm 3\sqrt{6}$, che nasce dal risolversi l'equazione $x^2-33x+235=0$, supposto $17 \pm 3\sqrt{6}=x$, la di cui radice n sia y , farà $y=\sqrt[n]{x}$, e però $y^n=x$, si sostituiscia questo valore nella precedente equazione, che la cambierà in $y^{2n}-34y^n+235=0$, che devesi risolvere in un numero n di fattori di secondo grado: Se pertanto si assumerà $y^2+py+q=0$ pel primo fattore indeterminato, gli altri fattori risulteranno da questo stesso con moltiplicarsi il coefficiente del di lui secondo termine nelle radici dell'equa-

zione $z^n - 1 = 0$. Ritrovati tutti questi fattori si moltiplichino fra loro, e dell'equazione, che ne verra si paragonino i coefficienti coi coefficienti dell'equazione $y^n - 34y^n + 235 = 0$, e con ciò si determineranno i valori delle assunte indeterminate p, q . Si sostituiscano per ultimo negli anzidetti fattori, questi valori di p, q , onde niente altro più si richiederà per avere le ricercate radici, che risolvere questi fattori di secondo grado, lo che non involve alcuna difficoltà.

739. Passiamo adesso ai radicali cubi, e primieramente debbasi estrarre la ra-

dice quadrata da un proposto radicale cubo, per esempio $2 + \sqrt[3]{7+4\sqrt{3}} +$

$\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}$. Supposto che non sia cognita l'equazione, dalla di cui risoluzione è provenuto questo radicale, bisognerà in primo luogo accingerli a ritrovarla. Dal modo di risolvere le equazioni cubiche già so, che la quantità razionale 2, che trovasi aggiunta al dato radicale, non è altro che quella quantità, con cui si sono diminuite le radici dell'equazione da risolverli a fine di trasformarla in un'altra mancante del secondo termine: Sicchè per ora si lasci da parte questa quantità 2, e si applichi a trovare l'equazione trasformata, dalla cui soluzione è venuto il dato radicale

$\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}$. Si supponga pertanto, che questa equazione sia $x^3 +$

$ax + b = 0$, la di cui radice è $x = \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} +$

$\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}}$. Si paragoni questo radicale indeterminato col radicale proposto per poter determinare i valori dei coefficienti indeterminati a, b . Si

faccia adunque $\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} =$

$\sqrt[3]{6+4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}$. Si inalzi al cubo l'uno, e l'altro membro di questa equazione come segue: Primieramente inalzo al quadrato il primo membro, e mi

viene $\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} \times \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} - \frac{2}{3}a +$

$\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} \times \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}}$, che di nuovo multi-

plico per $\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}}$ per ave-

re il cubo cercato, con che ho $-\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}$

$$\begin{aligned}
& -\frac{2}{3}a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}+ \\
& \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}\times\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}\times\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}+ \\
& \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}\times\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}\times\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}- \\
& \frac{2}{3}a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}, \text{ cioè } -b- \\
& \frac{2}{3}a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}-\frac{1}{3}a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}- \\
& \frac{1}{3}a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}-\frac{2}{3}a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}, \text{ e con-} \\
& \text{ seguentemente } -b-a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}
\end{aligned}$$

$$-a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}, \text{ che è il cubo cercato del primo membro}$$

$$\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}+\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b-\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}. \text{ Si prenda adesso}$$

il cubo del secondo membro $\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}}+\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}$, il di cui quadrato è

$$\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}}\times\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}}+2+\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}\times\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}, \text{ che moltiplicato in}$$

$$\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}}+\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}} \text{ per avere il cercato cubo, dà per ultimo } 7+4\sqrt{3}$$

$$+2\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}}+\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}\times\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}\times\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}+$$

$$\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}\times\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}}\times\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}}+2\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}+7-4\sqrt{3}, \text{ cioè } 14+$$

$3\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}}+3\sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}$. Ora che si è trovato il cubo dell' uno, e dell' altro membro, si paragoni la parte razionale colla razionale, e le radicali colle rispettive corrispondenti parti radicali, lo che fatto si avrà $-b=14$, e però $b=-14$, e

$$-a\sqrt[3]{-\frac{1}{2}b+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{27}a^3}}=3\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}};$$

—a

— $a \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} = 3 \sqrt[3]{7 - 4\sqrt{3}}$. Si elevino al cubo queste

due ultime equazioni, e ne verrà dalla prima $-a^3 \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} =$

$27 \sqrt[3]{7 + 4\sqrt{3}}$, dalla seconda $-a^3 \sqrt[3]{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}} = 27 \sqrt[3]{7 - 4\sqrt{3}}$,

cioè dalla prima $\frac{1}{2}a^3b - a^3 \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3} = 189 + 108\sqrt{3}$, e dalla seconda

$\frac{1}{2}a^3b + a^3 \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3} = 189 - 108\sqrt{3}$. Si sommino pertanto queste due

equazioni, e si otterrà $a^3b = 378$; e perchè si è trovato $b = -14$, farà $a^3b = -14a^3$, e però $-14a^3 = 378$, e dividendo l'uno, e l'altro membro per -14 , si ha $a^3 = -27$, ed estraendo la radice cuba $a = -3$. Si sostituiscano adesso questi ritrovati valori di a, b nell'assunta equazione indeterminata $x^3 + ax + b = 0$, con che essa si cambierà in $x^3 - 3x - 14 = 0$, che è l'equazione trasformata da cui è nato il proposto radicale $\sqrt[3]{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{7 - 4\sqrt{3}}$. Ma questa equazione non basta; bisogna tro-

var l'equazione, la di cui radice è $2 + \sqrt[3]{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{7 - 4\sqrt{3}}$. Siccome poi di sopra ho osservato, che l'equazione trasformata si è avuta col diminuirsi le radici dell'equazione da risolversi della quantità 2, così per avere questa equazione farà mestiere aumentare della quantità 2 le radici della ritrovata equazione trasformata. Si ponga adunque $x = z + 2$, e si facciano le sostituzioni come segue

$$\left. \begin{array}{rcl} x^3 & = & z^3 - 6z^2 + 12z - 8 \\ -3x & = & -3z + 6 \\ -14 & = & -14 \end{array} \right\} = 0$$

$$(A) \quad z^3 - 6z^2 + 9z - 16 = 0$$

Questa poi è la ricercata equazione, di cui è radice il dato radicale $2 +$

$$\sqrt[3]{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{7 - 4\sqrt{3}}.$$

740. Ora di questo radicale, che è uguale a z , volendosi la radice quadrata, supponga che essa sia $=y$, farà $y=\sqrt{z}$, e però $y^2=z$. Si sostituisca questo valore di z nell'equazione (A), ed essa si cambierà in (B) $y^6-6y^4+9y^2-16=0$, le di cui radici y daranno le radici quadrate delle tre radici dell'equazione (A); e siccome da ogni quantità si può estrarre doppia radice quadrata, essendo tre le radici dell'equazione (A), dovranno esser sei le cercate radici quadrate. Ma per avere più facilmente le radici dell'equazione (B), e averle nel tempo stesso della medesima forma del radicale proposto bisognerà risolvere in due fattori di terzo grado l'equazione (B), lo che si otterrà facilmente con prenderne uno comunque, per esempio $y^3+py^2+qy+r=0$, mentre l'altro giusta la regola più volte data farà $y^3-py^2+qy-r=0$. Si moltiplichino fra loro questi due fattori, e si avrà

$$\left. \begin{array}{l} y^3+py^2+qy+r \\ y^3-py^2+qy-r \end{array} \right\} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} y^6+py^3+qy^2+ry^2-py^3+qy^2-r^2 \\ -py^3-p^2y^4-pqy^3+q^2y^4-qry^2 \\ qy^4+pqy^2-pry^2 \\ -r^2 \end{array} \right\} = 0$$

$$y^6 + 2q - p^2 \times y^4 + q^2 - 2pr \times y^2 - r^2 = 0$$

Si paragonino i coefficienti di questa equazione coi coefficienti dell'equazione (B) a fine di determinare i valori di p , q , r , e si avrà $2q-p^2=-6$, $q^2-2pr=9$, $-r^2=-16$. Da quest'ultima si ha $r=4$, il qual valore sostituito nella seconda, se dalla medesima si prenderà il valore di q , si avrà $q=\sqrt{9+8p}$. Finalmente si metta questo valore di q nella prima, e ne verrà $2\sqrt{9+8p}=p^2-6$, ed elevando l'uno, e l'altro membro al quadrato, si avrà $p^4-12p^2-32p=0$, dalla quale si ha un valore di $p=0$. Posto a qualunque uguale a zero il valore di p nella prima equazione $2q-p^2=-6$, si avrà $q=-3$; ed ecco ritrovati i valori di $p=0$, di $q=-3$, e di $r=4$, che se si porranno negli affetti due fattori indeterminati, essi diverranno I. $y^3-3y+4=0$, II. $y^3-3y-4=0$. Risolvendoli col metodo delle equazioni cubiche si hanno dal primo le tre seguenti radici

$$\sqrt[3]{-2+\sqrt{3}} + \sqrt[3]{-2-\sqrt{3}}; -\frac{1+\sqrt{-3}}{2} \sqrt[3]{-2+\sqrt{3}} \\ -\frac{1-\sqrt{-3}}{2} \sqrt[3]{-2-\sqrt{3}}; -\frac{1-\sqrt{-3}}{2} \sqrt[3]{-2+\sqrt{3}} -\frac{1+\sqrt{-3}}{2} \sqrt[3]{-2-\sqrt{3}}$$

Del secondo fattore le tre radici sono $\sqrt[3]{2+\sqrt{3}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{3}};$

$$-\frac{1+\sqrt{-3}}{2} \sqrt[3]{2+\sqrt{3}} -\frac{1-\sqrt{-3}}{2} \sqrt[3]{2-\sqrt{3}};$$

T. II.

Nn

—1

$-\frac{1-\sqrt{-3}}{2} \sqrt[3]{2+\sqrt{3}} - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} \sqrt[3]{2-\sqrt{3}}$. E queste sono le sei cercate radici quadrate delle radici dell'equazione (B). Che però quattro di queste radici essendo immaginarie, siccome delle tre radici dell'equazione (B) due sono immaginarie, le due radici quadrate del proposto radicale $2+\sqrt[3]{7+4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}$ sono $\sqrt[3]{2+\sqrt{3}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{3}}$, $\sqrt[3]{-2+\sqrt{3}} + \sqrt[3]{-2-\sqrt{3}}$.

741. Si debba in secondo luogo estrarre la radice cuba da un proposto radicale cubo. Sia data la radice $x = -10 + \sqrt[3]{-3645+729\sqrt{-2}}$

+ $\sqrt[3]{-3645-729\sqrt{-2}}$, che si ha dall'equazione $x^3+30x^2-429x+1000=0$, e di questa radice vogliasi prendere la radice cuba. Sia essa pertanto $=y$, farà

$y = \sqrt[3]{x}$, e però $y^3 = x$. Si sostituisca questo valore di x nella precedente equazione, che la cambierà in (A) $y^3+30y^3-429y^3+1000=0$. Si risolva questa equazione ne' suoi tre fattori di terzo grado, de' quali se pel primo si prenderà l'indeterminato $y^3+py^3+qy+r=0$, gli altri due (che per le cose dette devono risultare da questo con moltiplicare il coefficiente del suo secondo, e terzo termine nell'altre due

radici dell'equazione $z^3-1=0$) faranno $y^3 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} py^3 - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} qy+r=0$,

$y^3 - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} py^3 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} qy+r=0$. Si moltiplichino insieme questi tre fattori, cominciando dai due ultimi come segue

$$\left. \begin{array}{l} \text{II. } y^3 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} py^3 - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} qy+r \\ \text{III. } y^3 - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} py^3 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} qy+r \end{array} \right\} =$$

$$\left. \begin{array}{l} y^6 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} py^5 - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} qy^4 + ry^3 \\ - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} + py^4 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} pqy^3 - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} py^3 \\ - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} qy^2 - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} pqy^2 + q^2y^2 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} qry \\ + ry^2 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2} ppy^2 - \frac{1-\sqrt{-3}}{2} qry + r^2 \end{array} \right\} =$$

$$\text{IV. } y^6 - py^5 + p^2 - q^2 \times y^4 + 2r - pq \times y^3 + q^2 - pr \times y^2 - qry + r^2 = 0.$$

Si

Si moltiplichì per ultimo questa equazione col primo fattore, e si avrà

$$\text{IV. } y^6 - py^5 + p^2 - q \times y^4 + 2r - pq \times y^3 + q^2 - pr \times y^2 - qry + r^2 = 0 \\ y^3 + py^2 + qy + r = 0$$

$$\left. \begin{aligned} & y^3 - py^2 + p^2 - q \times y^4 + 2r - pq \times y^5 + q^2 - pr \times y^6 - qry^3 + r^2 y^3 \\ & + py^6 - p^2 y^5 + p^3 - pq \times y^6 + 2pr - p^2 q \times y^7 + pq^2 - p^2 r \times y^8 - pqry^4 + p^2 y^8 \\ & + qy^7 - pqy^6 + p^2 q - q^2 \times y^7 + 2qr - pq \times y^8 + q^2 - pr \times y^9 - q^2 ry^4 + q^2 y^9 \\ & + ry^6 - pr y^5 + p^2 r - qr \times y^6 + 2r^2 - pr \times y^7 + q^2 r - pr^2 \times y^8 - qr^2 y + r^3 \end{aligned} \right\} = 0$$

$$\text{V. } y^3 + p^3 - 3pq + 3r \times y^6 + q^3 - 3pr + 3r^2 \times y^3 + r^3 = 0.$$

742. Ora paragono i coefficienti di questa equazione coi coefficienti dell'equazione (A) a fine di ritrovare i valori delle indeterminate affisse p, q, r , e mi viene $p^3 - 3pq + 3r = 30$; $q^3 - 3pr + 3r^2 = -429$; $r^3 = 1000$. Da quest'ultima ho $r = 10$, dalla prima $q = \frac{p^3 + 3r - 30}{3p}$; e questo valore di q sostituito nella seconda insieme col valore di r dà $p^3 - 270p^2 - 19683p = 0$, la quale equazione somministra $p = 0$. Questo valore di p riduce la seconda equazione alla seguente $q^3 + 3r^3 = -429$, cioè (con rimettere il valore di r) $q^3 = -729$, e però $q = -9$. Ecco pertanto ritrovati i valori degli affissi coefficienti indeterminati, che sono $p = 0$, $q = -9$, $r = 10$, conseguentemente il primo fattore $y^3 + py^2 + qy + r = 0$ si cambia in $y^3 - 9y + 10 = 0$,

di cui una radice è $y = \sqrt[3]{-5 + \sqrt{-2}} + \sqrt[3]{-5 - \sqrt{-2}}$, che è la cercata radice cuba del proposto radicale cubo. Le altre due radici del primo fattore $y^3 - 9y + 10 = 0$ si prendano nel modo detto al num. 585, e illesamente si trovino le radici

$$\text{degli altri due fattori } y^3 - \frac{1 + \sqrt{-3}}{2} py^2 - \frac{1 - \sqrt{-3}}{2} qy + r = 0,$$

$y^3 - \frac{1 - \sqrt{-3}}{2} py^2 - \frac{1 + \sqrt{-3}}{2} qy + r = 0$ dopo avere sostituito i ritrovati valori di q, r . Intanto poi si sono trovate nove radici cubiche, perchè l'equazione, il di cui radicale è stato proposto, essendo cubica, ha tre radici, da ciascuna delle quali per la stessa ragione si deve estrarre tripla radice. Una radice cubica adunque del pro-

posto radicale $-10 + \sqrt[3]{-3645 + 729\sqrt{-2}} + \sqrt[3]{-3645 - 729\sqrt{-2}}$, e però una radice dell'equazione $y^3 + 30y^2 - 429y + 1000 = 0$ è

N n 2

3V

$\sqrt[3]{-5+\sqrt{-2}} + \sqrt[3]{-5-\sqrt{-2}}$, da ciascuna parte del qual binomio si può estrarre la radice cuba, che della prima è $1+\sqrt{-2}$, e $1-\sqrt{-2}$ della seconda, la di cui somma è $=2$: Siccome poi dal proposto radicale si è estratta due volte la radice cuba, con che n'è venuto 2, però il cubo di questo 2, cioè 8 è la radice in questione dell'equazione $x^3+30x^2-429x+1000=0$.

743. Se da un radicale cubo $=x$, che nasce dal risolversi l'equazione $x^3+ax^2+bx+c=0$, si vorrà estrarre la radice quarta, si supponga essa $=y$, sarà $y=\sqrt[4]{x}$. e però $y^4=x$, il qual valore sostituito nella proposta equazione in luogo di x la cambia in $y^{12}+ay^8+by^4+c=0$, la quale devesi risolvere in quattro fattori di terzo grado, che faranno

- I. $y^3+py^2+qy+r=0$,
- II. $y^3-py^2+qy-r=0$,
- III. $y^3+\sqrt{-1} \times py^2-qy-\sqrt{-1} \times r=0$,
- IV. $y^3-\sqrt{-1} \times py^2-qy+\sqrt{-1} \times r=0$,

dal prodotto de' quali si ha $y^{12}-p^4+4p^3q-4p^2r-2q^3 \times y^9 +$

$q^4-4pq^2r+4q^3r+2p^2r^2 \times y^6-r^4=0$, di cui paragonando i coefficienti coi coefficienti dell'equazione in y , si avrà $-p^4+4p^3q-4p^2r-2q^3=a$; $q^4-4pq^2r+4q^3r+2p^2r^2=b$; $-r^4=c$, mercè cui si ritroveranno i valori delle assunte indeterminatè p, q, r , onde poi si passerà a risolvere ciascuno dei quattro fattori, e così si avranno dodici radici quarte delle tre radici dell'equazione $x^3+ax^2+bx+c=0$, poichè essendo quattro le radici quarte, che da qualunque quantità si possono estrarre, da ognuna delle tre radici della detta equazione si potranno estrarre quattro radici quarte, che però tra tutte sono dodici.

744. Con ugual metodo si proceda per estrarre da un proposto radicale cubo la radice quinta, sesta ec.

745. Niente di più esige il metodo per estrarre qualsivoglia radice da qualunque altro radicale quarto, quinto, sesto, settimo ec. Una cosa soltanto devesi osservare, ed è, che il metodo è bensì universale, ma però per quei radicali soltanto, che ammettono la cercata radice; molti però, anzi moltissimi faranno i radicali, che non avranno una bramata radice, e che perciò non vi si potrà estrarre.

Esempio I, in

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 -19 & -18 & -17 & -16 & -15 & -14 & -13 & -12 & -11 & & & \\
 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & & & \\
 -80 & -74 & -68 & -62 & -56 & -50 & -44 & -38 & -32 & & & \\
 +334 & +260 & +192 & +130 & +74 & +24 & -20 & -58 & -90 & & & \\
 -260 & 0 & +192 & +322 & +396 & +420 & +400 & +342 & +252 & & &
 \end{array}$$

Esempio II, i

$$\begin{array}{cccccccc}
 -11 & -10 & -9 & -8 & -7 & -6 & & \\
 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 24 & & \\
 -188 & -264 & -240 & -216 & -192 & -168 & & \\
 +1592 & +1328 & +1088 & +872 & +680 & +512 & & \\
 -5368 & -4040 & -2952 & -2080 & -1400 & -888 & & \\
 +4040 & 0 & -2952 & -5032 & -6432 & -7320 & &
 \end{array}$$

Esempio III,

$$\begin{array}{cccc}
 - & 4 & -3 & \\
 & 720 & 720 & \\
 - & 4560 & -3840 & - \\
 + & 11832 & +7992 & + \\
 - & 15534 & -7842 & - \\
 + & 11066 & +3224 & + \\
 - & 3384 & -160 & + \\
 + & 216 & +56 & +
 \end{array}$$

Esempio IV, in cu

$$\begin{array}{cccc}
 0 & 1 & 2 & \\
 8712748800 & 8712748800 & 8712748800 & \\
 -39207369600 & -30494520800 & -21781872000 & - \\
 +72606240000 & +42111619200 & +20329747200 & \\
 -71154115200 & -29042476000 & -8712748800 & \\
 +39451491440 & +10418225440 & +1706246640 & \\
 -27998858520 & -17579853080 & -15873616440 & - \\
 +33458377560 & +15878514480 & +4898040 & \\
 -19817502380 & -3939087900 & -3934189800 & - \\
 +3939092702 & +4802 & -3934185058 & - \\
 -131223697 & -131218895 & -4005403953 & - \\
 +74528343205 & +745152220310 & +741082810357 & +
 \end{array}$$

C A P O IV.

DELLE ESPRESSIONI ALGEBRAICHE DELLE RAGIONI,
PROPORZIONI, PROGRESSIONI, LOGARITMI EC.,
E LORO FORMOLE GENERALI.

A R T I C O L O I.

Delle ragioni, proporzioni, e progressioni.

746. IO qui suppongo la dottrina data nel I. Tomo circa le ragioni, proporzioni, e progressioni, e soltanto osservo brevissimamente alcune cose circa le loro espressioni algebriche, o sia accenno quali siano le loro formole generali. E primieramente quanto alle ragioni aritmetiche, quantunque una ragione aritmetica si possa esprimere generalmente con due lettere, così a, b , torna però più comodo far entrare nell'espressione generale l'esponente della ragione: Per lo che se si supponrà l'esponente di una ragione $=m$, e il minore di lei termine si dica $=a$, l'altro termine sarà $=m+a$, conseguentemente ella si rappresenterà così $a, m+a$: che se il maggiore si dirà $=a$, il minore sarà $a-m$. Per la stessa ragione una proporzione, che è il paragone di due ragioni uguali, si esprimerà in questo modo $a, m+a = d, m+d$. Se le due ragioni non faranno uguali, si indicheranno così $a, m+a, d, n+d$. Espreffe in questo modo le ragioni, e le proporzioni aritmetiche, si faranno sopra di esse le operazioni spiegate nel I. Tomo all' Art. III. del Capo III.

747. Quanto ho detto delle ragioni, e proporzioni aritmetiche, vale ancora per le ragioni, e proporzioni geometriche. Si può benissimo esprimere generalmente con due lettere una ragione geometrica così $a: b$, ma per altro torna meglio far entrare nell'espressione della ragione il di lei esponente; quindi è, che se quello esponente sarà $=m$, e il termine minore della ragione sia $=a$, il termine maggiore sarà $=am$, cioè essa sarà $a: am$; che se il termine maggiore sarà $=a$, il minore sarà $=\frac{a}{m}$: Per lo che $a: am$ esprimerà la ragione di minore inequality, ed $a: \frac{a}{m}$ la ragione di maggiore inequality. Siccome poi $a: am$ è uguale ad $1: m$, ed $a: \frac{a}{m}$ è uguale ad $1: \frac{1}{m}$; però la ragione di minore inequality si esprimerà generalmente così $1: m$, e la ragione di maggiore inequality così $1: \frac{1}{m}$.

748. Col tentare semplicemente diverse mutazioni, e combinazioni sulle precedenti espressioni ecumeniche delle ragioni, e proporzioni, si troveranno facilissima-

mente col nudo calcolo Algebrico i Teoremi, che io ho dimostrato agli Articoli III. IV. V. del Tomo I, lo che io lascio all'esercizio dello studioso.

749. Rispetto alla progressione Aritmetica si raccoglie da quanto ho detto circa l'espressione delle ragioni, e proporzioni aritmetiche, che se il di lei primo termine si denota $=a$, e l'esponente $=m$, la progressione ascendente si rappresenterà generalmente così

$$a. a+m. a+2m. a+3m. a+4m. a+5m. a+6m \text{ ec.}$$

e la discendente così

$$a. a-m. a-2m. a-3m. a-4m. a-5m. a-6m \text{ ec.}$$

e per esprimere nel tempo stesso l'una, e l'altra, sarà

$$a. a \pm m. a \pm 2m. a \pm 3m. a \pm 4m. a \pm 5m. a \pm 6m \text{ ec.}$$

750. Giusta il num. 1012. del I. Tomo la formola generale di un qualsivoglia termine di una progressione aritmetica, il di cui primo termine sia $=a$, l'esponente $=m$, il numero del termine cercato $=b$, e il termine cercato $=x$, sarà

$x = a \pm b-1 \times m$. Se la progressione è ascendente vale il segno superiore $+$, e in tal caso il termine x è il massimo; se è discendente vale l'inferiore $-$, e il termine x è il minimo. Mediante la stessa formola si troverà il minimo termine della progressione ascendente, che è $a = x - b+1 \times m$, e il massimo della progressione di-

scendente, che è $a = x + b-1 \times m$. Ciò poi si ottiene colla sola trasposizione de' termini, siccome colla medesima si potrà trovare l'esponente, essendo cognite le altre quantità, delle quali x esprime il massimo termine, a il minimo, b il numero de' termini così $\frac{x-a}{b-1} = m$, o pure si avrà il numero de' termini così $b = \frac{x-a+m}{m}$.

Stessamente col solo esponente, e numero de' termini si ottiene l'espressione della differenza, che passa tra il massimo, e il minimo termine così $x-a = b-1 \times m$.

751. Pel n. 1023. del I. Tom. essendo dato il massimo termine di una progressione $=x$, il minimo $=a$, e il numero de' termini $=b$, si ha la formula della progressione, che

chiamo $=s$, così $s = \frac{x+a}{2} \times b$, colla quale formola si può trovare il valore dell'

altre tre quantità x , a , b , così $x = \frac{2s-ab}{b}$; $a = \frac{2s-bx}{b}$; $b = \frac{2s}{x+a}$. Ora per

mezzo di queste due formole $x=a+b-1 \times m$, ed $s = \frac{x+a}{2} \times b$ si scioglie il seguente.

752. Problema. Dei cinque elementi di qualsivoglia progressione, che sono il minimo termine $=a$, il massimo $=x$, l'esponente $=m$, il numero dei termini $=b$, e la somma della progressione $=s$, essendone cogniti tre, si debba trovare ciascuno degli altri due.

753. Risol. Poichè del cinque detti elementi se ne suppongono dati tre, che possono essere quali si siano, essendo dieci le combinazioni, che nascono da cinque cose prese a tre a tre, dieci pure sono i casi, che ammette il presente problema; e siccome in ciascun caso si trovano due incognite, di ognuna delle quali deve determinarsi.

minare il valore, quindi è che il problema riceve venti soluzioni, delle quali quattro si vedano al num. 750, ed altre quattro al num. 751.. Nella seconda formola s'istituisce il valore di x preso dalla prima, e si avranno le seguenti quattro

$$s = \frac{2ab + b^2m - bm}{2}; a = \frac{2s - b^2m + bm}{2b}$$

$$b = \frac{1}{2} - \frac{a}{m} \pm \sqrt{\frac{a^2}{m^2} + \frac{2s - a}{m} + \frac{1}{4}}; m = \frac{2s - 2ab}{b \times b - 1}. \text{ Di nuovo nella seconda formola si sostituisce il valore di } a \text{ preso dalla prima formola, e si avranno le seguenti quattro soluzioni } s = \frac{2bx - b^2m + bm}{2}; x = \frac{2s + b^2m - bm}{2b};$$

$$b = +\frac{1}{2} + \frac{x}{m} \pm \sqrt{\frac{x^2}{m^2} - \frac{2s + x}{m} + \frac{1}{4}}; m = \frac{2bx - 2s}{b \times b - 1}. \text{ In terzo luogo si sostituisce nella seconda formola il valore di } b \text{ preso dalla prima, con che si avranno queste altre quattro soluzioni } s = \frac{x + a}{2} + \frac{x^2 - a^2}{2m};$$

$$x = -\frac{m}{2} \pm \sqrt{a^2 + 2s - a + \frac{m}{4}} \times m; m = \frac{x^2 - a^2}{2s - x - a};$$

$$a = \frac{1}{2} m \pm \sqrt{x^2 - 2s + x + \frac{m}{4}} \times m. \text{ Ed ecco trovate le venti cercate soluzioni, e quali se si disporranno secondo ciascun terno di elementi cogniti, si avrà}$$

Elementi cogniti

$$\text{I } \left. \begin{matrix} a \\ x \\ m \end{matrix} \right\} \quad \begin{aligned} b &= \frac{x - a + m}{m} \\ s &= \frac{x + a}{2} + \frac{x^2 - a^2}{2m} \end{aligned}$$

$$\text{II } \left. \begin{matrix} a \\ x \\ b \end{matrix} \right\} \quad \begin{aligned} m &= \frac{x - a}{b - 1} \\ s &= \frac{x + a}{2} \times b \end{aligned}$$

$$\text{III } \left. \begin{matrix} a \\ x \\ s \end{matrix} \right\} \quad \begin{aligned} b &= \frac{2s}{x + a} \\ m &= \frac{x^2 - a^2}{2s - x - a} \end{aligned}$$

$$\text{IV} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ m \\ b \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} x = a + \sqrt{b-1} \times m \\ s = \frac{2ab + b^2m - bm}{2} \end{array}$$

$$\text{V} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ m \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} b = \frac{1}{2} - \frac{a}{m} \pm \sqrt{\frac{a^2}{m^2} + \frac{2s-a}{m} + \frac{1}{4}} \\ x = -\frac{m}{2} \pm \sqrt{a^2 + 2s - a + \frac{m}{4}} \times m \end{array}$$

$$\text{VI} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ b \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} x = \frac{2s - ab}{b} \\ m = \frac{2s - 2ab}{b \times b - 1} \end{array}$$

$$\text{VII} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ m \\ b \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} a = a - \sqrt{b-1} \times m \\ s = \frac{2bx - b^2m + bm}{2} \end{array}$$

$$\text{VIII} \quad \left. \begin{array}{l} x \\ m \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} b = \frac{1}{2} + \frac{x}{m} \pm \sqrt{\frac{x^2}{m^2} - \frac{2s-x}{m} + \frac{1}{4}} \\ a = \frac{1}{2}m \pm \sqrt{x^2 - 2s + x + \frac{m}{4}} \times m \end{array}$$

$$\text{IX} \quad \left. \begin{array}{l} x \\ b \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} a = \frac{2s - bx}{b} \\ m = \frac{2bx - 2s}{b \times b - 1} \end{array}$$

$$\text{X} \quad \left. \begin{array}{l} m \\ b \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} a = \frac{2s - b^2m + bm}{2b} \\ x = \frac{2s + b^2m - bm}{2b} \end{array}$$

754. Basta riflettere a queste formole per osservare, che ad ogni elemento corrispondono quattro diversi valori.

755. Mediante la formola $m = \frac{x-a}{b-1}$ si possono trovare tra due date quantità, delle quali la maggiore si chiami $=x$, e la minore $=a$ un numero s di medie propor-

porzionali, poichè il numero de' continui proporzionali in tal caso sarà $t+2$, il qual valore sostituito nella formola in luogo di b , la cambierà nella seguente $m = \frac{x-a}{t+1}$, che è l'esponente, che devono avere questi continui proporzionali. Quindi è, che avendosi il primo x , e l'esponente m , si troveranno immediatamente anche gli altri.

756. L'espressione delle ragioni, e proporzioni geometriche data al num. 747. fa vedere, che se il primo termine di una progressione geometrica sarà $=a$, e l'esponente $=m$, la progressione ascendente dovrà essere $a. am. am^2. am^3. am^4. am^5$ ec., e la discendente $a. \frac{a}{m}. \frac{a}{m^2}. \frac{a}{m^3}. \frac{a}{m^4}. \frac{a}{m^5}$ ec., quantunque per la progressione discendente si può ritenere ancora la prima $a. am. am^2. am^3. am^4$, nel qual caso la lettera m è uguale ad una frazione.

757. Dato il numero b di un cercato termine x della progressione, dato il primo termine a , e dato l'esponente m , si ha (pel num. 1052. del I. Tomo) $x = am^{b-1}$, mediante la quale formola colla sola trasposizione de' termini si ricava $a = \frac{x}{m^{b-1}}$, ed $m = \sqrt[b-1]{\frac{x}{a}}$. Si può ancora ottenere il valore di b , ma ciò dipende dall'espressione logaritmica, di cui parlerò nel seguente Articolo; ciò non

ostante dal num. 1202. del I. Tomo costa, che l'espressione $\frac{x}{a} = m^{b-1}$ è uguale alla seguente (questa espressione L vuol dire logaritmo) L di $x - L$ di $a = \sqrt[b-1]{X}$

L di m , quindi $\frac{L. x - L. a}{L. m} = b-1$, e finalmente $b = \frac{L. x - L. a}{L. m} + 1$.

758. Pel num. poi 1067. del I. Tomo si ha la formola generale esprimente la somma s della progressione, così $s = \frac{am^b - a}{m-1}$, da cui ricavasi $a = \frac{ms - s}{m^b - 1}$;

$b = \frac{L. \frac{ms - s}{m-1} \times \frac{m-1}{L. m} - L. a}{L. m}$; e questa equazione $b = \frac{L. ms - s + a - L. a}{L. m}$ si ricava da

$s = \frac{am^b - a}{m-1}$, che è $\frac{ms - s + a}{a} = m^b$, e passando al logaritmi si ha $L. \frac{ms - s + a}{a}$

$- L. a = b. L. m$, conseguentemente $b = \frac{L. ms - s + a - L. a}{L. m}$; e il valore di m , che si ha

da questa equazione $m^b - \frac{ms}{a} + \frac{s}{a} - 1 = 0$, dedotta dalla stessa $s = \frac{am^b - a}{m-1}$.

759. Non meno nelle progressioni aritmetiche, che nelle geometriche concorrono cinque elementi, cioè il primo termine, che chiamerò $=a$, il massimo $=x$, il numero de' termini $=b$, l'esponente $=m$, e la somma della progressione $=s$. Di questi cinque elementi essendone cogniti tre quali si siano, se ne trovano gli altri due, e siccome dieci sono i terni, che risultano dalla combinazione di cinque cose a tre a tre, dieci perciò sono i casi, che riceve il seguente

760. Prob. Dei cinque elementi già detti essendone cogniti tre si debbano trovare gli altri due.

761. Rifol. Poichè questi cinque elementi si possono combinare dieci volte a tre a tre, e da ognuna di queste combinazioni si ricava il valore di due incognite, quindi è, che questo Problema ammette venti soluzioni. Quattro se ne sono trovate al num. 757, altre quattro al num. 758, ed ora ritroveremo le rimanenti dodici per mezzo delle due formole I. $x = am^{b-1}$; II. $s = \frac{am^b - a}{m-1}$. In questa seconda formola si sostituisca il valore di a preso dalla prima, ed essa si cambierà nella seguente $s = \frac{m^b x - x}{m-1 \times m^{b-1}}$, da cui si ricava $x = \frac{m-1 \times m^{b-1}}{m^b - 1} s$; l'equazione $m^b - \frac{s}{s-x} m^{b-1} + \frac{x}{s-x} = 0$, che dà il valore di m ;

e $b = \frac{l.x + l.m - l.\overline{mx+s-ms}}{l.m}$, che si ricava da $s = \frac{m^b x - x}{m-1 \times m^{b-1}}$, che è

$\overline{ms-1} \times m^{b-1} = m^b x - x$, o sia $\overline{ms-1} \times m^{b-1} = m \times m^{b-1} - x$, e però $\overline{mx+s-ms} \times m^{b-1} = x$; quindi $m^{b-1} = \frac{x}{mx+s-ms}$, e passando ai logaritmi

$\overline{b-1} \times l.m = l.x - l.\overline{mx+s-ms}$, e $b-1 = \frac{l.x - l.\overline{mx+s-ms}}{l.m}$, e finalmente

$b = \frac{l.x - l.\overline{mx+s-ms}}{l.m} + 1$, o sia $b = \frac{l.x - l.\overline{mx+s-ms} + l.m}{l.m}$. Parimente col sostituire nella formola II il valore di m preso dalla I si ottengono altre quattro for-

mole, cioè $s = x \frac{\sqrt[b-1]{\frac{x}{a}} - a}{\sqrt[b-1]{\frac{x}{a}} - 1}$, da cui si ricava $x \times \frac{\overline{b-1}}{s-x} = a \times \frac{\overline{b-1}}{s-a}$, colla

quale equazione si ottiene tanto il valore di x , come il valore di a ; in oltre si ha il valore di b , che è $b = \frac{l.x - l.a + l.\overline{s-a} - l.\overline{s-x}}{l.\overline{s-a} - l.\overline{s-x}}$, e questo si ricavà da

$x \times \frac{\overline{b-1}}{s-x} = a \times \frac{\overline{b-1}}{s-a}$, che è $\frac{x}{a} = \left(\frac{s-a}{s-x} \right)^{b-1}$, e passando ai logaritmi

si ha $l.x - l.a = \overline{b-1} \times \frac{l.\overline{s-a} - l.\overline{s-x}}{l.\overline{s-a} - l.\overline{s-x}}$, onde $b-1 = \frac{l.x - l.a}{l.\overline{s-a} - l.\overline{s-x}}$, e final-

mente $b = \frac{l.x - l.a}{l.\overline{s-a} - l.\overline{s-x}} + 1$, o sia $b = \frac{l.x - l.a + l.\overline{s-a} - l.\overline{s-x}}{l.\overline{s-a} - l.\overline{s-x}}$.

Final.

Finalmente si sostituisca nella formola II il valore di b preso dalla formola I, e si avranno le rimanenti quattro formole, cioè

$$s = a \times \frac{\frac{l \cdot x - l \cdot a}{l \cdot m} + 1}{m-1} - 1, \text{ da cui si ricava}$$

$$a = \frac{s \times \frac{m-1}{l \cdot x - l \cdot a}}{\frac{l \cdot x - l \cdot a}{l \cdot m} + 1}; \quad x = \frac{ms-s+a}{m}; \quad m = \frac{s-a}{s-x}$$

Questa penultima equazione poi $x = \frac{ms-s+a}{m}$ si ricava da $a = \frac{\frac{ms-s}{l \cdot x - l \cdot a + l \cdot m}}{\frac{l \cdot x - l \cdot a + l \cdot m}{l \cdot m} - 1}$

che è $am - a = ms - s$, e però $m = \frac{ms-s+a}{a}$,

e passando ai logaritmi si ha $\frac{l \cdot x - l \cdot a + l \cdot m}{l \cdot m} = \frac{ms-s+a}{l \cdot m} - l \cdot a$, o sia

$l \cdot x - l \cdot a + l \cdot m = l \cdot \frac{ms-s+a}{m} - l \cdot a$, e dai logaritmi passando ai numeri ne viene $\frac{mx}{a} = \frac{ms-s+a}{a}$, e però $x = \frac{ms-s+a}{m}$, da cui poscia si ottiene l'ultima equazione $m = \frac{s-a}{s-x}$.

762. Se queste ritrovate formole si disporranno secondo ciascun terno di elementi cogniti, si avrà

Elementi cogniti

$$\left. \begin{array}{l} a \\ x \\ m \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} b = \frac{l \cdot x - l \cdot a + l \cdot m}{l \cdot m} \\ s = \frac{am}{m-1} \end{array}$$

$$\text{II} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ x \\ b \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} m = \frac{\sqrt[1]{\frac{x}{a}}}{\sqrt[1]{\frac{x}{a}} - a} \\ s = \frac{\sqrt[1]{\frac{x}{a}}}{\sqrt[1]{\frac{x}{a}} - 1} \end{array}$$

$$\text{III} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ x \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} b = \frac{l, x - l, a + l, \sqrt[1]{\frac{x}{a}} - l, \sqrt[1]{\frac{x}{a}}}{l, \sqrt[1]{\frac{x}{a}} - l, \sqrt[1]{\frac{x}{a}} - x} \\ m = \frac{s - a}{s - x} \end{array}$$

$$\text{IV} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ m \\ b \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} x = \frac{am^{b-1}}{am^b - a} \\ s = \frac{m-1}{m-1} \end{array}$$

$$\text{V} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ m \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} b = \frac{\sqrt[1]{\frac{l, m-1}{l, m}} \sqrt[1]{\frac{s+a-l, a}{l, m}}}{\sqrt[1]{\frac{l, m-1}{l, m}}} \\ x = \frac{ms - s + a}{m} \end{array}$$

$$\text{VI} \quad \left. \begin{array}{l} a \\ b \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} mb - \frac{ms}{a} + \frac{s}{a} - 1 = 0, \text{dalla quale equaz. si ha il valore di } m \\ x = \sqrt[1]{\frac{s-a}{s-x}^{b-1}} = a \sqrt[1]{\frac{s-a}{s-x}^{b-1}} \text{dalla quale eq. si ha il val. di } x \end{array}$$

$$\text{VII} \quad \left. \begin{array}{l} x \\ m \\ b \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} a = \frac{x}{m^{b-1}} \\ s = \frac{mb \, x - x}{m-1 \sqrt[1]{\frac{x}{m}^{b-1}}} \end{array}$$

$$\text{VIII} \quad \left. \begin{array}{l} x \\ m \\ s \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} b = \frac{l, x + l, m - l, m \, x + s - ms}{l, m} \\ a = \frac{s \sqrt[1]{\frac{x}{m-1}}}{l, x - l, a + l, m} \\ m \quad \quad \quad -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{IX} & \left. \begin{array}{l} x \\ b \\ s \end{array} \right\} & m^b - \frac{s}{s-x} m^{b-1} + \frac{x}{s-x} = 0, \text{dalla quale eq. si ha il valore di } m \\
 & & x \times \frac{1}{s-x} = a \times \frac{1}{s-a}, \text{dalla quale eq. si ha il val. di } a \\
 \\
 \text{X} & \left. \begin{array}{l} m \\ b \\ s \end{array} \right\} & a = \frac{ms - s}{m^b - 1} \\
 & & x = \frac{ms - s}{m^b - 1} \times m^{b-1}
 \end{array}$$

763. Si offervi in primo luogo, che nelle precedenti formole 1, 2, 5, 9, 15, 16 ho avuto in vista i logaritmi comuni, ne quali si dà il zero per logaritmo all'unità, e perciò vi ho ommessa l'espressione logaritmica dell'unità: in secondo luogo, che per ogni elemento si sono trovati quattro diversi valori.

764. Nella progressione geometrica generale a, am, am^2, am^3, am^4 ec. si può osservare, che se l'esponente m è positivo, tutti i termini della progressione saranno positivi, o negativi, secondo che la quantità a sarà positiva, o negativa, ma se l'esponente m sarà negativo, perchè tutte le potestà pari di una quantità negativa sono positive, comunque sia il segno, da cui è affetta la quantità a , ne' termini della progressione alterneranno i segni. In questo caso per avere la somma della progressione bisogna concepirla risultante da due progressioni, delle quali una sia formata dai termini positivi, e l'altra dai termini negativi, indi trovare la somma dell'una, e dell'altra, e la differenza di queste somme darà la somma della progressione proposta, la quale sarà affetta dal segno dell'ultimo termine se la progressione è ascendente, e se è discendente, dal segno del primo. Ognuno poi può accorgersi, che l'esponente di ciascuna di queste due progressioni dovrà essere m^2 , perchè tra i termini di una cadendo i termini dell'altra, nel qual caso l'esponente è m , se si ometteranno i termini di mezzo l'esponente dovrà essere m^2 (pel num. 754 del I. Tomo).

765. Mediante la formola $m = \sqrt[b-1]{\frac{x}{a}}$ si ha la maniera di trovare quanti medj proporzionali si vogliono tra due quantità date. Il numero de' medj cercati sia $= t$, le due quantità date siano a, x , dunque il numero di tutti i termini sarà $t+2$: Quindi se nella formola $m = \sqrt[b-1]{\frac{x}{a}}$ si sostituirà $t+2$ in luogo di b , essa si cambierà nella seguente $m = \sqrt[t+1]{\frac{x}{a}}$, colla quale si ha il valore dell'esponente, e però si possono trovare i medj cercati (pel num. 1046 del I. Tomo). Si possono ancora dare le formole generali per ciascun numero di medj proporzionali, come si può vedere nella seguente Tavola, in cui i numeri romani denotano il numero de' medj proporzionali, che si prendono tra a, x .

I	$a.$	$\sqrt{a} x.$	x	
II	$a.$	$\sqrt[3]{a^3 x}.$	$\sqrt[3]{a x^3}.$	$x.$
III	$a.$	$\sqrt[4]{a^4 x}.$	$\sqrt[4]{a^3 x^3}.$	$\sqrt[4]{a x^4}.$ $x.$
IV	$a.$	$\sqrt[5]{a^5 x}.$	$\sqrt[5]{a^4 x^4}.$	$\sqrt[5]{a^3 x^3}.$ $\sqrt[5]{a^2 x^2}.$ $\sqrt[5]{a x^5}.$ $x.$
V	$a.$	$\sqrt[6]{a^6 x}.$	$\sqrt[6]{a^5 x^5}.$	$\sqrt[6]{a^4 x^4}.$ $\sqrt[6]{a^3 x^3}.$ $\sqrt[6]{a^2 x^2}.$ $\sqrt[6]{a x^6}.$ $x.$ ec.

Queste formole si possono continuare a piacere. In ciascuna serie dal primo medio proporzionale si generano tutti gli altri, come si può vedere in questa progressione

$a. x. \frac{x^2}{a} . \frac{x^3}{a^2} . \frac{x^4}{a^3} . \frac{x^5}{a^4}$ ec, in cui x è il primo medio, il quale alzato al quadrato,

to, e diviso pel primo termine a , genera il secondo medio $\frac{x^2}{a}$, e questo alzato al

quadrato, e diviso pel precedente termine x , genera il terzo $\frac{x^3}{a^2}$ ec. L' invenzione

poi del primo medio nelle proposte formole si ricava dal num. 1060. del I. Tomo, poichè essendo a, x le due quantità date, e y il primo de' medj proporzionali da trovarsi, de' quali il numero sia n , si avrà $a^{n+1} : y^{n+1} :: a : x$, da cui si ricava

$a^{n+1} x = a y^{n+1}$, cioè $a^n x = y^{n+1}$, conseguentemente $y = \sqrt[n+1]{a^n x}$; quindi il secondo sarà $\sqrt[n+1]{a^{n-1} x^2}$; il terzo $\sqrt[n+1]{a^{n-2} x^3}$; il quarto $\sqrt[n+1]{a^{n-3} x^4}$ ec.

A R T I C O L O II.

Delle espressioni logarithiche, e delle equazioni esponenziali.

766. **I**N qualsivoglia sistema di logarithmi quel numero, il di cui logarithmo è l'unità, chiamasi base logarithmica: Così nei logarithmi volgari la base logarithmica è il 10, a cui corrisponde l'unità per logarithmo. Supposto pertanto, che la lettera a rappresenti la base logarithmica, e y esprima un numero qualunque indeterminato, sarà $a^x = y$ l'equazione fondamentale. In questa equazione l'esponente indeterminato x della base logarithmica si chiama il logarithmo del numero y . Col determinarfi il valore di x resta ancora determinato il valore di y , poichè se si farà $x=0$, sarà $y=a^0$, e perchè $a^0=1$, sarà $y=1$: Facendosi $x=1$, sarà $y=a$, se $x=2$, sarà $y=a^2$; se $x=3$, si avrà $y=a^3$; se $x=-1$, sarà $y=a^{-1}$, cioè $y=\frac{1}{a}$; se $x=-2$, sarà $y=\frac{1}{a^2}$ ec.

767. Per esprimere un logarithmo di qualunque sistema egli sia si suole usare la lettera L come si è detto al num. 757, la quale non avendo per se stessa alcuna determinazione, non gli dà perciò alcun certo, e determinato valore: Onde volendosi esprimere il logarithmo di a , si fa-

Si farà $L. a$, per esprimere il logaritmo di $ab+ac$, si farà $L. \overline{ab+ac}$; così per dinotare il logaritmo di $\frac{a}{c}$, si farà $L. \frac{a}{c}$.

758. Quantunque nell'esposta maniera si possa sempre indicare il logaritmo di una data quantità, torna però sovente più comodo, ritenendo l'uso della stessa lettera L , prevalersi di certe trasformazioni, che dalle proprietà de' logaritmi ci vengono somministrate. In tre casi possono aver luogo queste trasformazioni: Il primo quando la quantità, di cui si vuole il logaritmo, nasce dalla moltiplicazione di diverse quantità, o pure di una sola più volte in se stessa, cioè a dire quando tale quantità è un prodotto, ovvero una potenza. Il secondo quando la detta quantità è una frazione: Il terzo quando è un radicale. Scorriamo ad uno ad uno questi casi, e mettiamo sotto gli occhi le convenienti espressioni logaritmiche per qualunque sistema di logaritmi.

759. Quanto al primo caso debbasi indicare il logaritmo di una quantità di due dimensioni, come farebbe ab . Ciò si può ottenere facendo $L. ab$; ma se si rifletterà, che (pel num. 495. del I. Tomo) essendo $1:a::b:ab$, la quantità data perciò è $\frac{ab}{1}$, e che (pel num. 1185. del I. Tomo) il logaritmo, che compete a un

prodotto è uguale alla somma dei logaritmi dei di lui fattori; il logaritmo poi (pel num. 1191. del I. Tomo) che conviene ad una frazione è uguale alla differenza, che nasce dal sottrarsi il logaritmo del denominatore dal logaritmo del numeratore, si intenderà benissimo, che l'espressione $L. \frac{ab}{1}$ è uguale alla se-

guente $L.a+L.b-L.1$. Per la stessa ragione il logaritmo di abc è $L.a+L.b+L.c-2L.1$, e il logaritmo di $abcd$ è $L.a+L.b+L.c+L.d-3L.1$. Così il logaritmo di $ab-ac$ è

$L.a+L.\overline{b-c}-L.1$ ec. Le dimostrazioni di queste ultime operazioni sono troppo evidenti, onde non v'abbia bisogno di esporle. Generalmente pertanto il logaritmo di una quantità di quante dimensioni si vogliono sarà sempre uguale alla somma dei logaritmi dei di lei fattori diminuita del logaritmo dell'unità preso tante volte, quante sono le dimensioni della proposta quantità una meno.

770. Da ciò, che poc'anzi ho detto circa il modo di indicare il logaritmo di un prodotto, si può abbastanza capire come debbasi esprimere il logaritmo di una potenza: Debba per Esempio esprimere il logaritmo di a^3 : non solo si potrà fare così $L.a^3$, ma si farà eziandio così $2L.a-L.1$, perchè essendo $1:a::a:a^3$, farà

$$a^3 = \frac{a^3}{1} = \frac{a \times a \times a}{1}; \text{ ma (pel num. 726.) } L. \frac{a \times a \times a}{1} = L.a+L.a+L.a-L.1, \text{ cioè } 2L.a-L.1.$$

Stessamente il logaritmo di a^4 è $3L.a-2L.1$; il logaritmo di a^5 è $4L.a-3L.1$, e generalmente il logaritmo di a^m è $mL.a-mL.1+L.1$. Così il logaritmo di $\overline{ac-c^2}$ è $mL.a-c-c-mL.1$

+ $L.1$, cioè (pel num. 769.) $m \times L.a-c+L.c-mL.1+L.1$. Questo modo di esprimere i logaritmi costa ancora dal num. 1198. del I. Tomo. Se la potenza sarà negativa, come se fosse a^{-m} , il suo logaritmo sarà $-mL.a+mL.1+L.1$; imperocchè

essendo $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$, che si risolve in $a^m:1::1:\frac{1}{a^m}$, il logaritmo di $\frac{1}{a^m}$ sarà $L.1+L.1-L.a^m$; ma si è veduto, che $L.a^m = mL.a-mL.1+L.1$, dunque farà $L.a^{-m} = L.1+L.1-mL.a+mL.1-L.1 = -mL.a+mL.1+L.1$.

771. Rispetto alle frazioni il modo di operare si deduce dal num. 1191. del I. Tomo. Debbaſi eſprimere il logaritmo della frazione $\frac{a}{c}$, poichè eſſa è $= 1 \times \frac{a}{c}$, mentre ſi ha $c : a :: 1 : \frac{a}{c}$, però il logaritmo di $\frac{a}{c}$ ſi eſprimerà non ſolo coſì $l.\frac{a}{c}$, ma più comodamente coſì $l.a + l.1 - l.c$; coſì il logaritmo di $\frac{b}{ac}$ farà $l.b + l.1 - l.ac$; ma $l.b = 3l.b - 2l.1$, e $l.ac = l.a + l.c - l.1$. quindi $l.\frac{b}{ac} = 3l.b - l.a - l.c$: Iſteſſamente il logaritmo $\frac{ac^m}{ex}$ è $ml.c + l.a - nl.x - l.e + n - ml.1$.

772. Reſta a diſcorrere del terzo caſo, in cui trattaſi del logaritmo di una quantità radicale. Debbaſi eſprimere il logaritmo di $\sqrt[n]{a}$. Poichè ſi ha $1 : \sqrt[n]{a} :: \sqrt[n]{a} : a$, ben ſi vede, che $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \times 1}$; ma (pel num. 1202 del I. Tomo il logaritmo, che compete ad una quantità radicale non è altro, che la parte del logaritmo della quantità eſiſtente ſotto al vincolo denominata dall'eſponente del vincolo, però il logaritmo di $\sqrt[n]{a}$ farà non ſolo $l.\sqrt[n]{a}$, ma ancora $\frac{l.a + l.1}{n}$; il logaritmo di $\sqrt[n]{a}$ farà $\frac{l.a + 2l.1}{3}$, e generalmente il logaritmo di $\sqrt[n]{a}$ farà $\frac{l.a + ml.1 - l.1}{m}$. Se ſi dovrà

eſprimere il logaritmo di una poteſtà imperfetta, ma negativa, come di $a^{-\frac{1}{m}}$, ſi farà $-\frac{l.a + l.1 + ml.1}{m}$, perchè $a^{-\frac{1}{m}} = \frac{1}{\sqrt[m]{a}}$, che ſi riſolve in $\sqrt[m]{a} : 1 :: 1 :$

$\frac{1}{\sqrt[m]{a}}$; quindi $l.\frac{1}{\sqrt[m]{a}} = l.1 + l.1 - l.\sqrt[m]{a}$; ma $l.\sqrt[m]{a} = \frac{l.a + ml.1 - l.1}{m}$, dun-

que $l.\frac{1}{\sqrt[m]{a}} = l.1 + l.1 - \frac{l.a - ml.1 + l.1}{m}$, cioè col farſi la riduzione allo ſteſſo denominatore ſi ha $-\frac{l.a + ml.1 + l.1}{m} = l.a^{-\frac{1}{m}}$

773. Finora ho dato le eſpreſſioni logaritmiche per qualunque ſiſtema di logaritmi, ma ſe ſi vorranno uſare ſoltanto i logaritmi volgari, ne' quali per logaritmo all'unità corriſponde il zero, riuſciranno aſſai più ſpedite, e brevi le eſpreſſioni logaritmiche con ommetterſi tutti i logaritmi dell'unità, mentre per quante volte ſi prenda il zero, torna ſempre zero. Io qui foggiungerò le precedenti formole pei logaritmi volgari.

$$l.ab = l.a + l.b; l.abdx = l.a + l.b + l.d + l.n; l.a^m = m.l.a; l.\overline{a+b} = m.l.\overline{a+b};$$

$$l.\frac{ad-bc}{ad-bc} = -m.l.a + m.l.\overline{d-c}; l.\frac{b}{a} = l.b - l.a;$$

$$l.\left(\frac{ab^2+b^2d}{c^3}\right) = 2.l.b + l.\overline{a+d} - 3.l.c; l.\sqrt[3]{ax-bd} = \frac{1}{3}.l.\overline{ax-bd};$$

$$l.\overline{ac+cy} - \frac{1}{m} = -\frac{1}{m}.l.\overline{ac+cy}.$$

774. Prima di passare avanti sembrami opportuno di sciogliere una difficoltà circa i logaritmi delle quantità negative, se siano cioè reali, e quali siano. A rispondere pertanto con tutta brevità, e chiarezza io osservo (giusta il num. 20.), che le quantità negative in niente altro differiscono dalle positive, se non se, che si prendono in senso contrario, e che i logaritmi non riguardano le relazioni, o opposizioni, che possono avere fra se le quantità, ma soltanto riguardano le quantità in se stesse, onde è, che tanto di una quantità positiva, come di una negativa uguale, il logaritmo deve essere lo stesso. Il modo poi di regolarli in caso, che si tratti di una formola risultante da quantità positive, e negative, quale farebbe

$a^m \cdot b^{\frac{cd}{e}}$ è questo: Si faccia $a^m \cdot b^{\frac{cd}{e}} = m$, $\frac{cd}{e} = n$, i di cui logaritmi faranno $l.m = 2.l.a + l.b$, e $l.n = l.c + l.d - l.e$. Mediante questi logaritmi si trovi tanto l'm, quanto l'n, indi si prenda $m-n$, e si avrà quello che si cercava.

775. Veniamo adesso alle formole, che servono per evitare i logaritmi negativi. Il Complemento logaritmico di un numero P farà (pel num. 1245 del I. Tomo) C. L. P = 10 - l. P, da cui si ricava l. P = 10 - C. L. P. Il logaritmo arbitrario di P (pel num. 1250 del I. Tomo) è L. A. P = 10 + l. P, da cui si ricava l. P = L. A. P - 10.

Il logaritmo arbitrario di una frazione, che abbia l'unità per numeratore, come $\frac{1}{P}$ è (pel num. 1255 del I. Tomo) L. A. $\frac{1}{P}$ = C. L. P. Il logaritmo arbitrario di una

qualunque potenza di un dato numero, come per Esempio di P^m è L. A. P^m = 10 - 10m + m.L. A. P, poichè (pel num. 1250 del I. Tomo) è L. A. P^m = 10 + l. P^m , cioè = 10 + m.l. P; ora in luogo di l. P sostituendo il suo valore preso dalla formola l. P = L. A. P - 10, si avrà L. A. P^m = 10 - 10m + L. A. P: Quindi se la potenza sarà im-

perfetta, come P^m , il suo logaritmo arbitrario sarà L. A. P^m = 10 - $\frac{10}{m}$ + $\frac{1}{m}$ L. A. P = $\frac{10m-10+L.A.P}{m}$ mediante la riduzione allo stesso denominatore. Queste sono

le formole, che possono bastare per evitare i logaritmi negativi. Veniamo intanto alle equazioni esponenziali.

776. Quantità esponenziale è quella, che trovasi inalzata ad una potenza, il di cui esponente è una quantità incognita, o sia indeterminata.

777. Varj sono gli ordini delle quantità esponenziali. Quando l'esponente è una
Tom. II. P p sem-

semplice quantità indeterminata, la quantità a tale potenza innalzata dicesi esponenziale del primo ordine, come a' : Si dice del secondo ordine, quando l'esponente della proposta quantità è egli stesso un'esponenziale del primo ordine, come $a^{a'}$. Sarà del terzo ordine così $a^{a^{a'}}$. La quantità elevata alla potenza d'esponente indeterminato può essere una quantità cognita, e può essere ancora una quantità incognita. Per ora io considererò solamente le quantità cognite elevate ad una potenza a' esponente indeterminato, come $a^{a'}$.

778. Equazioni esponenziali sono quelle, in cui entrano quantità esponenziali, e però tutte le quantità, dalle quali risultano queste equazioni, sono cognite, a riserva degli esponenti, che sono incogniti. Il modo pertanto di risolvere queste equazioni consiste in saper trovare il valore di tali esponenti indeterminati. Ora ciò si ottiene mediante i logaritmi, poichè quando due quantità sono uguali, uguali sono pure i loro logaritmi, onde è, che dai numeri esibiti da tali quantità si può passare ai logaritmi, e in tal caso mediante le trasformazioni logaritmiche indicate al numero 773, si può ottenere il valore dell'esponente indeterminato, come si può vedere eseguito nelle formole 1., 5., 9., 16., delle quali mi contenterò rimettendovi il lettore, a fine di non perdere il tempo in nuovi Esempi. Soltanto soggiungerò un Problema dipendente da queste equazioni, acciò colla pratica ognuno veda come debba regolati al bisogno.

779. Prob. Cercasi in quanti anni una data somma $=a$ di denaro acquisterà un proposto aumento b , coll'aggiungerli sempre al capitale $=a$ il frutto di ciascun anno.

780. Risol. Il tempo cercato sia $=x$; il numero arbitrario, come 100, su cui si regola il frutto sia $=m$. Il frutto, che su questo numero si ricava, sia $=n$. Il frutto, che rende il Capitale a dopo il primo anno, sarà $\frac{an}{m}$, perchè come sta $m:n$, così sta il capitale a al frutto, che rende in un anno. Siccome poi questo frutto si deve continuamente convertire nel capitale, però nel principio del secondo anno il capitale farà $a + \frac{an}{m}$: Onde facendo come $a:\frac{an}{m}$, così $a + \frac{an}{m}:\frac{an}{m}$ al quarto proporzionale, si avrà

$$\frac{\frac{an}{m} \times a + \frac{an}{m}}{a} = a \times \frac{\frac{mn+n^2}{m^2}}, \text{ e questo è il frutto, che rende il capitale } a + \frac{an}{m}$$

nel secondo anno. A questo frutto pertanto $a \times \frac{\frac{mn+n^2}{m^2}}$ si aggiunga $a + \frac{an}{m}$ capi-

$$\text{tale del secondo anno, e si avrà } a + \frac{an}{m} + a \times \frac{\frac{mn+n^2}{m^2}}{m} = a \times \frac{m^2+2mn+n^2}{m^2}$$

$$= a \times \frac{\frac{m+n}{m^2}}, \text{ che è il capitale nel principio del terzo anno. Si faccia di nuo-}$$

vo come $n : \frac{an}{m}$, così questo capitale $a \times \frac{m+n^2}{m^2}$ al quarto proporzionale, e si

avrà $\frac{\frac{an}{m} \times a \times \frac{m+n^2}{m^2}}{a} = an \times \frac{m+n^2}{m^3}$, che è il frutto corrispondente al capi-

itale del terzo anno. A questo frutto si aggiunga il capitale del terzo anno, e si avrà il capitale nel principio del quarto anno, che trovasi essere

$$a \times \frac{m+n^2}{m^2} + an \times \frac{m+n^2}{m^3} = \frac{am + an}{m^3} \times \frac{m+n^2}{m^2} = a \times \frac{m+n^2}{m^3} \times \frac{m+n^2}{m^2}$$

$= a \times \frac{m+n^2}{m^3}$. Nella stessa maniera continuando il calcolo si troverà, che nel

principio del quinto anno il Capitale sarà $a \times \frac{m+n^4}{m^4}$: nel principio del sesto

anno sarà $a \times \frac{m+n^5}{m^5}$ ec. Quindi allora che sarà passato un numero d'anni $= x$

il capitale sarà $a \times \frac{m+n^x}{m^x}$. Ma per la condizione proposta nel problema, l'au-

mento, che deve subire il Capitale dopo un numero d'anni $= x$, è $= b$, dunque al termine di x anni il capitale sarà $= a+b$, che pur ora si è trovato $=$

$a \times \frac{m+n^x}{m^x}$; che però si ha l'equazione $a \times \frac{m+n^x}{m^x} = a+b$, o sia

$a \times \frac{m+n^x}{m^x} = a+b \times \frac{m^x}{m^x}$, in cui la quantità incognita tiene luogo di esponente. Devesi dunque ritrovare il valore di questo esponente x , per ottenere il quale è mestiere aver ricorso ai logaritmi. Si faccia per tanto uso della trasformazione spiegata al num. 770, e si avrà $x \cdot l. m + a + l. a = x \cdot l. m + l. a + b$ (ommetto le espressioni logaritmiche dell'unità, perchè intendo servirmi dei logaritmi volgari), cioè

$$x \cdot l. m + a - x \cdot l. m = l. a + b - l. a, \text{ o sia } x \cdot l. m + a - l. m = l. a + b - l. a,$$

conseguentemente $x = \frac{l. a + b - l. a}{l. m + a - l. m}$. Si avrà adunque il cercato numero degli

anni con dividere il logaritmo di $a+b$ diminuito del logaritmo di a pel logaritmo di $m+n$ diminuito del logaritmo di m .

781. Per ridurre la soluzione generale di questo problema a qualche caso particolare. Sia il capitale $a = 600000$ lire: L'aumento b , che dopo un numero x di anni deve acquittare questo capitale sia 94575 lire. Sia il numero arbitrario $m = 100$, il frutto n , che si regola su questo numero 100, sia $= 5$. Fatta la sostitu-

zione di queſti valori ſi avrà $x = \frac{L.624575 - L.600000}{L.105 - L.100}$, e facendo l' uſo attuale

de' logarithmi ſi avrà $x = \frac{5.841720 - 5.778151}{2.021189 - 2.000000} = \frac{0.063569}{0.021189} = 3$, e però il cercato numero degli anni è 3, dopo i quali mediante la converſione del frutto in capitale ſi troverà, che col capitale di lire 600000 ſi ſono acquiſtate lire 94575.

782. Può ſuccedere, che per poterſi acquiſtare col capitale a il propoſto aumento b non baſti un numero completo d'anni, ma vi ſi richiegga in oltre una por-

zione dell'anno ſuſſeguento, nel qual caſo il valore di $\frac{L.a+b-L.a}{L.m+n-L.m}$ farà una fra-

zione impropria. Per determinare queſta porzione d'anno ſi potrebbe chiamare in ſuſſidio una nuova formola da ritrovarſi col calcolo: più ſpeditamente però ſi regoli nel ſeguento modo. Si faccia l'attual diviſione di $L.a+b-L.a$ per $L.m+n-L.m$, di cui il quoziente ſia A , ed il reſiduo ſia B ; indi ſ'iſtituiſca queſta analogia

$A \times \frac{L.m+n-L.m}{L.m+n-L.m} : B :: A : a$ al quarto, che farà $\frac{B}{L.m+n-L.m}$, e perchè un

anno è compoſto di dodici meſi, però la formola, che dà il numero de' meſi, che oltre gli anni trovati ſi richiedono pel cercato aumento è $\frac{12B}{L.m+n-L.m}$. Se que-

ſta diviſione non ſi fa eſattamente, egli è ſeguo, che oltre i Meſi vi vogliono ancora de' giorni, per trovare i quali la formola farà $\frac{30Q}{L.m+n-L.m}$, perchè 30

giorni fanno un Meſe (ſuppoſto che ſia Q il reſiduo, che riſulta dopo eſſerſi fatta la diviſione di $12B$ per $L.m+n-L.m$). Se nella frazione $\frac{12B}{L.m+n-L.m}$ il deno-

minatore foſſe maggiore del numeratore, onde non ſi poteſſe fare la diviſione, in tal caſo la porzione del ſeguento anno non ſarebbe di Meſi, ma ſoltanto di giorni,

e la formola, che ſomminiſtrerebbe queſti giorni farebbe $\frac{365B}{L.m+n-L.m}$, perchè

l'anno coſta di 365 giorni. Ma queſte coſe ſono per ſe ſteſſe troppo evidenti; e quindi affatto ſuperfluo il farne l'applicazione.

783. Nella formola trovata $a \times \frac{m+n}{m^x} = a+b$ l'incognita era l'eſponente x :

Potrebbe per altro darſi, che l'incognita foſſe qualunque dell'altre quantità a , b , m , n . Soggiungerò pertanto le formole dei loro valori

$a =$

$$a = \frac{bm^x}{m+n^x - m^x}$$

$$b = a \times \frac{m+n^x}{m^x} - a$$

$$m = \frac{n}{\sqrt[x]{\frac{a+b}{a}} - 1}$$

perchè $a \times \frac{m+n^x}{m^x} = am^x + bm^x$, da cui si ricava $\frac{m+n^x}{m^x} = \frac{a+b}{a}$, quindi

$$\frac{m+n}{m} = \sqrt[x]{\frac{a+b}{a}}, \text{ e però } m+n = m \sqrt[x]{\frac{a+b}{a}}, \text{ e finalmente } m = \frac{n}{\sqrt[x]{\frac{a+b}{a}} - 1},$$

da cui si ha il valore di n , che è $n = m \sqrt[x]{\frac{a+b}{a}} - m$.

784. Se il problema fosse stato proposto nella seguente maniera (cerchasi in quanti anni si estinguerà una data somma di denaro $= a$, stante la convenzione di dover pagare ogni anno, oltre il frutto corrispondente a ciò, che costituisce la somma per ciascun anno, una porzione di essa somma; così che l'annua pensione da pagarsi risultante dal conveniente frutto, e da una porzione della somma a , sia $= b$), si procederebbe alla risoluzione così. Qui si vede, che i pagamenti da farsi dovendo essere tutti uguali, solo si cerca il numero de' pagamenti da farsi, col cercarli il numero degli anni, dopo i quali resterà estinta la data somma a . Sia come sopra $\frac{an}{m}$ il frutto, che corrisponde alla somma a : Poichè questo frutto $\frac{an}{m}$ non basta a pagare la pensione $= b$ nel fine del primo anno, si dovrà dalla somma a sottrarre la quantità $b - \frac{an}{m}$, che rappresenta la porzione da detrarsi dalla somma a ; onde è, che la somma a nel secondo anno sarà $a - b + \frac{an}{m}$: Quindi per avere il frutto di questa rimanente somma, si faccia $a : \frac{an}{m} :: a - b + \frac{an}{m}$ al quarto proporzionale, che trovasi essere $\frac{a(mn - bmn + an^2)}{m^2}$, e che è il frutto della rimanente somma nel secondo anno. Se pertanto si sottrarrà questo frutto dalla pensione b si avrà $b - \frac{a(mn + bmn - an^2)}{m^2}$ cioè $\frac{bm^2 - amn + bmn - an^2}{m^2}$, =

b—

$b - \frac{an}{m} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a}$, che è la porzione da detrarsi dalla somma $a - b + \frac{an}{m}$ corrispondente al secondo anno; per lo che fatta questa sottrazione, la somma pel terzo anno farà $\frac{am^3 - 2bm^2 + 2amn - bmn + an^2}{m^3}$. Si faccia di nuovo

$a : \frac{an}{m} :: \frac{am^3 - 2bm^2 + 2amn - bmn + an^2}{m^3}$ al quarto proporzionale, che trovasi essere $\frac{am^3n - 2bm^2n + 2amn^2 - bmn^2 + an^3}{m^3}$, e ch'è il frutto conveniente alla somma esistente nel terzo anno. Se pertanto dalla pensione b si sottrarrà questo frutto, si avrà la porzione da detrarsi dalla somma, che trovasi essere

$\frac{bm^3 - am^3n + 2bm^2n - 2amn^2 + bmn^2 - an^3}{m^3} = b - \frac{an}{m} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a}$. Si levi adesso que-

sta quantità dalla somma del terzo anno, e si avrà $\frac{am^3 - 2bm^2 + 2amn - bmn + an^2}{m^2}$

$\frac{bm^3 + am^3n - 2bm^2n + 2amn^2 - bmn^2 + an^3}{m^3} =$
 $\frac{am^3 - 3bm^2 + 3am^2n - 3bm^2n + 3amn^2 - bmn^2 + an^3}{m^3}$, che è la somma corrispon-

dente al quarto anno. Per avere il frutto a questa somma conveniente si faccia

$a : \frac{an}{m} :: \frac{am^3 - 3bm^2 + 3am^2n - 3bm^2n + 3amn^2 - bmn^2 + an^3}{m^3}$ al quarto proporzionale, che è $\frac{am^3n - 3bm^2n + 3am^2n^2 - 3bm^2n^2 + 3amn^3 - bmn^3 + an^4}{m^4}$ frutto cer-

cato. Ora per avere la porzione da detrarsi dalla somma si levi questo frutto dalla pensione b , e si avrà

$\frac{bm^4 - am^3n + 3bm^2n - 3am^2n^2 + 3bm^2n^2 - 2amn^3 + bmn^3 - an^4}{m^4} =$

$b - \frac{an}{m} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^2}$. Collo stesso metodo proseguendo l'operazione si troverà, che siccome la porzione, di cui devesi diminuire la somma a alla fine del primo anno è $b - \frac{an}{m}$; la quantità di cui devesi diminuire la somma corrispondente al secondo

anno è $b - \frac{an}{m} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a}$; pel terzo anno è $b - \frac{an}{m} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^2}$; pel quarto è $b -$

$$b - \frac{an}{m} \times \frac{a - \frac{an}{m}}{a^1} ; \text{così pel quinto è } b - \frac{an}{m} \times \frac{a - \frac{an}{m}}{a^4} ; \text{pel sesto è}$$

$$b - \frac{an}{m} \times \frac{a - \frac{an}{m}}{a^5} \text{ ec., con che si vede che le diminuzioni da farsi succediva-$$

mente alla somma corrispondente a ciascun anno stanno fra loro in progressione geometrica ascendente, e reciprocamente le diminuzioni della somma stanno in progressione geometrica decrescente. Quindi è, che la data somma a si estinguerà precisamente in tanti anni quanti sono i termini di questa trovata progressione, o sia quanti sono i pagamenti da farsi, che devono uguagliare la somma a . Se pertanto l'incognito numero degli anni, o sia de' pagamenti, si dirà $= x$, la somma a sarà uguale alla somma dei termini della predetta progressione, di cui, come apparisce

dai precedenti termini, il primo termine è $b - \frac{an}{m}$, e l'esponente è $\frac{a + \frac{an}{m}}{a}$. Que-

sta somma poi si avrà facilmente mediante la formola $s = \frac{am^b - a}{m - 1}$ trovata al nu-

mero 758, con sostituirvi $b - \frac{an}{m}$ in luogo di a ; x in vece di b ; ed $\frac{a + \frac{an}{m}}{a}$ in luogo di m , per mezzo delle quali sostituzioni essa si cambia in

$$\frac{b - \frac{an}{m} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^2} - b + \frac{an}{m}}{\frac{a + \frac{an}{m}}{a} - 1}, \text{ che è uguale alla seguente}$$

$$\frac{b - \frac{an}{m} \times a + \frac{an}{m} - a^2 b + \frac{na^2 + x}{m}}{\frac{a^2 n}{m}} \text{ o sia } \bullet$$

$$\frac{bm - an \times a + \frac{an}{m} - a^2 bm + na^2 + x}{a^2 n}. \text{ Ora questa quantità, che è la somma del-}$$

della ritrovata progressione, deve essere uguale ad a , per lo che si ha l'equazione

$$\frac{bm - an}{a^n} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^n} = a^n bm + na^n + 1$$

a^n

a^n

$$\frac{bm - an}{a^n} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^n} = bm \text{ con liberarla dal denominatore } a^n, \text{ con togliere i due}$$

termini $na^n + 1$, $-na^n + 1$, che si elidono, e con liberare il termine $a^n bm$ dal fattore a^n . Poichè nell'equazione trovata l'incognita x tiene luogo di esponente, perciò a fine di risolverla è d'uopo ricorrere ai logaritmi: Prevalendosi adunque delle spiegate trasformazioni logaritmiche, l'equazione trovata si cambierà nella

$$\text{seguente } x \log a + \frac{an}{m} + \log \frac{bm - an}{a^n} = x \log a + \log bm, \text{ o sia}$$

$$x \log a + \frac{an}{m} - \log a = \log bm - \log \frac{bm - an}{a^n}, \text{ e però } x =$$

$$\frac{\log bm - \log \frac{bm - an}{a^n}}{\log a + \frac{an}{m} - \log a}. \text{ Ed ecco ritrovato il ricercato numero } x \text{ degli anni, in cui}$$

$$\log a + \frac{an}{m} = \log a$$

si estinguerà la proposta somma a , o sia ecco ritrovato il numero de' pagamenti da farsi.

785. Se non si fosse cercato il numero de' pagamenti da farsi, ma si avesse dovuto trovare a che somma monterà il primo de' pagamenti uguali, dalla determinazione del quale restano determinati ancora gli altri, in tal caso sarebbe fissato il numero degli anni, e però de' pagamenti, onde la x sarebbe quantità cognita, e l'incognita diverrebbe la b , il di cui valore si otterrà mediante la trovata equazione

$$\frac{bm - an}{a^n} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^n} = bm \text{ così: Questa equazione è uguale a quest'altra}$$

$$\frac{bm - an}{a^n} \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^n} = bm = an \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^n}, \text{ conseguentemente } b =$$

$$\frac{a + \frac{an}{m}}{a^x} = \frac{an \times a + \frac{an^2}{m}}{m \times a + \frac{an}{m} - ma^x} = \frac{an \times \frac{am + an}{m}}{m \times \frac{am + an}{m} - m^2 a^x}$$

$$m \times \frac{a + \frac{an}{m}}{a^x} - m$$

Istefamente si potranno trovare i valori dell' altre quantità a , m , n , come si è fatto al num. 758. mediante l'equazione $b = \frac{an \times \frac{am + an}{m}}{m \times \frac{am + an}{m} - m^2 a^x}$.

786. Se la data somma a non si esaurisse in un numero preciso d'anni, ma vi si richiedesse di più una porzione d'anno, lo che costerà dal ritrovarsi pel valore di x un numero intero più una frazione, in tal caso si regoli nel modo praticato al num. 782. Ometto di fare l'applicazione di queste soluzioni generali al caso particolare, perchè ciò non involve difficoltà alcuna.

ARTICOLO III.

Delle formole ecumeniche riguardanti i numeri figurati.

787. Supposte le dottrine esposte al Capo VII. del I. Tomo, comincerò dalla formola con cui si ottiene un qualsivoglia cercato numero poligono, di cui sia dato il lato, e il numero degli angoli. Sia $= x$ il cercato numero poligono; il dato numero degli angoli $= m$, il lato $= n$; farà (pel num. 1283. del I. Tomo)

$$\frac{1 + m - 2 \times \frac{n-1+1}{2}}{2} \times n$$

788. Giusta l'Articolo IV. del Capo VII. del I. Tomo si ha la formola generale, la quale dà un qualunque numero piramidale di qualsivoglia ordine nel primo genere. Il piramidale cercato sia $= x$; il numero esprimente il posto di questo piramidale sia $= m$, e l'ordine di tale piramidale sia $= n$; la formola farà

$m \times \frac{m+1}{2} \times \frac{m+2}{3} \times \frac{m+3}{4} \times \dots \times \frac{m+n}{n+1} = x$. Poichè un qualsivoglia piramidale di un qualunque ordine, il di cui posto sia $= m$ è uguale alla somma di un numero m di piramidi dell'ordine prossimamente inferiore, quindi è, che questa stessa formola può servire per trovare la somma di un numero m di piramidi dell'ordine n , se non che l'ultimo termine deve essere

$\frac{m+n+1}{n+2}$, e però la formola farà $m \times \frac{m+1}{2} \times \frac{m+2}{3} \times \dots \times \frac{m+n+1}{n+2} = 0$

789. Essendo $= a$ il genere de' piramidi da sommarli; il loro ordine $= n$, il numero de' piramidi da sommarli $= m$, la somma cercata $= x$, la formola che
Tom. II. Q 9 da-

darà questa somma sarà (pel num. 1307. del I. Tomo)

$$x = \frac{1}{a-1} \times \frac{m-1 \times m \times m+1 \dots \times m+n-1}{2. 3. n+2} + m \times \frac{m+1 \times m+2 \dots \times m+n+1}{2. 3. n+2}.$$

790. Finora ho considerati i numeri figurati, le di cui serie generatrici comincino dall'unità: ora li prenderò a considerare in ipotesi, che le loro serie generatrici non comincino dall'unità; e primieramente darò la formola generale interveniente a trovare la somma di un proposto numero di genitori di un qualsivoglia genere, de' quali sia dato il primo termine. La somma cercata sia uguale ad x , il genere de' genitori da sommarli $= a$, il loro primo termine $= b$: il loro numero $= m$, e l'ordine $= n$; sarà (pel num. 1317. del I. Tomo) $x = \frac{b-1}{a-1} \times m +$

$$\frac{1}{a-1} \times \frac{m-1}{m-1} \times \frac{m \times m+1 \dots \times m+n}{2. 3. n+2} + m \times \frac{m+1 \times m+2 \dots \times m+n+1}{2. 3. n+2}.$$

791. Essendo dato il genere $= a$, e l'ordine $= n$ di un numero $= m$ di piramidali, de' quali il primo termine sia $= b$, si avrà (giusta il num. 1327 del I. Tomo) la formola generale, che ne esibisce la somma $= x$, che è la seguente

$$x = \frac{b-1}{a-1} \times m \times \frac{m+1 \dots \times m+n}{2. n+1} + \frac{a-1}{a-1} \times \frac{m-1}{m-1} \times \frac{m \times m+1 \dots \times m+n}{2. 3. n+2} + m \times \frac{m+1 \times m+2 \dots \times m+n+1}{2. 3. n+2}.$$

792. Giacchè nel I. Tomo all' Articolo VII. del Capo VII. ho aggiunto alla dottrina de' numeri figurati la maniera di trovare la somma delle potestà, che si possono formare dai termini della serie naturale, ne soggiungerò anche qui per complemento le formole generali, estendendole alla somma di qualsivoglia potestà, quantunque per altro ciò s'inchioda in quello, che dirò al num. 930, ove le formole risultano più brevi.

793. Devonsi pertanto distinguere le potestà pari dalle impari. Comincerò dal modo di determinare la somma delle potestà impari, quale si ha con sommare tanti ordini di figurati del primo genere, quante unità contiene la metà dell' esponente (che suppongo $= m$) delle potestà da sommarli accresciuto di una unità, onde il numero degli ordini da sommarli sarà $\frac{m+1}{2}$. Quali poi debbano essere gli ordini

da sommarli, e quale il numero de' loro termini, eccolo. Sia n il numero delle potestà da sommarli: Per avere la somma dei cubi si dovrà sommare un numero $= n$ di genitori, e un numero $= n-1$ di piramidali secondi: Per avere la somma delle quarte potestà, bisognerà sommare un numero $= n$ di genitori, un numero $= n-1$ di piramidali secondi, e un numero $= n-2$ di piramidali quarti. Per le settime potestà si dovrà sommare un numero $= n$ di genitori, un numero $= n-1$ di piramidali secondi, un numero $= n-2$ di piramidali quarti, e un numero $= n-3$ di piramidali setti: Così per le none potestà si dovrà sommare un numero $= n$ di genitori, un numero $= n-1$ di piramidali secondi, un numero $= n-2$ di piramidali quarti, un numero $= n-3$ di piramidali setti, e un numero $= n-4$ di piramidali ottavi, e così successivamente collo stesso ordine per le altre potestà. La formola in oltre di ciascun ordine deve avere un fattore particolare, il quale varia secondo che

che variano le potestà da sommarfi. Per determinare quale debba essere il fattore corrispondente a ciascun ordine mi appiglio alla seguente generale espressione, in cui z, y, x, u, t sono i fattori cercati da determinarli, come farò or ora; m esprime l'esponente delle potestà da sommarfi; i numeri posti in A sono i termini della serie naturale delle cui potestà m cercasi la somma; i numeri posti in B sono i genitori del primo genere; i numeri che moltiplicano la z sono i piramidali secondi; i numeri che moltiplicano la y sono i piramidali quarti; i numeri che moltiplicano la x sono i piramidali sesti; i numeri che moltiplicano la u sono i piramidali ottavi ec.

A B

$$1^m = 1$$

$$2^m = 2 + 1 \times z$$

$$3^m = 3 + 4 \times z + 1 \times y$$

$$4^m = 4 + 10 \times z + 6 \times y + 1 \times x$$

$$5^m = 5 + 20 \times z + 21 \times y + 8 \times x + 1 \times u$$

$$6^m = 6 + 35 \times z + 56 \times y + 35 \times x + 10 \times u + 1 \times t$$

$$7^m = 7 + 56 \times z + 126 \times y + 120 \times x + 55 \times u + 12 \times t + 1 \times t$$

$$8^m = \text{ec.}$$

794. Veniamo adesso a determinare il valore di questi fattori z, y, x, u ec. Poichè l'esponente m è dato, dalla seconda equazione $2^m = 2 + 1 \times z$ si ha $z = 2^m - 2$, che suppongo $= P$, il qual valore posto nella terza equazione la cambia in $3^m = 3 + 4P + y$, dalla quale si ottiene il valore di y , che è $y = 3^m - 3 - 4P$, che faccio $= Q$; e nella quarta equazione sostituendosi questi valori P, Q in luogo di z, y , ella diventa $4^m = 4 + 10P + 6Q + x$, dalla quale si ha il valore di x , che è $x = 4^m - 4 - 10P - 6Q$, che suppongo $= R$. Questi valori di P, Q, R si pongano in vece di z, y, x nella quinta equazione, e si avrà $5^m = 5 + 20P + 21Q + 8R + u$, e però $u = 5^m - 5 - 20P - 21Q - 8R$; $6^m = \text{ec.}$

795. Se in vece di P, Q, R ec. si riterranno i propri valori, si avrà

$$z = 2^m - 2$$

$$y = 3^m - 3 - 4 \times 2^m + 8$$

$$x = 4^m - 4 - 10 \times 2^m + 20 - 6 \times 3^m + 18 + 24 \times 2^m - 48$$

$$u = 5^m - 5 - 20 \times 2^m + 40 - 21 \times 3^m + 63 + 84 \times 2^m - 168 - 8 \times 4^m + 32 + 80 \times 2^m -$$

$$160 + 48 \times 3^m - 144 - 192 \times 2^m + 384$$

$$t = \text{ec.}$$

Cioè per la terza potestà sarà $z=6$. Per la quinta potestà sarà $z=30$; $y=120$. Per la settima potestà sarà $z=126$; $y=1680$; $x=5040$. Per la nona potestà sarà $z=510$; $y=16640$; $x=157200$; $u=335880$. Per l'undecima potestà ec.

796. Per lo che supposto $=n$ il numero de' termini della serie naturale, delle cui potestà terze si vuol la somma, ella verrà esibita dalla seguente formola generale

$$Qq \ 2$$

rale $\frac{n \times n+1}{1 \times 2} + \frac{n-1 \times n \times n+1 \times n+2}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \times 6$. La formola della somma delle quinte potestà di un numero n di termini della serie naturale è

$$\frac{n \times n+1}{1 \times 2} + \frac{n-1 \times n \times n+1 \times n+2}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \times 30 +$$

$\frac{n-2 \times n-1 \times n \times n+1 \times n+2 \times n+3}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} \times 120$. La formola generale della somma delle settime potestà di un numero n di termini della serie naturale è

$$\frac{n \times n+1}{1 \times 2} + \frac{n-1 \times n \times n+1 \times n+2}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \times 126 +$$

$$\frac{n-2 \times n-1 \times n \times n+1 \times n+2 \times n+3}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} \times 1680 +$$

$$\frac{n-3 \times n-2 \times n-1 \times n \times n+1 \times n+2 \times n+3 \times n+4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8} \times 5040$$

Collo stesso metodo si otterranno le formole generali esprimenti le somme delle potestà superiori di un dato numero n di termini della serie naturale.

797. Si debba per Esempio trovare la somma delle settime potestà de' primi cento numeri della serie naturale. Nella precedente terza formola si sostituisca 100

in luogo di n , e si avrà $\frac{100 \times 100+1}{1 \times 2} + \frac{100-1 \times 100 \times 100+1 \times 100+2}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \times 126 +$

$$\frac{100-2 \times 100-1 \times 100 \times 100+1 \times 100+2 \times 100+3}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} \times 1680 +$$

$$\frac{100-3 \times 100-2 \times 100-1 \times 100 \times 100+1 \times 100+2 \times 100+3 \times 100+4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8} \times 5040$$

$= 5050 + 535446450 + 2402121762400 + 129818063695200 = 1300583304167100$, e quello è il numero, che esprime la somma cercata delle potestà settime de' primi cento numeri della serie naturale.

798. Passiamo adesso alla maniera di determinare la somma di un dato numero di termini della serie naturale elevati a potestà pari. Questa somma si otterrà con prendere la somma di tanti ordini di figurati del secondo genere, quanti ne esprime $\frac{m}{2}$ (m è l'esponente delle potestà). Ecco poi quali esser debbano questi ordini da sommarli, e quale il numero de' termini da sommarli in ciascun ordine. Sia $= n$ il

numero delle potestà da sommarli: Per avere la somma de' quadrati bisognerà sommare un numero n di piramidali primi del secondo genere. Per avere la somma delle quarte potestà si dovrà sommare un numero $\equiv n$ di piramidali primi, e un numero $\equiv n-1$ di piramidali terzi. Per le potestà seste si dovrà sommare un numero $\equiv n$ di piramidali primi, un numero $\equiv n-1$ di piramidali terzi, e un numero $\equiv n-2$ di piramidali quinti. Per le potestà ottave bisognerà sommare un numero $\equiv n$ di piramidali primi, un numero $\equiv n-1$ di piramidali terzi, un numero $\equiv n-2$ di piramidali quinti, e un numero $\equiv n-3$ di piramidali settimi ec. La somma poi di ciascun ordine deve avere il suo fattore particolare, il quale varia secondo che variano le potestà. Il modo di determinare questi fattori è simile a quello del num. 724. Siano x, y, z, u, t i fattori, che devonfi determinare. Sia m l'esponente delle potestà da sommarli. I numeri posti in A sono i termini della serie naturale, delle cui potestà m cercasi la somma. I numeri posti in B sono i piramidali primi del secondo genere; i numeri che moltiplicano la x , sono i piramidali terzi; quelli che moltiplicano la y sono i piramidali quinti; quelli che moltiplicano la z sono i piramidali settimi ec.

A	B
$1^m =$	1
$2^m =$	$4 + 1 \times x$
$3^m =$	$9 + 6 \times x + 1 \times y$
$4^m =$	$16 + 20 \times x + 8 \times y + 1 \times z$
$5^m =$	$25 + 50 \times x + 35 \times y + 10 \times z + 1 \times u$
$6^m =$	$36 + 105 \times x + 112 \times y + 54 \times z + 12 \times u + 1 \times t$
$7^m =$	ec.

793. Il valore di z si ricava dalla seconda equazione ed è $z = 2^m - 4$, che faccio $\equiv P$. Sostituisco questo valore di P nella terza equazione, e ne ho $3^m = 9 + 6P + y$, e però $y = 3^m - 9 - 6P$, che suppongo $\equiv Q$. Sostituisco nella quarta equazione questi valori P, Q in luogo di x, y , e mi viene $4^m = 16 + 20P + 8Q + x$; quindi $x = 4^m - 16 - 20P - 8Q$; $5^m =$ ec. Che se in vece di P, Q ec. si rimetteranno i propri valori, si avrà

$$\begin{aligned}
 x &= 2^m - 4 \\
 y &= 3^m - 9 - 6 \times 2^m + 24 \\
 x &= 4^m - 16 - 20 \times 2^m + 80 - 8 \times 3^m + 72 + 48 \times 2^m - 192 \\
 u &= 5^m - 25 - 50 \times 2^m + 200 - 35 \times 3^m + 315 + 210 \times 2^m - 840 - 10 \times 4^m \\
 &\quad + 160 + 200 \times 2^m - 800 + 80 \times 3^m - 720 - 480 \times 2^m + 1920 \\
 t &= \text{ec.}
 \end{aligned}$$

Cioè per la potestà quarta sarà $x=12$. Per la sesta potestà sarà $z=60$; $y=360$. Per la potestà ottava sarà $z=252$; $y=5040$; $x=20160$. Per la decima ec.

800. Supposto pertanto $\equiv n$ il numero de' termini della serie naturale, delle cui potestà seconde si vuole la somma, la formola generale, da cui essa verrà esibita, sarà

$$\frac{n-3 \times n-2 \times n-1 \times n \times n+1 \times n+2 \times n+3 \times n+4 \times n+5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9} \times 20160 +$$

$$\frac{n-4 \times n-3 \times n-2 \times n-1 \times n \times n+1 \times n+2 \times n+3 \times n+4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9} \times 20160.$$

801. Nella stessa maniera si troveranno le formole generali esprimenti la somma delle potestà superiori.

802. Si debba per esempio ritrovare la somma delle ottave potestà de' primi dieci numeri della serie naturale. Nella precedente ultima formola si sostituisca il numero 10 in luogo di n , e si avrà

$$\frac{10 \times 10+1 \times 10+2}{1 \times 2 \times 3} + \frac{10-1 \times 10 \times 10+1}{1 \times 2 \times 3} +$$

$$\frac{10-1 \times 10 \times 10+1 \times 10+2 \times 10+3}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} \times 252 +$$

$$\frac{10-2 \times 10-1 \times 10 \times 10+1 \times 10+2}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} \times 252 +$$

$$\frac{10-2 \times 10-1 \times 10 \times 10+1 \times 10+2 \times 10+3 \times 10+4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7} \times 5040 +$$

$$\frac{10-3 \times 10-2 \times 10-1 \times 10 \times 10+1 \times 10+2 \times 10+3}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7} \times 5040$$

$$+ \frac{10-3 \times 10-2 \times 10-1 \times 10 \times 10+1 \times 10+2 \times 10+3 \times 10+4 \times 10+5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9} \times 20160 +$$

$$\frac{10-4 \times 10-3 \times 10-2 \times 10-1 \times 10 \times 10+1 \times 10+2 \times 10+3 \times 10+4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9} \times 20160$$

= 385 + 23908 + 25945920 + 141261120 = 167731333, che è la somma cercata.

803. Qualora si dovranno sommare le potestà d'alcuni termini della serie naturale non principianti dall'unità, si dovrà prima trovare la somma di tutti i numeri della serie naturale elevati alla potestà proposta, i quali comincino dall'unità, e vadano a terminare coll'ultimo de' termini dati, indi bisognerà trovare la somma delle stesse potestà dei numeri naturali principianti dall'unità, e terminanti nel primo esclusivamente de' termini proposti, lo che fatto, col sottrarsi la seconda somma dalla prima, si avrà per residuo la somma cercata: Come volendosi la somma delle p^{te}te

stà m de' numeri naturali principiando dal 13 fino al 47 inclusivamente, bisognerà trovare la somma delle potestà m de' numeri naturali da 1 fino a 47, poscia da questa somma sottrarre la somma delle potestà m da 1 fino a 13 esclusivamente, e ciò che ne verrà sarà la somma cercata.

A R T I C O L O IV.

Delle formole generali per le combinazioni, e permutazioni.

804. **S**iccome pel num. 1357. del I. Tomo essendo $=n$ il numero delle cose da combinarsi secondo l'esponente 2, la formola generale esprime il numero

degli ambi è $\frac{n \times n-1}{1 \times 2}$, e la formola generale, che dà il numero dei terni è (pel

num. 1365. del I. Tomo) $\frac{n \times n-1 \times n-2}{1 \times 2 \times 3}$; siccome è $\frac{n \times n-1 \times n-2 \times n-3}{1 \times 2 \times 3 \times 4}$ la for-

mola generale, che dà il numero delle quaderne; così se si dovrà combinare un numero di cose $=n$ secondo l'esponente m , la formola generale, che darà il numero

di tutte le combinazioni sarà $\frac{n \times n-1 \times n-2 \times n-3 \dots \times n-m+1}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots m}$

Questa formola riguarda le combinazioni in caso, che le cose combinate non cambino posto, ma se li vorrà, che in ciascuna combinazione le cose varino di sito, siccome esse possono variare secondo il numero $1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots m$, quindi è, che per avere le combinazioni variate bisognerà moltiplicare per questo numero $1 \times 2 \times 3 \dots m$ (m è l'esponente) la formola delle combinazioni non variate, conseguentemente la formola delle combinazioni variate sarà

$$n \times n-1 \times n-2 \times n-3 \dots n-m+1.$$

805. Se poi si vorrà la formola generale esprime il numero di tutte le combinazioni possibili secondo ciascun esponente di un dato numero n di cose, essa sarà

$$\text{rà (pel num. 1371. del I. Tomo) } \frac{n \times n-1}{1 \times 2} + \frac{n \times n-1 \times n-2}{1 \times 2 \times 3} +$$

$$\frac{n \times n-1 \times n-2 \times n-3}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \frac{n \times n-1 \times n-2 \times n-3 \times n-4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5}$$

$$+ \dots \dots \dots \frac{n \times n-1 \times n-2 \times n-3 \dots \times n-m+1}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots m}$$

806. Rispetto a quelle combinazioni, in cui le cose da combinarsi sono diverse, ed ogni cosa deve combinarsi con se stessa, essendo $=n$ il numero delle cose da
com-

combinarsi, e l'esponente essendo 2, la formola generale, che dà il numero delle loro combinazioni è (pel num. 1388. del I. Tomo) $\frac{n \times n+1}{1 \times 2}$; se l'esponente sarà 3, la formola generale sarà (pel num. 1390. del I. Tomo)

$\frac{n \times n+1 \times n+2}{1 \times 2 \times 3}$; sarà $\frac{n \times n+1 \times n+2 \times n+3}{1 \times 2 \times 3 \times 4}$ se l'esponente sarà 4 ec.; e però ef-

fendo l'esponente $= m$, la formola ecumenica, che darà il numero di tutte le com-

binazioni, sarà $\frac{n \times n+1 \times n+2 \dots \times n+m-1}{1 \times 2 \times 3 \dots m}$. E qui si noti, che se sarà $m > n$,

si potrà dividere la precedente formola per $n \times n+1 \times n+2 \dots m$, con che essa diverrà

$$\frac{n+1 \times n+2 \times n+3 \dots \times m+n-1}{1 \times 2 \times 3 \dots m-1}.$$



C A P O V.

DELLE SERIE.

A R T I C O L O I.

Della natura, distinzione, e genesi delle Serie.

807. **COL** nome di serie non altro intendesi, che un'unione di quantità, delle quali con una certa legge le une vansi succedendo alle altre. Se il numero di queste quantità è finito, la serie dicesi finita, se è infinito, infinita chiamati la serie.

808. Qualunque quantità si può risolvere in una serie non solo finita, ma eziandio infinita, poichè ella si può dividere in un numero infinito di parti riguardandosi con certo rapporto, stante che la divisione della quantità continua (pel num. 6. del I. Tomo) non riconosce alcun limite: Se un piede per esempio si dividerà per metà, e una di queste metà si dividerà di nuovo per metà, e lo stesso si faccia, o almeno si concepisca in infinito rispetto alle susseguenti metà, ne verrà la seguente serie infinita uguale ad un piede, cioè

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} \text{ ec. in infinito. La quantità, da}$$

cui nasce la serie è il di lei vero valore.

809. In tre maniere possono procedere le serie, o con termini tutti uguali affetti da segni alternanti, come quella $1-1+1-1+1-1$ ec., e le serie di questa fatta chiamansi parallele, le quali in qualunque termine distano sempre egualmente dalla quantità, dalla quale nascono. Di fatto la serie precedente (come or ora vedremo) nasce da $\frac{1}{2}$: Ora se di questa serie si prenderà un numero pari di termini,

il loro risultato sarà $=0$, (come costa dall'alternativa de' segni) il quale dista per $\frac{1}{2}$ dal vero valore; se si prenderà un numero impari di termini, il loro risultato sa-

rà $=1$, che parimente dista per $\frac{1}{2}$ dal vero valore. In secondo luogo possono

procedere le serie con termini continuamente crescenti, e queste serie poichè si vanno sempre più scostando dal vero valore, si chiamano divergenti. Finalmente le serie, che procedono con termini decrescenti all'infinito, si dicono convergenti, perchè si vanno infinitamente approssimando al vero valore, e tale è la precedente se-

rie $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ ec. all'infinito, la quale si va continuamente accostando al valore 1, e allora soltanto vi diviene uguale, quando è continuata in infinito. Le serie ora procedono con alternanti termini positivi, e negativi; ora con termini ent-

ti positivi, ora con infinite negazioni, secondo la varia posizione del primo termine.

810. Nelle serie decrescenti all'infinito l'ultimo termine infinitesimo diventa minore di qualunque quantità assegnabile, conseguentemente svanisce, e diventa uguale a zero, onde è che per la di lui addizione nè si accresce l'unità, nè si diminuisce per la di lui sottrazione.

811. Tre sono i generi principali, ne quali dividonsi le serie: Al primo genere spettano le serie Aritmetiche; al secondo le Geometriche; al terzo le Aritmetico-Geometriche, le quali si compongono da serie aritmetiche, e geometriche. Nel primo genere hanno luogo non solo tutte le progressioni aritmetiche, ma eziandio tutte le serie, che hanno le differenze n^{esime} costanti (per n intendasi qualunque numero), delle quali ho parlato ai num. 762, 808, 844, 866, 868, e 1335 del I. Tomo, e tali pure sono le serie, mediante le quali ho dato il modo all'Articolo IX. del Cap. III. di ritrovare le radici di qualsivoglia equazione. Tutte le progressioni aritmetiche si chiamano serie aritmetiche di primo ordine; tutte le potenze seconde di una quantità variabile m , cioè a dire la serie, che nasce da m^2 , o pure da $A+Bm^2$ (poichè non si muta la serie con moltiplicare tutti i di lei termini, e nel tempo stesso aggiungerci una quantità costante), diceli serie aritmetica di secondo ordine; e perchè (giusta il num. 1005. del I. Tomo) col sommarli insieme i termini di due progressioni aritmetiche ne viene un'altra progressione aritmetica, però la serie aritmetica di secondo ordine sarà rappresentata tanto da $A+Bm^2$, come da $A+Bm+Cm^2$, in cui Bm rappresenta una progressione aritmetica: Parimente le terze potenze di m formano una serie aritmetica di terzo ordine, che però sarà essa rappresentata da m^3 , o pure da $A+Bm+Cm^2+Dm^3$; e generalmente la formola $A+Bm+Cm^2+Dm^3+E m^4+...+Vm^n$ rappresenta le serie di tutti gli ordini da 1 fino ad n , cioè i due primi termini $A+Bm$ rappresentano le serie aritmetiche di primo ordine, i tre primi quelle del secondo, i quattro priani quelle del terzo ec., le quali cose costano dall'Articolo IX. del Capo III., dove si può vedere, che qualsivoglia equazione rappresenta una serie aritmetica di ordine corrispondente al grado dell'equazione. Queste serie aritmetiche di diverso ordine nascono ancora dal moltiplicarli rispettivamente i termini di più progressioni aritmetiche, come costa dai num. 1006, 1007 del I. Tomo. Al secondo genere appartengono non solo tutte le progressioni geometriche indicate da P^n , o pure da AP^n , che chiamansi serie geometriche di primo ordine, ma eziandio le serie geometriche, che nascono dal sommarli ovvero dal sottrarsi rispettivamente i termini di due, tre, quattro ec. progressioni geometriche, delle quali la formola esprimevole sarà $AP^n \pm BQ^n \pm CR^n \pm DS^n \pm$ ec.. Se la serie risulterà dai due primi termini $AP^n \pm BQ^n$, essa sarà di secondo ordine; sarà del terzo ordine, se nascerà dai tre primi termini ec.. Così la seguente serie (H) è del secondo ordine, la serie (I) del terzo, e la serie (K) del quarto.

Progreſſ. geom.	{	1.	2.	4.	8.	16.	32.	64. ec.
		1.	3.	9.	27.	81.	243.	729. ec.
(H)		2.	5.	13.	35.	97.	275.	793. ec.
Progreſſ. geom.	{	1.	4.	16.	64.	256.	1024. ec.	
		1.	6.	36.	216.	1296.	7776. ec.	
		1.	5.	25.	125.	625.	3125. ec.	
(I)		3.	15.	77.	405.	2177.	11925. ec.	
Progreſſ. geom.	{	1.	3.	9.	27.	81.	243. ec.	
		1.	5.	25.	125.	625.	3125. ec.	
		1.	7.	49.	343.	2401.	16807. ec.	
		1.	2.	4.	8.	16.	32. ec.	
(K)		4.	17.	87.	503.	3123.	20207. ec.	

Al terzo genere ſi riducono tutte le ſerie, che in qualunque maniera ſi poſſono comporre da ſerie aritmetiche, e geometriche, come farebbe dal moltiplicarſi riſpettivamente i termini di una ſerie aritmetica di qualunque ordine eſſa ſia per i termini di una progreſſione geometrica. Queſte ſerie poi non meno, che le altre ſi diſtinguono in ordini, e l'ordine di ciaſcuna viene denominato dalla ſomma degli eſponenti degli ordini delle ſerie componenti.

812 Tutte le ſerie, i di cui termini riſultano da uno, due, tre ec. termini precedenti moltiplicati in date quantità coſtanti, ſi chiamano ſerie ricorrenti. Il loro ordine ſi deſume dal numero de' termini precedenti, da' quali proviene ciaſcuno de' loro termini: Se ciaſcun termine di una propoſta ſerie riſulterà dal termine precedente, eſſa farà una ſerie ricorrente del primo ordine, ſe da due termini precedenti, farà del ſecondo ordine, ſe da tre, del terzo ec. Tutte le progreſſioni geometriche, nelle quali ciaſcun termine riſulta dal ſuo precedente moltiplicato nel denominatore della progreſſione, ſono ſerie ricorrenti del primo ordine, e le altre ſerie geometriche di qualsivoglia ordine ſono ſerie ricorrenti dello ſteſſo ordine: Le progreſſioni poi aritmetiche ſono ſerie ricorrenti del ſecondo ordine, poichè in queſte progreſſioni qualsivoglia termine riſulta dal doppio dell'ultimo precedente termine meno il termine penultimo (pel num. 409 del I. Tomo); e le altre ſerie aritmetiche d'ordine n danno una ſerie ricorrente d'ordine $n+1$. Conſequentemente ſono pure ſerie ricorrenti le ſerie, che appartengono al terzo genere. Ecco due eſempj di due ſerie ricorrenti, la prima (A) di ſecondo ordine, della quale ciaſcun termine riſulta dalla ſomma de' due precedenti, il primo moltiplicato in 3, e il ſecondo in 2. La ſeconda (B) di terzo ordine, di cui ciaſcun termine riſulta dai tre precedenti, il primo moltiplicato in -1 , il ſecondo in -3 , il terzo in 5

(A)

(A)	1.	1.	5.	13.	41.	121.	365.	ec.
(B)	0.	1.	3.	12.	50.	211.	893.	ec.

I primi termini della serie, che servono a ritrovare il susseguente, si prendono ad arbitrio.

813. Si osservi che una stessa serie ricorrente si può riferire a diverso ordine, in quanto che ciascun di lei termine può risultare da diverso numero di termini precedenti: Per esempio la serie 1. 2. 4. 8. 16. 32. ec. sarà di primo ordine se si continuerà, che ciascun di lei termine nasca dal suo precedente moltiplicato in 2; ma ella sarà di secondo ordine se i di lei termini si riguarderanno come risultante ognuno dai due immediati termini precedenti, il primo moltiplicato in 3, e il secondo in $\frac{1}{2}$, così che ella sia 1. 2. $1 \times 3 + 2 \times \frac{1}{2}$. 2 $\times 3 + 4 \times \frac{1}{2}$.

$4 \times 3 + 8 \times \frac{1}{2}$ ec.

814. In tre maniere soglionfi generare nel calcolo le serie: O dalle potenze di un binomio, o dalle frazioni, o dalle quantità radicali. Ne tratterò per ordine, e intanto comincerò dalla prima.

815. Debboni inalzare alla potenza m il binomio $1 \pm a$ a fine di avere ciò, che viene espresso da $(1 \pm a)^m$. Per trovare spedatamente i termini della cercata potenza mi preveggo della formola Newtoniana data al numero 259, nella quale pongo 1 in luogo di P , e $\pm a$ in vece di Q , fatte le quali sostituzioni mi nasce la seguente serie (A), che vedesi corrispondere alla formola generale data al num. 255 mediante il solo cambiamento di a in 1, e di b in a . Ecco la seconda

$$\begin{aligned} (1 \pm a)^m = & (A) 1 \pm \frac{m}{1} a + \frac{m \times m-1}{1 \times 2} a^2 \pm \frac{m \times m-1 \times m-2}{1 \times 2 \times 3} a^3 + \\ & \frac{m \times m-1 \times m-2 \times m-3}{1 \times 2 \times 3 \times 4} a^4 \pm \frac{m \times m-1 \times m-2 \times m-3 \times m-4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} a^5 + \text{ec.} \end{aligned}$$

816. Queste serie (a riserva del caso, in cui sia $m = \infty$, o pure m eguale a un numero negativo, o a una frazione) non hanno, che un'apparenza d'infinita, e il numero de'loro termini, che è sempre $m+1$, resta limitato, subito che viene determinato il numero m ; che però se si supporrà $m=5$, la serie non avrà, che sei termini, interdependenti ella nel settimo, che andrà a zero insieme con tutti gli altri, a motivo che ciascun di loro sarà moltiplicato in $m-5$, cioè in $5-5=0$.

817. Se nel dato binomio $1+a$ sarà $1 < a$, i termini della serie anderanno continuamente crescendo, come colla dal solo osservare la serie; ma se sarà $1 > a$, i termini anderanno decrescendo.

818. Dovendosi inalzare alla potenza m il binomio $a \pm b$, poichè si ha

$$\begin{aligned} a \pm b^m = & a^m \times \left(1 \pm \frac{b}{a} \right)^m, \text{ perciò nella serie (A) del num. 815. si ponga} \\ & \pm \frac{b}{a} \text{ in luogo di } a, \text{ indi si moltiplichino i termini di questa serie per } a^m, \text{ con} \\ & \text{che} \end{aligned}$$

che si avrà la serie cercata $= \overline{a \pm b}^m$.

819. Per discendere dalla generalità al caso particolare sia nel precedente binomio $a=3$, $b=2$, $m=4$, farà $a^m \chi \left(1 + \frac{b}{a}\right)^m = 3^4 \chi \left(1 + \frac{2}{3}\right)^4$
 $= 3^4 \chi 1 + \frac{6}{3} + \frac{24}{9} + \frac{32}{27} + \frac{16}{81} = 625$.

820. Fin' ora ho supposto, che l'esponente m sia un numero intero, e positivo; che se egli farà un numero intero bensì, ma negativo, la formola $\overline{a \pm b}^m$ si risolverà niente di meno in una serie, la quale però sarà infinita; e nel caso solamente, che sia convergente, cioè a dire che i di lei termini vadano sempre decrescendo, si accosterà essa al vero valore di $\overline{a \pm b}^m$, a cui giungerà allorchè sarà prodotta in infinito. Per inalzare adunque alla potenza $-m$ il binomio $a \pm b$, faccio $\overline{a \pm b}^{-m} = a^{-m} \chi \left(1 \pm \frac{b}{a}\right)^{-m}$, indi nella serie (A) del num. 815

pongo $\frac{b}{a}$ in luogo di a , e $-m$ in vece di m , indi multiplico tutti i termini della serie, che nasce, per a^{-m} , lo che fatto mi viene (B)

$$a^{-m} \chi 1 \pm \frac{m}{1} \chi \frac{b}{a} - \frac{m \chi -m-1}{1 \chi 2} \chi \frac{b^2}{a^2} + \frac{m \chi -m-1 \chi -m-2}{1 \chi 2 \chi 3} \chi \frac{b^3}{a^3} \text{ ec. in infinito,}$$

821. L'esponente m può essere non solo un numero intero positivo, o negativo, ma può essere eziandio un numero fratto positivo, o negativo, (del qual caso parlerò in appresso), come pure un numero irrazionale, ed anche immaginario tanto positivo, come negativo. Sia in primo luogo $m=\sqrt{3}$, e però $\overline{1+a}^{\sqrt{3}}$: Nella serie (A) del num. 815 si sostituiscia $\sqrt{3}$ in luogo di m , e si avrà

$$1 + \frac{\sqrt{3}}{1} \chi a + \frac{3-\sqrt{3}}{1 \chi 2} \chi a^2 - \frac{9+5\sqrt{3}}{1 \chi 2 \chi 3} \chi a^3 + \frac{42-41\sqrt{3}}{1 \chi 2 \chi 3 \chi 4} \chi a^4 \text{ ec. Essendo}$$

$$\overline{1+a}^{-\sqrt{3}}, \text{ la corrispondente serie farebbe}$$

$$1 - \frac{\sqrt{3}}{1} \chi a + \frac{3+\sqrt{3}}{1 \chi 2} \chi a^2 - \frac{9-5\sqrt{3}}{1 \chi 2 \chi 3} \chi a^3 + \frac{42+41\sqrt{3}}{1 \chi 2 \chi 3 \chi 4} \chi a^4 \text{ ec.}$$

Se farà $m=\sqrt{-3}$, o pure $m=-\sqrt{-3}$, nel primo caso la serie sarà

$$1 + \frac{\sqrt{-3}}{1} \chi a - \frac{3-\sqrt{-3}}{1 \chi 2} \chi a^2 + \frac{9-\sqrt{-3}}{1 \chi 2 \chi 3} \chi a^3 - \frac{24+12\sqrt{-3}}{1 \chi 2 \chi 3 \chi 4} \chi a^4 \text{ ec.,}$$

$$\text{e nel secondo } 1 - \frac{\sqrt{-3}}{1} \chi a - \frac{3+\sqrt{-3}}{1 \chi 2} \chi a^2 + \frac{9+\sqrt{-3}}{1 \chi 2 \chi 3} \chi a^3 -$$

$\frac{24-12\sqrt{-3}}{1\lambda^2\lambda^3\lambda^4}X^{a^4}$ ec. Ma per dedurre opportunamente alcune conseguenze da queste serie, prendiamo le serie, che nascono dalle due quantità $\frac{1+a}{1+a}$; $\frac{1+a}{1+a}$ considerate così generalmente. La serie, che al num. 815 si è trovata nascere dalla prima è $\frac{1+a}{1+a} = (P) 1 + \frac{m}{1}a + \frac{m}{1}\frac{X^{m-1}}{1\lambda^2}a^2 + \frac{m}{1}\frac{X^{m-1}\lambda^{m-2}}{1\lambda^2\lambda^3}a^3 + \frac{m}{1}\frac{X^{m-1}\lambda^{m-2}\lambda^{m-3}}{1\lambda^2\lambda^3\lambda^4}a^4$ ec.; la serie, che al num. 820. si è trovata na-

scere dalla seconda è $\frac{1+a}{1+a} = (Q) 1 - \frac{m}{1}a - \frac{m}{1}\frac{X^{m-1}}{1\lambda^2}a^2 -$

$\frac{m}{1}\frac{X^{m-1}\lambda^{m-2}}{1\lambda^2\lambda^3}a^3 - \frac{m}{1}\frac{X^{m-1}\lambda^{m-2}\lambda^{m-3}}{1\lambda^2\lambda^3\lambda^4}a^4$ ec., cioè col fare le attuali moltiplicazioni de' coefficienti la prima (P) è

$$1 + \frac{ma}{1} + \frac{m^2-m}{1\lambda^2}X^{a^2} + \frac{m^3-2m^2+2m}{1\lambda^2\lambda^3}X^{a^3} + \frac{m^4-3m^3+11m^2-6m}{1\lambda^2\lambda^3\lambda^4}X^{a^4} \text{ ec.,}$$

e la seconda (Q) è $1 - \frac{ma}{1} + \frac{m^2+m}{1\lambda^2}X^{a^2} - \frac{m^3-2m^2-2m}{1\lambda^2\lambda^3}X^{a^3} +$

$\frac{m^4-3m^3+11m^2-6m}{1\lambda^2\lambda^3\lambda^4}X^{a^4}$ ec. Se adunque la formola data da ridursi in serie sarà

la quantità complessa $\frac{1+a}{1+a} + \frac{1+a}{1+a}$, si dovranno ridurre in serie le di lei due parti, come pur ora si è fatto, indi sommare i corrispondenti termini di queste due serie, con che si avrà una serie, ne' di cui termini o non vi sarà la quantità m , o vi sarà elevata a potenza pari. Di fatto nasce la serie

$$2 + m^2a^2 - m^2a^2 + \frac{m^4+11m^2}{12}X^{a^4} \text{ ec.: Che però, o la quantità } m \text{ sia radicale,}$$

o immaginaria, nè l'una, nè l'altra comparirà nella serie, ma essa sarà interamente, e reale, e razionale; e perchè col dividerli i termini di questa serie per 2, lo che nasce dalla supposizione di $\frac{1+a}{2} + \frac{1+a}{2}$, si ha $1 + \frac{m^2a^2}{2} - \frac{m^2a^2}{2}$

$+ \frac{m^4+11m^2}{24}X^{a^4}$ ec., la qual serie risulta dalla serie (P) con levarci i termini, in cui entrano le potestà impari di m , quindi si vede come si possa avere immediatamente la serie, che nasce da $\frac{1+a}{2} + \frac{1+a}{2}$. Se la data quantità complessa

farà $\frac{1+a^m}{1+a} - \frac{1+a^m}{1+a}$, per avere la serie, che da lei nasce, dovranno sottrarre i termini della serie (Q) dai termini della serie (P), nel qual modo si avrà una serie, i di cui termini includeranno le sole potestà impari di m , che è la seguente

$$2ma - ma^3 + \frac{m^3 + 2m}{3} \chi a^1 - \frac{m^3 - m}{2} \chi a^3 \text{ ec.}; \text{ per lo che se la quantità } m \text{ farà ra-}$$

dicale, o immaginaria, tutti i termini della serie saranno irrazionali, o immaginari:

Ma se la data quantità complessa fosse $\frac{1+a^m}{1+a} - \frac{1+a^m}{1+a}$, poichè in tal caso bisognerebbe dividere per m ciascun termine della serie, lo che la cambierebbe nella

$$\text{seguente } 2a - a^3 + \frac{m+2}{3} \chi a^1 - \frac{m-1}{2} \chi a^3 \text{ ec.}, \text{ però abbastanza si vede, come}$$

la serie, che nasce da $\frac{1+a^m}{1+a} - \frac{1+a^m}{1+a}$, comunque la quantità m sia o radicale,

o immaginaria, la serie nulla contiene o di irrazionale, o d'immaginario. Se in ol-

tre la proposta quantità complessa farà $\frac{1+a^m}{1+a} - \frac{1+a^m}{1+a}$, la serie, che da lei

nascerà, farà uguale a tutti quei termini della serie (P) divisi per m , ne quali la quantità m si trova inalzata a potestà impari. La cosa è chiara per se stessa, nulladimeno veniamo all'esempio. Dovendosi ridurre in serie la quantità complessa

$$\frac{\sqrt{3}}{1+a} + \frac{-\sqrt{3}}{1+a}, \text{ si avrà } 2+3a^2-3a^4+\frac{21}{6}a^6 \text{ ec. Se la quantità da ri-}$$

durfi in serie fosse $\frac{\sqrt{3}}{1+a} + \frac{-\sqrt{3}}{1+a}$, la serie farebbe $2-3a^2+3a^4-2a^6 \text{ ec.}$

Parimente dalla quantità $\frac{\sqrt{3}}{1+a} - \frac{-\sqrt{3}}{1+a}$ nasce la serie $2a-a^3+\frac{5}{3}a^5-2a^7 \text{ ec.};$

e dalla quantità $\frac{\sqrt{3}}{1+a} - \frac{-\sqrt{3}}{1+a}$ si ottiene la serie $2a-a^3-\frac{1}{3}a^5+a^7 \text{ ec.}$

822. Nelle precedenti formole la quantità a può essere razionale, o irrazionale, o immaginaria, intera, o fratta, positiva, o negativa, secondo i quali casi particolari nasceranno diverse serie razionali, o irrazionali, reali, o immaginarie. E qui si osservi, che acciò una serie sia immaginaria, basta che fra i suoi termini ve ne sia un solo immaginario, lo che concorda con ciò, che di sopra si è detto delle quantità miste di reali, e d'immaginarie.

823. Nascono in secondo luogo le serie dalle frazioni, quando cioè non si può fare una proposta divisione esattamente. In diverse maniere si può svolgere in serie una data frazione. La prima si eseguisce mediante l'ordinaria regola della divisione, con dividere il numeratore della frazione pel denominatore, indi dividere di nuovo il residuo collo stesso denominatore, e così di mano in mano, osservando sem-

sempre nelle sottrazioni, moltiplicazioni, e divisioni le leggi de' segni. Non è poi necessario produrre in infinito queste divisioni, ma basta continuarle per tanti termini, finchè si scuopra la legge, colla quale tendono all'infinito i termini della serie, lo che pure ha luogo e nelle sopra esposte evoluzioni delle potenze di un binomio, e nell'invenzione di qualunque altra serie. Debba si svolgere in una serie la

frazione $\frac{d}{c+e}$: Comincio a dividere il numeratore d per la prima parte c del de-

nomiatore, e il quoziente $\frac{d}{c}$ farà il primo termine della serie; moltiplico poscia al solito giusta la regola della divisione questo quoziente nel divisore $c+e$, e ne sottraggo il prodotto $d + \frac{de}{c}$ dal dividendo d , e mi viene di residuo $-\frac{de}{c}$, che in secondo luogo divido per la prima parte del denominatore $c+e$, lo che fatto nasce di quoziente $-\frac{de}{c^2}$, che deve essere il secondo termine della serie. Si moltip-

chi questo quoziente pel denominatore, o sia divisore $c+e$, e il prodotto $-\frac{de}{c} - \frac{de^2}{c^2}$ si sottragga dal residuo $-\frac{de}{c}$, e ne verrà di residuo $+\frac{de^2}{c^2}$, che devesi in terzo luogo

dividere per la prima parte c del denominatore $c+e$, dalla qual divisione si ha $\frac{de^2}{c^3}$

per quoziente, che farà il terzo termine della serie. Siccome poi da questa divisione nasce un nuovo residuo, e così in seguito, non potendosi mai fare la divisione perfettamente, quindi egli è chiaro, che l'operazione va all'infinito, conseguentemente il ricercato quoziente sarà una serie infinita, i di cui termini sono altrettante frazioni, che hanno per numeratore la quantità d moltiplicata nelle potestà di e , i di cui esponenti sono minori di una unità del numero esprimente il loro posto, e per denominatore hanno le potestà di c , i di cui esponenti sono uguali al numero denotante il loro posto. Scoperta essendosi pertanto questa legge si potrà facilmente, senza continuare la divisione, proseguire la serie, che sarà

$\frac{d}{c} - \frac{de}{c^2} + \frac{de^2}{c^3} - \frac{de^3}{c^4} + \frac{de^4}{c^5} - \frac{de^5}{c^6} + \text{ec.}$, la qual serie si esprimerà anche nel modo

seguente $\frac{d}{c} \times 1 - \frac{e}{c} + \frac{e^2}{c^2} - \frac{e^3}{c^3} + \frac{e^4}{c^4} - \frac{e^5}{c^5} + \frac{e^6}{c^6} \text{ ec.}$ Ecco il calcolo

Divifore $c + e$	Dividendo d
	$d + \frac{de}{c}$
	$\frac{de}{c}$
	$\frac{de}{c} \quad \frac{de^2}{c^2}$
	$+ \frac{de^2}{c^2}$
	$+ \frac{de^2}{c^2} + \frac{de^3}{c^3}$
	$- \frac{de^3}{c^3}$
	$- \frac{de^3}{c^3} + \frac{de^4}{c^4}$
	$+ \frac{de^4}{c^4}$
	$+ \frac{de^4}{c^4} + \frac{de^5}{c^5}$
	$- \frac{de^5}{c^5} \quad \text{ec.}$

Quoz. $\frac{d}{c} - \frac{de}{c^2} + \frac{de^2}{c^3} - \frac{de^3}{c^4} + \frac{de^4}{c^5} - \frac{de^5}{c^6} + \frac{de^6}{c^7} - \text{ec.}$

824. Se la frazione fosse stata $\frac{d}{c - e}$, ne sarebbe venuta la seguente serie
 $\frac{d}{c} + \frac{de}{c^2} + \frac{de^2}{c^3} + \frac{de^3}{c^4} + \frac{de^4}{c^5} + \frac{de^5}{c^6} \text{ ec.}$

825. Nelle frazioni, che s'volgonfi in serie quattro cose devonfi offerbare relativamente alle serie, che indi ne nascono: Primieramente che, acciò una frazione si possa svolgere in serie, il di lei denominatore deve essere diviso in due parti: In secondo luogo, che se di queste due parti la prima sarà maggiore della seconda, cioè $c > e$ rispetto alla frazione $\frac{d}{c \pm e}$, la serie, che ne nascerà sarà decrescente all' infinito, o sia sarà convergente, e quanto più la prima parte c sarà maggiore di e ,
tan-

tanto più la serie si farà convergente, lo che si scorge dalla serie medesima, ne' di cui termini i denominatori vanno continuamente crescendo sopra i numeratori, mentre il contrario succede quando è $e < c$; e però in terzo luogo quando la prima parte del denominatore è minore della seconda cioè $e < c$, i termini della serie andranno continuamente crescendo, conseguentemente essa farà divergente, mentre quanto più si prolunga la divisione, sempre avanza un termine maggiore all' infinito da dividersi, che è sempre l'ultimo termine della serie. Per altro queste serie, qualora si voglia, si potranno rendere convergenti, niente altro per ottenere ciò richiedendosi, che mutar luogo alle parti del denominatore della frazione mettendo in primo luogo quella, che era in secondo, lo che non altera il valore della frazione. Essendo dunque $c < e$, la frazione si dovrà disporre così $\frac{d}{c+e}$, da cui nasce la

serie convergente $\frac{d}{c} - \frac{de}{c^2} + \frac{dc^2}{c^3} - \frac{dc^3}{c^4} + \frac{dc^4}{c^5} -$ ec. Essendo data una serie divergente si troverà facilmente la frazione, dalla quale essa è nata mediante la seguente analogia: Come sta la differenza tra il primo termine, e il secondo al primo, così lo stesso primo sta alla frazione cercata. Per Esempio essendo data la serie divergente $\frac{d}{c} - \frac{de}{c^2} + \frac{dc^2}{c^3} - \frac{dc^3}{c^4}$ ec. si avrà la frazione, dalla quale essa nasce, con fare

$$\frac{d}{c} - \frac{de}{c^2} : \frac{d}{c} :: \frac{d}{c} : \frac{d}{c} \text{ al quarto, che è } \frac{\frac{d^2}{c^2}}{\frac{cd + de}{c^2}} = \frac{d^2}{cd + de} = \frac{d}{c+e}, \text{ che è}$$

la frazione cercata.

826. Finalmente se la prima parte del denominatore della frazione sarà uguale alla seconda, cioè $c=e$, si avrà una serie d' infiniti termini tutti uguali a $\frac{d}{c}$, vale a dire si avrà $\frac{d}{c+e} = \frac{d}{c} - \frac{d}{c} + \frac{d}{c} - \frac{d}{c} + \frac{d}{c} - \frac{d}{c}$ ec., ch'è una serie parallela, la quale in qualunque termine (pel num. 809.) dista egualmente dal vero valore, la quale loro proprietà ci serve di scorta a poterle tradurre in qualche maniera ad uso, mentre la metà di un qualunque loro termine, che deve considerarsi affetto dallo stesso segno, dal quale è affetto il primo termine della serie, dà il vero valore della serie. Se poi la frazione da svolgersi in serie farà $\frac{d}{c-e}$, la serie, che ne verrà, sarà $\frac{d}{c} + \frac{d}{c} + \frac{d}{c} + \frac{d}{c} + \frac{d}{c}$ ec., i di cui termini sono tutti uguali, e positivi, e perciò la serie andrà continuamente crescendo all' infinito, e ci darà pel valore della proposta frazione un quoziente infinito, lo che di fatto corrisponde al valore della stessa frazione, che a motivo di $c=e$ è $\frac{d}{0}$, cioè infinito, avvegnachè la divisione sia un' esame di contenenza, e il nulla si contenga infinite volte in una quantità finita.

827. Si debba per esempio ridurre in serie la frazione $\frac{1}{3}$: Per poter ciò fare

bisogna (giusta il num. 825.) dividere in due parti il denominatore, ma se si farà $\frac{1}{1+2}$, ne verrà una serie divergente (giusta il num. 825.): di fatti si sostituisca nella serie $\frac{d}{c} - \frac{de}{c^2} + \frac{de^2}{c^3} - \frac{de^3}{c^4} + \frac{de^4}{c^5}$ ec. del num. 823. 1 in luogo di d , 1 in luogo di c , e 2 in vece di e , con che la serie diverrà $1-2+4-8+16-32$ ec., nella quale il primo termine 1 supera la data frazione $\frac{1}{3}$ di $\frac{2}{3}$; due termini sono minori della stessa frazione $\frac{1}{3}$ di $\frac{4}{3}$; tre termini la superano di $\frac{8}{3}$, quattro termini gli sono minori di $\frac{16}{3}$ ec. Dunque questi aumenti, e decrementi non sono niente altro, che il susseguente termine della serie diviso per il denominatore della frazione, conseguentemente qualora si voglia, che la serie finisca in un certo termine, per avere il vero valore, da cui nasce la serie, debbesi aggiungere all'ultimo preso termine della serie, se egli è negativo, o vi si deve levare, se è positivo, il susseguente termine diviso pel denominatore della frazione: Come volendo che la serie termini nel quinto termine $+16$, per avere il vero valore bisognerà levarci $\frac{32}{3}$, onde si abbia $\frac{1}{1+2} = 1-2+4-8+16 - \frac{32}{3}$. Se la frazione da svolgersi in serie fosse $\frac{1}{1-2}$ col sostituire nella serie generale i valori numerici alle lettere si avrebbe questa serie $1+2+4+8+16$ ec., che è tutt'affatto divergente, e che in niun'altra maniera si può correggere, se non con cambiare posto alle parti del denominatore, scrivendo la frazione così $\frac{1}{-2+1}$, dalla quale, fatte le debite sostituzioni nella serie generale, nasce la seguente serie $-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{32}$ ec. $= -\frac{1}{-2+1}$. Parimente acciocchè la serie, che nasce dalla frazione $\frac{1}{3}$ sia convergente, bisogna disporre la frazione così $\frac{1}{2+1}$, da cui si ha la serie $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \frac{1}{32} - \frac{1}{64}$ ec. Dovendosi svolgere in serie la frazione $\frac{1}{2}$, e volendosi spezzare il di lei denominatore in numeri interi, non si può far altro che così $\frac{1}{1+1}$, da cui nasce questa serie parallela $1-1+1-1+1-1$ ec. di cui ho parlato al num. 809. Ma se si spezzerà il denominatore della frazione $\frac{1}{2}$ in due parti fratte, così $\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}$, si avrà la seguente serie convergente $\frac{2}{3} - \frac{2}{9} + \frac{2}{27} - \frac{2}{81} + \frac{2}{243}$ ec.

828. Finora ho considerato le frazioni, il di cui denominatore è un binomio,
ma

ma egli può essere ancora un trinomio, un quadrinomio ec., delle quali parliò dopo avere dato il secondo metodo di svolgere in serie una frazione.

829. Il secondo metodo pertanto di ridurre in serie una frazione è il seguente. Dovendosi svolgere in serie una frazione, si faccia esser uguale ad una serie a coefficienti indeterminati, quale è la seguente $A+Bx+Cx^2+Dx^3+Ex^4$ ec., la quale poscia si moltiplichi pel denominatore della frazione, nel qual modo questo prodotto sarà uguale al numeratore. Per avere poi i valori delle assunte indeterminate A, B, C, D ec. si facciano uguali a zero i coefficienti dei termini del detto prodotto, a riserva di altrettanti termini della serie, quanti sono i termini del numeratore della proposta frazione, de' quali hanli a paragonare i rispettivamente corrispondenti. Debba per esempio svolgere in serie la frazione $\frac{d}{c+ex}$, si faccia $\frac{d}{c+ex} = A+Bx+Cx^2+Dx^3+Ex^4+Fx^5+Gx^6$ ec. Si moltiplichi poscia questa equazione pel denominatore $c+ex$ della frazione, lo che fatto si avrà

$$d = Ac + Bcx + Ccx^2 + Dcx^3 + Ecx^4 + Fcx^5 + Gcx^6 \text{ ec.} \\ + Aex + Bex^2 + Cex^3 + Dex^4 + Eex^5 + Fex^6 \text{ ec.}$$

Ora si paragoni il primo termine di questa serie col numeratore d , poscia si uguagli a zero i coefficienti degli altri termini, con che si avrà $Ac=d$, $Bc+Ac=0$, $Cc+Be=0$, $Dc+Ce=0$, $Ec+De=0$ ec. Dal primo paragone si ha $A = \frac{d}{c}$;

dal secondo $B = -\frac{Ae}{c}$, che col farsi la sostituzione del valore di A è $B = -\frac{de}{c^2}$;

dal terzo $C = -\frac{Be}{c}$, cioè $C = +\frac{de^2}{c^3}$; dal quarto $D = -\frac{Ce}{c}$, vale a dire

$D = -\frac{de^3}{c^4}$; dal quinto $E = -\frac{De}{c}$, o sia $E = +\frac{de^4}{c^5}$ ec. La serie adunque, che

nasce dalla frazione $\frac{d}{c+ex}$ è $\frac{d}{c} - \frac{dex}{c^2} + \frac{de^2x^2}{c^3} - \frac{de^3x^3}{c^4} + \frac{de^4x^4}{c^5}$ ec. Basta poi offer-

vare i ritrovati coefficienti $A = \frac{d}{c}$, $B = -\frac{Ae}{c}$, $C = -\frac{Be}{c}$, $D = -\frac{Ce}{c}$, $E = -\frac{De}{c}$ ec. per accorgersi, che la ritrovata serie è una serie ricorrente del primo

ordine, di cui ciascun termine nasce dal precedente moltiplicato in $-\frac{e}{c}$. Se dalla data frazione si vorrà ricavare una serie, i di cui termini sian divisi per x , e per le sue potestà (cioè poi avrà luogo solamente in caso, che sia $x > \frac{e}{c}$, affinchè la serie possa essere convergente), bisognerà disporre la frazione, e la serie generale così $\frac{d}{cx+c} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x^4} + \frac{E}{x^5} + \frac{F}{x^6}$ ec., indi moltiplicare la serie nel denominatore della frazione, con che si avrà

$$d =$$

$$d = Ae + \frac{Be}{x} + \frac{Ce}{x^2} + \frac{De}{x^3} + \frac{Ee}{x^4} + \frac{Fe}{x^5} \text{ ec.}$$

$$+ \frac{Ac}{x} + \frac{Bc}{x^2} + \frac{Cc}{x^3} + \frac{Dc}{x^4} + \frac{Ec}{x^5} \text{ ec.}$$

e mediante il paragone dei coefficienti dei termini si ricavano i valori delle indeterminate A, B, C, D, come si è fatto di sopra, cioè $A = \frac{d}{e}$, $B = -\frac{Ac}{e}$, $C = -\frac{Be}{e}$, $D = -\frac{Cc}{e}$, $E = -\frac{De}{e}$, $F = -\frac{Ee}{e}$ ec., e rimettendo continuamente i ritrovati valori, si avrà finalmente $\frac{d}{ex+c} = \frac{d}{ex} - \frac{dc}{e^2x^2} + \frac{dc^2}{e^3x^3} - \frac{dc^3}{e^4x^4} + \frac{dc^4}{e^5x^5} \text{ ec.}$, o

$$\text{fia } \frac{d}{ex+c} = \frac{d}{ex} \times 1 - \frac{c}{ex} + \frac{c^2}{e^2x^2} - \frac{c^3}{e^3x^3} + \frac{c^4}{e^4x^4} - \frac{c^5}{e^5x^5} + \frac{c^6}{e^6x^6} \text{ ec.}$$

830. Eguale si opererà se il denominatore della frazione sarà un trinomio, quadrinomio ec. Si debba per esempio ridurre in serie la frazione $\frac{b+dx^2}{a+cx+ex^2+ix^3}$. Si assuma la serie generale $A+Bx+Cx^2+Dx^3$, ec. cui si faccia uguale la data frazione, poscia si moltiplichino l'uno, e l'altro membro di questa equazione pel denominatore della frazione, e si avrà

$$b+dx^2 = Aa + aBx + aCx^2 + aDx^3 + aEx^4 + aFx^5$$

$$+ Acx + Bcx^2 + Ccx^3 + Dcx^4 + Ecx^5$$

$$+ Aex^2 + Bex^3 + Cex^4 + Dex^5$$

$$+ Aix^3 + Bix^4 + Cix^5 \text{ ec.}$$

Ora si faccia il paragone dei termini a fine di avere i valori delle affinte indeterminate A, B, C ec. Si paragoni pertanto il primo termine del numeratore col primo termine della serie, perchè sono tutti due quantità costanti, e ne verrà $A = \frac{b}{a}$. Il secondo termine del numeratore, perchè è moltiplicato in x^2 , non si può uguagliare, che al coefficiente del terzo termine della serie, che pure è moltiplicato in x^2 ; che però il coefficiente del secondo termine della serie si uguagli a zero, e si avrà $aB + Ae = 0$, conseguentemente $B = -\frac{Ac}{a}$. Si paragoni al secondo termine del numeratore il terzo termine della serie, e si avrà $d = aC + Be + Ae$, quindi $C = \frac{d - Be - Ae}{a}$; uguagliando poi a zero i rimanenti termini della serie, si otterrà $aD + Cc + Be + Ai = 0$, cioè $D = -\frac{Cc - Be - Ai}{a}$, $aE + Dc + Ce + Bi = 0$, vale a

di-

dire $E = -\frac{De - Ce - Bi}{a}$, $aF + Ec + De + Ci = 0$, e però $F = -\frac{Ec - De - Ci}{a}$ ec.

Che se si sostituiranno successivamente i ritrovati valori delle lettere A, B, C ec., si avrà finalmente la ricercata serie, nella quale si svolge la frazione

$$\frac{b+dx^3}{a+cx+cx^3+ix^3}, \text{ che è } \frac{b}{a} - \frac{bcx}{a^2} + \frac{a^3d+bc^2-abc}{a^3} \chi x^3 \\ + \frac{2acx^2 - a^2cd - a^2ci - bc^2}{a^4} \chi x^3 + \frac{a^3c^2d + 2a^2bc^2 + a^2d^2 - a^3de - 2ac^2c^2 + a^2bc^2}{a^5} \chi x^3 \text{ ec.}$$

831. Quando il termine ix^3 del denominatore della frazione sia maggiore degli altri, si dovrà disporre la frazione così $\frac{dx^3+b}{ix^3+cx^3+cx+a}$, con che la serie, che se ne avrà sarà della seguente forma $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x^4}$, e così sarà convergente.

832. Osservando i ritrovati coefficienti $A = \frac{b}{a}$, $B = -\frac{Ac}{a}$, $C = \frac{d-Bc-Ac}{a}$
 $D = -\frac{Ce-Bc-Ai}{a}$, $E = -\frac{De-Ce-Bi}{a}$, $F = -\frac{Ec-De-Ci}{a}$ ec., si scuopre ab-

bastanza, che la ritrovata serie è una serie ricorrente del terzo ordine. Generalmente poi il grado della formola, che serve di denominatore alla frazione darà l'ordine della serie ricorrente, in cui si svolge la stessa frazione. Ma acciò la serie ricorrente cominci immediatamente, e continui collo stesso ordine, fa di mestiere, che la x abbia minor esponente nel numeratore, che nel denominatore, altrimenti se la x avrà uguale, o maggiore esponente nel numeratore, che nel denominatore, si perturberà l'ordine della serie in quel termine, che contiene la x elevata allo stesso esponente, che nel numeratore della frazione, dopo il qual termine proseguirà

essa ordinatamente: Come se la frazione fosse $\frac{b+dx^4}{a+cx+cx^2}$, dalla quale deve nascere una serie ricorrente del secondo ordine, essa si altererà nel quarto termine, dopo il quale procederà invariabilmente, come si potrà vedere facendone il calcolo, con cui si ha la seguente serie $A = \frac{b}{a}$, $B = -\frac{Ac}{a}$, $C = -\frac{Bc-Ac}{a}$, $D = -\frac{Ce-Bc}{a}$,

$E = \frac{d-De-Cc}{a}$, $F = -\frac{Fc-De}{a}$, $G = -\frac{Ec-Ec}{a}$ ec., il di cui quinto termine, che

deve essere moltiplicato in x^4 , esce dall'ordine degli altri. In questi casi a fine di avere una serie ricorrente, che collo stesso ordine proceda dal primo fino all'ultimo termine, bisogna dividere il numeratore della frazione pel denominatore, finchè ne risulti per residuo una frazione, di cui la x nel numeratore abbia minor esponente,

che nel denominatore. Ne prendo l'esempio dalla frazione poc'anzi data $\frac{b+dx^4}{a+cx+cx^2}$, si divida il numeratore pel denominatore, finchè si abbia un tal residuo, che nel numeratore la x abbia minor esponente, che nel denominatore, e si avrà $\frac{dx^3}{c} -$

$$\frac{cdx}{e^2} + \frac{c^2d - ade}{e^2} = \frac{\frac{c^2d + 2acde}{e^2} \times x - \frac{ac^2d + a^2de}{e^2} + b}{ex^2 + cx + a}, \text{ indi col metodo esposto}$$

$$\text{si svolga in serie la frazione } = \frac{\frac{c^2d + 2acde}{e^2} \times x - \frac{ac^2d + a^2de}{e^2} + b}{ex^2 + cx + a}.$$

833. Lo stesso metodo ha luogo comunque l'esponente di x sia intero, o fratto; in questo secondo caso però devonvi usare alcune precauzioni necessarie per giungere al fine bramato. Quando adunque in una data frazione da svolgersi in serie gli esponenti della x saranno numeri fratti, bisognerà primieramente determinare la progressione aritmetica, la più semplice, che sia possibile, secondo la quale devono procedere gli esponenti fratti da darli alla x per ciascun termine della serie. Questa progressione poi deve esser tale, che comprenda fra' suoi termini tutti gli esponenti, che affettano i termini tanto del numeratore, come del denominatore della frazione. Se la serie cercata dovrà avere i suoi termini moltiplicati per x , la detta progressione aritmetica, i di cui termini devonvi assegnare ordinatamente per esponenti a ciascun termine della serie indeterminata, deve cominciare dal zero; ma se i termini della serie dovranno avere la x per denominatore, in tal caso la progressione aritmetica non dovrà cominciare dal zero, ma dal massimo esponente, che trovasi nel denominatore della frazione. Debba per esempio ridurre in serie la fra-

zione seguente $\frac{b + dx^{\frac{1}{4}}}{a + c^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} + x}$. Poichè la progressione aritmetica, che nel denomina-

tore formano gli esponenti è $0, \frac{1}{2}, 1$, nella quale non può cadere l'esponente $\frac{1}{4}$ del numeratore, però si deve ritrovare un'altra progressione, nella quale possano entrar tutti. A questo fine riduco le due frazioni $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ allo stesso denomina-

tore, che è 8, poscia dispongo la data frazione così $\frac{b^{\frac{8}{8}} + a^{\frac{8}{8}}x^{\frac{2}{8}}}{a^{\frac{8}{8}} + c^{\frac{4}{8}}x^{\frac{4}{8}} + x^{\frac{8}{8}}}$, i di cui

esponenti cadono tutti fra i termini della progressione aritmetica $0, \frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8}, \frac{8}{8}$, e questi saranno gli esponenti, che avrà la x nei termini della serie. In oltre nel denominatore della frazione devonvi supplire i termini, che mancano secondo l'ordine de' precedenti esponenti, moltiplicandoli per altro in zero, nel qual modo la frazione uguagliata alla serie indeterminata sarà

si spezzerà, faranno $\frac{1}{\gamma \times \delta - \gamma \times \varphi} + \frac{1}{\delta \times \gamma - \delta \times \varphi} + \frac{1}{\varphi \times \gamma - \varphi \times \delta}$, ognuna delle quali deve poi essere moltiplicata in a^1 .

836. Per certificarsi della verità della proposizione comincio da una frazione, il di cui denominatore abbia due soli fattori, per esempio $\frac{1}{\gamma \varphi}$, la quale (giusta il num. 835.) deve si spezzare nelle due seguenti $\frac{1}{\gamma \times \varphi - \gamma} + \frac{1}{\varphi \times \gamma - \varphi}$. Di fatto si cambino i segni al numeratore, e al denominatore di una di queste frazioni, come alla seconda (il che non altera la frazione pel num. 81.), e si avrà $\frac{1}{\gamma \times \varphi - \gamma} -$

$\frac{1}{\varphi \times \gamma - \varphi}$, le quali ridotte allo stesso denominatore danno $\frac{\varphi - \gamma}{\gamma \varphi \times \varphi - \gamma} = \frac{1}{\gamma \varphi}$, lo che si

doveva in primo luogo dimostrare. Sia in secondo luogo la frazione $\frac{1}{\gamma \delta}$, che deve

essere $= \frac{1}{\gamma \times \delta - \gamma \times \varphi} + \frac{1}{\delta \times \gamma - \delta \times \varphi} + \frac{1}{\varphi \times \gamma - \varphi \times \delta}$. Primieramente considero la fra-

zione $\frac{1}{\gamma \delta}$ così $\frac{1}{\gamma \delta} \times \frac{1}{\varphi}$. Spezzando giusta il num. 835. ne' suoi fattori la frazione

$\frac{1}{\gamma \delta}$, e moltiplicandoli per $\frac{1}{\varphi}$ si ha $\frac{1}{\gamma \varphi \times \delta - \gamma} + \frac{1}{\delta \varphi \times \gamma - \delta}$. Ora considerando

queste due frazioni nel modo seguente $\frac{1}{\delta - \gamma} \times \frac{1}{\gamma \varphi} + \frac{1}{\gamma - \delta} \times \frac{1}{\delta \varphi}$ si spezzino le due

frazioni $\frac{1}{\gamma \varphi}$, $\frac{1}{\delta \varphi}$, e quelle che nascono dalla prima moltiplicandole per $\frac{1}{\delta - \gamma}$;

quelle che nascono dalla seconda per $\frac{1}{\gamma - \delta}$, si avrà $\frac{1}{\gamma \times \varphi - \gamma \times \delta - \gamma} +$

$\frac{1}{\delta \times \varphi - \delta \times \gamma - \delta} + \frac{1}{\varphi \times \delta - \varphi \times \gamma - \varphi}$: Ma la seconda e la terza di queste

frazioni sommate insieme sono uguali ad $\frac{1}{\varphi \times \gamma - \varphi \times \delta - \varphi}$, o sia $\frac{1}{\varphi} \times \frac{1}{\gamma - \varphi \times \delta - \varphi}$,

poichè risultano dallo spezzarsi in due frazioni la frazione $\frac{1}{\gamma - \varphi \times \delta - \varphi}$ relativa-

mente ai due fattori del suo denominatore, indi moltiplicarle in $\frac{1}{\varphi}$. Dunque le fra-

frazioni nelle quali si spezza la data frazione sono $\frac{1}{\gamma \times \delta - \gamma \times \delta - \gamma} + \frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta}$
 $+ \frac{1}{\delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta}$.

837. Collo stesso discorso proseguendo si dimostrerà, che la frazione $\frac{1}{\delta \gamma \delta}$ si spezza nelle quattro seguenti $\frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta} + \frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta} +$
 $\frac{1}{\gamma \times \delta - \gamma \times \delta - \gamma \times \delta - \gamma} + \frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta}$ poichè considerando la frazione

$\frac{1}{\delta \gamma \delta}$ così $\frac{1}{\delta} \times \frac{1}{\gamma \delta}$, si spezzi come si è dimostrato al num. 836. la frazione $\frac{1}{\gamma \delta}$ in tre frazioni, ognuna delle quali si moltiplichì in $\frac{1}{\delta}$, e si avrà $\frac{1}{\delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta}$ +

$\frac{1}{\gamma \times \delta - \gamma \times \delta - \gamma} + \frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta}$, cioè $\frac{1}{\delta} \times \frac{1}{\gamma - \delta - \delta \times \delta - \delta} + \frac{1}{\gamma \delta} \times \frac{1}{\delta - \gamma - \delta \times \delta - \delta} +$
 $\frac{1}{\delta \delta} \times \frac{1}{\delta - \delta \times \gamma - \delta}$, e spezzando le tre frazioni $\frac{1}{\delta}$, $\frac{1}{\gamma \delta}$, $\frac{1}{\delta \delta}$ in altre da multi-

carsi ne' suoi corrispondenti fattori, ne verranno le seguenti $\frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta} +$
 $\frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta} + \frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta} +$
 $\frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta} + \frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta}$. Ma la seconda, la quarta, e la sesta di

queste sei frazioni si trovano uguali a $\frac{1}{\delta \times \delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta}$, o sia

$\frac{1}{\delta} \times \frac{1}{\delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta}$, poichè risultano dallo spezzarsi in tre frazioni la frazione

$\frac{1}{\delta - \delta \times \gamma - \delta \times \delta - \delta}$ relativamente ai tre fattori del suo denominatore, indi multi-

plicarle in $\frac{1}{\delta}$. Dunque le frazioni, nelle quali si spezza la data frazione $\frac{1}{\delta \gamma \delta}$ so-

$$\text{no } \frac{1}{\delta \lambda \delta - \delta \quad \lambda \gamma - \delta \quad \lambda \delta - \delta} + \frac{1}{\delta \lambda \delta - \delta \quad \lambda \gamma - \delta \quad \lambda \delta - \delta} + \frac{1}{\gamma \lambda \delta - \gamma \quad \lambda \delta - \gamma \quad \lambda \delta - \gamma} +$$

$$\frac{1}{\delta \lambda \delta - \delta \quad \lambda \delta - \delta \quad \lambda \gamma - \delta}$$

838. Egualmente si continui il raziocinio, e si vedrà che la frazione $\frac{1}{\delta \gamma \lambda \delta}$, il di cui denominatore ammette cinque fattori, si spezza nelle cinque seguenti

$$\frac{1}{\delta \lambda \delta - \delta \quad \lambda \gamma - \delta \quad \lambda \delta - \delta \quad \lambda \delta - \delta} + \frac{1}{\delta \lambda \delta - \delta \quad \lambda \gamma - \delta \quad \lambda \delta - \delta \quad \lambda \delta - \delta} +$$

$$\frac{1}{\gamma \lambda \delta - \gamma \quad \lambda \delta - \gamma \quad \lambda \delta - \gamma \quad \lambda \delta - \gamma} + \frac{1}{\lambda \delta - \lambda \quad \lambda \delta - \lambda \quad \lambda \gamma - \lambda \quad \lambda \delta - \lambda}$$

. Lo stesso si dica se il denominatore della frazione $\frac{1}{\delta \lambda \delta - \delta \quad \lambda \delta - \delta \quad \lambda \gamma - \delta \quad \lambda \delta - \delta}$ avrà sei, sette ec. fattori.

839. Se la data frazione avrà nel denominatore più fattori uguali, come se fosse $\frac{1}{\delta \delta \delta} = \frac{1}{\delta \delta \delta}$, nel qual caso operando al solito si avrebbe

$$\frac{1}{\delta \delta \delta} + \frac{1}{\delta \delta \delta} + \frac{1}{\delta \delta \delta}, \text{ delle quali equazioni le due ul-}$$

time hanno il zero in denominatore, perchè $\delta - \delta = 0$, e una quantità moltiplicata in zero rende zero, però per evitare in simili casi questo inconveniente bisognerà considerare la frazione, come se nel denominatore avesse un solo di que' fattori uguali, e così spezzarla col metodo esposto, lo che fatto, col prodotto de' denominatori ommessi si dovranno moltiplicare i denominatori delle frazioni spezzate: Così nell'

esempio addotto della frazione $\frac{1}{\delta \delta \delta}$ bisognerà considerarla in questo modo $\frac{1}{\delta \delta \delta}$,

che spezzata dà $\frac{1}{\delta \delta \delta} + \frac{1}{\delta \delta \delta}$, ognuna delle quali moltiplicata poscia in $\frac{1}{\delta}$

$$\text{diventa } \frac{1}{\delta \delta \delta} + \frac{1}{\delta \delta \delta}.$$

840. Se nel numeratore della frazione da spezzarsi si troverà l'incognita x elevata a uguale, o maggiore potenza, che nel denominatore, si dovrà primieramente (giusta il num. 832.) dividere tante volte il numeratore pel denominatore, finchè l'esponente della x nel numeratore sia minore, che nel denominatore, anzi qualora si tratti di spezzarsi in più frazioni una frazione, il di cui denominatore risulti da fattori di primo grado, non potrà essa avere la x in numeratore per la ragione del num. 832., ma tale numeratore dovrà essere di sole quantità cognitive, e tale si ren-

de-

derà mediante la divisione: Per altro questa operazione si potrà fare ancora dopo lo spezzamento rispetto a ciascuna frazione spezzata, nel qual modo ogni frazione si ridurrà a due parti, una intera, e l'altra fratta.

841. Nel modo detto pertanto spezzandosi la frazione $\frac{a^3}{x+a \times x-b \times x+c}$

proposta di sopra, essa si ridurrà alle seguenti $\frac{a^3}{x+a \times x-b-x-a \times x+c-x-a} +$

$\frac{a^3}{x-b \times x+a-x+b \times x+c-x+b} + \frac{a^3}{x+c \times x+a-x-c \times x-b-x-c}$, cioè

$\frac{a^3}{x+a \times x-b-a \times x-c-a} + \frac{a^3}{x-b \times x+a+b \times x+c+b} + \frac{a^3}{x+c \times x-a-c \times x-b-c}$. Spezzata poi che si sia una frazione, si ridurrà in serie nella maniera già data ciascuna delle spezzate, e così si eviteranno le serie ricorrenti degli ordini elevati.

842. Lo stesso farà il modo di operare, e la stessa pure farà la dimostrazione qualora i fattori del denominatore della frazione siano di secondo grado. Ne prendo l'esempio da una frazione a due fattori per non estendermi soverchiamente. Sia

la frazione $\frac{x}{x+a \times x+b}$, dico che essa si risolverà nelle due seguenti

$\frac{x}{x+a \times x+b-(x+a)^2} + \frac{x}{x+b \times x+a-(x+b)^2}$

Di fatto si cambino i segni al numeratore, e denominatore di questa seconda frazione, poscia si riducano esse al comune denominatore, e si avrà

$$\frac{-(x+b)^2 - (x+a)^2}{x+a \times x-(x+b)^2 \times x-(x+a)^2 \times x+b^2} = \frac{x}{x+a \times x+b}.$$

843. Nascono in terzo luogo le serie da quelle quantità, dalle quali non si può estrarre una cercata radice. Per levare queste quantità irrazionali dalla inconcepibile oscurità, con cui le circonda il vincolo radicale, e ridurle a espressioni intelligibili, e insieme effabili, si svolgono in serie, le quali prodotte all'infinito ci forniscono il loro vero valore. In due maniere si può svolgere in serie una quantità radicale, o col metodo comune di estrarre da una quantità una cercata radice, o per mezzo della formola Newtoniana usata di sopra. Cominciamo dal primo modo.

844. Debba si svolgere in serie la quantità radicale $\sqrt{a^2 \pm c^2}$. Si estraiga primieramente la radice quadrata dal primo termine a^2 , e si avrà a primo termine della serie; si alzi al quadrato questa radice, indi si sottragga dalla quantità data, lo che fatto si avrà di residuo $\pm c^2$. Si divida quello $\pm c^2$ per $2a$ doppio della radice

ce trovata, e il quoziente $\pm \frac{c^2}{2a}$ farà il secondo termine della serie. Con questo quoziente si moltiplichì $2a \pm \frac{c^2}{2a}$, e il prodotto $\pm c^2 + \frac{c^4}{4a^2}$ sottratto da $\pm c^2$ lascerà di residuo $-\frac{c^4}{4a^2}$, quale si divida pel primo termine del doppio della radice finora trovata, cioè per $2a$, e il quoziente $-\frac{c^4}{8a^3}$ darà il terzo termine della serie, con cui si moltiplichì $2a \pm \frac{c^2}{2a} - \frac{c^4}{8a^3}$, e il prodotto $-\frac{c^4}{4a^2} \mp \frac{c^6}{8a^4} + \frac{c^8}{64a^6}$ si levi dal residuo $-\frac{c^4}{4a^2}$, con che si avrà per nuovo residuo $\pm \frac{c^6}{8a^4} - \frac{c^8}{64a^6}$. Si divida di nuovo il primo termine di questo residuo pel primo termine del doppio della fin' ora trovata radice, e il quoziente $\pm \frac{c^6}{16a^5}$ farà il quarto termine della serie. Se in questo modo si proseguirà l'operazione; si potrà prostrarre la serie all' infinito, e però si avrà $\sqrt{a^2 \pm c^2} = a \pm \frac{c^2}{2a} - \frac{c^4}{8a^3} \pm \frac{c^6}{16a^5} - \frac{5c^8}{128a^7} \pm \text{ec.}$

845. Acciò la serie sia convergente deve essere $a^2 > c^2$; e se farà $a^2 < c^2$ la quantità radicale si dovrà disporre così $\sqrt{\pm c^2 + a^2}$; in caso poi che valga il segno inferiore, cioè sia $\sqrt{-c^2 + a^2}$, perchè la quantità è immaginaria, farà immaginaria anche la serie, che ne nascerà, la quale farà $c\sqrt{-1} + \frac{a^2}{2c\sqrt{-1}} + \frac{a^4}{8c^3\sqrt{-1}} + \frac{a^6}{16c^5\sqrt{-1}} + \frac{5a^8}{128c^7\sqrt{-1}} + \text{ec.}$ Se fosse $a^2 = c^2$, ne verrebbe la serie $a + \frac{a}{2} - \frac{a}{8} + \frac{a}{16} - \frac{5a}{128} + \text{ec.}$

846. Istessamente si operi se la quantità sotto al vincolo farà trinomia, quadrimonia ec.: Se poi la data quantità farà un radicale cubo, quadrato-quadrato ec., si faccia uso delle regole date per l'estrazione della radice cuba, quadrato-quadrato ec.

847. In secondo luogo si svolge una quantità radicale in serie mediante la formola Newtoniana $P^m + \frac{m}{1} AQ + \frac{m-1}{2} BQ + \frac{m-2}{3} CQ + \frac{m-3}{4} DQ + \frac{m-4}{5} EQ \text{ ec.}$ Ma per facilitare nel caso presente il calcolo delle frazioni, si sostituisca nella formola in vece dell'esponente m una frazione, come $\frac{m}{n}$, con che la

suddetta formola diverrà $P^{\frac{m}{n}} + \frac{m}{n} AQ + \frac{m-n}{2n} BQ + \frac{m-2n}{3n} CQ + \frac{m-3n}{4n} DQ + \text{ec.}$

848. Debbaſi ſvolgere in ſerie la quantità radicale $\sqrt[5]{c^5+c^4e-a^5}$, o ſia $\frac{1}{c^5+c^4e-a^5}^{\frac{1}{5}}$. Si ponga $P=c^5$, $Q=\frac{c^4e-a^5}{c^5}$, $m=1$, $n=5$, fatte le quali ſoſtitu-
zioni nella formola, ſi avrà

$$P^{\frac{m}{n}} = c^{\frac{5}{5}} = c = A.$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{c^4e-a^5}{5c^4} = B.$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{2c^8e^2+4a^5c^4e-2a^{10}}{25c^9} = C.$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = \frac{6c^{13}e^3-18a^5c^8e^2+18a^{10}c^4e-6a^{15}}{125c^{14}} \text{ ec.}$$

$$\text{Per lo che ſi avrà } \sqrt[5]{c^5+c^4e-a^5} = c + \frac{c^4e-a^5}{5c^4} - \frac{2c^8e^2+4a^5c^4e-2a^{10}}{25c^9} + \frac{6c^{13}e^3-18a^5c^8e^2+18a^{10}c^4e-6a^{15}}{125c^{14}} - \text{ec.}$$

849. Vale egualmente il metodo anche quando l'eſponente fratto è negativo.
Debbaſi per eſempio ſvolgere in ſerie la quantità $\frac{1}{\sqrt{a^2+c^2}}$, che è =

$$\frac{1}{a^2+c^2}^{\frac{1}{2}}: \text{ Si ponga } P=a^2, Q=\frac{c^2}{a^2}, \text{ o ſia } Q=c^2a^{-2} \text{ } m=-1, n=2, \text{ con che ſi avrà}$$

$$P^{\frac{m}{n}} = a^{-1} = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = -\frac{1}{2} c^2 a^{-3} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = +\frac{3}{8} c^4 a^{-5} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{5}{16} c^6 a^{-7} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = +\frac{35}{128} c^8 a^{-9} = E \text{ ec.}$$

$$\text{onde si ha } \frac{1}{a^3 + c^2} = a^{-3} - \frac{1}{2} c^2 a^{-5} + \frac{3}{8} c^4 a^{-7} - \frac{5}{16} c^6 a^{-9} +$$

$$\frac{35}{128} c^8 a^{-9} \text{ ec., o sia } = \frac{1}{a} - \frac{c^2}{2a^3} + \frac{3c^4}{8a^5} + \frac{5c^6}{16a^7} - \frac{35c^8}{128a^9} - \text{ec.}$$

850. Ognuno vede come si debba regolare per isvolgere in serie la quantità $\frac{\sqrt{a^2 \pm c^2}}{a \pm c}$, o la quantità $\frac{\sqrt{a \pm c^2}}{\sqrt{a \pm c}}$, mentre la prima essendo $\sqrt{a^2 \pm c^2} \times \sqrt{a \pm c}^{-1}$,

non altro devesi fare, che mediante la formola elevare $a^2 \pm c^2$ alla potenza $\frac{1}{2}$, e la quantità $a \pm c$ alla potenza -1 , indi moltiplicare tra loro (nel modo, che si dirà fra poco) le due serie, che ne nasceranno, lo che pure devesi fare rispetto alla seconda quantità $\frac{\sqrt{a \pm c^2}}{\sqrt{a \pm c}} = (a^2 \pm c^2)^{\frac{1}{2}} \times (a \pm c)^{-\frac{1}{2}}$

851. Da ciò si intende, che la stessa formola Newtoniana serve egualmente per isvolgere in serie una frazione razionale, come farebbe

$$\frac{b}{a \pm c}, \text{ la quale è } = b \times \sqrt{a \pm c}^{-1}.$$

852. Se la data quantità da svolgersi in serie farà tale, che vi si possa estrarre esattamente la radice cercata, la serie dopo aver dato il valore di questa radice procederà bensì all'infinito, ma con termini, che si distruggeranno vicendevolmente l'un l'altro.

853. Per venire all'esempio particolare, si debba svolgere in serie la quantità $\sqrt{5}$, che dispongo così $\sqrt{4+1}$. Si ponga $P=4$, $Q=\frac{1}{4}$, $m=1$, $n=2$, e si avrà

$$P^{\frac{m}{n}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2 = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{4} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{64} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = \frac{1}{512} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{5}{16384} = E \text{ ec.}$$

$$\text{e però si trova } 4 + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{64} + \frac{1}{512} - \frac{5}{16384} \text{ ec.}$$

ARTICOLO II.

Delle frazioni continue.

854. **F**razione continua è quella, il di cui denominatore ha due parti, una intera, e l'altra fratta, e di questa frazione parimente il denominatore è in parte intero, in parte fratto, e così in seguito. Il primo termine di queste frazioni continue può essere una quantità sì intera, come fratta. I numeratori delle frazioni o possono essere sempre gli stessi, o possono variare in ciascuna, lo che si dica ancora de' denominatori. Soggiungo qui alcuni esempi secondo questi diversi casi

I	II	III
$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 2+1 \\ \hline 2+1 \\ \hline 2+1 \\ \hline 2+1 \\ \hline 2+1 \\ \hline 2+1 \\ \hline 2 \text{ ec.} \end{array}$	$\begin{array}{r} 3+10 \\ \hline 3+10 \\ \hline 3+10 \\ \hline 3+10 \\ \hline 3+10 \\ \hline 3+10 \\ \hline 3 \text{ ec.} \end{array}$	$\begin{array}{r} 1+4 \\ \hline 1+9 \\ \hline 1+16 \\ \hline 1+25 \\ \hline 1+36 \\ \hline 1 \text{ ec.} \end{array}$

T. II.

Vv

Ge-

Generalmente esprimerò così una frazione continua

$$(A) \ a + \frac{p}{b + \frac{q}{c + \frac{r}{d + \frac{s}{e + \frac{t}{f \text{ ec.}}}}}}$$

855. Qualunque frazione continua si può ridurre a frazione comune, siccome qualsivoglia frazione comune, o decimale si può ridurre a frazione continua. Colla semplice regola di ridurre due frazioni allo stesso denominatore si ridurranno le frazioni continue a frazione comune, avvertendo che devesi cominciare l'operazione non dalla prima, ma dall'ultima frazione. Prendo l'esempio dalla precedente frazione (A), di cui si vogliono ridurre a frazione comune i primi termini

$$a + \frac{p}{b + \frac{q}{c}} : \text{Comincio a ridurre la parte } \frac{p}{b + \frac{q}{c}}, \text{ e mi viene } \frac{pc}{bc + q},$$

che col primo termine è $a + \frac{pc}{bc + q}$, e questa frazione ridotta di nuovo al comune denominatore trovasi essere $\frac{abc + aq + pc}{bc + q} = a + \frac{p}{\frac{b + q}{c}}$. Volendo ridurre

a frazione comune i primi termini $a + \frac{p}{b + \frac{q}{c + \frac{r}{d}}}$, comincio a ridurre al comune denominatore la frazione

$$\frac{q}{c + \frac{r}{d}}, \text{ e ne ho } \frac{dq}{cd + r}, \text{ poscia riduco}$$

$$\frac{p}{b + \frac{q}{c + \frac{r}{d}}}, \text{ con che ritrovo } \frac{cdp + pr}{cbd + cr + dq}, \text{ poscia riduco}$$

$$a + \frac{cdp + pr}{cbd + cr + dq}, \text{ ed ho finalmente } \frac{abcd + abr + adq + cdp + pr}{cbd + br + dq}.$$

Lo stesso metodo si potrebbe tenere per ridurre a frazione comune una frazione continua comunque prolungata: Ma coll'osservare l'ordine dei termini, da' quali si com-

compongono queste frazioni comuni ricavate da frazioni continue, si è ravvivata una regola per formare a dirittura quelle frazioni comuni indipendentemente dalla riduzione allo stesso denominatore. La regola è tale che mediante l'essere date due di queste frazioni si trova la seguente, e così sempre in poi. Si prenda per la prima di queste frazioni $\frac{1}{0}$ (questa frazione ad altro non serve, che per trovare

la frazione $\frac{ab+p}{b}$, e però far valere la regola pel primo termine), per la secon-

da $\frac{a}{1}$: Sopra queste due frazioni, e sopra le altre, che di mano in mano si andranno trovando, si scrivano per ordine, cominciando dal primo termine a , i denominatori delle frazioni continue, e corrispondentemente al di sotto vi si scrivano i numeratori, come qui si vede.

a	b	c	d	e	
$\frac{1}{0}$	$\frac{a}{1}$	$\frac{ab+p}{b}$	$\frac{abc+aq+pc}{bc+q}$	$\frac{abcd+abr+adq+cdp+pe}{bcd+br+dq}$	ec.
p	q	r	s	t	

Ciò fatto, per avere il numeratore di una qualsivoglia frazione ridotta si prenderà l'aggregato del numeratore dell'ultima precedente frazione moltiplicato nella lettera, che gli sta di sopra, e del numeratore della penultima moltiplicato nella lettera, che gli sta di sotto; e per avere il denominatore si prenderà l'aggregato del denominatore della frazione ultima precedente moltiplicato nella lettera, che gli sta di sopra, e del denominatore della penultima moltiplicato nella lettera, che gli sta di sotto.

856. Queste frazioni comuni, che si sono dedotte dalle frazioni continue, si chiamano le loro equivalenti. Per avere il vero valore di una frazione continua bisognerà prendere l'ultima frazione equivalente, mentre, le precedenti non danno, che un valore prossimo, il quale tanto più si fa esatto, quanto più la presa frazione equivalente si accosta all'ultima.

857. Avendo dato il modo di ridurre una frazione continua a frazione comune, dirò adesso come si possa ridurre una frazione comune a frazione continua.

Sia data la frazione comune $\frac{a}{b}$, nella quale suppongo $a > b$, che però ella è una frazione impropria: Si divida il numeratore a pel denominatore b , onde si abbia di quoziente β , e di residuo c ; con quello residuo c , che è minore del divisore b , si divida lo stesso divisore, e ne venga di quoziente δ col residuo d ; di poi con questo residuo d si divida il divisore c , e il quoziente sia e col residuo e , e così in poi si continui l'operazione finchè la divisione del divisore pel residuo si faccia esattamente senza alcun avanzo, osservando lo stesso modo d'operare, che si pratica per trovare il massimo comun divisore tra due quantità (giusta il num. 217.) Ecco il Calcolo, in cui le lettere β, δ, e, g , ec. esprimono i quozienti, e le lettere, c, d, e, f, g ec. esprimono i residui.

Quoz.	Refidui	
$\frac{a}{b}$	β	c
$\frac{b}{c}$	d	e
$\frac{c}{d}$	1	e
$\frac{d}{e}$	ν	f
$\frac{e}{f}$	γ	g ec.

}
dunque

$\frac{a}{b} = \beta + \frac{c}{b} \quad I$

$\frac{b}{c} = d + \frac{e}{c} \quad II$

$\frac{c}{d} = 1 + \frac{e}{d} \quad III$

$\frac{d}{e} = \nu + \frac{f}{e} \quad IV$

$\frac{e}{f} = \gamma + \frac{g}{f} \quad V$

Ma dalla frazione II si ha $\frac{b}{d + \frac{e}{c}} = 1$, cioè $\frac{b}{d + \frac{e}{c}} = c$, e finalmente $\frac{1}{d + \frac{e}{c}} = \frac{c}{b}$ (A). Per la stessa ragione dalla frazione III si ha $\frac{1}{1 + \frac{e}{d}} = \frac{d}{c}$ (B). Dalla frazione IV si ha $\frac{1}{\nu + \frac{f}{e}} = \frac{e}{d}$ (C); e dalla frazione V si ha $\frac{1}{\gamma + \frac{g}{f}} = \frac{f}{e}$. Quindi nella frazione I. sostituendo il poc' anzi ritrovato valore (A) in luogo di $\frac{c}{b}$, e nella frazione (A) sostituendo in vece di $\frac{d}{c}$ il suo valore (B), così nella frazione (B) rimettendo il valore (C) in cambio di $\frac{e}{d}$ ec., si avrà finalmente la ricercata frazione continua uguale alla data frazione $\frac{a}{b}$, come segue

$$\frac{a}{b} = \beta + \frac{1}{d + \frac{1}{1 + \frac{1}{\nu + \frac{1}{\gamma \text{ ec.}}}}}$$

857. Riduciamo il metodo esposto a un esempio numerico. Si debba ridurre a frazione continua la frazione comune $\frac{3425}{1148}$. Faccio la divisione del numeratore pel de-

denominatore, poscia divido il divisore pel residuo, e di nuovo il divisore pel residuo, e così continuamente fino in ultimo; Queste divisioni indicate si vedano in D, e i corrispondenti quoti coi residui divisi pel divisore si vedano in E

D	E
$\frac{3425}{1148}$	$= 2 + \frac{1129}{1148}$
$\frac{1148}{1129}$	$= 1 + \frac{19}{1129}$
$\frac{1129}{19}$	$= 59 + \frac{8}{19}$
$\frac{19}{8}$	$= 2 + \frac{3}{8}$
$\frac{8}{3}$	$= 2 + \frac{2}{3}$
$\frac{3}{2}$	$= 1 + \frac{1}{2}$
$\frac{2}{1}$	$= 2$

Fatto questo preparativo si avrà giusta il numero precedente la cercata frazione continua uguale alla data $\frac{3425}{1148}$, che trovasi essere

$$\frac{3425}{1148} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{59 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}}}$$

Giusta il num. 855. si riduca questa frazione continua a frazione comune, e si troverà appunto uguale alla data frazione $\frac{3425}{1148}$.

858. Se la data frazione comune $\frac{a}{b}$ da svolgersi in frazione continua fosse stata frazione propria, cioè se fosse stato $a < b$, in tal caso si sarebbe dovuto cominciare dal dividere il denominatore pel numeratore.

Una cosa qui si offervi, che se una data frazione continua si ridurrà a frazione equivalente, e lo stesso si ripeta con omettere l'ultimo termine, o frazione della fra-

frazione continua, indi si sottragga questa frazione dalla precedente, trascurando poscia il comune denominatore, il residuo sarà ± 1 . Così la frazione continua

$$2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{59 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}}}$$

ridotta a frazione equivalente è $\frac{3425}{1148}$. Ora della precedente frazione continua si

ometta l'ultimo termine, o frazione $\frac{1}{2}$ e si riduca a frazione equivalente solamente la frazione

$$2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{59 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1}}}}}$$

e si avrà $\frac{1262}{423}$. Si faccia $\frac{3425}{1148} - \frac{1262}{423}$, e fatta la riduzione allo stesso denominatore, che poscia si trascura, si ottiene $1448775 - 1448776 = -1$. Questo pertanto è il modo, al quale ho rimesso al num. 439, con cui, data una frazione qualunque, se ne trova un'altra, che sottratta dalla proposta, e trascurato il comune denominatore, lascia un residuo $= \pm 1$: Si deve cioè ridurre a frazione continua la frazione data, indi ridurre a frazione equivalente tale frazione continua mutilata dell'ultimo termine, e questa frazione equivalente sarà la ricercata. Così al sopradetto num. 439 si è presa la frazione $\frac{14}{25}$ da sottrarsi da $\frac{33}{59}$: Ma questa frazione $\frac{14}{25}$ si trova con ridurre a frazione continua la frazione $\frac{33}{59}$, che è

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}}}}$$

di cui si ometta l'ultimo termine $\frac{1}{2}$, onde resti

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}}$$

la di cui frazione equivalente è appunto $\frac{14}{25}$.

La verità di questa osservazione si può dimostrare con assumere una frazione continua indeterminata, per esempio

$$a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d}}} \text{ ec.}$$

dalla quale si deducono le seguenti frazioni comuni

I. $\frac{ab+1}{b}$; II. $\frac{abc+a+c}{bc+1}$; III. $\frac{abcd+ab+ad+cd+1}{bcd+b+d}$ ec. Dalla prima si sottra-

ga la seconda, e omettendo il comune denominatore, si avrà $ab^2c+bc+ab+1-ab^2c-ab-bc=1$. Dalla seconda si sottragga la terza, e si avrà $ab^2c'd+2abcd+bc^2d+ab^2c+ab+bc+ad+cd-ab^2c'd-2abcd-bc^2d-ab^2c-ab-bc-ad-cd=1$ ec.

Dal che si vede, che le frazioni comuni, le quali si deducono dalle frazioni continue sono sempre ridotte ai loro minimi termini.

859. E' facile il riflettere, che se la frazione equivalente farà una frazione propria, il primo termine della frazione continua farà sempre una frazione, e solamente in caso, che la frazione equivalente sia impropria, la frazione continua comincerà da una quantità intera.

860. Vengo ora alla maniera di ridurre una frazione continua in serie. A questo fine comincio ad osservare, che fatta uguale ad x una frazione continua, come la seguente

$$a + \frac{p}{b + \frac{q}{c + \frac{r}{d + \frac{s}{e}}}} \text{ ec.}$$

il primo termine a , poichè diminuito della rimanente frazione, colla quale per ipotesi è uguale ad x , dovrà così solitario essere minore di x , cioè $a < x$;

ma $a + \frac{p}{b} = \frac{ab+p}{b} > x$, perchè il denominatore della frazione $\frac{p}{b}$ si trova diminuito della seguente frazione continua, la quale supposta $= x$ renderebbe $a + \frac{p}{b+x} = x$, conseguentemente dovrà essere $a + \frac{p}{b} > x$: Parimente

$$a+p$$

$$a + \frac{p}{b + \frac{q}{c}} = \frac{abc + aq + pc}{bc + q} < x, \text{ perchè il denominatore della frazione } \frac{q}{c}$$

essendo diminuito della residua susseguente frazione continua, egli è perciò minore del giusto, quindi è, che la frazione $\frac{q}{c}$ diventa maggiore del giusto, conseguentemente il suo numeratore q si fa rispettivamente maggiore del giusto; ma essendosi egli fatto maggiore, la frazione $\frac{p}{b + q}$ è per questo motivo divenuta

$$\text{minore del giusto, dunque deve essere } a + \frac{p}{b + \frac{q}{c}} = \frac{abc + aq + pc}{bc + q} < x.$$

Proseguendo lo stesso discorso si dimostrerà, che

$$a + \frac{p}{b + \frac{q}{c + \frac{r}{d}}} = \frac{abcd + abr + aq + cdr + pr}{cd + cr + dq} > x, \text{ e così alternativa-$$

mente in seguito. Queste frazioni comuni poi sono continuamente convergenti verso il vero valore della quantità espressa dalla frazione continua; e questo vero valore medierà sempre fra due quali si siano frazioni consecutive. Le frazioni equivalenti di una data frazione continua siano le seguenti $\frac{a}{m}, \frac{b}{n}, \frac{c}{p}, \frac{d}{q}$ ec. con

sottrarsi la prima dalla seconda, si avrà (pel num. 858.) $\frac{b}{n} - \frac{a}{m} = \frac{1}{mn}$; con

sottrarsi la seconda dalla terza ne verrà $\frac{c}{p} - \frac{b}{n} = \frac{1}{np}$; con sottrarsi la terza

dalla quarta si avrà $\frac{d}{q} - \frac{c}{p} = \frac{1}{pq}$ ec. Quindi le frazioni comuni $\frac{a}{m}, \frac{b}{n}, \frac{c}{p}$ ec.,

non possono mai differire dal vero valore della quantità espressa dalla frazione continua, che di una quantità minore di $\frac{1}{mn}$; $\frac{1}{np}$; $\frac{1}{pq}$ ec., lo che dà lume per giudicare di quanto si accosti al vero valore cercato. Siccome poi, come pur ora si è detto $m < n, n < p, p < q$ ec., si avrà $\frac{1}{m^2} > \frac{1}{mn}$; $\frac{1}{n^2} > \frac{1}{np}$; $\frac{1}{p^2} > \frac{1}{pq}$ ec., vale a dire l'errore di ciascuna frazione sarà sempre minore dell'unità divisa pel quadrato del denominatore della stessa frazione.

Poichè queste frazioni equivalenti sono alternativamente maggiori, e minori del vero valore x della frazione continua, si prendano le successive loro differenze, sottraendo la prima dalla seconda, la seconda dalla terza, la terza dalla quarta ec., nel qual modo queste differenze, che andranno sempre diminuendo da una frazione all'altra formeranno una serie, la quale finirà col finire la frazione continua; di cui esprimerà il valore.

861. Prendiamo le frazioni equivalenti alle successive porzioni della frazione continua del num. 854, che sono le seguenti

$$\begin{array}{llll} \text{I} & \text{II} & \text{III} & \text{IV} \\ \frac{a}{1} & \frac{ab+p}{b} & \frac{abc+aq+pc}{bc+q} & \frac{abcd+abr+adq+cdr+pr}{bcd+br+dq} \\ & \text{V} & & \\ \frac{abcde+abcr+abce+adeq+aqr+cder+cpr+cpr}{bcde+bcv+ver+deq+qr} & \text{ec.} & & \end{array}$$

Dalla seconda si sottragga la prima, e si avrà $\frac{p}{b}$ (le sottrazioni si fanno al solito con ridurre prima le frazioni allo stesso denominatore); col sottrarsi la seconda dalla terza ne viene $-\frac{pq}{b \times bc+q}$; la differenza tra la terza, e la quarta è

$$\frac{+pqr}{d \times bc+q+br \times bc+q} \text{ ec.}$$

La serie adunque nella quale si svolge la frazione continua del num. 854 è

$$\begin{array}{l} a + \frac{p}{b} - \frac{pq}{b \times bc+q} + \frac{pqr}{d \times bc+q+br \times bc+q} \\ \text{ec.} \end{array}$$

862. Facciamone l'applicazione alla frazione continua del num. 857. Le frazioni equivalenti, che alle di lei successive parti corrispondono, sono le seguenti

$$\frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{179}{60}, \frac{361}{121}, \frac{901}{302}, \frac{1252}{423}, \frac{3425}{1145}. \text{ Prendendo nel modo detto le differenze tra l'una, e l'altra di queste frazioni, si ha la cercata seguente serie}$$

$2+1-\frac{1}{60}+\frac{1}{7260}-\frac{1}{30542}+\frac{1}{127745}-\frac{1}{485604}$, che dà il valore della proposta frazione continua. Di fatto la somma dei termini positivi di questa serie è

$+\frac{451740481}{154572060}$, e la somma dei negativi è $-\frac{370338251}{22181175710}$. Ora levando la seconda di queste frazioni dalla prima si ha

$\frac{204581305545759825}{68572065719894972}$, che è il valore della trovata serie, e però il valore della proposta frazione continua.

863. Da quanto ho detto al num. 859. s'intende, che i termini della serie, nella quale si svolge una frazione continua, non considerando il primo, procedono sempre con segni alternanti.

854. Se i termini di una frazione continua procederanno con una costante legge, come farebbero per esempio le tre seguenti frazioni,

$$\text{I.} \quad x = \frac{a}{b + \frac{a}{c + \frac{a}{d + \frac{a}{e}}}} \text{ ec.}$$

$$\text{II.} \quad x = \frac{a}{b + \frac{a}{c + \frac{a}{d + \frac{a}{e + \frac{a}{f}}}}} \text{ ec.}$$

$$\text{III.} \quad x = \frac{a}{b + \frac{a}{c + \frac{e}{i + \frac{a}{b + \frac{c}{e + \frac{e}{i + \frac{a}{b}}}}}}} \text{ ec.}$$

delle quali i termini vanno ritornando gli stessi, si potrà facilmente averne la loro somma, mentre la prima di queste frazioni si rappresenterà così $x = \frac{a}{b+x}$, la quale

si riduce alla seguente espressione $x^2 + bx = a$, da cui si ricava facilissimamente il valore di x : La seconda frazione si esprime così $x = \frac{a}{b + \frac{a}{c+x}}$, la quale si riduce

$$\frac{b+d}{c+x}$$

ad $x^2 + c + \frac{d-a}{b}x = \frac{ac}{b}$. La terza frazione si esprime così

$$x = \frac{a}{b + \frac{a}{c + \frac{e}{i + x}}}, \text{ che si riduce ad } x^2 + i - \frac{ac}{bc+d}x = \frac{aci}{bc+d}.$$

865. Da ciò si scorge essere facilissima cosa esprimere con una frazione continua la radice di una equazione quadrata: Come essendo data l'equazione generale $x^2 - px - q = 0$, si farà $x^2 = px + q$, e fatta la divisione per x , si avrà $x = p + \frac{q}{x}$, cioè $x = p + \frac{q}{x}$

$$\begin{array}{r} \overline{p+q} \\ \quad \overline{p+q} \\ \qquad \overline{p+\frac{q}{p}cc.} \end{array}$$

Con facilità grande si otterrà la somma di quanti si vogliano termini di questa sorte di frazioni continue mediante la seguente formola

$$\begin{aligned} & a^n + \frac{n-1}{1} \times a^{n-1} b + \frac{n-2 \times n-2}{1, 2, 2} a^{n-2} b^2 + \frac{n-3 \times n-4 \times n-3}{1, 2, 3, 3} a^{n-3} b^3 + \\ & \frac{n-7 \times n-5 \times n-5 \times n-4}{1, 2, 3, 4} a^{n-4} b^4 + \frac{n-9 \times n-8 \times n-7 \times n-6 \times n-5}{1, 2, 3, 4, 5} a^{n-5} b^5 + \\ & \frac{n-11 \times n-10 \times n-9 \times n-8 \times n-7 \times n-6}{1, 2, 3, 4, 5, 6} a^{n-6} b^6 + \text{cc.} \end{aligned}$$

in cui la lettera n rappresenta il numero de' termini della frazione continua, che si vogliono sommare; la lettera a esprime il coefficiente del secondo termine dell'equazione, e la lettera b designa l'ultimo termine, presi l'uno, e l'altro con segno contrario. Ecco poi come si è dedotta la precedente formola. Sia la seguente frazione continua $x = a + b$

$$\begin{array}{r} a + b \\ \quad a + b \\ \quad \quad a \end{array} \quad \text{EC}$$

nata dall'equazione $x^2 - ax - b = 0$. Dei di lei due primi termini $a + \frac{b}{a}$ la somma è $\frac{a^2 + b}{a}$; dei tre primi $a + \frac{b}{a}$ la somma è $\frac{a^3 + 2ab}{a + b}$; dei quat-

tro primi $\frac{a+b}{a+b}$ la somma è $\frac{a^4+3a^2b+b^2}{a^3+2ab}$: dei cinque primi

termini la somma è $\frac{a^5+4a^3b+3ab^3}{a^4+3a^2b+b^3}$: dei sei primi è $\frac{a^6+5a^4b+5a^2b^2+b^3}{a^5+4a^3b+3a^2b^2}$: dei

primi sette è $\frac{a^7 + 5a^5b + 10a^3b^3 + 4ab^5}{a^6 + 5a^4b + 6a^2b^2 + b^3}$ ec. Si osservino queste somme, e si scorge-
rà, che il denominatore di una qualunque è lo stesso, che il numeratore della pre-
cedente. Non è dunque necessario cercar altro, che i numeratori: A questo og-
getto osserviamo con qual legge procedono. Eccoli per ordine

di un termine	a
di due	$a^2 + b$
di tre	$a^3 + 2ab$
di quattro	$a^4 + 3a^2b + b^2$
di cinque	$a^5 + 4a^3b + 3ab^2$
di sei	$a^6 + 5a^4b + 6a^2b^2 + b^3$
di sette	$a^7 + 6a^5b + 10a^3b^2 + 4ab^3$
di otto ec.	

Ciascun numeratore pertanto costa di tanti termini, quante unità contiene la metà
del numero de' termini da sommarli accresciuto di una unità, se tal numero è dispari,
e accresciuto di 2, se è pari: Così il numeratore, che nasce dalla somma di sette

termini contiene termini $\frac{7+1}{2} = 4$; e il numeratore nato dalla somma di otto

termini contiene termini $\frac{8+2}{2} = 5$. In secondo luogo il massimo esponente di a è

sempre uguale al numero de' termini da sommarli: In terzo luogo queste potenze
di a in ciascun numeratore decrescono con quest'ordine $a^n, a^{n-2}, a^{n-4}, a^{n-6}$ ec.:
In quarto luogo le potenze di b ascendono secondo la serie de' numeri naturali:
Per lo che queste potenze di a , e di b si combinano così;

$$a^n \quad a^{n-2} \quad a^{n-4} \quad a^{n-6} \quad a^{n-8} \\ b \quad b^2 \quad b^3 \quad b^4 \quad \text{ec.}$$

onde, non curando per ora i coefficienti, la somma di un numero n di termini tro-
vati essere $a^n + a^{n-2}b + a^{n-4}b^2 + \text{ec}$. Quanto poi ai coefficienti, rispetto ai se-
condi termini essi sono i genitori del primo genere; rispetto ai terzi termini sono i figura-
ti del primo ordine nel primo genere; dei quarti termini sono i figurati del secondo ordi-
ne ec.: Ma de' genitori debet prendere il quarto volendo la somma di cinque ter-
mini; il quinto per la somma di sei termini, e generalmente l' $n-1$ esimo per la som-
ma di n termini. De' figurati del primo ordine si deve prendere il terzo per la

somma di sei termini, e generalmente il $n-3$ esimo per la somma di n termini. Ora
mediante ciò si è ottenuta la precedente formola ecumenica inserviente a ritrova-
re immediatamente la somma di quanti termini si vogliono di una frazione conti-
nua della forma $x = \frac{a+b}{a+b}$ indipendentemente dalle somme

$$\frac{a+b}{a+b} = \frac{a+b}{a+b} = \frac{a+b}{a+b} \text{ ec.}$$

precedenti.

Non

Non solamente poi per mezzo delle frazioni continue si può esprimere la radice di una equazione quadrata, ma si può approssimare quanto si vuole al vero valore delle radici irrazionali di qualsivoglia equazione, e a differenza degli altri metodi di approssimazione, mediando (pel num. 860.) il vero valore fra due frazioni consecutive, giudicare conseguentemente della quantità dell'approssimazione. Per darne un saggio sia l'equazione $ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} \dots + m = 0$, che abbia una radice irrazionale, il di cui prossimo valore intero sia $= p$, così che sia $x > p$, e $x < p + 1$. Si supponga $x = p + \frac{1}{y}$, e mediante la sostituzione di questo valore si trasformi l'equazione data, così che ne venga l'equazione (A) $a'y^n + b'y^{n-1} + c'y^{n-2} \dots + m' = 0$: E siccome $\frac{1}{y}$ si suppone una frazione propria, perciò sarà $y > 1$, conseguentemente l'equazione (A) avrà necessariamente almeno una radice reale maggiore dell'unità. Per mezzo dell'equazione (A) si trovi il valore intero prossimo di y , che si dica $= q$; indi si faccia $y = q + \frac{1}{z}$, e mediante la sostituzione di questo valore si trasformi l'equazione (A), con che si avrà l'equazione (B) $a''z^n + b''z^{n-1} + c''z^{n-2} \dots + m'' = 0$, la quale per la ragione precedente avrà per lo meno una radice reale z maggiore dell'unità. Si trovi il prossimo intero valore di z , che suppongo $= r$, poscia di nuovo si ripeteranno le precedenti operazioni facendo $z = r + \frac{1}{u}$, e sostituendo questo valore nell'equazione (B), lo che la cambierà in $a'''u^n + b'''u^{n-1} + c'''u^{n-2} \dots + m''' = 0$, della cui radice reale il prossimo vero valore si dica $= s$, ritrovato il quale si faccia $u = s + \frac{1}{w}$ ec. e così in poi finchè si vuole. La radice adunque irrazionale, il di cui prossimo valore si cerca, sarà espressa dalla seguente frazione continua, cioè

$$x = p + \frac{1}{q + \frac{1}{r + \frac{1}{s + \frac{1}{w}}}} \text{ ec.}$$

la quale fra tutte le espressioni farà la più convergente possibile verso il vero valore cercato.

Ho supposto, che le radici, alle quali devonsi approssimare siano positive; se fossero negative, per renderle positive basterà regolarli giusta il num. 501. Quando due, o più radici dell'equazione fossero bensì ineguali, ma nel cercare il loro prossimo valore intero si trovasse soltanto p , in tal caso i valori di queste radici saranno rappresentati da $p + \frac{1}{y}$, ma la y avrà due, o più diversi valori

rea-

reali maggiori dell'unità. Lo stesso si dica rispetto a x nell'equazione $y = q + \frac{x}{z}$, qualora i valori di y avessero lo stesso prossimo valore intero q .

855. Resta per ultimo a esporre la maniera di ridurre una qualunque serie alternante in frazione continua: Per ottenere ciò si prenda la serie generale del num.

856., che è $a + \frac{p}{b} - \frac{pq}{b \times bc + q} + \text{ec.}$, la quale si è dedotta dalla frazione continua $a + \frac{p}{b + \frac{q}{c}}$, della qual serie si paragoni ciascun termine con ciascun

$$\frac{b + q}{c} \text{ ec.}$$

termine della serie proposta, e prendendosi ad arbitrio i numeratori p, q, r ec. della frazione continua, che si cerca, mediante gli accennati paragoni si determinino i valori de' denominatori b, c, d ec., o pure prendendosi ad arbitrio i denominatori b, c, d ec., si determinino i valori de' numeratori. Solamente deve avvertire, che i numeratori per esempio presi ad arbitrio sieno tali, che rendano i denominatori numeri interi; o pure i denominatori presi ad arbitrio diano pe' numeratori de' numeri interi. Determinati poi, che si faranno i valori de' numeratori (supposto che si sieno presi ad arbitrio i denominatori), o de' denominatori (se si sono presi ad arbitrio i numeratori), si sostituiscano nella frazione $a + \frac{p}{b + \frac{q}{c}}$ i numeratori in luogo di b, c, r ec., e i denominatori in luogo di b, c, d ec., e ciò fatto si avrà la cercata frazione continua, alla quale si riduce la proposta serie.

867. Poichè il modo di operare è sempre lo stesso, qualunque sia la serie data, la quale o può essere $x = A - B + C - D + E - F + \text{ec.}$, o $x = \frac{a}{A} - \frac{a}{B} + \frac{a}{C} - \frac{a}{D} + \text{ec.}$; o $x = \frac{a}{A} - \frac{a}{AB} + \frac{a}{ABC} - \frac{a}{ABCD} + \text{ec.}$, o $x = A - By + Cy^2 - Dy^3 + Ey^4 - \text{ec.}$; o $x = \frac{A}{P} - \frac{By}{Qz} + \frac{Cy^2}{Rz^2} - \frac{Dy^3}{Sz^3} + \text{ec.}$; in somma può avere qualsivoglia forma; però, per venire a un'esempio, supponiamo che sia data da ridursi in frazione continua la serie $x = A - B + C - D + E - \text{ec.}$: Si paragonino i termini di questa serie coi termini della serie $x = \frac{p}{b} - \frac{pq}{b \times bc + q} + \text{ec.}$, e si avranno le seguenti equazioni

I. $A = \frac{p}{b}$	o sia per maggiore semplicità, che per altro è lo stesso, perchè si divide l'uno, e l'altro membro per la stessa quantità.	1. I. $A = \frac{p}{b}$
II. $B = \frac{pq}{b \times uc + q}$		2. II. $\frac{B}{A} = \frac{q}{bc + q}$
III. $C = \frac{pqr}{d \times uc + q + br \times uc + q}$		3. III. $\frac{C}{B} = \frac{br}{d \times uc + q + br}$
IV. $D = \text{ec.}$		4. IV. $\frac{D}{C} = \text{ec.}$

Quindi dalla 1. I. si ha $p = Ab$ (si prendano ad arbitrio i denominatori b, c, d ec.), dalla 2. II. si ottiene $q = \frac{Bbc}{A-B}$, dalla 3. III. ne viene $\frac{Cbcd + Cdq}{Bb - Cb} = r$, in cui

rimettendo il poc' anzi trovato valore di q , si ha $\frac{Cbcd + \frac{BCcd}{A-B}}{Bb - Cb} = r$, vale

a dire con farsi le debite riduzioni sarà $\frac{ACcd}{A-B \times B-C}$. Collo stesso metodo si determineranno gli altri numeratori s, t ec. Ma affinchè questi numeratori p, q, r ec. siano numeri interi dovrasse a ciò avere riguardo nella scelta de' denominatori: Si faccia pertanto $b = 1, c = A - B, d = B - C$ ec., con che sarà $p = A, q = B, r = AC$ ec., per lo che nella frazione continua $x = + \frac{p}{b + \frac{q}{c + \frac{r}{d}}}$ ec. sostituendosi que-

sti valori di p, q, r ec. di b, c, d ec., si avrà finalmente quello che si cercava, cioè $x = A - B + C - D + \text{ec.} = \frac{A}{1 + B}$

$$\frac{A}{1 + B} = \frac{A}{1 + \frac{A-B+AC}{B-C+BD}} \text{ ec.}$$

868. Istessamente si debba ridurre in frazione continua la serie seguente $x = \frac{A}{F} - \frac{ABr}{PQs} + \frac{ABCv^2}{r^2 \times z^2} - \text{ec.}$ Si paragonino i termini di questa serie coi termini del-

della serie $x = \frac{p}{b} - \frac{pq}{b \times bc + q} + \text{ec.}$ e si avrà

$$\text{I. } \frac{A}{P} = \frac{p}{b}$$

$$\text{II. } \frac{AB\gamma}{PQz} = \frac{pq}{b \times bc + q}$$

$$\text{III. } \frac{ABC\gamma^2}{PQRz^2} = \frac{pqr}{d \times bc + q + br \times bc + q}$$

IV. ec.

cioè I. $p = \frac{Ab}{P}$. II. $\frac{P}{A} \times \frac{AB\gamma}{PQz} = \frac{b}{p} \times \frac{pq}{b \times bc + q}$, e però $\frac{B\gamma}{Qz} = \frac{q}{bc + q}$, onde

$Bbc\gamma + Bq\gamma = Qqz$, conseguentemente $q = \frac{Bbc\gamma}{Qz - B\gamma}$. III. $\frac{PQz}{AB\gamma} \times \frac{ABC\gamma^2}{PQRz^2} =$

$\frac{b \times \overline{bc + q}}{Pq} \times \frac{pqr}{d \times bc + q + br \times bc + q}$, cioè $\frac{C\gamma}{Rz} = \frac{br}{d \times bc + q + br}$, che si riduce a

$Cbcd\gamma + Cdq\gamma + Cbr\gamma = Rbrz$, quindi $r = \frac{Cbcd\gamma + Cdq\gamma}{Rbz - Cb\gamma}$, la quale mediante la sosti-

tuzione del poc' anzi ritrovato valore di q si cambia in $\frac{Cbcd\gamma + \frac{BCbr\gamma^2}{Qz - B\gamma}}{Rbz - Cb\gamma}$, cioè

$r = \frac{CQcd\gamma z}{Rz - C\gamma \times Qz - B\gamma}$. Ora acciò questi numeratori p, q, r ec. siano quantità

intere, si desumano i denominatori b, c, d ec. come segue, $b = Pz, c = Qz - B\gamma, d = Rz - C\gamma$ ec., onde fatta la sostituzione di questi valori, sarà $p = Az, q = BP\gamma z, r = CQ\gamma z$, ec.; e però nella frazione $x = p$

$$\frac{b + q}{c + r} = \frac{d + s}{e} \text{ ec.}$$

fo-

fosostituendo questi valori di p, q, r ec. e di b, c, d , si avrà finalmente $x = \frac{A}{P} -$

$$\frac{AB_y}{PQz} + \frac{ABC_y^2}{PQRz^2} - \text{ec.} = \frac{Az}{Pz + BP_yz}$$

$$\frac{Qz - By + CQ_yz}{Rz - Cy} + \text{ec.}$$

869. Acciò la dottrina esposta riesca ancora più chiara aggiungerò un esempio numerico. Debba si ridurre a frazione continua la seguente serie del num. 828.

$x = \frac{2}{3} - \frac{2}{9} + \frac{2}{27} - \frac{2}{81} + \text{ec.}$, la quale viene espressa dalla serie generale $x = \frac{a}{A} - \frac{a}{A^2} + \frac{a}{A^3} - \frac{a}{A^4} + \text{ec.}$ Si prenda al solito la serie ecumenica del num. 861., che è $\frac{p}{b} - \frac{pq}{b \times bc + q} + \frac{pqr}{d \times bc + q^2 + br \times bc + q} + \text{ec.}$, e si paragoni ciascun termine di questa serie con ciascun termine della serie proposta, e si avrà

$$\text{I. } \frac{p}{b} = \frac{2}{3}$$

$$\text{cioè I. } \frac{p}{b} = \frac{2}{3}$$

$$\text{II. } \frac{pq}{b \times bc + q} = \frac{2}{9}$$

$$\text{2. II. } \frac{b}{p} \times \frac{pq}{b \times bc + q} = \frac{2}{3} \times \frac{2}{9}, \text{ e però } \frac{q}{bc + q} = \frac{1}{3}$$

$$\text{III. } \frac{pqr}{d \times bc + q^2 + br \times bc + q} = \frac{2}{27}$$

$$\text{3. III. } b \times \frac{bc + q}{pq} \times \frac{pqr}{d \times bc + q^2 + br \times bc + q} = \frac{q}{2} \times \frac{2}{27}$$

$$\text{IV. vale a dire } \frac{br}{dbc + dq + br} = \frac{1}{3} \text{ ec.}$$

Dalla 1. I. si ricava $p = \frac{2b}{3}$. Dalla 2. II. si ha $3q = bc + q$, e però $q = \frac{bc}{3-1}$.

Dalla 3. III. ne viene $3br = dbc + dq + br$, quindi $r = \frac{dbc + dq}{3b - b}$, in cui sostituendo

$$\text{il poc' anzi trovato valore di } q, \text{ si avrà } r = \frac{dbc + \frac{dbc}{3-1}}{3b - b} = \frac{2dc}{3-1 \times 3-1} \text{ ec.}$$

Ora affinchè questi numeratori p, q, r ec. risultino numeri interi, si determinino i denominatori b, c, d ec. così $b=1, c=3-1, d=3-1$ ec., con che sarà $p = \frac{2}{2}$

Tom. II.

Y y

$\frac{2}{3}$, $q=1$, $r=3$ ec. Si sostituiscano adunque questi valori di p , q , r ec., e di b , c , d ec. nella frazione continua generale $x = \frac{p}{b + \frac{c + \frac{r}{d} \text{ ec.}}{}}$, e si avrà

$$x = \frac{2}{3} - \frac{2}{9} + \frac{2}{27} - \frac{2}{81} + \text{ec.} = \frac{2}{3 + 1}$$

$$(3-1) + 3$$

$$(3-1) + \text{ec.}$$

o sia $\frac{2}{3 + 1}$, lo che si doveva trovare.

$$\frac{2 + 3}{2} \text{ ec.}$$

ARTICOLO III.

Della moltiplicazione, divisione, elevarzione a potestà, estrazione di radici nelle serie infinite.

870. **P**ER moltiplicare una serie infinita in un'altra non altro richiedesi, che far uso della solita regola della moltiplicazione comune, moltiplicando cioè con ciascun termine della serie moltiplicante tutti i termini della serie moltiplicanda. Si debba per esempio moltiplicare la serie (Δ) per la serie (Π): Si operi al solito, e si avrà di prodotto la serie (Σ). Ecco il Calcolo.

$$(\Delta) A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + Fx^5 + Gx^6 + Hx^7 + Ix^8 \text{ ec.}$$

$$(\Pi) a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5 + gx^6 + hx^7 + ix^8 \text{ ec.}$$

$$(\Sigma) \begin{array}{l} Aa + aBx + aCx^2 + aDx^3 + aEx^4 + aFx^5 + aGx^6 + aHx^7 + aIx^8 \text{ ec.} \\ + Abx + Bbx^2 + bCx^3 + bDx^4 + bEx^5 + bFx^6 + bGx^7 + bHx^8 \text{ ec.} \\ + Acx^2 + Bcx^3 + Ccx^4 + cDx^5 + cEx^6 + cFx^7 + cGx^8 \text{ ec.} \\ + Adx^3 + Bdx^4 + Cdx^5 + dDx^6 + dEx^7 + dFx^8 \text{ ec.} \\ + Aex^4 + Bex^5 + Cex^6 + dEx^7 + Eex^8 \text{ ec.} \\ + Afx^5 + Bfx^6 + Cfx^7 + Dfx^8 \text{ ec.} \\ + Agx^6 + Bgx^7 + Cgx^8 \text{ ec.} \\ + Ahx^7 + Bbx^8 \text{ ec.} \\ + Aix^8 \text{ ec.} \end{array}$$

871.

871. Col solo osservare questo prodotto si conoscerà, che per prolungare la serie non è necessario continuare la moltiplicazione, bastando tenere la legge, colla quale procedono i coefficienti di ciascun termine, la qual legge somministra ancora il modo di ritrovare immediatamente un qualsivoglia termine indipendentemente dagli altri. Questa legge si è, che un termine qualunque m nella serie trovatali pel prodotto costa di tante parti, quante ne mostra il numero n esprimente il numero de' primi termini della serie moltiplicante, co' quali intendesi fatta la moltiplicazione, o sia, che è lo stesso, quante ne mostra il medesimo numero m , e quelle parti risultano dal moltiplicarsi a due a due i coefficienti di altrettanti termini delle due serie, moltiplicanda, e moltiplicante per modo, che il coefficiente del primo termine della serie moltiplicanda si moltiplichi nel coefficiente del termine m della serie moltiplicante, poi il coefficiente del secondo termine della serie moltiplicanda si moltiplichi nel coefficiente del termine $m-1$ della serie moltiplicante ec.

872. Se pertanto si dovrà moltiplicare la serie $1-2+4-8+16$ ec. per la serie $2+\frac{1}{4}-\frac{1}{64}+\frac{1}{512}-\frac{1}{10384}$ ec., si opererà come si è fatto poc'anzi così

$$\begin{array}{r}
 1-2+4-8+16 \text{ ec.} \\
 2+\frac{1}{4}-\frac{1}{64}+\frac{1}{512}-\frac{1}{10384} \text{ ec.} \\
 \hline
 2-4+8-16+32 \\
 +\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+1-2 \\
 -\frac{1}{64}+\frac{1}{32}-\frac{1}{16} \\
 +\frac{1}{512}-\frac{1}{256} \\
 -\frac{1}{10384} \\
 \hline
 \text{Prodotto } 2-\frac{3}{4}+\frac{479}{64}-\frac{7563}{512}+\frac{492431}{10384}
 \end{array}$$

Da ciò, che si è detto, s'intende cosa dovrà essere $\frac{1 \pm nm}{1 \pm nm} \times \frac{1 \pm nm}{1 \pm nm}$ (A), in cui a sia un numero razionale, intero, o rotto, ed m sia un numero razionale, o irrazionale, o immaginario, o pure la quantità $\frac{1 \pm nm}{1 \pm nm} \times \frac{1 \pm nm}{1 \pm nm}$ $\pm \frac{1 \pm nm}{1 \pm nm} \times \frac{1 \pm nm}{1 \pm nm}$ (B), mentre la prima (A) non vorrà esprimere altro, che il prodotto della serie di $\frac{1 \pm nm}{1 \pm nm}$ nella serie di $\frac{1 \pm nm}{1 \pm nm}$; e la seconda (B) rappresenta la somma, o la differenza di due prodotti, il primo nato dalle serie di

di $\frac{1 \pm nm}{1 \pm nn} \pm m$, e di $\frac{1 \pm nm}{1 \pm nn} \pm am$, e il secondo nato dalle serie di $\frac{1 \pm nm}{1 \pm nn} \mp m$, e di $\frac{1 \pm nm}{1 \pm nn} \mp am$.

873. Quanto al modo di dividere una serie per un'altra, o si può fare l'operazione mediante la regola ordinaria della divisione, o pure con supporre il quoziente di questa divisione uguale ad una nuova serie indeterminata, la quale dev'essere moltiplicata nella serie, che serve di divisore, indi mediante il paragone de' termini devon'essere ritrovati i valori de' coefficienti de' termini dell'assunta serie indeterminata.

874. Per venire all'esempio debbasi in primo luogo dividere la quantità ϕ per la serie $(\Delta) a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4$ ec. Si faccia $\frac{\phi}{a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4}$ ec. $= A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4$ ec. Si moltiplichino il denominatore della frazione nella serie indeterminata, e si avrà

$$\phi = \begin{cases} Aa + ABx + ACx^2 + ADx^3 + AE x^4 \text{ ec.} \\ a + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 \text{ ec.} \\ \hline Aa + aBx + aCx^2 + aDx^3 + aEx^4 \text{ ec.} \\ + Abx + Bbx^2 + bCx^3 + bDx^4 \text{ ec.} \\ + Acx^2 + Bcx^3 + Ccx^4 \text{ ec.} \\ + Adx^3 + Bdx^4 \text{ ec.} \\ + Aex^4 \text{ ec.} \end{cases}$$

Paragonando il primo termine di questo prodotto con ϕ , ed eguagliando a zero i coefficienti degli altri termini, si avranno i valori dei coefficienti indeterminati A, B, C, D ec. così $A = \frac{\phi}{a}$, $B = -\frac{b\phi}{a^2}$, $C = \frac{b^2\phi}{a^3} - \frac{c\phi}{a^2}$, $D = -\frac{b^3\phi}{a^4} + \frac{2bc\phi}{a^3} - \frac{d\phi}{a^2}$,

$E = \frac{b^4\phi}{a^5} - \frac{3b^2c\phi}{a^4} - \frac{2bd^2\phi}{a^3} + \frac{c^2\phi}{a^3} - \frac{cd\phi}{a^2}$ F=ec, e però il quoziente cercato farà la seguente serie

$$\frac{\phi}{a} - \frac{b\phi x}{a^2} + \frac{b^2\phi - c\phi x}{a^3} x^2 - \frac{b^3\phi - 2bc\phi x - d\phi x^2}{a^4} x^3 + \frac{b^4\phi - 3ab^2\phi - 2a^2bd\phi + a^2c^2\phi - a^2cd\phi}{a^5} x^4.$$

875. La quantità ϕ può essere qualunque, conseguentemente può essere ancora l'unità, come pure può essere anche una quantità complessa.

876. Si debba in secondo luogo dividere una serie (Δ) per un'altra (Π) .

Si faccia $\frac{\Delta}{\Pi} = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4$ ec., indi $\Delta =$

$\Pi (A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4)$ ec., poscia si paragonino i termini di questo prodotto coi termini della serie (Δ) , e in questo modo si ritrovino i valori delle indeterminate A, B, C , ec., con che si avrà la serie esprimente il quoziente cercato. O pu-

pure si regoli in quest' altra maniera: Si consideri la frazione $\frac{\Delta}{n}$ così $\Delta \times \frac{1}{n}$.

Si trovi (giusta il num. 828.) la serie, che esprime il valore di $\frac{1}{n}$, questa serie trovata si moltiplichi in (Δ) , e ciò, che ne verrà sarà il quoziente cercato.

877. Veniamo ora alla maniera d'innalzare una serie infinita a qualsivoglia potenza. Tra i varj metodi, che a ciò possono servire, io preliegherò quello, che il celebre P. Ruggiero Boscovich della Compagnia di Gesù ha pubblicato nel giornale de' letterati di Roma, si perchè egli è assai facile, e piano, si perchè si può trovare a piacere un qualunque termine della cercata potenza indipendentemente dagli altri. Prima di venire al metodo è necessario sciogliere il seguente

878. Problema. Cercanti tutte le maniere, nelle quali un dato numero si può dividere in parti intere, tra le quali abbia luogo ancora lo stesso numero considerato come parte unica, e totale di se stesso.

879. Risol. Si scrivano primieramente in una riga tante unità, quante ne contiene il numero dato; poi in una riga al di sotto si scriva in ultimo a destra un 2, e innanzi si scrivano una dopo l'altra tante unità, quante ne restano a compiere il detto numero. Nella terza riga si scrivano due 2 con avanti le unità residue. Nella quarta riga si scrivano tre 2 colle unità residue innanzi, e così in poi finchè si può. Finiti tutti i 2 si scriva in una nuova riga in ultimo a destra un 3 colle unità residue innanzi, nella seguente riga si scriva un 3, poi un 2, indi le unità residue; nella seguente riga si scriva un 3, poi due 2 colle residue unità, e così in seguito, finchè si può. Si passi poscia a due 3 colle unità, indi co' 2 proseguendo col medesimo ordine, e così in appresso a tre 3, a quattro, a cinque ec. finchè si può. Finiti i 3 si passi ai 4, quindi ai 5 ec. colla stessa maniera, finchè si arrivi al numero proposto, che rimarrà parte unica di se medesimo. L'esempio metterà sotto gli occhi l'operazione chiara già per se stessa. Si cercano tutti i modi, ne' quali il numero 7 può essere diviso in parti. Ciascuno di questi modi viene mostrato dal corrispondente numero romano.

I.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	I.
	1.	1.	1.	1.	2.		II.
		1.	1.	2.	2.		III.
			1.	2.	2.	2.	IV.
				1.	1.	3.	V.
				1.	1.	2.	VI.
					2.	2.	VII.
					1.	3.	VIII.
						1.	IX.
						1.	X.
						3.	XI.
						1.	XII.
						2.	XIII.
						1.	XIV.
						7.	XV.

880. Date tutte le maniere, colle quali può essere diviso in parti un qualunque numero m , si può per mezzo loro trovare tutte le maniere, colle quali può essere diviso in parti un numero maggiore di una unità, cioè $m+1$. A ciascuna divisione del numero dato si aggiunga a sinistra una nuova parte, che sia l'unità, poscia si accrescano, o sia si ingrossino di una unità tutte, e sole le prime parti a sinistra di quelle divisioni, che cominciano con una parte minore della prossima seguente, e in questo modo si avranno tutte le maniere, nelle quali può essere diviso in parti il numero $m+1$. Che i risultati dalle accennate operazioni siano altrettante divisioni del numero $m+1$, la cosa è tanto evidente, che non abbisogna di dichiarazione; che poi in questo modo si abbiano tutte le maniere, nelle quali può essere diviso il numero $m+1$ rendesi manifesto dall'osservare, che tutte le divisioni del numero $m+1$ nascer devono dalle divisioni del numero m mediante l'aggiunta di una unità: Ma alle divisioni del numero m non si può fare altro aumento, onde nascano le parti componenti il numero $m+1$, che nelle due indicate maniere. Dunque operando nel modo esposto si trovano tutte le maniere possibili, colle quali può essere diviso in parti il numero $m+1$. Prendo per esempio le precedenti divisioni del numero 7, colle quali voglio trovare tutte le divisioni del numero 8. Scrivo in A tutte le divisioni del numero 7, scrivo in B tutte le divisioni del numero 8, che nascono dalle divisioni del numero 7 mediante l'aumento di una nuova parte 1, scrivo in C tutte le divisioni del numero 8, che nascono coll'aumentarsi di una unità le prime parti dissimili a sinistra delle divisioni del numero 7.

A	B	C
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	2. 2. 2. 2.
1. 1. 1. 1. 1. 2.	1. 1. 1. 1. 1. 2.	2. 3. 3.
1. 1. 1. 2. 2.	1. 1. 1. 1. 2. 2.	2. 2. 4.
1. 2. 2. 2.	1. 1. 2. 2. 2.	4. 4.
1. 1. 1. 1. 3.	1. 1. 1. 1. 1. 3.	3. 5.
1. 1. 2. 3.	1. 1. 1. 2. 3.	2. 6.
2. 2. 3.	1. 2. 2. 3.	8.
1. 3. 3.	1. 1. 3. 3.	
1. 1. 1. 4.	1. 1. 1. 1. 4.	
1. 2. 4.	1. 1. 2. 4.	
3. 4.	1. 3. 4.	
1. 1. 5.	1. 1. 1. 5.	
2. 5.	1. 2. 5.	
1. 6.	1. 1. 6.	
7.	1. 7.	

881. Date tutte le divisioni del numero $m+1$ si troveranno con metodo inverso tutte le divisioni del numero m .

882. Veniamo ora al metodo di inalzare a qualsivoglia potenza una serie infinita, come (A) $a+bx+cx^2+dx^3+ex^4+fx^5+gx^6$ ec.. Poichè questo metodo propriamente riguarda la maniera di ritrovare isolatamente un qualsivoglia termine della serie, che deve essere la potenza cercata, e ciò è appunto quanto basta per potere e cominciare, e proseguire a piacere questa serie, però tutta la dottrina con-

cer-

cernente questo metodo si ridurrà al modo di sapere generalmente trovare un termine m dell'accennata serie, che deve essere la potenza cercata.

883. Essendo per ipotesi infinita la serie, che dev'essere innalzata a una qualunque potenza n , infiniti pure saranno i termini, che comporranno la potenza n . Il primo di questi termini sarà a^n , gli altri poi risulteranno dalle successive potenze x , x^2 , x^3 , x^4 , e i. ec., le quali distingueranno per ordine ciascun termine, e in oltre ciascuno di questi termini sarà affetto da coefficienti numerici, e letterali risultanti da prodotti de' coefficienti a , b , c , d ec. della serie (A). A motivo di questi coefficienti ciascun termine si comporrà da altrettante parti quanti saranno quelli prodotti, e tali prodotti saranno tanti, quante saranno le maniere, colle quali il numero esprimente il termine cercato diminuito di una unità, potrà essere diviso in parti.

884. Si scrivano in una riga i numeri della serie naturale 1, 2, 3, 4, 5, ec., che servono di esponenti alla x nella serie (A); sotto a ciascuno di scriva la corrispondente lettera b , c ec., che serve di coefficiente al termine, in cui ha luogo tale esponente, così

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
b .	c .	d .	e .	f .	g .	h .	i. ec.

Ciò posto, qualunque termine m non solo avrà tante parti, quante sono le maniere, secondo le quali è divisibile il numero $m-1$, ma in oltre ciascuna di queste parti si formerà dipendentemente da una di tali divisioni nella maniera seguente. Si chiami p il numero delle parti di ciascuna divisione del numero $m-1$; tra i coefficienti letterali formanti ciascuna parte vi sarà in primo luogo a^{m-p} , in secondo luogo vi faranno le lettere b , c , d ec., ogni qual volta nella corrispondente divisione si trovino i numeri, che gli sono compagni, e queste lettere elevate alla potenza indicata dal numero delle volte, che in essa divisione ha luogo il numero compagno. Rispetto al coefficiente numerico esso avrà per numeratore il prodotto nato dalla moltiplicazione di tanti termini della progressione aritmetica

$n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)$ ec., quanti ne disegna il numero p , e per denominatore il prodotto di altrettanti termini della serie naturale 1, 2, 3, ec., quante sono le parti uguali nella corrispondente divisione, e quante volte si muterà la grossezza delle parti, altrettante volte si ricomincerà da capo la serie naturale.

885. Si vedano qui sotto i primi otto termini della serie risultante dall'innalzarsi alla potenza n la serie (A), lateralmente ai quali ho posto le divisioni del proprio numero diminuito di una unità, dalle quali dipende l'invenzione delle parti di tale termine. Perché $1-1=0$, il primo termine non ha, che a^n : Perché $2-1=1$, che non è in altre parti divisibile, e ad 1 corrisponde b , però il secondo termine è

$\frac{n}{1} a^{n-1} b x$. Il terzo termine è $n \times \frac{n-1}{1} a^{n-2} b^2 + \frac{n}{1} a^{n-1} c x^2$, perchè

$3-1=2$, e il 2 ha per parti componenti 1, 1, e 2. La prima divisione 1, 1. somministra la prima parte $n \times \frac{n-1}{1} a^{n-2} b^2$ di questo terzo termine, mentre la prima maniera 1, 1, in cui è diviso il 2 dà tanto a^{n-2} , perchè in questo caso $p=2$, quanto b^2 , perchè l'1 corrispondente al b è posto due volte. La seconda maniera 2, in

2, in cui prendesi diviso il 2 dà la seconda parte $\frac{n}{1} a^{n-1} c$ di questo terzo termine, perchè in questa divisione vi è una sola parte, che perciò determina $p=1$, onde si ha a^{n-1} , e questa parte è 2, cui corrisponde il c , che per questo motivo deve moltiplicare a^{n-1} . Le stesse osservazioni si facciano sopra i seguenti altri termini.

I. termine

 a^n

Divisioni del num. 1.

II.

$$+ \frac{n}{1} a^{n-1} b x$$

Divis. del num. 2.

III.

1. 1.

2.

$$\left. \begin{array}{l} + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 2} a^{n-2} b^2 \\ \frac{n}{1} a^{n-1} c \end{array} \right\} x^2$$

Divis. del num. 3.

IV.

1. 1. 1.

1. 2.

3.

$$\left. \begin{array}{l} + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 3} a^{n-3} b^3 \\ + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} b c \\ \frac{n}{1} a^{n-1} d \end{array} \right\} x^3$$

Divis.

Divis. del num. 4.

V.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 2.

2. 2.

1. 3.

4.

$$\begin{aligned}
 & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3}}{1 \times 2 \times 3 \times 4} a^{n-4} b^4 \\
 & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 3} a^{n-3} b^3 c \\
 & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 2} a^{n-2} c^2 \\
 & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} b d \\
 & + \frac{n}{1} a^{n-1} c
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3}}{1 \times 2 \times 3 \times 4} a^{n-4} b^4 \\ & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 3} a^{n-3} b^3 c \\ & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 2} a^{n-2} c^2 \\ & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} b d \\ & + \frac{n}{1} a^{n-1} c \end{aligned}} \right\} x^4$$

Divis. del num. 5.

VI.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 2.

1. 2. 2.

1. 1. 3.

2. 3.

1. 4.

5.

$$\begin{aligned}
 & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3} \times \overline{n-4}}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} a^{n-5} b^5 \\
 & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3}}{1 \times 2 \times 3 \times 1} a^{n-4} b^4 c \\
 & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 1 \times 2} a^{n-3} b^2 c^2 \\
 & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 1} a^{n-3} b^3 d \\
 & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} c d \\
 & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} b e \\
 & + \frac{n}{1} a^{n-1} f
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3} \times \overline{n-4}}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} a^{n-5} b^5 \\ & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3}}{1 \times 2 \times 3 \times 1} a^{n-4} b^4 c \\ & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 1 \times 2} a^{n-3} b^2 c^2 \\ & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 1} a^{n-3} b^3 d \\ & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} c d \\ & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} b e \\ & + \frac{n}{1} a^{n-1} f \end{aligned}} \right\} x^5$$

Divis. del num. 6.

VII.

$$\begin{array}{lcl}
 1. 1. 1. 1. 1. 1. & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3} \times \overline{n-4} \times \overline{n-5}}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} a^{n-6} b^6 & \\
 1. 1, 1. 1. 1. 2. & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3} \times \overline{n-4}}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 1} a^{n-5} b^4 c & \\
 2. 1. 2. 2. & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3}}{1 \times 2 \times 1 \times 2} a^{n-4} b^3 c^2 & \\
 2. 2. 2. & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 3} a^{n-3} c^3 & \\
 1. 1. 1. 3. & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3}}{1 \times 2 \times 3 \times 1} a^{n-4} b^3 d & \\
 1. 2. 3. & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 1 \times 1} a^{n-3} b c d & \\
 3. 3. & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 2} a^{n-2} d^2 & \\
 1. 1. 4. & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 1} a^{n-3} b^2 c & \\
 2. 4. & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} c^2 & \\
 1. 5. & + \frac{n \times \overline{n-1}}{1 \times 1} a^{n-2} b f & \\
 6. & + \frac{n}{1} a^{n-1} g &
 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1. 1. 1. 1. 1. 1. \\ 1. 1, 1. 1. 1. 2. \\ 2. 1. 2. 2. \\ 2. 2. 2. \\ 1. 1. 1. 3. \\ 1. 2. 3. \\ 3. 3. \\ 1. 1. 4. \\ 2. 4. \\ 1. 5. \\ 6. \end{array}} \right\} x^6$$

Divis. del num. 7.

VIII.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}} \overline{X^{n-3}} \overline{X^{n-4}} \overline{X^{n-5}} \overline{X^{n-6}}}{1 \overline{X^2} \overline{X^3} \overline{X^4} \overline{X^5} \overline{X^6} \overline{X^7}} a^n - 7b^7$$

1. 1. 1. 1. 1. 2.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}} \overline{X^{n-3}} \overline{X^{n-4}} \overline{X^{n-5}}}{1 \overline{X^2} \overline{X^3} \overline{X^4} \overline{X^5} \overline{X^6}} a^n - 6b^6c$$

1. 1. 1. 2. 2.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}} \overline{X^{n-3}} \overline{X^{n-4}}}{1 \overline{X^2} \overline{X^3} \overline{X^4} \overline{X^5}} a^n - 5b^5c^2$$

1. 2. 2. 2.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}} \overline{X^{n-3}}}{1 \overline{X^1} \overline{X^2} \overline{X^3}} a^n - 4b^4c^3$$

1. 1. 1. 1. 3.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}} \overline{X^{n-3}} \overline{X^{n-4}}}{1 \overline{X^2} \overline{X^3} \overline{X^4} \overline{X^5}} a^n - 5b^4d$$

1. 1. 2. 3.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}} \overline{X^{n-3}}}{1 \overline{X^2} \overline{X^1} \overline{X^1}} a^n - 4b^3cd$$

2. 2. 3.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}}}{1 \overline{X^2} \overline{X^1}} a^n - 3c^3d$$

1. 3. 3.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}}}{1 \overline{X^1} \overline{X^2}} a^n - 3b^2d^2$$

1. 1. 1. 4.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}} \overline{X^{n-3}}}{1 \overline{X^2} \overline{X^3} \overline{X^4}} a^n - 4b^3c$$

1. 2. 4.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}}}{1 \overline{X^1} \overline{X^1}} a^n - 3bce$$

3. 4.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}}}{1 \overline{X^1}} a^n - 3de$$

1. 1. 5.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}} \overline{X^{n-2}}}{1 \overline{X^2} \overline{X^1}} a^n - 3b^2f$$

2. 5.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}}}{1 \overline{X^1}} a^n - 3cf$$

1. 6.

$$\frac{n \overline{X^{n-1}}}{1 \overline{X^1}} a^n - 3bg$$

7.

$$\frac{n}{1} a^n - 3b$$

Zz 2

886.

836. La dimostrazione di questo metodo si deduce dall'osservare, che, a norma di quanto si è detto per inalzare una quantità qualunque a una proposta potenza, essendo $\Rightarrow$ il primo termine della serie (A) da inalzarli alla potenza n , e gli altri termini contenendo la x colle di lei successive potenze, il primo termine della potenza n della serie (A) dovrà essere a^n e gli altri termini dovranno risultare da prodotti de' coefficienti b, c, d ec., tra quali deve aver luogo una conveniente potenza di a , moltiplicati nelle successive potenze di x : Ma con moltiplicarli una quantità in se stessa una sola volta ciascun di lei termine si combina con qualunque altro, onde ne nascono tutti gli ambi possibili di questi termini, così con moltiplicarla due volte in se stessa ne nascono tutti i terni, e generalmente con moltiplicarla in se stessa un numero di volte $\Rightarrow n$ ne devono nascere tutti i prodotti secondo il numero n ; quindi è, che dovendosi alzare la serie (A) alla potenza n , in ogni parte di ciascun termine della potenza n vi dovrà essere un prodotto tale di coefficienti letterali b, c ec., che con la conveniente potenza di a giunga a compiere le dimensioni n . Ora moltiplicandosi tutti in tutti questi coefficienti letterali, vi devono perciò essere tutte le loro combinazioni possibili; e siccome le divisioni del numero $m-1$ (in vece di prendere le divisioni del numero m esprimente un qualunque termine della cercata potenza si prendono le divisioni del numero $m-1$, perchè i coefficienti letterali cominciano ad aver luogo solo nel secondo termine di quella potenza) danno tutte le combinazioni, dalle quali può risultare lo stesso numero $m-1$, egli è perciò, che in ciascuna parte di qualsivoglia termine di questa potenza vi devono essere le combinazioni de' coefficienti letterali relativamente alle divisioni del numero $m-1$, cioè vi devono essere le lettere compagne delle parti di queste divisioni, e queste lettere inalzate alle potestà indicate dal numero delle parti compagne, conseguentemente essendo $\Rightarrow$ il numero delle parti componenti in ciascuna divisione, sarà pure $\Rightarrow p$ la somma degli esponenti delle lettere b, c, d ec., onde dovendo essere sempre $\Rightarrow$ il numero delle dimensioni, che ha in ogni parte di ciascun termine della cercata potenza n il coefficiente letterale, la potenza di a , che vi interverrà dovrà essere $n-p$. Quanto al coefficiente numerico dovendo esso esprimere il numero di tutte le combinazioni possibili dello stesso numero n di lettere a, b, c ec. ripetute quanto porta l'esponente di ciascuna, egli dovrà appunto essere (giusta il num. 1383. del I. Tomo) a norma delle fatte determinazioni.

837. Allorchè si determinerà l'esponente n ad essere un numero intero positivo, tra le diverse divisioni del numero $m-1$ varranno quelle sole, in cui il numero delle parti non sarà maggiore di n , altrimenti se si prendesse un numero di parti maggiore di n , si avrebbe nel numeratore del coefficiente numerico $n-n \Rightarrow 0$, che manderebbe cotai parte a zero: Per esempio se si volesse inalzare alla quarta potenza la serie (A) tanto che si giungesse al sesto termine (si osservino questi termini trovati al num. 885.) si dovrebbe ommettere la parte corrispondente alla prima divisione: Pel settimo termine si dovrebbero ommettere le parti corrispondenti alla prima, e seconda divisione: Per l'ottavo termine si rigetterebbero la prima, seconda, terza, e quinta ec.

838. Se nella serie da inalzarli alla potenza n mancherà qualche potenza di x , sarà $\Rightarrow$ il coefficiente letterale di questo termine, onde è, che si dovranno rigettare tutte quelle divisioni del numero $m-1$, in cui entrerà tra le sue parti quello esponente di x , che manca, vale a dire il numero corrispondente alla lettera $\Rightarrow 0$; O pure nella formola generale trovata al num. 885. bisognerà levare da ciascun termine quelle parti, nelle quali si trova la detta lettera. Per esempio dovendosi inal-

zare alla potenza n la serie $a+bx+fx^3+ix^5$ ec., l'ottavo termine di questa potenza farebbe

$$\left. \begin{aligned} & + \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2} \times \overline{n-3} \times \overline{n-4} \times \overline{n-5} \times \overline{n-6}}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7} a^{n-7} b^7 \\ & \frac{n \times \overline{n-1} \times \overline{n-2}}{1 \times 2 \times 1} a^{n-3} b^3 f \end{aligned} \right\} x^7$$

889. Quando la serie da inalzarsi alla potenza n avrà tutti i termini, al crescere de' termini della cercata potenza cresceranno a dismisura le parti componenti ciascuno di loro. Il Sig. Eulero ha esaminato questa materia al Capo 16 del primo Tomo dell'introduzione in *Analysin infinitorum*, ove dà la seguente Tavola

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	2.	3.	5.	7.	11.	15.	22.	30.	42.	56.	77.	101.	135.	176.
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.						
231.	297.	385.	490.	627.	792.	1002.	1250.	1570.						

nella quale ciascun numero, che sta di sotto mostra in quante maniere possa dividersi il numero, che gli sta di sopra.

890. Per ridurre al caso pratico la precedente formola del num. 885. inserviente a inalzare una serie a qualunque potenza, sia proposto di inalzare al cubo la serie $a+x+\frac{x^3}{a}+\frac{x^5}{a^2}+\frac{x^7}{a^3}+\frac{x^9}{a^4}+\frac{x^{11}}{a^5}+\frac{x^{13}}{a^6}$ ec. Nella formola del numero 885.

si faccia $m=3$, $a=a$, $b=1$, $c=\frac{1}{a}$, $d=\frac{1}{a^2}$, $e=\frac{1}{a^3}$, $f=\frac{1}{a^4}$, $g=\frac{1}{a^5}$, $h=\frac{1}{a^6}$ ec. lo che fatto, il primo termine della cercata potenza farà a^3 , il secondo $3a^2x$, il terzo $6ax^2$, il quarto $10x^3$, il quinto $\frac{15x^4}{a}$, di cui la prima parte va a zero giu-

sta il num. 887., il sesto, di cui le due prime parti vanno a zero, $\frac{21x^5}{a^2}$, il settimo,

di cui vanno a zero la prima, la seconda, la terza, e la quinta parte, $\frac{28x^6}{a^3}$, l'ot-

tavo, di cui va a zero la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 parte, $\frac{36x^7}{a^4}$ ec., e però

$$a+x+\frac{x^3}{a}+\frac{x^5}{a^2}+\frac{x^7}{a^3} \text{ ec. } = a^3+3a^2x+6ax^2+10x^3+\frac{15x^4}{a}+\frac{21x^5}{a^2}+\frac{28x^6}{a^3}+\frac{36x^7}{a^4} \text{ ec.}$$

Osservando i termini di questa serie si scoprirà tosto la legge con cui vanno all'infinito, mentre nel numeratore di ciascun termine la x va continuamente crescendo di un grado, e lo stesso fa pure l' a nel denominatore, i coefficienti numeri-
ci

ci poi procedono con quest'ordine, che ciascuno di un qualunque termine m nasce dal coefficiente del termine precedente aumentato del termine m della serie naturale, dal che nascono per coefficienti i numeri triangolari. Ora mediante queste osservazioni si potrà continuare la serie a piacere senza aver bisogno di più ricorrere alla formola del num. 885.

891. Questa formola del numero 885. serve per tutti i casi, comunque l'esponente n sia intero, o rotto, positivo, o negativo. Prenderò a esaminare il caso, in cui l'esponente n è un numero fratto positivo, mentre ciò appunto serve per l'ultima delle proposte operazioni nelle serie, che è di estrarre una qualunque radice da una serie infinita. Dovendo adunque essere n un numero fratto, si faccia egli $= \frac{1}{n}$, e questo valore si sostituisca nella formola del num. 885., con che essa si cambierà nella seguente.

I. termine

$$\frac{1}{a^n}$$

II.

$$\frac{1}{n} \frac{1-n}{a^n} b x$$

III.

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \frac{1-2n}{a^n} b^2 \\ \frac{1}{n} \frac{1-n}{a^n} c \end{aligned} \right\} x^2$$

IV.

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \frac{1-3n}{a^n} b^3 \\ \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} \frac{1-2n}{a^n} b c \\ \frac{1}{n} \frac{1-n}{a^n} d \end{aligned} \right\} x^3$$

V.

V.

$$\left. \begin{aligned}
 & + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{n} \quad b^4 \\
 & + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{n} \times \frac{1-3n}{n} \quad b^3 c \\
 & \quad \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{n} \quad c^3 \\
 & \quad \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} \times \frac{1-2n}{n} \quad b d \\
 & \quad \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} \times \frac{1-3n}{n} \quad c
 \end{aligned} \right\} \times^4$$

VL

$$\left. \begin{aligned}
 & + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{n} \quad b^5 \\
 & + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{n} \times \frac{1-4n}{n} \quad b^4 c \\
 & + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} \times \frac{1-2n}{2n} \times \frac{1-3n}{n} \quad b^3 c^2 \\
 & + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{n} \times \frac{1-3n}{n} \quad b^3 d \\
 & \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} \times \frac{1-2n}{n} \quad c d \\
 & \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} \times \frac{1-2n}{n} \quad b e \\
 & \quad \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} \quad f
 \end{aligned} \right\} \times^5$$

VII.

VII.

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} a \frac{1-6n}{n} b^6 \\
& \quad \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{1-3n} \times \frac{1-4n}{n} a \frac{1-5n}{n} b^5 c \\
& \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{n} \times \frac{1-3n}{2n} a \frac{1-4n}{n} b^4 c^2 \\
& \quad \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} a \frac{1-3n}{n} c^3 \\
& \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{n} a \frac{1-4n}{n} b^3 d \\
& \quad \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} \times \frac{1-2n}{n} a \frac{1-3n}{n} bcd \\
& \quad \quad \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} a \frac{1-3n}{n} d^2 \\
& \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{n} a \frac{1-3n}{n} b^2 e \\
& \quad \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} a \frac{1-2n}{n} ce \\
& \quad \quad \quad + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{n} a \frac{1-2n}{n} bf \\
& \quad \quad \quad \quad + \frac{1}{n} a \frac{1-n}{n} g
\end{aligned}
\Bigg\} x^6$$

VIII.

VIII.

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{7n} \times \frac{1-7n}{a} b^7 \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b^5 c \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b^3 c^2 \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b c^3 \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b^4 d \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b^3 c d \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b^2 c^2 d \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b d^3 \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b^3 e \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b^2 c e \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} d e \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b^3 f \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} c f \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b g \\
& + \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{3n} \times \frac{1-3n}{4n} \times \frac{1-4n}{5n} \times \frac{1-5n}{6n} \times \frac{1-6n}{a} b
\end{aligned}$$

892. Per fare l'applicazione di questa formola generale a qualche caso particolare prendo per esempio la precedente formola $a + x + \frac{x^2}{a} + \frac{x^3}{a^2} + \frac{x^4}{a^3} + \frac{x^5}{a^4} + \frac{x^6}{a^5} + \frac{x^7}{a^6}$ ec., dalla quale voglio estrarre la radice cuba. Sarà adunque $n=3$, $a=a$, $b=1$, $c=\frac{1}{a}$, $d=\frac{1}{a^2}$, $e=\frac{1}{a^3}$ ec. Fatte queste sostituzioni nella poc' anzi trovata

formola generale, il primo termine della cercata radice si troverà essere $\frac{1}{a^{\frac{1}{3}}}$, il secondo $\frac{x}{3a^{\frac{2}{3}}}$, il terzo $\frac{4x^2}{18a^{\frac{5}{3}}}$, il quarto $\frac{14x^3}{81a^{\frac{8}{3}}}$, il quinto $\frac{35x^4}{243a^{\frac{11}{3}}}$, il

sesto $\frac{71x^5}{729a^{\frac{14}{3}}}$ ec., e però sarà $a + x + \frac{x^2}{a} + \frac{x^3}{a^2} + \frac{x^4}{a^3} + \frac{x^5}{a^4}$ ec. =

$$a^{\frac{1}{3}} + \frac{x}{3a^{\frac{2}{3}}} + \frac{4x^2}{18a^{\frac{5}{3}}} + \frac{14x^3}{81a^{\frac{8}{3}}} + \frac{35x^4}{243a^{\frac{11}{3}}} + \frac{71x^5}{729a^{\frac{14}{3}}} \text{ ec.}$$

893. Tanto la formola del num. 885, come quella del num. 891 può servire per un numero finito di quantità, la prima per inalzarle alla potenza n , la seconda per estrarci la radice $\frac{1}{n}$.

894. Io ho sempre considerate le serie, il di cui primo termine è una quantità cognita, perchè quantunque la serie sia così $ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + ex^5 + fx^6$ ec., ella si potrà considerare in questo modo $x \sqrt[n]{a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5}$ ec. da trattarsi come sin' ora si è fatto.

ARTICOLO IV.

Del regresso delle serie.

895. Il regresso delle serie non consiste in altro, se non che avendo il valore x di una serie, i di cui termini sono distinti dalle potenze di y , trovare il valore di y mediante una nuova serie, i di cui termini siano distinti colle potenze di x .

896. La maniera di ottenere ciò è la seguente. Sia data la serie $x = ay + by^2 + cy^3 + dy^4 + ey^5 + \text{ec.}$, e si voglia trovare il valore di y espresso da una serie avente le potenze di x . Si eguagli primieramente a zero l'equazione da-

data così $0 = -x + ay + by' + cy'' + dy'''$ ec.; poscia si ponga l'incognita y uguale ad una serie a coefficienti indeterminati, e da determinarsi col calcolo, in questo modo $y = Ax + Bx' + Cx'' + Dx''' +$ ec. Questa serie a coefficienti indeterminati si innalzi a tutte le potenze (giusta il metodo dato ai num. 883., e 884.), alle quali trovatisi innalzata la y nei termini dalla serie proposta, in essa si sostituiscano queste potenze in luogo delle corrispondenti potenze di y , si mettano sotto a un sol termine tutti quei coefficienti, che affettano una stessa potenza di x , si faccia poscia uguale a zero ciascun termine, e con ciò si ricavano i valori delle assunte indeterminate A, B, C, D ec.; si sostituiscano per ultimo questi ritrovati valori nella serie indeterminata $Ax + Bx' + Cx'' +$ ec., lo che fatto, sarà essa la serie cercata.

897. Poichè il metodo è lo stesso anche in caso, che, essendovi una equazione, i di cui due membri siano due serie, la prima risultante dalle potenze di una incognita, e la seconda dalle potenze di un'altra incognita, si voglia trovare il valore di una di queste due incognite per mezzo di una serie, che contenga l'altra incognita, perciò proporrò l'esempio su questo caso, mentre essendo esso genetalissimo, e abbracciando sotto di se qualunque altro, la serie, che ne dedurrò, potrà servire di canone ecumenico da potersene servire in qualsivoglia circostanza senza aver bisogno di ricorrere al calcolo.

898. Sia data l'equazione $ax + bx' + cx'' + dx''' + ex'''' +$ ec. $= ay + yy' + yy'' + yy''' +$ ec.: Si trasportino i termini, e si uguagli questa equazione a zero, così $(\Delta) ax + bx' + cx'' + dx''' + ex'''' +$ ec. $- ay - yy' - yy'' - yy''' -$ ec. $= 0$. Volendosi il valore di x espresso da una serie data per y , si assuma la seguente serie indeterminata, e si faccia $x = Ay + By' + Cy'' + Dy''' + Ey'''' +$ ec., indi nella serie (Δ) in luogo di x , e delle sue potenze si sostituiscano questo suo valore, e le di lui corrispondenti potenze, come segue

$$\begin{aligned}
 ax &= aAy + aB^2y^2 + aCy^3 + aDy^4 + aEy^5 + aFy^6 + aGy^7 + aHy^8 \text{ ec.} \\
 +bx' &= +bA^2y^2 + 2bAB^2y^3 + bB^3y^4 + 2bADy^5 + bC^2y^6 + 2bCDy^7 + bD^2y^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 2bACy^4 + 2bBCy^5 + 2bAEy^6 + 2bBEy^7 + 2bCEy^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 2bBDy^5 + 2bAEy^7 + 2bBFy^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 2bAGy^8 \text{ ec.} \\
 +cx'' &= +cA^3y^3 + 3cA^2By^4 + 3cAB^2y^5 + cB^3y^6 + 3cB^2Cy^6 + 3cBC^2y^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 3cA^2Cy^5 + 6cABCy^6 + 3cAC^2y^7 + 3cB^2Dy^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 3cA^2Dy^6 + 6cABDy^7 + 6cACDy^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 3cA^2Ey^7 + 6cABEy^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 3cA^2Fy^8 \text{ ec.} \\
 +dx''' &= +dA^4y^4 + 4dA^3By^5 + 6dA^2B^2y^6 + 3dAB^3y^7 + dB^4y^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 4dA^3Cy^6 + 12dA^2BCy^7 + 12dAB^2Cy^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 4dA^3Dy^7 + 6dA^2C^2y^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 12dA^2BDy^8 \text{ ec.} \\
 &\quad + 4dA^2Ey^8 \text{ ec.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
+rx^2= & +cA^2y^5+5cA^2By^4+10cA^1B^2y^3+10cA^1B^1y^2 & \text{ec.} \\
& +5cA^1Cy^2+20cA^1BCy^2 & \text{ec.} \\
& +5cA^1Dy^2 & \text{ec.} \\
+fx^4= & +fA^4y^6+6fA^3By^5+15fA^2B^2y^4 & \text{ec.} \\
& +5fA^1Cy^6 & \text{ec.} \\
+gx^8= & +gA^7y^7+7gA^6By^6 & \text{ec.} \\
+bx^8= & +bA^8y^8 & \text{ec.} \\
-8y & -7y^2 & -2y^3 \quad -y^4 \quad -2y^5 \quad -y^6 \quad -\mu y^7 \quad -y^8 \quad \text{ec.}
\end{array}$$

Si uguagli ora a zero ciascun termine della ritrovata serie a fine di avere i valori delle affiunte indeterminate A, B, C ec., e ne verrà I. $Aa - B = 0$. II. $aB + A^2b - \gamma = 0$. III. $aC + 2bAB + cA^3 - \delta = 0$. IV. $aD + bB^2 + 2bAC + 3A^2cB + dA^4 - s = 0$. V. $aE + 2bAD + 2bBC + 3cAB^2 + 3cA^2C + 4dA^1B + cA^5 - \lambda = 0$. VI. $aF + bC^2 + 2bAE + 2bBD + cB^3 + 6cABC + 3cA^2D + 6dA^2B^2 + 4dA^3C + 5cA^4B + fA^6 - \varphi = 0$. VII. $aG + 2bCD + 2bBE + 2bAF + 3cB^2C + 3cAC^2 + 5cABD + 3cA^2E + 4dAB^3 + 12dA^2BC + 4dA^3D + 10cA^1B^2 + 5cA^4C + 5fA^5B + gA^7 - \mu = 0$. VIII. $aH + bD^2 + 2bCE + 2bBF + 2bAG + 3cBC^2 + 3cB^2D + 6cACD + 6cABE + 3cA^2F + dB^4 + 12dAB^2C + 5dA^1C^2 + 12dA^1BD + 4dA^1E + 10cA^1B^2 + 20cA^1BC + 5cA^4D + 15fA^4B^2 + 6fA^3C + 7gA^8B + bA^8 - \nu = 0$. ec.

Con questi paragoni si determinino adesso le incognite così. da I. si ha

$$A = \frac{\beta}{a}. \text{ Da II. } B = \frac{\gamma - A^2b}{a} = \frac{a^2\gamma - \beta^2b}{a^3} \text{ con sostituirli il valore di } A^2.$$

$$\text{Da III. } C = \frac{\delta - cA^3 - 2bAB}{a} = \frac{a^4\delta - a\beta^3c - 2a^2\gamma\beta b + 2b^3\beta^3}{a^5} \text{ con sostituirli i va-}$$

$$\text{lori di } A^3, \text{ e di } AB. \text{ Da IV. } D = \frac{s - dA^4 - 3A^2Bc - 2bAC - bB^3}{a} =$$

$$\frac{a^6s - a^2d\beta^4 - 3a^3\beta^2\gamma + 5abc\beta^4 - 2a^4b\beta\delta + 6a^2b^2\beta^3\gamma - 5b^3\beta^4 - a^4b\gamma^2}{a^7}$$

mediante la sostituzione de' valori di A^4 , di A^2B , di AC , e di B^3 .

$$\text{Da V. } E = \frac{\lambda - cA^5 - 4dA^1B - 3cA^2C - 3cAB^2 - 2bBC - 2bAD}{a}$$

$$= \frac{\begin{cases} a^6\lambda - a^3c\beta^5 - 4a^4d\beta^2\gamma + 6a^2b\delta\beta^3 - 3a^5\beta^3c\delta + 3a^3\beta^2c^2 + 20a^3b\beta^2c\gamma - 21a^4b^2\beta^2c \\ - 3a^5\beta^2\gamma^2 - 2a^6b\delta\gamma + 5a^4b^2\beta^2\gamma^2 + 6a^2b^2\beta^2\delta + 14b^4\beta^5 - 2a^6b\beta^4 - 20a^2b^3\beta^3\gamma \end{cases}}{a^9}$$

col rimettere i valori di A^5 , A^1B ec. Da VLF =

$$\frac{-fA^6 - 5cA^4B - 4dA^2C - 6dA^2B^2 - 3cA^2D - 6cABC - cB^3 - 2bBD - 2bAE - bC^2}{a};$$

cioc

cioè, sostituendo i valori di A, B, C, D, E

$$F = \frac{\left\{ \begin{aligned} & a^{10} - a^4 f \beta^4 - 5c \chi (a^3 \beta^2 \gamma - a^3 b \beta^2) - 2d \chi (2a^2 \beta^2 \delta - 2a^2 c \beta^2 - 10a^4 b \beta^2 \gamma + 7a^2 b^2 \beta^4 + \\ & 3a^2 \beta^2 \gamma^2) - c \chi (3a^2 \beta^2 \gamma - 3a^2 d \beta^2 - 15a^4 c \beta^2 \gamma + 21a^2 b c \beta^2 - 12a^3 b \beta^2 \delta + 45a^3 b^2 \beta^4 \gamma - \\ & 28a^3 b^2 \beta^4 - 18a^3 b \beta^2 \gamma^2 + 6a^2 \beta^2 \gamma \delta + a^2 \gamma^2) - b \chi (2a^2 \beta^2 \lambda - 2a^2 \beta^2 c - 10a^4 d \beta^2 \gamma + 14a^2 b d \beta^4 \\ & - 8a^3 c \beta^2 \delta + 7a^2 c^2 \beta^2 + 50a^4 b c \beta^2 \gamma - 55a^4 b^2 c \beta^2 - 12a^3 c \beta^2 \gamma^2 - 12a^2 c b \beta^2 \delta + 30a^4 b^2 \beta^4 \gamma^2 \\ & + 20a^4 b^2 \beta^2 \delta + 42b^4 \beta^4 - 6a^4 b \beta^2 \gamma - 70a^2 b^2 \beta^4 \gamma + 2a^2 \gamma^2 - 2a^2 b \gamma^2 + a^2 \delta^2) \end{aligned} \right\}}{a^{11}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} & \mu - g A^7 - 6f A^5 B - 5c \chi (A^4 C + 2A^3 B^2) - 4d \chi (A^3 D + 3A^2 B C + A B^2) \\ & - 3c \chi (A^2 E + 2ABD + AC^2 + B^2 C) - 2b \chi (A F + B E + C D) \end{aligned} \right\}$$

Da VII. G =

cioè sostituendo i ritrovati valori di A, B, C, D, E, F

$$G = \frac{\left\{ \begin{aligned} & a^{11} \mu - a^2 g \beta^7 - 6f \chi (a^6 \beta^2 \gamma - a^4 b \beta^2) - 5c \chi (a^7 \beta^2 \delta - a^4 \beta^2 c - 5a^3 b \beta^2 \gamma + 4a^3 b^2 \beta^4 \gamma \\ & + 2a^2 \beta^2 \gamma^2) - 4d \chi (a^6 \beta^2 \gamma - a^4 d \beta^2 - 6a^3 c \beta^2 \gamma - 8a^3 b^2 c \beta^2 - 5a^4 b \beta^2 \delta + 2a^4 b^2 \gamma^2 \\ & - 12a^4 b^2 \beta^2 - 10a^4 b \beta^2 \gamma^2 + 3a^2 \beta^2 \gamma \delta + a^2 \gamma^2) \\ & - 3c \chi (2a^2 \beta^2 \gamma - 6a^3 d \beta^2 \gamma - 10a^4 c \beta^2 \gamma^2 + 42a^2 b c \beta^2 \gamma - 12a^2 b^2 \beta^2 \gamma + 30a^4 b^2 \beta^4 \gamma^2 \\ & - 54a^3 b^2 \beta^2 - 4a^2 b \beta^2 \gamma - 4a^2 b \beta^2 \gamma + 8a^3 b d \beta^2 - 36a^3 b^2 c \beta^2 + 15a^4 b^2 \beta^2 \gamma + a^2 \beta^2 \delta \\ & - 5a^4 c \beta^2 \delta + 4a^3 c^2 \beta^2 + a^2 \gamma^2 \delta + a^2 \beta^2 \lambda - a^4 c \beta^2) - 2b \chi (a^{10} \delta - 5a^4 d \beta^2 \delta - 12a^2 c \beta^2 \delta \\ & + 30a^3 b c \beta^2 \delta - 3a^3 b \beta^2 \delta + 30a^4 b^2 \beta^2 \delta - 35a^4 b^2 \beta^2 \delta - 3a^2 b \gamma^2 \delta - 4a^2 c \beta^2 \delta + 8a^3 c d \beta^2 \\ & + 21a^4 c^2 \beta^2 - 36a^4 b c^2 \beta^2 - 168a^3 b^2 c \beta^2 \gamma + 120a^4 b^2 c \beta^2 \gamma + 60a^3 b c \beta^2 \gamma^2 - 6a^4 b \beta^2 \gamma \\ & + 42a^4 b d \beta^2 \gamma - 70a^4 b^2 \beta^2 \gamma + 126a^3 b^2 \beta^2 \gamma + 10a^4 b^2 \beta^2 \gamma + 10a^4 b^2 \beta^2 \gamma - 36a^3 b^2 d \beta^2 \\ & - 66b^5 \beta^2 + a^{10} \gamma \lambda - 6a^5 c \beta^2 \gamma - 10a^4 d \beta^2 \gamma^2 - 4a^2 c \beta^2 \gamma - 3a^2 b \beta^2 \lambda + 8a^3 b c \beta^2 \\ & + a^{10} b \beta - a^4 f \beta^2) \end{aligned} \right\}}{a^{13}}$$

Si avrà adunque la serie cercata, che dà il valore di x, così

$$(II) x = \frac{\beta}{a} \gamma + \frac{a^2 \gamma - b \beta^2}{a^3} \gamma^2 + \frac{a^4 \delta - a \beta c - 2a^2 \gamma b \beta + 2b^2 \beta^2}{a^3} \gamma^3 + \frac{a^5 \delta - a^2 d \beta^2 - 3a^2 \beta^2 \gamma + 3ab c \beta^2 - 2a^4 b \beta^2 + 2ab \beta^2 c + 5a^4 b^2 \beta^2 \gamma - 5b^2 \beta^2 \gamma - a^2 b \gamma^2}{a^7} \gamma^4$$

899. Questa serie trovata è una formola generalissima, la quale serve non solo nel caso di $ax + bx^m + cx^n + d\sqrt{x} + ex^2$ ec. = $\beta \gamma + \gamma^2 + \delta \gamma^3 + \gamma^4 + \lambda \gamma^5 +$ ec., in cui tan-

tanto gli esponenti m, n, p, q ec., come gli esponenti r, s, t, u ec. possono essere in qualsivoglia progressione aritmetica, ma serve eziandio nel caso di $x = ay + by^m + cy^n + dy^p + \text{ec.}$ qualunque sia la progressione aritmetica formata dagli esponenti m, n, p ec., mentre in questi casi non si dovrà far altro, che supporre in questa formula generale uguali a zero i coefficienti di quei termini, che mancano nelle proposte serie. Quanto al primo caso sia data l'equazione $ax + cx^3 + ex^5 + gx^7 + \text{ec.} = by + dy^3 + ly^5 + my^7 + \text{ec.}$, e si voglia il valore di x espresso da una serie data per y . Poichè mancano tutti i termini in potti pari, si faccia nella serie generale (II) $b=0, d=0, f=0$ ec., $\gamma=0, \delta=0, \lambda=0$ ec., e tutti i termini, ne quali entrano queste lettere andranno a zero, onde essa si cambierà nella seguente

$$x = \frac{\beta}{a} + \frac{a^3\delta - \beta^3\epsilon}{a^4} \chi y^3 + \frac{+a^5\lambda - 3\beta^2\delta^2\epsilon - a\epsilon\beta^2 + \beta^5\epsilon^2}{a^5} \chi y^5 + \text{ec.}$$

Se l'equazione fosse stata $ax + dx^4 + gx^7 + \text{ec.} = by + cy^3 + ly^5 + \text{ec.}$ nella serie generale (II) si dovrebbe fare $b=0, c=0, e=0, f=0$ ec., $\gamma=0, \delta=0, \lambda=0, \mu=0$ ec.,

conseguentemente ella farebbe $x = \frac{\beta}{a} + \frac{a^4\epsilon - d\beta^4}{a^5} \chi y^4 + \text{ec.}$

900. Quanto al secondo caso sia data l'equazione $y = ax + bx^3 + cx^5 + dx^7 + ex^9$ ec., e si voglia il valore di x espresso da una serie data per y ; poichè del primo membro dell'equazione del num. 898 non vi è, che il primo termine, il di cui coefficiente è 1, perciò nella serie (II) si faccia $\beta=1, \gamma=0, \delta=0, \lambda=0$ ec., ed

essa si cambierà nella seguente $x = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a^3}y^3 + \frac{2b^2 - ac}{a^5}\chi y^5 +$

$$\frac{5abc + 6a^2b^2c - 5b^3 - a^2d}{a^7}\chi y^7 + \frac{6a^2bd - a^3c + 3a^2c^2 - 21ab^2c + 4b^4 - 12a^2b^2c}{a^9}\chi y^9 \text{ ec.}$$

901. Se l'equazione data al precedente numero 900 fosse stata $y^m = ax + bx^3 + cx^5 + dx^7 + \text{ec.}$, e si avesse voluto il valore di x espresso da una serie data per y , si avrebbe primieramente dovuto rendere lineare la y con estrarre dall'uno, e l'altro membro della data equazione la radice m , lo che fatto si opererebbe giusta lo stesso num. 900.

902. Se non si avesse in pronto la serie (II) del num. 898, e fosse data l'equazione $y = ax + bx^3 + cx^5 + \text{ec.}$ con questo di trovare il valore di x dato per y , ciò si otterrebbe operando nel modo stesso praticato al num. 898, con fare cioè la x uguale a una serie indeterminata, come $Ay + By^3 + Cy^5 + Dy^7$ ec., nella quale devonfi sostituire tutte le potenze di y prese dall'equazione data con alzarla successivamente a quelle potenze, indi mediante il paragone de' termini ricavare i valori di A, B, C ec., dalla di cui sostituzione nella serie indeterminata, si avrà la serie cercata. Che se farà data l'equazione $y = a + bx + cx^3 + dx^5 + \text{ec.}$ per facilitare il calcolo si faccia $y - a = z$, con che l'equazione data farà $z = bx + cx^3 + dx^5 + \text{ec.}$, onde bisognerà fare x uguale alla seguente serie indeterminata $Bz + Cz^3 + Dz^5 + \text{ec.}$, e poscia operare come pur ora si è detto.

903. Dalle cose esposte s'intende come si dovrà regolare, se essendo data l'equazione $ax + byx + cy^3x + dy^5x + \text{ec.} = by + y^3 + y^5 + y^7 + \text{ec.}$, o qualunque altra simile, si voglia il valore di x espresso da una serie data per y .

904. Resterebbe da dimostrarli l'operazione esposta al num. 898, ma questa è una cosa tanto evidente, che nulla più, mentre con sostituirli nel primo membro dell'equazione (Δ) in luogo delle potenze di x i loro corrispondenti valori, egli non si altera; ma col trasferirsi da una parte del segno d'egualità tutti i termini di una equazione essa va a zero, lo che non succede, se non con distruggerli rispettivamente i termini consimili: Ottimamente adunque l'aggregato de' termini consimili si uguaglia a zero a fine di avere i valori delle aliante indeterminate A, B, C ec. Lo che era da dimostrarli.

905. Veniamo per ultimo a un caso particolare. Data l'equazione $y = x + \frac{1}{6} x^2 + \frac{3}{40} x^3 + \frac{5}{112} x^4 + \text{ec.}$ si voglia il valore di x espresso da una serie data per y . Prendo la serie generale (Π) del num. 898, nella quale faccio $a=1, \gamma=0, \delta=0, \epsilon=0$ ec., e in oltre $a=1, b=0, c=\frac{1}{6}, d=0, e=\frac{3}{40}, f=0, g=\frac{5}{112}$ ec. con che ho $x=y - \frac{1}{6} y^2 + \frac{1}{120} y^3 - \frac{1}{5040} y^4 + \text{ec.}$

ARTICOLO V.

Modo di sommare le serie.

906. **T**Ra le serie d'infiniti termini, delle quali si vuole la somma, altre sono sommabili, che ricevono una somma finita: Altre non ammettono una somma esatta, ma solo per approssimazione: Alcune danno una somma infinita, in quanto che o sono crescenti, o sia divergenti, o pure essendo decrescenti procedono con un tale ordine di parti, che non si possono avere in un tutto, se egli non si prenda un numero infinito di volte, e in tal caso, che questo tutto si prenda un numero infinito di volte, la serie è infinita, ovvero *vice versa* essendo la serie infinita, il tutto si deve prendere un numero infinito di volte. Tale è la serie

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ ec., i di cui termini vanno bensì decrescendo, ma quando il loro numero è infinito, infinita è pure la somma della serie. Alcune altre serie danno una somma minore di qualunque quantità assegnabile. Ciò si può vedere osservando come procedono le somme delle seguenti serie infinite, per le quali si è trovato al num. 1104. del I. Tomo, che

di $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \frac{1}{243} + \text{ec.}$ la somma è $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

di $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{256} + \frac{1}{1024} + \text{ec.}$ la somma è $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$

di $\frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \frac{1}{625} + \frac{1}{3125} +$ ec. la somma è $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{1}{4}$

di $\frac{1}{6} + \frac{1}{36} + \frac{1}{216} + \frac{1}{1296} + \frac{1}{7776} +$ ec. la somma è $\frac{1}{6} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{1}{5}$ ec.

Quindi le somme di queste serie andando continuamente decrescendo a misura, che cresce il denominatore del primo termine, ben si vede, che essendo arbitrario il primo termine, egli si potrà prendere tale, che la somma della serie sia minore di qualunque quantità assegnabile. La ragione poi per cui queste serie danno una somma minore, e minore del tutto che confidero per l'unità, si è, perchè tra i termini di queste serie non cadono tutte le parti, che formano il tutto, e il numero delle parti mancanti è tanto maggiore, quanto maggiore è il denominatore del primo termine.

907. Nel determinare la somma delle serie io seguirò il metodo del Chiarissimo Padre Riccati della Compagnia di Gesù comunicatoci nell'aureo suo Commentario *De seriebus recipiendis summam algebraicam, aut exponentialem*, avvegnachè facile, e piano egli sia, e vanti maggiore generalità sopra ogni altro. Si è veduto al num. 811, che tre sono i generi principali, ne quali distinguonsi le serie, cioè in serie aritmetiche, in serie geometriche, e in serie aritmetico-geometriche. Anderò per ordine esponendo il modo di determinare le somme.

908. Prima di tutto però bisogna dire, che cosa sia il termine generale di una serie. Termine generale pertanto di una serie non è altro, che una certa funzione (dal num. 558. costa che cosa debba intendere per nome di funzione) di una lettera indeterminata, per esempio n , la qual funzione rappresenta qualsivoglia termine della serie; per lo che per avere un certo termine della serie, basta sostituire nella detta funzione in luogo di n quel numero della serie naturale, che esprime il posto dello stesso termine nella serie: Così per avere il settimo termine bisognerà sostituire il 7 in luogo di n , e bisognerà sostituirci il 21 per avere il termine vigesimo primo; e per avere tutti i termini della serie, cominciando dal primo, bisognerà sostituirci successivamente tutti i numeri 1, 2, 3, 4, 5 ec. della serie naturale. Ora da ciò, e da quanto si è detto all'Articolo IX. del Capo III. si intende, che qualsivoglia equazione è termine generale di una serie, le quali serie sono di genere aritmetico (giusta il num. 811.)

909. Somma generale di una serie non è altro, che una certa funzione di una lettera indeterminata n , la qual funzione rappresenta generalmente la somma di quanti termini si vogliono della serie, e per avere attualmente questa somma basta sostituire nella detta funzione in luogo di n il numero de' termini da sommarli: Come volendosi la somma di undici termini, si dovrà sostituire il numero 11 in luogo di n .

910. In avvenire la lettera n indicherà sempre il numero de' termini, o sia (che poi ritorna lo stesso) esprimerà il posto, che occupa un certo termine nell'ordine de' termini.

911. Due cose adunque devonfi principalmente considerare rispetto alle serie, cioè il loro termine generale, e la loro somma. Data la somma generale di una serie si passa facilmente a trovare il di lei termine generale, e dal termine generale si può passare alla somma. Il metodo del Padre Riccati si riduce a prendere certe for-

formole, che rappresentino indeterminatamente le somme generali delle serie; da queste formole si deducono i termini generali, i quali devono somministrare le condizioni, che aver debbono i veri termini generali, mediante i quali devesi passare alle somme cercate. L'esempio or ora renderà tutto palpabile. Il metodo si appoggia al seguente semplicissimo

912. Teorema. In qualunque serie il termine generale è uguale alla somma di tutti i termini inclusivamente fino al termine n , meno la somma di tutti i termini fino al termine $n-1$ inclusivamente: Onde chiamando T il cercato termine n^{esimo} , dicendo S la somma de' termini indicati dal numero n , e facendo s la somma de' termini espressi dal numero $n-1$, farà $T=S-s$.

913. La verità di questo teorema è evidentissima, poichè dalla somma di un numero $n-1$ di termini più il termine n^{esimo} risulta la somma di un numero n di termini; dunque perchè la sottrazione distrugge ciò, che ha fatto la somma, se dalla somma di un numero n di termini si sottrarrà la somma di un numero di termini $n-1$, il residuo farà il termine n^{esimo} , conseguentemente egli farà il termine generale cercato.

914. Qualora pertanto sia data la somma generale di una serie, che farà espressa da una funzione di n , si sostituisca in questa funzione $n-1$ in luogo di n , e la formola, che ne risulta, si sottragga dalla data somma generale, e il residuo farà il termine generale cercato: Sia data per esempio la somma generale $8n + \frac{1}{3}n +$

$$\frac{2}{3}n^2=S, \text{ si sostituisca in questa somma } n-1 \text{ in luogo di } n, \text{ e si avrà } 8n-8 + \frac{1}{3}n - \frac{2}{3}n^2=S, \text{ si sottragga } s \text{ da } S, \text{ e si avrà } S-s=8 + \frac{1}{3} + 2n^2-2n + \frac{2}{3}=9-2n+2n^2=T, \text{ che è il termine generale cercato.}$$

915. Acciò che il termine generale T espresso da $S-s$ possa servire al bisogno non devesi lasciare sotto questa forma $S-s$, dalla quale si ricavano due serie mutuamente distruggentesi a riserva del primo termine di una, e dell'ultimo dell'altra, ma mediante la conveniente riduzione devesi mettere sotto altra forma la più propria, come per esempio si è praticato al precedente numero 914.

916. Non sempre poi, che si abbia $T=S-s$, farà S la vera somma della serie, ma potrà essa esserne maggiore, o minore di una certa quantità indipendente da n . Per assicurarsene si sostituisca 1 in luogo di n tanto nel termine generale T , come nella somma S , e se da questa sostituzione risulterà $T=S$, farà S la vera somma, poichè mediante la sostituzione di 1 in luogo di n , si riduce la somma S al valore del primo termine, il qual pure deve essere espresso da T in virtù della stessa sostituzione, conseguentemente deve essere $T=S$: Ma se sarà $T>S$, o $T<S$, tanto nell'uno, come nell'altro caso non farà S la vera somma, e per ridurre la S ad essere la vera somma, vi si dovrà nel primo caso aggiungere la differenza fra T , ed S , e nel secondo vi si dovrà levare.

Modo di sommare le serie algebriche.

917. Cominciamo dalle serie ricorrenti aritmetiche, che chiamansi serie algebriche, ed esponiamo la maniera di determinarne i loro termini, e somme generali. Per determinare i termini generali di queste serie si potrebbe qui richiamare il metodo dato al num. 732, poichè il termine generale di qualunque di queste serie è sempre un'equazione algebrica; amo però meglio di seguire l'intrapreso metodo del Padre Riccati. Poichè (pel num. 916.) quelle formole, che hanno un termine costante indipendente da n non danno le vere somme, perciò prendo la formola generale $An+Bn^2+Cn^3+Dn^4+$ ec., di cui ciascun termine involge la lettera n , e dalla quale desumerò ordinatamente il necessario numero de' termini, che devono somministrare la somma di una proposta serie; mentre se la serie risulterà da quantità uguali, la di lei somma sarà espressa da An : Se la serie avrà le prime differenze costanti, la di lei somma ci verrà data da $An+Bn^2$: Se la serie avrà le seconde differenze costanti, la formola esprimente la di lei somma sarà $An+Bn^2+Cn^3$, e così in seguito. Di fatto cerco che serie farà quella, la di cui somma viene espressa da An , e che quantità avrà per termine generale. Giusta il num. 914. sostituisco $n-1$ in luogo di n nella data espressione An , poscia sottraggo ciò, che mi viene da An , ed ho $An-An+A=A$. Essendo dunque $T-S=A$ il termine generale, ben si vede, che la serie, la quale nasce da questo termine generale, è una serie di quantità eguali, cioè ella è A, A, A, A .

918. Seguirò a dare il modo di ritrovare i termini generali delle serie algebriche de' successivi ordini, espressi però da quantità indeterminate, siccome pure tali assunse le somme generali; che poi esporrò la maniera di determinare e per gli uni, e per le altre i valori delle attinte indeterminate. Passo pertanto a investigare, che serie sarà quella, la di cui somma generale è $An+Bn^2$, e quale dovrà essere il di lei termine generale. In questa quantità $An+Bn^2$ sostituisco $n-1$ in luogo di n , indi dalla medesima sottraggo ciò, che mi viene, e trovo $S-S=A+Bn^2-An+A-Bn^2+2Bn-B$: Onde è $T=A-B+2Bn$. Se in luogo di n si sostituiranno successivamente in questo termine generale i numeri 1, 2, 3, 4 ec. della serie naturale, si avrà la seguente serie $A+B, A+3B, A+5B, A+7B$ ec., che è una serie algebrica di primo ordine, le di cui differenze prime sono costanti ed uguali a $2B$.

919. Per le serie algebriche adunque di primo ordine la forma del termine generale è $A-B+2Bn$, e la forma della somma generale è $An+Bn^2$.

920. Sia data la somma generale $An+Bn^2+Cn^3$. Si sostituisca $n-1$ in luogo di n , e si faccia al solito la sottrazione della quantità, che ne nasce, e il residuo sarà il termine generale della serie, la di cui somma generale è la proposta. Ora si ha $T=S-S=A+Bn^2+Cn^3-An+A-Bn^2+2Bn-B-Cn^3+3Cn^2-3Cn+C$, cioè $T=A-B+C+2Bn-3Cn+3Cn^2$. In questo termine generale si sostituiscono successivamente in luogo di n i numeri 1, 2, 3, 4 ec. della serie naturale, e ne verrà la seguente serie $A+B+C, A+3B+7C, A+5B+19C$ ec., che è una serie algebrica di secondo ordine, le di cui differenze seconde sono costanti, ed uguali a $6C$.

921. Per le serie algebriche adunque di secondo ordine la forma del termine generale è $A-B+C+2B-3C \times n+3Cn^2$, e la forma della somma generale è $An+Bn^2+Cn^3$.

922. Sia proposta la somma generale $An+Bn^2+Cn^3+Dn^4$. Se ne deduca il solito il termine generale, che trovasi essere $T=S-r=A-B+C-D+2B-3C+4D \times n + 3C-6D \times n^2+4Dn^3$. Si sostituiscano in questo termine generale in luogo di n i numeri della serie 1, 2, 3, 4, ec., e ne verrà la seguente serie $A+B+C+D$, $A+3B+7C+15D$, $A+5B+19C+65D$, $A+7B+37C+175D$ ec., che è una serie algebrica di terzo ordine, le di cui terze differenze sono costanti, e sono uguali a $24D$.

923. Per le serie algebriche adunque di terzo ordine la forma del termine generale è $A-B+C-D+2B-3C+3D \times n+3C-6D \times n^2+4Dn^3$, e la forma della somma generale è $An+Bn^2+Cn^3+Dn^4$.

924. Basteranno queste formole trovate per avere la maniera di trovare le altre per le serie d'ordini superiori, e per iscuoprire la legge, colla quale procedono. Le serie adunque algebriche, il di cui ordine sia espresso per esempio da m , hanno per termine generale una funzione di n , in cui un termine è costante, e gli altri sono distinti dalle successive potenze di n fino alla potenza, che ha m per esponente. La somma generale poi d'una serie d'ordine m è una funzione di n , in cui niun termine è costante, ma tutti sono distinti dalle successive potenze di n cominciando dalla potenza di esponente 1 fino alla potenza di esponente $m+1$: Per lo che la formola indeterminata esprimente il termine generale di una serie d'ordine m sarà $A+Bn+Cn^2+Dn^3+\dots+Nn^m$, e la formola esprimente la somma generale sarà, come si detto al num. 917., $An+Bn^2+Cn^3+\dots+Nn^{m+1}$.

925. Dopo che si sono ritrovate le formole indeterminate dei termini, e delle somme generali delle serie, resta a dirsi come s'abbiano a determinare i valori delle assunte quantità indeterminate A , B , C , ec. dalla sostituzione de' quali ne' dati termini, e somme indeterminate, si otterranno i cercati termini, e somme generali. La maniera è la seguente. Sia data una serie, che abbia le differenze m^{th} costanti; si prenda il suo corrispondente termine generale indeterminato (nel modo detto ai num. 918, 920, 922), in cui si sostituiscano successivamente in luogo di n i numeri 1, 2, 3, 4 ec. della serie naturale fino al numero $m+1$, e i risultati da queste sostituzioni si uguaglino al primo, secondo terzo ec. termine della serie, e mediante queste equazioni, che saranno tante, quante sono le indeterminate A , B , C , ec. se ne ritrovino i loro valori nella maniera praticata al num. 733. Tanto nel termine, come nella somma indeterminata si sostituiscano questi valori in luogo di A , B , C , ec. e si avrà sì il termine generale, come la somma cercata. Si debba per esempio trovare il termine, e la somma generale della serie 60, 120, 210, 336, che ha le differenze terze costanti uguali a 6. Si prenda il termine generale indeterminato corrispondente alla serie, che hanno le differenze terze costanti, il quale (giusta il num. 922.) è $A-B+C-D+2B-3C+4D \times n+3C-6D \times n^2+4Dn^3$, che per maggior comodo delle sostituzioni si può disporre così

$$\begin{aligned} & A \\ & -B + 2Bn \\ & C - 3Cn + 3Cn^2 \\ & -D + 4Dn - 6Dn^2 + 4Dn^3 \end{aligned}$$

Si sostituiscano successivamente in luogo di n i numeri della serie naturale, e i risultati si paragonino ai dati termini della serie come segue

Sostituendosi 1 in luogo di n	$A + B + C + D = 60$
Sostituendosi 2	$A + 3B + 7C + 15D = 120$
Sostituendosi 3	$A + 5B + 19C + 63D = 210$
Sostituendosi 4	$A + 7B + 37C + 175D = 336$

Si sottragga la prima dalla seconda, la seconda dalla terza, e la terza dalla quarta, con ciò si avranno le tre seguenti equazioni

$$\begin{aligned} (A) \quad & 2B + 6C + 14D = 60 \\ & 2B + 12C + 50D = 90 \\ & 2B + 18C + 110D = 126 \end{aligned}$$

Di queste equazioni si sottragga la prima dalla seconda, e la seconda dalla terza, e ne verranno le due seguenti

$$\begin{aligned} (B) \quad & 6C + 36D = 30 \\ & 6C + 60D = 36 \end{aligned}$$

Levandosi la prima dalla seconda si avrà $24D = 6$, e però $D = \frac{1}{4}$. Si sostituisca questo valore in una delle due equazioni segnate (B), per esempio nella prima, e ne risulterà $6C + 9 = 30$, cioè $C = \frac{7}{2}$. Si sostituiscano questi valori di C , D in una delle equazioni segnate (A), come nella prima, e ne verrà $2B + 21 + \frac{7}{2} = 60$, vale a dire $B = \frac{71}{4}$. Finalmente in una delle prime equazioni, come in $A + B + C + D = 60$, si sostituiscano i ritrovati valori di B , C , D , e si avrà $A + \frac{71}{4} + \frac{7}{2} + \frac{1}{4} = 60$, conseguentemente $A = \frac{77}{2}$. Se pertanto si sostituiranno questi valori di A , B , C , D tanto nel termine generale indeterminato

$$\begin{array}{r} A \\ -B + 2Bn \\ C - 3Cn + 3Cn^2 \\ -D + 4Dn - 6Dn^2 + 4Dn^3 \end{array}$$

come nella somma $An+Bn^2+Cn^3+Dn^4$, si avrà $24+26n+9n^2+n^3$ per termine generale della proposta serie, e $\frac{77}{2}n + \frac{71}{4}n^2 + \frac{7}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^4$ per somma generale.

926. Si avverta, che dopo essersi fatte le sostituzioni dei numeri 1, 2, 3, 4 ec. della serie naturale in luogo di n nel termine generale indeterminato, non è arbitrario il paragone dei risultati a qual più piaccia termine della serie, ma deve di cominciare il paragone dal primo termine della serie, indi procedere ordinatamente agli altri; e generalmente per paragonare il termine generale a un termine arbitrario della serie bisogna sostituire nel termine generale in luogo di n quel numero della serie naturale, che indica il posto nella serie del termine dato.

927. Che se essendo dato il termine generale d'una qualunque serie, fosse proposto di trovarne la somma generale, si faccia così: Si prenda il termine generale indeterminato corrispondente al dato termine generale, si faccia il mutuo paragone delle loro parti, e si determinino i valori di A , B , C ec., i quali sostituiti nella corrispondente somma indeterminata, renderanno la somma generale cercata. Si debba per esempio trovare la somma generale della serie, che ha per termine generale $4-n+n^2$. Si prenda il corrispondente termine generale indeterminato che è

$$\begin{array}{r} A \\ -B + 2Bn \\ C - 3Cn + 3Cn^2 \end{array}$$

si faccia il paragone delle parti così $A-B+C=4$, $2B-3C=-1$, $3C=1$. Da quest'ultima equazione si ha $C=\frac{1}{3}$, che sostituito nella seconda dà $2B-1=-1$, cioè $B=0$, finalmente sostituendosi nella prima i valori di B , C ne viene $A=\frac{11}{3}$. Ma la somma indeterminata, che corrisponde al dato termine generale è $An+Bn^2+Cn^3$; sostituendosi adunque i ritrovati valori di A , B , C , sarà $\frac{11}{3}n + \frac{1}{3}n^3$ la somma generale cercata. Questi due esempi serviranno di regola per qualunque altro caso.

928. Quantunque l'esposto metodo per trovare i termini e le somme generali delle serie algebriche sia facile, e piano, si può per altro mediante alcune riflessioni facilitare anche di più l'invenzione degli uni, e delle altre. Cominciamo dalle serie, che hanno le differenze prime costanti, il di cui termine generale indeterminato è (pel num. 919.) $A-B+2Bn$ (β), e la somma è $An+Bn^2$ (β). Assumo la serie algebrica canonica di primo ordine, a ; $a+b$; $a+2b$; $a+3b$; $a+4b$ ec., il di cui primo termine è a , e la differenza è b , indi uguaglio il di lei primo termine a col termine generale (β), in cui ho posto 1 in luogo di n , e mi viene $A+B=$

$B=a$; di nuovo uguaglio il secondo termine $a+b$ della serie allo stesso termine generale (β) dopo avere supposto $n=2$, con che ritrovo $A+3B=a+b$. Da questa equazione sottraggo la precedente e mi viene $2B=b$, cioè $B=\frac{1}{2}b$. Sostituisco que-

sto valore nella prima equazione $A+B=a$, ed ho $A+\frac{1}{2}b=a$, e però $A=a-\frac{1}{2}b$. Sostituisco adesso nel termine generale (β) questi ritrovati valori di A , B ,

con che egli diventa $a-b+bn$, vale a dire $a+\overline{n-1} \times b$. Parimente sostituendo i valori di A , B nella somma (δ) , essa diverrà $an-\frac{1}{2}bn+\frac{1}{2}bn^2$, o sia $an+$

$$\frac{n \times \overline{n-1}}{2} \times b.$$

929. Passiamo alle serie, che hanno le differenze seconde costanti; che perciò prendo la serie algebrica cattolica di secondo ordine a ; $a+b$; $a+2b+c$; $a+3b+3c$; $a+4b+6c$; $a+5b+10c$; ec. di cui il primo termine è a , la prima differenza è b , e la seconda differenza, che è costante è c . Giusta il num. 921. il termine

generale indeterminato delle serie di secondo ordine è (γ) $A=B+C+2B-3C \times n+3Cn^2$, e la somma è (δ) $An+Bn+Cn^2$. Supposto 1 in luogo di n nel termine generale, lo paragono al primo termine della serie così $A+B+C=a$; poscia lo paragono al secondo termine, posto $n=2$, e mi viene $A+3B+7C=a+b$; finalmente lo paragono al terzo termine dopo aver fatto $n=3$, lo che mi dà $A+5B+19C=a+2b+3c$. Sottraggo la prima di queste due equazioni dalla seconda, e la seconda dalla terza, e trovo le due seguenti

$$(X) \quad \begin{array}{rcl} 2B + 6C & = & b \\ 2B + 12C & = & b + c \end{array}$$

Sottraggo per ultimo la prima di queste due equazioni dalla seconda, e ne ho $6C=c$, cioè $C=\frac{1}{6}c$, il qual valore sostituito nella prima delle due equazioni segnate

(X) dà $B=\frac{1}{2}b-\frac{1}{2}c$; finalmente si sostituiscano questi valori di A , B nella

prima equazione $A+B+C=a$, e si avrà $A=a-\frac{1}{2}b+\frac{1}{3}c$. Si sostituiscano pertanto questi ritrovati valori di A , B , C nel termine generale (γ) , con che esso

diverrà $a-b+c+bn-\frac{2}{3}cn+\frac{1}{2}cn^2$, o sia $a+\frac{n-1}{1} \times b+\frac{n-1 \times \overline{n-2}}{1 \cdot 2} \times c$,

perchè $-b+bn=\overline{n-1} \times b$, e $c-\frac{3cn}{2}+\frac{cn^2}{2}=\frac{n-1 \times \overline{n-2}}{1 \cdot 2} \times c$. Col fare le sot-

sti.

sistuzioni dei valori di A, B, C nella somma (*), essa si cambierà in $an - \frac{1}{2}bn +$

$\frac{1}{3}cn + \frac{1}{2}bn^2 - \frac{1}{2}cn^2 + \frac{1}{6}cn^3$, o sia $an + \frac{n \times n-1}{1. 2.} X^b + \frac{n \times n-1 \times n-2}{1. 2. 3.} X^c$, per-

chè $-\frac{1}{2}bn + \frac{1}{2}bn^2 = \frac{n \times n-1}{1. 2.} X^b$, e $\frac{1}{3}cn - \frac{1}{2}cn^2 + \frac{1}{6}cn^3 =$

$$\frac{n \times n-1 \times n-2}{1. 2. 3.} X^c$$

933. Proseguendo lo stesso calcolo si troverà, che tanto i termini generali, come le somme dei susseguenti ordini seguono la stessa legge, lo che facilita l'invenzione del termine, e della somma generale di una serie di qualsivoglia ordine, e del pari ne facilita l'uso, come si vedrà più chiaramente nel seguente esempio. Intanto aggiungerò i termini generali distinti colla lettera T, e le somme generali distinte colla lettera S delle serie dei primi cinque ordini a fine di mettere in prospetto la legge, colla quale procedono.

Per le serie algebriche di primo ordine.

$$T = a + \frac{n-1}{1} X^b$$

$$S = an + \frac{n \times n-1}{1. 2.} X^b$$

Per le serie algebriche di secondo ordine

$$T = a + \frac{n-1}{1.} X^b + \frac{n-1 \times n-2}{1. 2.} X^c$$

$$S = an + \frac{n \times n-1}{1. 2.} X^b + \frac{n \times n-1 \times n-2}{1. 2. 3.} X^c$$

Per le serie algebriche di terzo ordine

$$T = a + \frac{n-1}{1.} X^b + \frac{n-1 \times n-2}{1. 2.} X^c + \frac{n-1 \times n-2 \times n-3}{1. 2. 3.} X^d$$

$$S = an + \frac{n \times n-1}{1. 2.} X^b + \frac{n \times n-1 \times n-2}{1. 2. 3.} X^c + \frac{n \times n-1 \times n-2 \times n-3}{1. 2. 3. 4.} X^d$$

Per

Per le serie algebriche di quarto ordine.

$$T = a + \frac{n-1}{1} X^b + \frac{n-1}{1} \frac{n-2}{2} X^c + \frac{n-1}{1} \frac{n-2}{2} \frac{n-3}{3} X^d$$

$$+ \frac{n-1}{1} \frac{n-2}{2} \frac{n-3}{3} \frac{n-4}{4} X^e$$

$$S = an + \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} X^b + \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} \frac{n-2}{3} X^c + \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} \frac{n-2}{3} \frac{n-3}{4} X^d$$

$$+ \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} \frac{n-2}{3} \frac{n-3}{4} \frac{n-4}{5} X^e$$

Per le serie algebriche di quinto ordine.

$$T = a + \frac{n-1}{1} X^b + \frac{n-1}{1} \frac{n-2}{2} X^c + \frac{n-1}{1} \frac{n-2}{2} \frac{n-3}{3} X^d$$

$$+ \frac{n-1}{1} \frac{n-2}{2} \frac{n-3}{3} \frac{n-4}{4} X^e + \frac{n-1}{1} \frac{n-2}{2} \frac{n-3}{3} \frac{n-4}{4} \frac{n-5}{5} X^f$$

$$S = an + \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} X^b + \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} \frac{n-2}{3} X^c + \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} \frac{n-2}{3} \frac{n-3}{4} X^d$$

$$+ \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} \frac{n-2}{3} \frac{n-3}{4} \frac{n-4}{5} X^e + \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} \frac{n-2}{3} \frac{n-3}{4} \frac{n-4}{5} \frac{n-5}{6} X^f$$

931. Qualunque termine generale adunque costa di tante parti, quante unità contiene l'esponente dell'ordine della serie accresciuto di una unità. La prima parte è sempre il primo termine della serie, le altre parti contengono le quantità b , c , d , che dinotano le successive differenze della serie. Lo stesso ha luogo nella formola della somma.

932. Si debbano per esempio trovare il termine, e la somma generale della serie 0. 10. 68. 234. 592. 1250. ec. Poichè questa serie ha le quarte differenze costanti, si prendano le due precedenti formole per le serie di quarto ordine; e perchè il primo termine della serie è = 0, farà $a = 0$. Per avere i valori delle altre lettere b , c , d ec., si prendano le differenze delle differenze ec. come segue

Differenze quarte costanti		24.	24.
Differenze terze		60.	84. 108.
Differenze seconde		48.	108. 192. 300.
Differenze prime		10.	53. 165. 358. 658.
Serie data	0.	10.	68. 234. 592. 1250.

Quindi $b = 10$; $c = 48$; $d = 60$; $e = 24$, e però fatte le sostituzioni di questi valori nelle dette formole, il termine generale della data serie farà

$T =$

$$T = \frac{n-1}{1.} X^{10} + \frac{n-1}{1.} \frac{X^{n-2}}{2.} X^{48} + \frac{n-1}{1.} \frac{X^{n-2}}{2.} \frac{X^{n-3}}{3.} X^{60} \\ + \frac{n-1}{1.} \frac{X^{n-2}}{2.} \frac{X^{n-3}}{3.} \frac{X^{n-4}}{4.} X^{24}$$

o la fomma generale farà

$$S = \frac{nX^{n-1}}{1. \ 2.} X^{10} + \frac{nX^{n-1}}{1. \ 2.} \frac{X^{n-2}}{3.} X^{48} + \frac{nX^{n-1}}{1. \ 2.} \frac{X^{n-2}}{3.} \frac{X^{n-3}}{4.} X^{60} \\ + \frac{nX^{n-1}}{1. \ 2.} \frac{X^{n-2}}{3.} \frac{X^{n-3}}{4.} \frac{X^{n-4}}{5.} X^{24}$$

Considerandosi la ferie non cominciando dal 0, ma dal 10 così 10, 68, 234, 592 ec., il di lei termine generale farà

$$T = 10 + \frac{n-1}{1.} X^{58} + \frac{n-1}{1.} \frac{X^{n-2}}{2.} X^{108} + \frac{n-1}{1.} \frac{X^{n-2}}{2.} \frac{X^{n-3}}{3.} X^{84} \\ + \frac{n-1}{1.} \frac{X^{n-2}}{2.} \frac{X^{n-3}}{3.} \frac{X^{n-4}}{4.} X^{24}$$

e la fomma generale farà

$$S = 10n + \frac{nX^{n-1}}{1. \ 2.} X^{58} + \frac{nX^{n-1}}{1. \ 2.} \frac{X^{n-2}}{3.} X^{108} + \frac{nX^{n-1}}{1. \ 2.} \frac{X^{n-2}}{3.} \frac{X^{n-3}}{4.} X^{84} \\ + \frac{nX^{n-1}}{1. \ 2.} \frac{X^{n-2}}{3.} \frac{X^{n-3}}{4.} \frac{X^{n-4}}{5.} X^{24}$$

Alcune volte potrà tornare più comodo ridurre ad altra forma questi termini, e fomme generali. Ciò si otterrà con fare le attuali moltiplicazioni ivi indicate. Prendo per esempio il termine, e la fomma generale precedente. Il termine generale mediante le attuali moltiplicazioni diventa

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 58 + 58n \\ + 108 - 102n + 54n^2 \\ - 84 + 154n - 84n^2 + 14n^3 \\ + 24 - 50n + 35n^2 - 10n^3 + n^4 \end{array}$$

$$\text{e però } T = \frac{5n^4 + 4n^3 + \dots}{\dots}$$

La fomma colle attuali moltiplicazioni diventa

$$\begin{array}{r}
 10n \\
 - 20n + 20n^2 \\
 + 30n - 54n^2 + 18n^3 \\
 - 21n + \frac{77}{2}n^2 - 21n^3 + \frac{7}{2}n^4 \\
 + \frac{24}{5}n - 10n^2 + 7n^3 - 2n^4 + \frac{1}{5}n^5 \\
 \hline
 \end{array}$$

e però
$$S = \frac{4}{5}n + \frac{7}{2}n^2 + 4n^3 + \frac{3}{2}n^4 + \frac{1}{5}n^5$$

933. Finora ho considerate le serie algebriche risultanti da termini interi, passeremo adesso a considerare quelle, i di cui termini sono fratti; di queste frazioni poi i numeratori fra loro, e parimente i denominatori fra loro sono altrettanti termini di serie algebriche. Assumerò le somme generali indeterminate, come ho fatto ai num. 917, 918, 920, e 922, per quindi dedurne i cercati termini, e somme generali.

934. Prendo primieramente la somma indeterminata $\frac{Ln}{A+Bn}$, e cerco le condizioni, che devono accompagnare il termine, generale corrispondente a questa somma indeterminata. Giusta il metodo del Padre Riccati vi sostituisco $n-1$ in luogo di n , indi dalla somma data sottraggo il risultato per avere il termine generale, che tro-

vai essere
$$\frac{Ln}{A+Bn} - \frac{L \times n-1}{A+B \times n-1} = \frac{AL}{A+B \times n-1 \times A+Bn}.$$
 Questo termine

generale ha per numeratore una quantità costante, e per denominatore ha due fattori, ognuno de' quali considerato come un termine generale somministra una serie di primo ordine, e tanto una, come l'altra ha la stessa differenza B , ne v'è tra loro altro divario, se non che la seconda serie comincia dal secondo termine della prima, come si vedrà facilmente sostituendo in questo denominatore in luogo di n i numeri della serie naturale 1, 2, 3, 4 ec. Sia $L=4$, $A=3$, $B=2$; fatte le debite sostituzioni, dal termine generale nascerà la seguente serie $\frac{12}{3 \cdot 5}$, $\frac{12}{5 \cdot 7}$, $\frac{12}{7 \cdot 9}$,

$\frac{12}{9 \cdot 11}$, $\frac{12}{11 \cdot 13}$ ec., di cui il termine generale è $\frac{12}{3+2 \times n-1 \times 3+2n}$, e la somma ge-

nerale è $\frac{4n}{3+2n}$. Se fosse data la serie $\frac{12}{3 \cdot 5}$, $\frac{12}{5 \cdot 7}$, $\frac{12}{7 \cdot 9}$ ec., si determinerebbero i valori di A , B , L facendo A uguale al primo fattore 3 del denominatore, $B=7-5=2$, $AL=12$, e però $L=\frac{12}{A}=\frac{12}{3}=4$.

935. Vengo alle serie, che ricevono la somma generale di questa forma

Ln

$\frac{Ln + Mn^2}{A+B \times \overline{n-1} \times A+Bn}$. Sostituendo al solito $n-1$ in luogo di n , e facendo la sottrazione, e la debita riduzione allo stesso denominatore si ottiene il seguente termine generale

$$\frac{\begin{array}{r} AL - BLn \\ - AM - BMn \\ + 2AMn \end{array}}{A+B \times \overline{n-2} \times A+B \times \overline{n-1} \times A+Bn}$$

Offervando questa formola si scorgerà, che il numeratore è termine generale d'una serie algebrica di primo ordine, purchè il coefficiente di n non diventi uguale a zero, nel qual caso il numeratore sarà una quantità costante; il denominatore poi costa di tre fattori, ognuno de' quali è termine generale di una serie algebrica di primo ordine, le quali serie hanno tutte la stessa differenza, ma la seconda comincia dal secondo termine della prima, e la terza comincia dal terzo termine della prima, come si vedrà sostituendo successivamente in luogo di n i numeri 1, 2, 3, 4 ec. della serie naturale. Sia pertanto $A=3$, $B=1$, $M=\frac{1}{2.3}$, $L=\frac{7}{2.3}$, e fatte le debite sostituzioni si avrà la serie $\frac{4}{2.3.4}$, $\frac{7}{3.4.5}$, $\frac{10}{4.5.6}$, $\frac{13}{5.6.7}$ ec., il di cui termi-

ne generale è $\frac{1+3n}{3+1 \times \overline{n-2} \times 3+1 \times \overline{n-1} \times 3+n}$, e la somma generale è

$$\frac{7n+5n^2}{2 \times 3 \times \overline{2+n} \times 3+n}.$$

936. Collo stesso metodo si potrà procedere a determinare i termini generali delle serie, che ammettono le seguenti somme generali

$$\frac{Ln + Mn^2 + Nn^3}{A+B \times \overline{n-2} \times A+B \times \overline{n-1} \times A+Bn};$$

$$\frac{Ln + Mn^2 + Nn^3 + Pn^4}{A+B \times \overline{n-3} \times A+B \times \overline{n-2} \times A+B \times \overline{n-1} \times A+Bn} \text{ ec.}$$

937. Potrà succedere, che nei termini della serie manchi qualche fattore intermedio, nel qual caso nella formola del termine generale mancherà pure il parziale termine generale corrispondente a questo fattore. In questo caso bisognerà moltiplicare il numeratore, e il denominatore di ciascun termine della serie per i termini mancanti, e similmente per le loro corrispondenti formole generali dovranno moltiplicare il numeratore, e il denominatore del termine generale. Sia data per esempio

Ccc 2

la serie $\frac{1}{2 \cdot 11}$, $\frac{1}{5 \cdot 14}$, $\frac{1}{8 \cdot 17}$, $\frac{1}{11 \cdot 20}$ ec., dei di cui denominatori i fattori disposti per ordine tornano le due seguenti serie

$$\begin{array}{cccc} 2. & 5. & 8. & 11. \\ 11. & 14. & 17. & 20. \end{array}$$

Poichè la seconda serie comincia dal quarto termine della prima, si moltiplichino il numeratore, e il denominatore di ciascun termine della proposta serie pel prodotto dei due fattori, che mancano, e si avrà $\frac{5 \cdot 8}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11}$, $\frac{8 \cdot 11}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14}$, $\frac{11 \cdot 14}{8 \cdot 11 \cdot 14 \cdot 17}$, $\frac{14 \cdot 17}{11 \cdot 14 \cdot 17 \cdot 20}$ ec.

Della serie data poi il termine generale essendo $\frac{1}{8+3 \times n-3 \times 8+3n}$, e i termini generali parziali corrispondenti ai due termini mancanti essendo $8+3 \times n-2$, $8+3 \times n-1$, però il termine generale, che corrisponde alla serie completa, sarà

$$\frac{8+3 \times n-2 \times 8+3 \times n-1}{8+3 \times n-3 \times 8+3 \times n-2 \times 8+3 \times n-1 \times 8+3 \times n}$$

938. Bastano le cose dette, e per avere il metodo del Padre Riccati, e per dedurne, come ho fatto al num. 928, e seguenti, altre formole, le quali procedendo con costante legge si possono, data la serie, speditissimamente comporre, e il di cui uso non può essere più agevole. Comincio dalla serie corrispondente alla forma generale indeterminata $\frac{Ln}{A+Bn}$. Si è trovato al num. 934, che il termine ge-

nerale di questa serie è $\frac{AL}{A+B \times n-1 \times A+Bn}$, il di cui denominatore costa di

due fattori, da' quali nascono due serie di primo ordine, e di uguali differenze, e la seconda di queste serie incomincia dal secondo termine della prima. La serie pertanto, che nasce da $A+B \times n-1$ sia $a, a+b, a+2b, a+3b, a+4b$ ec., la serie, che nascerà dal secondo fattore $A+Bn$ sarà $a+b, a+2b, a+3b, a+4b$ ec. Per determinare col primo termine a , e colla differenza b di questa serie i valori di A, B , si facciano i seguenti paragoni. Si sostituisca 1 in luogo di n nel fattore

$A+B \times n-1$, indi si uguagli al primo termine della serie, e si avrà $A=a$: Pofcia si sostituisca 2 in luogo di n , e facendo il paragone col secondo termine della serie ne verrà $A+B=a+b$. Da questa equazione si sottragga la precedente $A=a$, e si otterrà $B=b$. Ecco dunque determinati i valori di A , e di B , i quali sostituiti nel precedente termine generale (poichè il numeratore AL è costante, e cognito, lo

fac-

faccio $\equiv c$), lo cambiano in $\frac{c}{a+n-1 \times b \times a+bn}$. Essendo $AL \equiv c$, o sia $aL \equiv c$, sarà

$L \equiv \frac{c}{a}$. Per avere espressa in questo modo anche la somma generale niente altro resta a farsi, se non se sostituire nella somma affunta la quantità a in luogo di A , b in luogo di B , e $\frac{c}{a}$ in vece di L , con che essa diverrà $\frac{cn}{a \times a+bn}$.

939. Cerchiamo ora con simile espressione il termine, e la somma generale delle serie, alle quali si riferisce la somma indeterminata $\frac{Ln+Mn^2}{A+B \times n-1 \times A+Bn}$, cui al num. 935. si è trovato corrispondere il seguente termine generale

$$\frac{\begin{array}{r} AL - BLn \\ - AM - BMn \\ + 2AMn \end{array}}{A+B \times n-2 \times A+B \times n-1 \times A+Bn}$$

Di questa formola il numeratore essendo termine generale di una serie di primo ordine, purchè il coefficiente di n non diventi zero, ben si vede, che i numeratori dei termini delle serie, delle quali si tratta, formano una serie algebrica di primo ordine, il di cui primo termine dicendosi $\equiv d$, e la differenza $\equiv d$, sarà (pel n. 918.)

$$\begin{array}{r} c + \frac{n-1}{1} \times d = AL - BLn \\ - AM - BMn \\ + 2AMn \end{array}$$

Il denominatore poi risulta da tre fattori, che sono termini generali di tre serie algebriche di primo ordine, e di differenze uguali, ma il primo termine della seconda serie è il secondo della prima, e il terzo della stessa prima e il primo della terza; così che se la serie corrispondente ad $A+B \times n-2$ sarà $a, a+b, a+2b, a+3b$ ec., la serie corrispondente ad $A+B \times n-1$ sarà $a+b, a+2b, a+3b$ ec., e la serie corrispondente ad $A+Bn$ sarà $a+2b, a+3b$ ec. Per determinare i valori di A, B , che entrano in questo denominatore, mediante il primo termine a , e la differenza b , si prenda il fattore $A+B \times n-2$, e fatta $n=1$, si paragoni al primo termine della prima serie, e si avrà $A-B \equiv a$. Di poi fatta $n=2$, si paragoni al

se-

secondo termine, e ne verrà $A=a+b$. Sostituendosi nella precedente questo valore di A , si troverà $B=b$. Si facciano ora le debite sostituzioni nel precedente termine generale, e se ne otterrà il seguente

$$\frac{a + \frac{n-1}{1} \times b}{a+b+n-2 \times b \times a+b+n-1 \times b \times a+b+n}$$

Per avere la somma generale con espressione simile prendo la proposta somma indeterminata, vi sostituisco in luogo del denominatore $A+B \times \frac{n-1}{1} \times A+B$ il suo corrispondente valore $a+b+n-1 \times b \times a+b+n$, che si ha con sostituire in luogo di A , B i fuci poc' anzi trovati valori, poscia ne faccio il paragone col termine generale, supponendo tanto in una, come nell'altro $n=1$ (perchè col supporre $n=1$ tanto nella somma, come nel termine generale, ne risulta il primo termine

della serie), e mi viene $\frac{L+M}{a+b \times a+2b} = \frac{c}{a \times a+b \times a+2b}$, cioè (Z)

$L+M = \frac{c}{a}$. E siccome con supporre $n=2$ nella somma generale si ha la somma dei due primi termini della serie, i quali essendo fratti devonfi prima per sommarli ridurre allo stesso denominatore, però nell'ultimamente trovato termine generale sostituisco prima 1, e poi 2 in luogo di n , e mi vengono i due primi termini della

serie, che sono $\frac{c}{a \times a+b \times a+2b}$, $\frac{c+d}{a+b \times a+2b \times a+3b}$, che ridotti allo stesso denominatore, e sommati danno $\frac{a \times c+d + a+1 \times c}{a \times a+b \times a+2b \times a+3b}$, che paragono alla

somma proposta (nella quale sia fatto $n=2$, e siano sostituiti i valori di A , B),

così $\frac{2L+4M}{a+2b \times a+3b} = \frac{a \times c+d + c \times a+3b}{a \times a+b \times a+2b \times a+3b}$, cioè (X) $2L+4M =$

$\frac{a \times c+d + c \times a+3b}{a \times a+b}$, che divisa per 2 è $L+2M = \frac{a \times c+d + c \times a+3b}{2 \times a \times a+b}$,

dalla quale sottraendosi l'equazione (Z) ne viene $M = \frac{a \times c+d + c \times a+3b}{2 \times a \times a+b} - \frac{c}{a}$,

che

che col farsi le debite riduzioni diventa $M = \frac{c \times \overline{b-a} + a \times \overline{c+d}}{2 \times a \times \overline{a+b}}$. Sostituendosi

questo valore di M nell'equazione (Z) si troverà il valore di L , che è

$L = \frac{c \times \overline{a+b} - a \times \overline{c+d}}{2 \times a \times \overline{a+b}}$. Si mettano ora nella data somma indeterminata i ritro-

vati valori di L , M , A , B , ed essa diverrà

$$\frac{c \times \overline{a+b} - a \times \overline{c+d} \times n + c \times \overline{b-a} + a \times \overline{c+d} \times n^2}{2 \times a \times \overline{a+b} \times \overline{a+b+n-1} \times \overline{b} \times \overline{a+b+bn}}.$$

940. Osservando lo stesso modo d'operare si troveranno le altre formole dei termini, e delle somme generali. Ne soggiungo qui alcune, acciò si veda la legge, che tengono. Colla lettera T esprimerò il termine generale, e colla lettera S la somma generale. Le lettere c , d , e ec. si riferiscono alla serie, che risulta dai numeratori delle frazioni, che sono i termini della serie data; il c designa il primo termine della serie, il d esprime la prima differenza, quella cioè, che passa tra il primo, e il secondo termine della serie, l' e dinota la differenza seconda ec., come si è detto ai num. 931., 932.. Le lettere a , b si riferiscono alle serie, che risultano dai fattori de' denominatori; la lettera a rappresenta il primo termine della prima serie, e la lettera b esprime la differenza, che è comune a tutte queste serie.

Per le serie, che ricevono la somma generale di questa forma $\frac{Ln}{A+Bn}$

L

$$T = \frac{c}{a+n-1 \times b \times \overline{a+bn}}$$

$$S = \frac{cn}{a \times \overline{a+bn}}$$

Per

Per le serie, che ricevono la somma generale di questa forma $\frac{Ln+Mn^2}{A+B \times n-1 \times A+Bn}$

II.

$$T = \frac{c + \frac{n-1}{1} \times d}{a+b+n-2 \times b \times a+b+n-1 \times b \times a+b+Ln}$$

$$S = \frac{c \times \frac{3a+b}{2} - a \times \frac{c+d}{2} \times n + c \times \frac{b-a+a \times c+d}{2} \times n^2}{2 \times a \times a+b \times a+b+n-1 \times b \times a+b+bn}$$

Per le serie, che ricevono la somma generale di questa forma

$$\frac{Ln+Mn^2+Nn^3}{A+B \times n-2 \times A+B \times n-1 \times A+Bn}$$

III.

$$T = \frac{c + \frac{n-1}{1} \times d + \frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{1} \times e}{a+2b+n-3 \times b \times a+2b+n-2 \times b \times a+2b+n-1 \times b \times a+2b+bn}$$

$$S = \left\{ \begin{array}{l} a^3 \times \frac{0c-3d+2e+ab \times 12c-4d+2e+4b^2c}{2} \times n \\ + 3a^2 \times \frac{d-e+2ab \times 2c \cdot d - e + 6b^2c}{2} \times n^2 + a^2c + ab \times \frac{d+e+2b \cdot c}{2} \times n^3 \\ 6 \times a \times a+b \times a+2b \times a+2b+n-2 \times b \times a+2b+n-1 \times b \times a+2b+bn \end{array} \right\}$$

941. Debbaſi trovare per eſempio il termine, e la ſomma generale della ſe-
guente ſerie $\frac{4}{4} \cdot \frac{7}{7} \cdot \frac{10}{10} \cdot \frac{13}{13} \cdot \frac{16}{16} \cdot \frac{19}{19} \cdot \frac{22}{22} \cdot \frac{25}{25} \cdot \frac{28}{28} \cdot \frac{31}{31} \cdot \frac{34}{34} \cdot \frac{37}{37} \cdot \frac{40}{40} \cdot \frac{43}{43} \cdot \frac{46}{46} \cdot \frac{49}{49} \cdot \frac{52}{52} \cdot \frac{55}{55} \cdot \frac{58}{58} \cdot \frac{61}{61} \cdot \frac{64}{64} \cdot \frac{67}{67} \cdot \frac{70}{70} \cdot \frac{73}{73} \cdot \frac{76}{76} \cdot \frac{79}{79} \cdot \frac{82}{82} \cdot \frac{85}{85} \cdot \frac{88}{88} \cdot \frac{91}{91} \cdot \frac{94}{94} \cdot \frac{97}{97} \cdot \frac{100}{100} \cdot \frac{103}{103} \cdot \frac{106}{106} \cdot \frac{109}{109} \cdot \frac{112}{112} \cdot \frac{115}{115} \cdot \frac{118}{118} \cdot \frac{121}{121} \cdot \frac{124}{124} \cdot \frac{127}{127} \cdot \frac{130}{130} \cdot \frac{133}{133} \cdot \frac{136}{136} \cdot \frac{139}{139} \cdot \frac{142}{142} \cdot \frac{145}{145} \cdot \frac{148}{148} \cdot \frac{151}{151} \cdot \frac{154}{154} \cdot \frac{157}{157} \cdot \frac{160}{160} \cdot \frac{163}{163} \cdot \frac{166}{166} \cdot \frac{169}{169} \cdot \frac{172}{172} \cdot \frac{175}{175} \cdot \frac{178}{178} \cdot \frac{181}{181} \cdot \frac{184}{184} \cdot \frac{187}{187} \cdot \frac{190}{190} \cdot \frac{193}{193} \cdot \frac{196}{196} \cdot \frac{199}{199} \cdot \frac{202}{202} \cdot \frac{205}{205} \cdot \frac{208}{208} \cdot \frac{211}{211} \cdot \frac{214}{214} \cdot \frac{217}{217} \cdot \frac{220}{220} \cdot \frac{223}{223} \cdot \frac{226}{226} \cdot \frac{229}{229} \cdot \frac{232}{232} \cdot \frac{235}{235} \cdot \frac{238}{238} \cdot \frac{241}{241} \cdot \frac{244}{244} \cdot \frac{247}{247} \cdot \frac{250}{250} \cdot \frac{253}{253} \cdot \frac{256}{256} \cdot \frac{259}{259} \cdot \frac{262}{262} \cdot \frac{265}{265} \cdot \frac{268}{268} \cdot \frac{271}{271} \cdot \frac{274}{274} \cdot \frac{277}{277} \cdot \frac{280}{280} \cdot \frac{283}{283} \cdot \frac{286}{286} \cdot \frac{289}{289} \cdot \frac{292}{292} \cdot \frac{295}{295} \cdot \frac{298}{298} \cdot \frac{301}{301} \cdot \frac{304}{304} \cdot \frac{307}{307} \cdot \frac{310}{310} \cdot \frac{313}{313} \cdot \frac{316}{316} \cdot \frac{319}{319} \cdot \frac{322}{322} \cdot \frac{325}{325} \cdot \frac{328}{328} \cdot \frac{331}{331} \cdot \frac{334}{334} \cdot \frac{337}{337} \cdot \frac{340}{340} \cdot \frac{343}{343} \cdot \frac{346}{346} \cdot \frac{349}{349} \cdot \frac{352}{352} \cdot \frac{355}{355} \cdot \frac{358}{358} \cdot \frac{361}{361} \cdot \frac{364}{364} \cdot \frac{367}{367} \cdot \frac{370}{370} \cdot \frac{373}{373} \cdot \frac{376}{376} \cdot \frac{379}{379} \cdot \frac{382}{382} \cdot \frac{385}{385} \cdot \frac{388}{388} \cdot \frac{391}{391} \cdot \frac{394}{394} \cdot \frac{397}{397} \cdot \frac{400}{400} \cdot \frac{403}{403} \cdot \frac{406}{406} \cdot \frac{409}{409} \cdot \frac{412}{412} \cdot \frac{415}{415} \cdot \frac{418}{418} \cdot \frac{421}{421} \cdot \frac{424}{424} \cdot \frac{427}{427} \cdot \frac{430}{430} \cdot \frac{433}{433} \cdot \frac{436}{436} \cdot \frac{439}{439} \cdot \frac{442}{442} \cdot \frac{445}{445} \cdot \frac{448}{448} \cdot \frac{451}{451} \cdot \frac{454}{454} \cdot \frac{457}{457} \cdot \frac{460}{460} \cdot \frac{463}{463} \cdot \frac{466}{466} \cdot \frac{469}{469} \cdot \frac{472}{472} \cdot \frac{475}{475} \cdot \frac{478}{478} \cdot \frac{481}{481} \cdot \frac{484}{484} \cdot \frac{487}{487} \cdot \frac{490}{490} \cdot \frac{493}{493} \cdot \frac{496}{496} \cdot \frac{499}{499} \cdot \frac{502}{502} \cdot \frac{505}{505} \cdot \frac{508}{508} \cdot \frac{511}{511} \cdot \frac{514}{514} \cdot \frac{517}{517} \cdot \frac{520}{520} \cdot \frac{523}{523} \cdot \frac{526}{526} \cdot \frac{529}{529} \cdot \frac{532}{532} \cdot \frac{535}{535} \cdot \frac{538}{538} \cdot \frac{541}{541} \cdot \frac{544}{544} \cdot \frac{547}{547} \cdot \frac{550}{550} \cdot \frac{553}{553} \cdot \frac{556}{556} \cdot \frac{559}{559} \cdot \frac{562}{562} \cdot \frac{565}{565} \cdot \frac{568}{568} \cdot \frac{571}{571} \cdot \frac{574}{574} \cdot \frac{577}{577} \cdot \frac{580}{580} \cdot \frac{583}{583} \cdot \frac{586}{586} \cdot \frac{589}{589} \cdot \frac{592}{592} \cdot \frac{595}{595} \cdot \frac{598}{598} \cdot \frac{601}{601} \cdot \frac{604}{604} \cdot \frac{607}{607} \cdot \frac{610}{610} \cdot \frac{613}{613} \cdot \frac{616}{616} \cdot \frac{619}{619} \cdot \frac{622}{622} \cdot \frac{625}{625} \cdot \frac{628}{628} \cdot \frac{631}{631} \cdot \frac{634}{634} \cdot \frac{637}{637} \cdot \frac{640}{640} \cdot \frac{643}{643} \cdot \frac{646}{646} \cdot \frac{649}{649} \cdot \frac{652}{652} \cdot \frac{655}{655} \cdot \frac{658}{658} \cdot \frac{661}{661} \cdot \frac{664}{664} \cdot \frac{667}{667} \cdot \frac{670}{670} \cdot \frac{673}{673} \cdot \frac{676}{676} \cdot \frac{679}{679} \cdot \frac{682}{682} \cdot \frac{685}{685} \cdot \frac{688}{688} \cdot \frac{691}{691} \cdot \frac{694}{694} \cdot \frac{697}{697} \cdot \frac{700}{700} \cdot \frac{703}{703} \cdot \frac{706}{706} \cdot \frac{709}{709} \cdot \frac{712}{712} \cdot \frac{715}{715} \cdot \frac{718}{718} \cdot \frac{721}{721} \cdot \frac{724}{724} \cdot \frac{727}{727} \cdot \frac{730}{730} \cdot \frac{733}{733} \cdot \frac{736}{736} \cdot \frac{739}{739} \cdot \frac{742}{742} \cdot \frac{745}{745} \cdot \frac{748}{748} \cdot \frac{751}{751} \cdot \frac{754}{754} \cdot \frac{757}{757} \cdot \frac{760}{760} \cdot \frac{763}{763} \cdot \frac{766}{766} \cdot \frac{769}{769} \cdot \frac{772}{772} \cdot \frac{775}{775} \cdot \frac{778}{778} \cdot \frac{781}{781} \cdot \frac{784}{784} \cdot \frac{787}{787} \cdot \frac{790}{790} \cdot \frac{793}{793} \cdot \frac{796}{796} \cdot \frac{799}{799} \cdot \frac{802}{802} \cdot \frac{805}{805} \cdot \frac{808}{808} \cdot \frac{811}{811} \cdot \frac{814}{814} \cdot \frac{817}{817} \cdot \frac{820}{820} \cdot \frac{823}{823} \cdot \frac{826}{826} \cdot \frac{829}{829} \cdot \frac{832}{832} \cdot \frac{835}{835} \cdot \frac{838}{838} \cdot \frac{841}{841} \cdot \frac{844}{844} \cdot \frac{847}{847} \cdot \frac{850}{850} \cdot \frac{853}{853} \cdot \frac{856}{856} \cdot \frac{859}{859} \cdot \frac{862}{862} \cdot \frac{865}{865} \cdot \frac{868}{868} \cdot \frac{871}{871} \cdot \frac{874}{874} \cdot \frac{877}{877} \cdot \frac{880}{880} \cdot \frac{883}{883} \cdot \frac{886}{886} \cdot \frac{889}{889} \cdot \frac{892}{892} \cdot \frac{895}{895} \cdot \frac{898}{898} \cdot \frac{901}{901} \cdot \frac{904}{904} \cdot \frac{907}{907} \cdot \frac{910}{910} \cdot \frac{913}{913} \cdot \frac{916}{916} \cdot \frac{919}{919} \cdot \frac{922}{922} \cdot \frac{925}{925} \cdot \frac{928}{928} \cdot \frac{931}{931} \cdot \frac{934}{934} \cdot \frac{937}{937} \cdot \frac{940}{940} \cdot \frac{943}{943} \cdot \frac{946}{946} \cdot \frac{949}{949} \cdot \frac{952}{952} \cdot \frac{955}{955} \cdot \frac{958}{958} \cdot \frac{961}{961} \cdot \frac{964}{964} \cdot \frac{967}{967} \cdot \frac{970}{970} \cdot \frac{973}{973} \cdot \frac{976}{976} \cdot \frac{979}{979} \cdot \frac{982}{982} \cdot \frac{985}{985} \cdot \frac{988}{988} \cdot \frac{991}{991} \cdot \frac{994}{994} \cdot \frac{997}{997} \cdot \frac{1000}{1000}$

$$\begin{array}{cccc} & 6. & 10. & 14. \\ 1. & 7. & 17. & 31. \end{array}$$

Si sostituiscano nelle formole del num. III. i valori di a, b, c, d, e , e si avrà

$$\begin{aligned} T &= \frac{1 + bX^{\frac{n-1}{1}} + 4X^{\frac{n-1}{1.} \frac{n-2}{2}}}{10 + 3X^n - 3X^{10+3X^{n-2}}X^{10+3X^{n-1}}X^{10+3^n}} \\ S &= \frac{-76n + 194n^2 + 202n^3}{1680X^{10+3X^{n-2}}X^{10+3X^{n-1}}X^{10+3^n}} \\ &\quad - \frac{19}{420}n + \frac{7}{40}n^2 + \frac{101}{840}n^3 \\ &= \frac{10 + 3X^n - 2X^{10+3X^{n-1}}X^{10+3^n}}{10 + 3X^n - 2X^{10+3X^{n-1}}X^{10+3^n}} \end{aligned}$$

942. Se la serie proposta avrà il numeratore de' termini costante, in tal caso si dovranno cancellare nelle formole del termine, e della somma generale tutti que' termini, ne' quali entrano le lettere d, e ec.

943. Essendo dato il termine generale di una serie, si passerà per di lui mezzo a trovare la somma generale a norma delle cose dette. Se nel numeratore del dato termine generale l'esponente della lettera n sarà uguale, o maggiore del numero de' fattori del denominatore, in tal caso si moltiplichino fra loro questi fattori del denominatore, e col loro prodotto si divida il numeratore, come si è fatto al num. 832, con che il proposto termine generale si spezzerà in due formole, una intera, e l'altra fratta, che faranno termini generali di due serie, della prima delle quali si troverà la somma mediante la conveniente formola desunta tra le date al num. 930: della seconda serie poi si avrà la somma nella maniera poc' anzi esposta, eccettuandone però il caso, in cui il massimo esponente di n nel numeratore del termine generale sia minore di una sola unità del numero de' fattori del denominatore, lo che succedendo manca il metodo, e la somma, che egli ci esibisce non è la vera somma della serie: Se poi il detto esponente sarà minore per lo meno di due unità del numero de' fattori del denominatore, si potrà sempre avere la somma algebrica della serie.

944. Se sarà data per termine generale una formola, che abbia per denominatore una funzione di n , e da questo termine generale si debba dedurre la somma generale della corrispondente serie, si risolva co' merodi dari il denominatore ne' suoi fattori di primo grado, quali devono essere tutti ineguali, e in oltre devono essere quantità intere, o per lo meno devono essere intere le loro differenze, poscia col precedente metodo se ne determini la somma: O pure si spezzi giusto il num. 834 ec. la formola data in più frazioni, ognuna delle quali abbia per denominatore

T. II.

Ddd

due

due fattori conseguenti, come sarebbe $n \times 1 + n$; $1 + n \times 2 + n$
 $2 + n \times 3 + n$ ec., ognuna delle quali farà termine generale di una serie.
 Da ciascuno di questi termini generali si deduca nel modo sopra esposto la corri-
 spondente somma generale, e l'aggregato di tutte queste somme parziali darà la
 somma cercata corrispondente al termine generale proposto. Devesi poi sempre av-
 vertire di evitare il caso indicato al num. 943, nel quale manca il metodo, nè ci
 dà la somma bramata.

945. Chi rendendosi familiare l'esposto metodo saprà maneggiarlo opportuna-
 mente a dovere secondo i casi, non troverà difficoltà alcuna a determinare i ter-
 mini, e le somme generali d'infinite altre diverse serie. Due esempi renderan-
 no la cosa affatto evidente. Quanto al primo sia data la somma generale

$1n + Mn^2$. Secondo il metodo del Padre Riccati sostituendo $n-1$ in luo-
 go di n , e facendo la debita sottrazione, e riduzione allo stesso denominatore, si ha
 il seguente termine generale

$$\frac{A1 + 2AMn + BMn^2}{-AM - BMn - CLn^2 + CLn}$$

$$A + B \times n-1 + C \times n-1^2 \times A + Bn + Cn^2$$

Ora per dedurne il termine generale a tenore del metodo finora praticato, offer-
 vo che il numeratore di questa frazione è termine generale di una serie algebrica
 di secondo ordine, della quale se il primo termine si dirà $= \beta$, la prima differenza
 $= \delta$, e la seconda differenza, che è costante, uguale ad ϵ , detto numeratore si potrà

esprimere così $\beta + \frac{n-1}{1} \times \delta + \frac{n-1 \times n-2}{2} \times \epsilon$. Il denominatore poi costa di

due fattori, ognuno de' quali è termine generale di una serie algebrica di secondo
 ordine: Se pertanto il primo termine della prima serie si dirà $= a$, la prima diffe-
 renza $= b$, la seconda differenza, che è costante $= c$, il primo termine della secon-
 da serie $= p$, la prima differenza $= q$, la seconda differenza (la quale è la stessa,
 che la differenza della serie dell'altro fattore, a motivo, che la seconda serie è la stes-
 sa della prima, se non che comincia dal lei secondo termine), $= \epsilon$, il suddetto de-
 nominatore si potrà rappresentare così

$$a + \frac{n-1}{1} \times b + \frac{n-1 \times n-2}{2} \times c \times p + \frac{n-1}{1} \times q + \frac{n-1 \times n-2}{2} \times \epsilon$$

conseguentemente il cercato termine generale farà

$$T = \frac{a + \frac{n-1}{1} X p + \frac{n-1}{1} \frac{X^{n-2}}{2} X^c}{a + \frac{n-1}{1} X b + \frac{n-1}{1} \frac{X^{n-2}}{2} X^c \times p + \frac{n-1}{1} X q + \frac{n-1}{1} \frac{X^{n-2}}{2} X^c}$$

Per avere la somma generale bisogna determinare le due quantità L , M a fine di sostituirne i valori nella somma proposta. Il Padre Riccati per poterlo fare ha bisogno di certe condizioni: io però attenendomi alla maniera praticata al num. 939 cuopro facilissimamente questi valori cesi. Paragono la data somma al precedente

termine generale con supporre $n=1$ e ritrovo $L + M = \frac{\beta}{a}$

(poichè $A + Bn + Cn^2 = p + \frac{n-1}{1} X q + \frac{n-1}{1} \frac{X^{n-2}}{2} X^c$):

Pocfia suppongo nel termine generale $n=1$, indi $n=2$, faccio la somma di questi due termini, quale uguaglio alla proposta somma generale, in cui faccio $n=2$,

$$\text{e mi viene } 2L + 4M = \frac{a \gamma p \gamma \overline{\beta + d} + \beta \gamma a + b \gamma \overline{p + q}}{a \gamma p \gamma a + b}$$

Per mezzo di queste due equazioni determino al solito i valori di L , M , che ritrovo

$$\text{essere } L = \frac{a \gamma p \gamma \overline{a + b} - a \gamma p \gamma \overline{\beta + d} - \beta \gamma a + b \gamma \overline{p + q}}{2 \gamma a \gamma p \gamma a + b},$$

$$M = \frac{a \gamma p \gamma \overline{\beta + d} + \beta \gamma a + b \gamma \overline{p + q} - 2 \beta \gamma p \gamma a + b}{2 \gamma a \gamma p \gamma a + b}. \text{ Conseguentemente la som-}$$

ma cercata farà

$$S = \frac{\left\{ \frac{a \beta \gamma p \gamma a + b - a \gamma p \gamma \overline{\beta + d} - \beta \gamma a + b \gamma \overline{p + q} X^n + a \gamma p \gamma \overline{\beta + d} + \beta \gamma a + b \gamma \overline{p + q} - 2 \beta \gamma p \gamma a + b \gamma n^2}{2 \gamma a \gamma p \gamma a + b} X p + \frac{n-1}{1} X q + \frac{n-1}{1} \frac{X^{n-2}}{2} X^c \right\}}$$

Le serie, che si riferiscono al precedente termine generale hanno per denominatore due fattori, che sono due quadrati. Il numeratore poi può essere una serie di secondo ordine; può essere una serie di primo ordine, nel qual caso farà $a=0$; e può essere ancora una quantità costante, e in allora farà $\beta=0$, $a=0$. Per esempio a questo termine si riferirà la serie $\frac{1}{2^1 X^5}, \frac{3}{5^1 X^8}, \frac{5}{8^1 X^{11}}, \frac{7}{11^1 X^{14}}, \frac{9}{14^1 X^{17}}, \text{cc.}$

ma in questo caso sarà $a=0$. Per appropriare pertanto il termine, e la somma generale trovata a questa serie prendo i valori di a, b, c, p, q, s, t . Perchè il primo termine della serie de' numeratori è 1, farà $s=1$, e perchè la differenza prima, che è costante è 2, farà $p=2$. Quanto ai denominatori, che costano di due fattori, la serie de' fattori primi essendo $2^2, 3^2, 8^2, 11^2, 14^2$ ec., o sia 4, 25, 64, 121, 196, le di cui differenze prima e seconda si hanno mediante la sottrazione cos,

$$\begin{array}{r} 18. \quad 18. \\ 21. \quad 39. \quad 57. \quad \text{ec.} \\ + \quad 25. \quad 64. \quad 121. \end{array}$$

Onde trovasi essere $a=4, b=21, c=18$. La serie poi de' secondi fattori è $3^2, 8^2, 11^2, 14^2, 17^2$, o sia 25, 64, 121, 196, 289 ec., di cui si prenderanno le differenze prima, e seconda come segue

$$\begin{array}{r} 18. \quad 18. \\ 39. \quad 57. \quad 75. \\ + \quad 25. \quad 64. \quad 121. \quad 196. \end{array}$$

e però $p=25, q=39$. Sostituendo questi valori nel termine, e nella somma generale, si avrà

$$\begin{aligned} T &= \frac{1 + 2X^{\frac{n-1}{1}}}{1} \\ &= \frac{4+21X^{\frac{n-1}{1}} + 18X^{\frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2}} X^{25} + 39X^{\frac{n-1}{1}} + 18X^{\frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2}}}{12n + 13n^2} \\ S &= \frac{100X^{25} - 39X^{\frac{n-1}{1}} + 18X^{\frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2}}}{1} \end{aligned}$$

946. Prendo il secondo esempio dalla somma generale $\frac{Ln + Mn^2 + Nn^3}{A + Bn + Cn^2 + Dn^3}$, dalla quale secondo il metodo del Padre Riccati si deduce il seguente termine generale

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{AL} & + & 2\text{AM}_n & + & 2\text{AN}_n^2 & + & 2\text{BN}_n^3 & + & \text{CN}_n^4 \\
 \text{AM} & - & 3\text{AN}_n & + & \text{BM}_n^2 & - & 2\text{CN}_n^3 & - & \text{DM}_n^4 \\
 \text{AN} & - & \text{BM}_n & - & 3\text{BN}_n^2 & - & 2\text{DL}_n^3 & & \\
 & + & \text{BN}_n & - & \text{CL}_n^2 & + & 2\text{DM}_n^3 & & \\
 & + & \text{CL}_n & + & \text{CN}_n^2 & & & & \\
 & - & \text{DL}_n & + & 3\text{DL}_n^2 & & & & \\
 & & & - & \text{DM}_n^3 & & & &
 \end{array}$$

$$A + B \chi^{n+1} + D \chi^{n-1} + D \chi^{n-1} \chi A + Bn + Cn^2 + Dn^3$$

e secondo il nostro metodo si ha per termine generale

$$T = \frac{\left\{ \beta + \frac{n-1}{1} \chi^2 + \frac{n-1}{1} \frac{\chi^{n-2}}{2} \chi^2 + \frac{n-1}{1} \frac{\chi^{n-2} \chi^{n-3}}{2 \cdot 3} \chi^2, \right.}{\left. + \frac{n-1}{1} \frac{\chi^{n-2} \chi^{n-3} \chi^{n-4}}{2 \cdot 3 \cdot 4} \chi^2 \right\}} \cdot \left\{ \left(a + \frac{n-1}{1} \chi^b + \frac{n-1}{1} \frac{\chi^{n-2}}{2} \chi^c + \frac{n-1}{1} \frac{\chi^{n-2} \chi^{n-3}}{2 \cdot 3} \chi^d \right) \chi \right. \\ \left. \left(p + \frac{n-1}{1} \chi^q + \frac{n-1}{1} \frac{\chi^{n-2}}{2} \chi^r + \frac{n-1}{1} \frac{\chi^{n-2} \chi^{n-3}}{2 \cdot 3} \chi^d \right) \right\}$$

perchè il numeratore della formola, che dà il termine generale, è termine generale di una serie di quarto ordine, e il denominatore costa di due fattori, ognuno dei quali è termine generale di una serie di terzo ordine, delle quali la seconda comincia dal secondo termine della prima; i termini poi di queste serie sono cubi perfetti. La somma generale si determina come segue.

Nel precedente termine generale si faccia $n=1$, con che si cambierà in $\frac{\beta}{a \chi^p}$, che pongo $= A$. Di poi si faccia $n=2$, e diverrà $\frac{\beta + \delta}{a + b \chi^{p+q}}$, che aggiunto a $\frac{\beta}{a \chi^p}$ dà la somma dei due primi termini della serie, che è $\frac{\beta}{a \chi^p} + \frac{\beta + \delta}{a + b \chi^{p+q}}$, quale faccio $= B$. Finalmente suppongo $n=3$, e mi viene $\frac{\beta + 2\delta + \epsilon}{a + 2b + c \chi^{p+2q+r}}$, che aggiunto al precedente valore di B dà la somma dei tre primi termini della serie, cioè $\frac{\beta}{a \chi^p} + \frac{\beta + \delta}{a + b \chi^{p+q}} + \frac{\beta + 2\delta + \epsilon}{a + 2b + c \chi^{p+2q+r}}$, che dico $= C$. Assumo

adef.

adesso la somma generale indeterminata $\frac{Ln+Mn^2+Nn^3}{A+Bn+Cn^2+Dn^3}$, in cui $A+Bn+Cn^2+Dn^3 = p+q\chi\frac{n-1}{1}+r\chi\frac{n-1}{1}\chi\frac{n-2}{2}+d\chi\frac{n-1}{1}\chi\frac{n-2}{2}\chi\frac{n-3}{3}$. Paragono ad A questa somma, in cui suppongo $n=1$, e mi viene $\frac{L+M+N}{p} = A$, cioè (Δ) $L+M+N=Ap$. Pofcia vi pongo $n=2$, e la paragono a B, e mi viene $\frac{2L+4M+8N}{p+q} = B$; vale a dire (Θ) $2L+4M+8N=B\chi\overline{p+q}$. Finalmente vi faccio $n=3$, e la paragono a C, e ritrovo $\frac{3L+9M+27N}{p+q+r} = C$, o fia (Λ) $3L+9M+27N=C\chi\overline{p+q+r}$. Dal valore di (Θ) si sottragga il valore di (Δ) moltiplicato per 2, e si avrà (Π) $2M+6N=B\chi\overline{p+q}-2Ap$. Dal valore di (Λ) si sottragga il valore di (Δ) moltiplicato per 3, e ne verrà (Σ) $6M+24N=C\chi\overline{p+q+r}-3Ap$; e sottraendo dal valore di (Σ) il valore di (Π) moltiplicato in 3, si avrà $6N = C\chi\overline{p+q+r}-3B\chi\overline{p+q}+3Ap$, cioè (Τ) $N = \frac{1}{6}C\chi\overline{p+q+r} - \frac{1}{2}B\chi\overline{p+q} + \frac{1}{2}Ap$, il qual valore sostituito in (Π) dà $2M = -C\chi\overline{p+q+r} + 4B\chi\overline{p+q} - 5Ap$, vale a dire (Φ) $M = -\frac{1}{2}C\chi\overline{p+q+r} + 2B\chi\overline{p+q} - \frac{5}{2}Ap$. Finalmente sostituendo in (Δ) i ritrovati valori (Τ, Φ) di M, N, si avrà (Ω) $L = \frac{1}{3}C\chi\overline{p+q+r} - \frac{3}{2}B\chi\overline{p+q} + 3Ap$. Conseguentemente la somma generale cercata (con fare $p+2q+r=\varphi$, $p+q=\mu$) è

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{3}C\chi\varphi - \frac{3}{2}B\chi\mu + 3Ap\chi n - \frac{1}{2}C\chi\varphi + 2B\chi\mu - \frac{5}{2}Ap\chi n^2 \\ + \frac{1}{6}C\chi\varphi - \frac{1}{2}B\chi\mu + \frac{1}{2}Ap\chi n^3 \end{array} \right\}}{p+q\chi\frac{n-1}{1}+r\chi\frac{n-1}{1}\chi\frac{n-2}{2}+d\chi\frac{n-1}{1}\chi\frac{n-2}{2}\chi\frac{n-3}{3}}$$

Se pertanto la serie data farà $\frac{1}{1^1\chi 2^1}, \frac{5}{2^1\chi 3^1}, \frac{9}{3^1\chi 4^1}, \frac{13}{4^1\chi 5^1}, \frac{17}{5^1\chi 6^1}$ ec., o fia $\frac{1}{1\chi 8}, \frac{5}{8\chi 27}, \frac{9}{27\chi 64}, \frac{13}{64\chi 125}, \frac{17}{125\chi 216}$ ec. fatte al solito le determinazioni si troverà $p=1, r=4, s=0, \gamma=0, \alpha=0, a=1, b=7, c=12, d=6, p=8, q=19, r=18$, e però il termine generale farà

T=

$$T = \frac{1 + 4 \sqrt[n]{n-1}}{\left\{ \left(1 + 7 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1}} + 12 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}} + 6 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2} \cdot \frac{n-3}{3}} \right) \sqrt[n]{n-1} \right. \\ \left. \left(8 + 19 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1}} + 18 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}} + 6 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2} \cdot \frac{n-3}{3}} \right) \right\}}$$

e la somma generale $S =$

$$\frac{22n + 48n^2 + 11n^3}{81 \sqrt[n]{8} + 19 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1}} + 18 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}} + 6 \sqrt[n]{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2} \cdot \frac{n-3}{3}}}$$

947. Avanti di por fine alle serie algebriche offerverò una cosa, la quale si è, che per avere la somma di una serie protratta all'infinito basterà ritenere solamente dalla somma generale quel termine, in cui la lettera n è elevata alla massima potenza, poichè in tal caso essendo $n = \infty$ tutti gli altri termini rispetto a quello, che è elevato alla massima potenza, vanno a zero, essendo quegli di loro infinitamente più grande. Questa cosa ha luogo in qualunque serie tanto algebrica, come geometrica, o algebrico geometrica.

Modo di sommare le serie geometriche.

948. La somma, che ricevono queste serie, chiamasi esponenziale, in quanto che nella formula esprime la somma generale di queste serie la lettera n , che denota il numero de' termini, sta in luogo di esponente.

949. Già abbastanza ho detto al num. 811. come nascano queste serie, e come si distinguano in ordini. Comincerò adunque dal termine, e dalla somma generale, che convengono alle progressioni geometriche, e per non discostarmi dalla maniera già praticata esprimerò l'uno, e l'altra mediante il primo termine, e il denominatore della progressione. Se il primo termine della progressione sarà $= a$, e il denominatore $= m$, il termine generale della progressione sarà $T = am^{n-1}$ giusta il num. 757. comunque la serie sia ascendente, o discendente, o pure comunque il denominatore sia un numero intero, o fratto. La somma generale poi (giusta il num. 1067. del I. Tomo) trovasi essere $S = \frac{am \sqrt[n]{m^{n-1} - a}}{m - 1} =$

$\frac{a}{m-1} \sqrt[n]{mn-1}$ quando il denominatore della progressione è un numero maggiore dell'unità, ma se egli sarà un numero minore dell'unità, la somma della progressione, che in tal caso è discendente, o sia decresciente sarà

$S = \frac{a}{1-m} \sqrt[n]{1-m^n}$. Siccome poi il termine generale $T = am^{n-1}$ è uguale ad $\frac{am^{n-1}}{m-1} \sqrt[n]{m-1} = \frac{a}{m-1} \sqrt[n]{m-1} \sqrt[n]{m^{n-1}}$, ben si vede, che quando il denomi-

tore $m > 1$, la serie è crescente, facendosi i di lei termini sempre maggiori, finchè divenendo n un numero infinitamente grande, l'ultimo termine della serie è infinito, e tale pure è la di lei somma: Quando $m = 1$, tutti i termini della serie, e la di lei somma $= 0$: Quando $m > 1$, la serie è decrescente, ed m^n è una quantità infinitamente piccola, e in questo caso l'espressione $\frac{a}{m-1} \times \overline{m-1} \times m^{n-1}$ del ter-

mine generale farà $\frac{a}{1-m} \times \overline{1-m} \times m^{n-1}$, come ho fatto rispetto alla somma, poichè se non si usasse questo artificio, le formole del termine, e della somma generale risulterebbero negative. Qualora il termine generale sia m^n , la somma generale farà $\frac{m^{n+1}-m}{m-1}$.

950. Si debba per esempio trovare la somma della serie $3, 5, 8 \frac{1}{3}, 13 \frac{8}{9}, 23 \frac{4}{27}$ ec. Poichè questa progressione è crescente, il di cui denominatore è $\frac{5}{3}$ si dovrà far uso della formola $S = \frac{a}{m-1} \times \overline{m^n-1}$. Si ha pertanto $a=3, m=\frac{5}{3}$:

Che però fatte queste sostituzioni farà $S = \frac{3}{\frac{5}{3}-1} \times \overline{\frac{5^n}{3^n}-1} = \frac{3^1}{2} \times \overline{\frac{5^n}{3^n}-1} = \frac{5^n-3^n}{2 \times 3^{\frac{n-1}{2}}}$. Il termine generale poi farà $T = am^{n-1} = 3 \times \overline{\frac{5^{n-1}}{3^{n-1}}} = \frac{5^{n-1}}{3^{\frac{n-1}{2}}}$.

951. Qualora sia dato il termine generale di una progressione geometrica, sarà facile il dedurne la somma: Si faccia $n=1$ nel proposto termine generale, e ciò che ne verrà sarà uguale ad a ; poscia si faccia $n=2$, e ciò che ne verrà diviso per a farà il valore di m : Per esempio sia dato il termine generale $T = \frac{4^{n-1}}{2^{n-1}}$. Si faccia $n=1$, e si avrà $\frac{4^1}{2^1} = 2 = a$; poscia si faccia $n=2$, lo che darà $\frac{4^2}{2^2} = 32$, che diviso per 2 valore di a rende $\frac{32}{2} = 16 = m$. Ora che si è avuto il valore di a , e di m , se ne faccia la sostituzione nella formola $S = \frac{a}{m-1} \times \overline{m^n-1}$ (perchè m è un numero maggiore dell'unità), e si otterrà la bramata somma, che è $\frac{2}{15} \times \overline{16^n-1}$.

952. Se il denominatore della progressione sarà una quantità negativa, la progressione procederà con segni alternanti: In questo caso pertanto se il primo termine della progressione è positivo, e il secondo negativo, si dovrà considerare la progressione come decrescente, e conseguentemente si dovrà far uso della formola $S = \frac{a}{1-m} \times \overline{1-m^n}$: Se poi il primo termine sarà negativo, e il secondo po-

siti-

sicivo, si considererà la progressione come crescente, e però si dovrà adoperare la formula $S = \frac{a}{m-1} \times \frac{m^n - 1}{m - 1}$.

953. Quanto alle serie geometriche degli altri ordini, siccome nascono (pel num. 811), o da somme, o da differenze di serie geometriche del primo ordine, eosì si avranno i loro termini, e somme generali mediante le corrispondenti composizioni de' termini, e somme generali delle serie componenti. Per esempio volendo il termine, e la somma generale della serie $\frac{5}{2}, \frac{39}{4}, \frac{271}{8}$ ec., si osservi che ella nasce dal sottrarsi la serie C dalla somma delle serie A, B

(A)	2.	6.	18.	54.	162.
(B)	1.	4.	16.	64.	256.
(C)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$

Ma della serie (A) il termine generale è $2 \times 3^{n-1}$, perchè $a=2$, $m=3$; della serie (B) il termine generale è $1 \times 4^{n-1}$; della serie (C) il termine generale è $\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. Dunque il termine generale della serie proposta è

$2 \times 3^{n-1} + 4^{n-1} - \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. Parimente la somma generale della serie (A)

è $3^n - 1$; della serie (B) è $\frac{1}{3} \times 4^n - 1$; della serie (C) è $\frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \times 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$; quindi la somma generale della proposta serie $\frac{5}{2}, \frac{39}{4}, \frac{271}{8}$ ec.

è $3^n + \frac{1}{3} \times 4^n - \frac{7}{3} + \frac{1}{2^n}$.

Modo di sommare le serie algebrico-geometriche.

954. Comincio col Padre Riccati dalla formola $\overline{A+Bn} \times K^n - A$, che rappresenta la somma generale di una serie algebrico-geometrica. Le due serie, una algebrica, e l'altra geometrica, dall'ordinata moltiplicazione delle quali essa risulta, sono ciascuna di primo ordine; e tale per esempio è la seguente serie

(A)	2.	20.	128.	704.	3584. ec.
-----	----	-----	------	------	-----------

la quale risulta dal moltiplicarsi rispettivamente fra loro i termini di queste due serie

Serie aritmetica	2.	5.	8.	11.	14.	ec.
Serie geometrica	1.	4.	16.	64.	256.	

Ora chiamando a il primo termine della serie algebrica componente, la di lei differenza $=b$; il primo termine della serie geometrica $=p$, e il di lei denominatore $=m$, dalla formola proposta $A + Bn \times K^n = A$ dedurrò, come ho fatto per le serie algebriche, le formole dei termini, e della somma generale delle corrispondenti serie algebrico-geometriche, che faranno $T = a + n-1 \times b \times p^{n-1}$

$$S = \frac{m-1 \times ap - bnp}{m-1} + \frac{bp \times n}{m-1} \times m^n - \frac{ap \times m-1 + bnp}{m-1}$$

$$(\text{poichè } A = \frac{ap \times m-1 - bnp}{m-1}, B = \frac{bp}{m-1}, \text{ e } K=m)$$

per lo che rispetto alla serie A essendo $a=2$, $b=3$, $p=1$, $m=4$, farà

$$T = 2 + 3 \times n-1 \times 1^{n-1} \quad S = -\frac{2}{3} + n \times 4^n + \frac{2}{3};$$

rispetto poi alla serie $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{7}{24}$, $\frac{9}{48}$ ec., che nasce dal moltiplicarli fra loro i termini delle due seguenti

Serie aritmetica	1,	3,	5,	7,	9	ec.
Serie geometrica	$\frac{1}{3}$,	$\frac{1}{6}$,	$\frac{1}{12}$,	$\frac{1}{24}$,	$\frac{1}{48}$	

il termine generale è $1 + 2 \times n-1 \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, e la somma generale, (nella quale devonsi lasciare come è negativo il denominatore $m-1$, tale risultando per essere un numero fratto) trovasi essere $S = -2 - \frac{4}{3} n \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$.

Se si fossero mutati i segni alla formola generale così

$$S = \frac{ap \times 1-m + bnp}{1-m} + \frac{bp}{1-m} \times n \times m^n - \frac{ap \times 1-m - bnp}{1-m},$$

per la precedente serie $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{12}$ ec. si farebbe avuta la somma

$S =$

$S = 2 + \frac{4}{3} X \frac{1}{2} - 2$, la quale è negativa, onde per evitare le quantità negative devonsi ella usare come sta.

955. Passiamo alle serie algebrico-geometriche, che ricevono la somma generale della seguente forma $\frac{A+Bn+Cn^2}{X} K^n - A$. La serie algebrica componente è di secondo ordine, la geometrica è di primo ordine. Alla precedente somma si riduce la seguente serie

$$B. \quad 2. \quad 16. \quad 72. \quad 256 \quad \text{ec.}$$

la quale si compone dalla rispettiva moltiplicazione dei termini di quelle due.

$$\begin{array}{cccccc} 1. & 4. & 9. & 16. & 25 & \\ 2. & 4. & 8. & 16. & 32 & \text{ec.} \end{array}$$

Ne deduco pertanto le formole del termine, e della somma generale, che sono

$$T = a + \frac{n-1}{1} X^b + \frac{n-1}{1} \frac{X^{n-2}}{2} X^c X^{pm^{n-1}}$$

$$S = \left\{ \begin{array}{l} \frac{2apX^{m-1} - 2bpX^{m-1} + 2cpX^3}{2X^{m-1}} + \\ \frac{2bpX^{m-1} - cpX^{m-1}}{2X^{m-1}} X^n + \frac{cp}{2X^{m-1}} X^{n^2} \end{array} \right\} X^{m^n}$$

$$- \frac{2apX^{m-1} + 2bpX^{m-1} - 2cpX^3}{2X^{m-1}}$$

in cui al solito la lettera a disegna il primo termine della serie algebrica; b la prima differenza; c la seconda differenza, p il primo termine della serie geometrica, ed m il denominatore. Per lo che rispetto alla serie (B) farà

$$T = 1 + 3 X \frac{n-1}{1} + 2 X \frac{n-1}{1} \frac{X^{n-2}}{2} X^2 X^{2^{n-1}}$$

$$S = \frac{6-4n+2n^2}{X^2} X^{2^n} - 6, \text{ essendo } a=1, b=3, c=2, p=2, m=2.$$

956. Se fosse data la serie (D) $1, \frac{5}{12}, \frac{9}{48}, \frac{15}{192}, \frac{23}{768}$ ec., che risulta dalle due seguenti

$$\begin{array}{ccccc} \frac{3}{1}, & \frac{5}{12}, & \frac{9}{48}, & \frac{15}{192}, & \frac{23}{768} \\ \frac{1}{3}, & \frac{1}{12}, & \frac{1}{48}, & \frac{1}{192}, & \frac{1}{768} \end{array} \quad \text{ec.}$$

Ecc 2

poi-

poichè è $a=3$, $b=2$, $c=2$, $p=\frac{1}{3}$, $m=\frac{1}{4}$, farà

$$T = 3 + 2 \times \frac{n-1}{1} + 2 \times \frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4};$$

$$S = -\frac{140}{81} - \frac{20}{27}n - \frac{4}{9}n^2 \times \frac{1}{4} + \frac{140}{81}.$$

957. Qualora in vece d'esser data la serie fosse proposto il termine generale, siccome in esso restano inconfusi i termini generali delle serie componenti, mediante la sostituzione di 1, 2, 3, ec. a misura del bisogno in luogo di n nel termine generale, si trovino i primi termini delle serie componenti, e per mezzo loro si avranno i valori di p , m , a , b , c ec. da sostituirsi nella formola generale della somma. Sia per esempio proposto il termine generale $1+n+n^2 \times 2^n$, e si debba ritrovare la corrispondente somma generale. Il primo fattore $1+n+n^2$ di questo termine generale dà la serie algebrica

$$3, \quad 7, \quad 13, \quad 21, \quad 31, \quad 43 \text{ ec.}$$

rispetto alla quale è $a=3$, $b=4$, $c=2$. Il secondo fattore 2^n dà la serie geometrica

$$2, \quad 4, \quad 8, \quad 16, \quad 32, \quad 64 \text{ ec.}$$

rispetto alla quale è $p=m=2$. Ora la serie

$$6, \quad 28, \quad 104, \quad 336, \quad 992, \quad 2752 \text{ ec.}$$

che nasce dalle due precedenti, e di cui perciò è termine generale $1+n+n^2 \times 2^n$, risultando e da una serie algebrica di secondo ordine, e da una serie geometrica di primo ordine, ha per somma generale una formola di questa forma $A+Bn+Cn^2 \times K^n = A$. Ma la somma generale corrispondente a questa forma si è trovata essere (al num. 955.)

$$S = \left\{ \frac{2ap \times m-1 - 2bpm \times m-1 + 2cpm^2}{2 \times m-1} + \frac{2bp \times m-1 - cp \times 3m-1}{2 \times m-1} \times n + \frac{cp}{2 \times m-1} \times n^2 \right\} \times m^n - \frac{2ap \times m-1 + 2bpm \times m-1 - 2cpm^2}{2 \times m-1}$$

Che

Che però se in vece di a, b, c, p, m si sostituiranno i ritrovati rispettivi valori, si avrà $S = 6 - 2n + 2n^2 \times 2^m - 6$ somma cercata.

958. Nello stesso modo, col quale ai num. 954, 955 si sono ritrovate le somme generali corrispondenti alle forme $A+Bn \times K^n - A$, $A+Bn+Cn^2 \times K^n - A$, si determineranno pure le somme generali corrispondenti alle forme

$$A+Bn+Cn^2+Dn^3 \times K^n - A; \quad A+Bn+Cn^2+Dn^3+E n^4 \times K^n - A \text{ ec.}$$

959. Al num. 953 ho detto come si possa avere il termine, e la somma generale delle serie geometriche, che risultano dalla somma, o differenza di serie geometriche di primo ordine, in supposizione però, che siano cognite queste serie geometriche di primo ordine, stante la quale supposizione si avranno pure nello stesso modo i termini, e le somme generali delle serie algebrico-geometriche, che risultano dalla somma, o differenza di serie algebrico-geometriche, niente altro a ciò richiedendosi, che prendere i termini, e le somme generali delle serie componenti, e unite col segno $+$, o $-$, secondo che la serie proposta si forma per addizione, o per sottrazione. Il più delle volte però sono date le serie composte, delle quali han si a trovare i termini generali, senza che siano date le serie componenti. Per poter avere pertanto i termini generali di queste serie composte, che sono sempre serie ricorrenti, basta che sia data la loro legge. Si ha poi la legge di una serie ricorrente, ogniquale volta sono cogniti i moltiplicatori de' termini precedenti un termine proposto. Come della serie 1, 2, 8, 28, 100, 356 ec. la legge si è, che un qualsivoglia termine risulti dalla somma de' due precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato per 3, e il penultimo per 2. Il numero de' termini precedenti, che concorrono a formare un dato termine determina l'ordine della serie.

960. Ora le serie ricorrenti, che risultano dalla somma di due serie geometriche, ricevono il termine generale di questa forma AK^n+BH^n , come abbastanza è manifesto dalle cose dette; la forma del termine generale delle serie ricorrenti, che risultano dalla somma di tre serie geometriche è $AK^n+BH^n+CI^n$; la forma del termine generale delle serie ricorrenti, che risultano dalla somma di quattro serie geometriche è $AK^n+BH^n+CI^n+DL^n$ ec.

961. Le serie, il di cui termine generale è di questa forma AK^n+BH^n , sono ricorrenti del secondo ordine, ciascun termine delle quali viene determinato dai due precedenti, de' quali quello, che è prossimo al termine proposto si moltiplica per $K+H$, e l'altro si moltiplica per $-KH$. Di fatto il termine proposto sia AK^n+BH^n , il prossimo antecedente sarà $AK^{n-1}+BH^{n-1}$, e il precedente a questo sarà $AK^{n-2}+BH^{n-2}$: Se pertanto si moltiplicherà il termine $AK^{n-1}+BH^{n-1}$ per $K+H$, e il termine $AK^{n-2}+BH^{n-2}$ per $-KH$, la somma di questi due prodotti troverassi dare il termine AK^n+BH^n , lo che dimostra, che della serie, la quale ammette il termine generale di questa forma AK^n+BH^n , ciascun termine risulta dalla somma de' due precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato per $K+H$, e il penultimo per $-KH$. La stessa operazione fa vedere, che ciascun termine delle serie, le quali ricevono il termine generale di questa forma $AK^n+BH^n+CI^n$, risulta dalla somma de' tre precedenti termini, l'ultimo de' quali, o sia il prossimo al termine proposto sia moltiplicato per $K+H+I$, il penultimo per $-KH-KI-HI$, l'antepenultimo per KHI : Così quanto alle serie ricorrenti, che ammettono il termine generale di questa forma $AK^n+BH^n+CI^n+DL^n$, ciascun termine risulta dalla somma dei quattro precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato per $K+H+I+L$,

il

il penultimo per $-KH-KI-KL-HI-HL-IL$, l'antepenultimo per $KHI+KHL+HIL$, e l'altro per $-KHIL$.

962. Nelle precedenti formole de' termini generali le lettere A, B, C ec., K, H, I ec. sono incognite, le cose dette però nel precedente num. 961 ci portano a determinare con tutta facilità le quantità K, H, I ec., mentre per una serie ricorrente dell'ordine n un qualsivoglia termine risulta dalla somma di un numero n di termini precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato per un numero n di quantità K, H, I ec., il penultimo per la somma degli ambi di queste quantità prese con segno contrario, l'antepenultimo per la somma de' loro terni ec. Adunque queste quantità, che servono di moltiplicatori de' termini precedenti concorrenti alla formazione del termine proposto, hanno le proprietà, che convengono (giusta i num. 477, e 479) ai coefficienti di una equazione, conseguentemente le quantità K, H, I ec. il di cui numero sia n , sono radici di una equazione di grado n : Per lo che se i moltiplicatori de' termini precedenti al termine proposto di una serie ricorrente saranno β, δ, γ ec., de' quali $\beta = K+H+I$ ec., $\delta = -KH-KI-KL$ ec.; $\gamma = KHI+KHL$ ec., $\gamma = -KHIL$ ec., l'equazione, che avrà per radici K, H, I ec. farà $x^n - \beta x^{n-1} + \delta x^{n-2} - \gamma x^{n-3} + \dots$ ec.

963. Determinate così le quantità K, H, I ec., restano a determinarsi le quantità A, B, C ec., ma prima di farlo prendiamo a considerare di ugual maniera le serie ricorrenti algebrico-geometriche. Quelle, che ricevono il termine generale di questa forma $A+Bn \chi K^n$, si formano con questa legge, che ciascun termine risulta dai due precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato per $2K$, e il penultimo per $-K^2$, lo che si può dimostrare nella maniera praticata al num. 951. Quanto alle serie che ricevono il termine generale di questa forma $A+Bn+Cn^2 \chi K^n$, ciascun termine nasce dalla somma de' tre precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato per $3K$, il penultimo per $-3K^2$, l'antepenultimo per K^3 . Così delle serie, le quali ricevono il termine generale di questa forma $A+Bn+Cn^2+Ln^3 \chi K^n$, ciascun termine si forma dai quattro precedenti, l'ultimo de' quali si moltiplica per $4K$, il penultimo per $-6K^2$, l'antepenultimo per $4K^3$, e l'altro per $-K^4$ ec. Se pertanto si applicheranno qui le osservazioni fatte al num. 952, si scorderà, che essendo $\theta, \lambda, \mu, \pi$ ec. i moltiplicatori de' termini precedenti concorrenti alla formazione di un termine proposto, così che sia (la lettera n rappresenta l'ordine della

la serie) $\theta = nK, \lambda = -\frac{n \chi^{n-1}}{1. 2} K^2, \mu = \frac{n \chi^{n-1} \gamma^{n-2}}{1. 2. 3} K^3$ ec., si avrà l'equazione

$x^n - \theta x^{n-1} + \lambda x^{n-2} - \mu x^{n-3} + \dots$ ec., che ha un numero n di radici ciascuna eguale a K .

964. Ciò posto veniamo alla determinazione dei termini generali tanto dell'una, come dell'altra specie di queste serie ricorrenti. Sia data la legge della serie ricorrente, della quale si vuole il termine generale, cioè siano dati i moltiplicatori de' termini precedenti, i quali moltiplicatori siano $\sigma, \tau, \varphi, \chi, \psi$; si formi l'equazione $x^5 - \sigma x^4 + \tau x^3 - \varphi x^2 + \chi x - \psi = 0$, le di cui radici siano a, b, c, d, e . Ora perchè questa equazione ha due radici uguali a, d , e tre ineguali b, c, e , il termine generale corrispondente alla proposta serie avrà la seguente forma

$A K^n + B H^n + C I^n + D + E n \chi N^n$ (se l'equazione avesse tutte le radici ine-

uali, il termine generale sarebbe di questa forma $AK^n + BH^n + CI^n + \text{ec.}$; e se ella avesse tutte le radici uguali, egli sarebbe di questa forma $A + Bn + Cn^2 + \text{ec.} \times K^n$). Di questo termine generale già sono cognite le quantità K, H, I, N , che ci vengono esibite dalle radici dell'equazione, onde non restano più, che da determinarsi i valori di A, B, C, D, E . Per farlo adunque, si paragoni il detto termine generale ai cinque primi termini della serie, facendo in esso primieramente $n=1$, poscia $n=2$ ec., e con questi cinque paragoni, giacchè cinque sono le quantità da determinarsi, si ritrovino i valori di E, D, C, B, A . Si sostituiscano per ultimo nella formola $AK^n + BH^n + CI^n + D + En \times N^n$ i ritrovati valori di $A, B, C, D, E, K, H, I, N$, e ciò che ne verrà sarà il termine generale della proposta serie. Essendosi trovato il termine generale, si avrà la somma generale giusta le cose dette di sopra.

955. Un solo esempio basterà a togliere ogni ombra di difficoltà all'espuesto metodo. Si debba ritrovare il termine generale della serie

$$0, \quad 1, \quad 1, \quad 3, \quad 29, \quad 152, \quad 621 \text{ ec.}$$

di cui ciascun termine risulta dalla somma de' quattro precedenti, il più prossimo le quali sia moltiplicato per 8, quel che vien dopo per -23 ; il terzo per 28, e il quarto per -12 . Avendosi pertanto i moltiplicatori, che, danno la legge della serie, se ne faccia uso, come di coefficienti, i quali devonfi prendere con segno contrario; per formare l'equazione, le di cui radici devono somministrare i valori di K, H ec. Poichè quattro sono i moltiplicatori, l'equazione deve essere di quarto grado, che si formerà così $x^4 - 8x^3 + 23x^2 - 28x + 12 = 0$ (Abbastanza costa dalle cose dette, che il moltiplicatore del termine precedente a quello, che si cerca, deve essere il coefficiente del secondo termine dell'equazione ec.). Ora di questa equazione le radici sono 1, 2, 2, 3, e perchè di queste radici due sono eguali, e due ineguali, il termine generale corrispondente alla proposta serie avrà questa forma $AK^n + BH^n + E + Fn \times M^n$, di cui K, H, M sono determinate dalle radici dell'equazione, cioè è $K=1$, $H=3$, $M=1$, onde il detto termine generale si cambia in $A \times 1^n + B \times 3^n + E + Fn \times 1^n$. Per determinare i valori di A, B, E, F , si faccia in primo luogo $n=1$, indi si paragoni questo termine generale al primo termine della serie; in secondo luogo si faccia $n=2$, e si paragoni al secondo termine della serie ec. come segue

$$\begin{aligned} & A + 3B + 2E + 2F = 0 \\ & A + 9B + 4E + 8F = 1 \\ & A + 27B + 8E + 24F = 1 \\ & A + 81B + 16E + 64F = 3 \end{aligned}$$

Dalla seconda equazione si sottragga la prima, dalla terza la seconda, e dalla quinta la terza così

$$\begin{aligned}
 (e) \quad & 6B+2F+6F=1 \\
 & 18B+4E+16F=0 \\
 & 54B+8E+40F=2
 \end{aligned}$$

Dalla seconda si sottragga la prima moltiplicata per 3, e dalla terza si sottragga la seconda moltiplicata pure per 3, e si avrà

$$\begin{aligned}
 (A) \quad & -2E-2F=3 \\
 & -4E-8F=2
 \end{aligned}$$

Finalmente dalla seconda si sottragga la prima moltiplicata per 2, e si avrà $-4F=8$, e però $F=-2$. Si sostituisca questo valore di F in una delle due equazioni (A), lo che darà $E=\frac{7}{2}$. In una delle tre equazioni (e) si sostituiscono i valori di E, F , e si troverà $B=1$. Per ultimo si sostituiscono in una delle quattro equazioni (A) i valori di B, E, F , e si avrà $A=-6$. Quindi essendosi trovati anche i valori di A, B, E, F , se si sostituiranno nella formola $A \times 1^n + B \times 3^n + E + F n \times 2^n$, si avrà finalmente il termine generale della proposta serie, che è

$-6 \times 1^n + 1 \times 3^n + \frac{7}{2} - 2n \times 2^n$ a cui corrisponde la somma generale
 $-6n + 3 \times \frac{3^n-3}{2} + \frac{11-4n}{2} \times 2^n - 11$, perchè la somma del termine -6×1^n è $-6n$, la somma del termine 1×3^n è $3 \times \frac{3^n-3}{2}$ (pel num. 949.), e la somma del termine $\frac{7}{2} - 2n \times 2^n$ è $\frac{11-4n}{2} \times 2^n - 11$ (giusta la formola del num. 954, nella quale trovasi essere $a=-3, b=-4, m=2$, e p che dovrebbe essere $=2$ diventa $=1$ a motivo che la formola dovrebbe essere divisa per 2, onde p entrando in tutti i termini della formola, si ha $p=\frac{2}{2}=1$)

Altre serie si possono considerare, le quali risultano dai termini delle precedenti serie ricorrenti accresciuti, o diminuiti d'una quantità costante, alle quali è piaciuto al P. Riccati di dare il nome di serie ricorrenti con appendice, che è la quantità costante già detta. Tale è la serie 1, 3, 7, 15, 31, ec., di cui ogni termine è originato dal doppio del termine precedente accresciuto di una unità, che però è serie ricorrente con appendice. La serie 0, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$, 1, 2, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{2}$, 2 ec. è ricorrente con appendice di secondo ordine, poichè ciascun di lei termine risulta dai due precedenti (assunti 0, 1 per i due primi), il più prossimo de' quali sia moltiplicato per zero, e il più rimoto per 1, e questo prodotto sia aumentato di $\frac{1}{2}$. Così la serie 1, 0, 0, $\frac{3}{8}$, $\frac{13}{16}$, $\frac{19}{16}$, $\frac{47}{32}$ è ricorrente con appendice di terzo ordine poichè ciascun di lei termine nasce dai tre precedenti il più prossimo dei qua-

quali sia moltiplicato per $\frac{3}{4}$, e l'altro per $\frac{1}{8}$, e questo prodotto sia accresciuto

di $\frac{1}{4}$; e così in poi.

Queste serie ricorrenti con appendice non sono altro, che serie ricorrenti volgari di ordine superiore, ogniquale l'unità è una radice di quell'equazione mediante la di cui risoluzione si ottiene il termine generale, cioè una serie ricorrente con appendice di primo ordine, è una serie ricorrente volgare di secondo ordine; una serie ricorrente con appendice di secondo ordine è una serie ricorrente volgare di terzo ordine ec. Di fatto sia $=a$ il primo termine di una serie ricorrente con appendice di primo ordine l'appendice sia x , e la quantità che moltiplica il termine precedente sia $=r$. Si supponga in oltre, che i termini di questa serie siano a , b , c , d , e ec., poichè ciascun termine nasce dal precedente moltiplicato in r , più x , sarà $b=ra+x$, $c=rb+x$, $d=rc+x$ ec. L'equazione, che dà il valore di x

è $x-r=0$. Si moltiplichino questa equazione per $x-1$, e si avrà $x^2-rx+x-r=0$. Si prendano adesso i due primi termini a , b della precedente serie, e se ne formi una serie ricorrente volgare di secondo ordine moltiplicando il prossimo termine precedente per $r+1$, e l'antepenultimo per $-r$, con che il terzo termine della serie sarà $rb+b-ra$; ma poc' anzi si è trovato $b=ra+x$, dunque fatta la sostituzione di questo valore, si avrà $rb+x$, che si è trovato essere il terzo termine della prima serie. Parimente il quarto termine di questa seconda serie sarà $rc+c-rb$, ma precedentemente si è trovato $c=rb+x$, dunque sostituendosi questo valore si avrà $rc+x$, che è il quarto termine della prima serie; lo stesso si troverà rispetto agli altri termini, lo che dimostra, che una serie ricorrente con appendice di primo ordine è una serie ricorrente volgare di secondo ordine.

Sia in secondo luogo a , b , c , d , e ec. una serie ricorrente con appendice di secondo ordine, la di cui appendice sia x , e ciascun termine si formi dai due precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato per r , e il penultimo per s . Poichè a , b sono i due primi termini della serie, sarà $c=rb+as+x$, $d=rc+sb+x$, $e=rd+sc+x$ ec. Colle quantità r , s , che devono moltiplicare i termini precedenti si formi l'equazione $x^2-rx-s=0$, dalla di cui moltiplicazione per $x-1$ si avrà

$x^3-rx^2-sx+x^2-rx+s=0$. Ora presi i tre primi termini della serie a , b , c si formi una serie ricorrente volgare di terzo ordine con moltiplicare c per $r+1$, b per $s-r$, ed a per $-s$, con che si avrà $rc+c+sb-rb-sa$; ma essendosi poc' anzi trovato $c=rb+as+x$, se vi si sostituirà questo valore, ne verrà $rc+sb+x$, che è il quarto termine della serie superiore. Ilteffamente il quinto termine sarà $rd+d+sc-rd-sb$, che, mediante la sostituzione del precedentemente trovato valore di d , diventa $rd+sc+x$, che è lo stesso quinto termine della serie precedente. Egualmente si troveranno corrispondere i termini di una serie ai termini dell' altra; conseguentemente una serie ricorrente con appendice di secondo ordine è una serie ricorrente volgare di terzo ordine. Tenendo in seguito lo stesso modo di dimostrare resterà generalmente provato, che una serie ricorrente qualunque con appendice corrisponde a una serie ricorrente volgare d'ordine superiore.

Dunque qualora sia proposta una di queste serie ricorrenti, e se ne voglia il termine, e la somma generale, basterà prendere il termine, e la somma generale

Tom. II.

F f f

cor-

corrispondente alla serie ricorrente volgare d'ordine superiore nella maniera di sopra esposta. Per avere poi la legge (mediante la quale si determina la somma, e il termine generale della serie) di questa serie ricorrente volgare d'ordine superiore, cioè a dire, per avere i moltiplicatori de' precedenti termini, che concorrono alla formazione di un qualunque termine, i quali devono essere $n+1$ se quelli della serie ricorrente con appendice erano in numero n , si faccia così. Si formi una equazione, il di cui primo termine sia x innalzata alla potestà indicata dall'ordine della serie ricorrente con appendice, e gli altri termini abbiano per coefficienti quelle quantità, che devono essere prese negativamente, le quali servono di moltiplicatori de' termini precedenti, avvertendo di dare per coefficiente al secondo termine la quantità, che moltiplica il termine ultimo precedente, quella che moltiplica il penultimo per coefficiente al terzo termine ec. Dopo ciò si moltiplichi questa equazione per $x-1$, e i coefficienti dell'equazione, che ne proverrà, saranno i moltiplicatori de' termini precedenti, da' quali risulterà la stessa serie ricorrente con appendice proposta.

Sia data per esempio la serie ricorrente con appendice 0, 1, 1, 2, 4, 9, 21 ec. di cui ciascun termine si forma dai due precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato per 2, e il primo per 1, e dalla somma di questi due prodotti sia sottratta una unità, che è l'appendice. Poichè i moltiplicatori sono 2, 1, l'equazione da formarli sarà $x^2-2x-1=0$, quale si moltiplichi per $x-1$, e si avrà $x^3-3x^2+x+1=0$. Dunque i moltiplicatori, che servono alla formazione della serie ricorrente volgare d'ordine superiore alla proposta sono 3, -1, -1. Si assumano pertanto i primi tre termini della serie 0, 1, 1, e si moltiplichi il primo per -1, il secondo per -1, il terzo per 3, e così in poi, con che si troverà la serie data 0, 1, 1, 2, 4, 9 ec.

Vice versa se sarà data una serie ricorrente volgare, e l'equazione, la di cui risoluzione serve a ritrovarne il termine generale, avrà una radice uguale all'unità, si potrà passare alla serie ricorrente con appendice dividendo per $x-1$ tale equazione, e dell'equazione, che ne verrà i coefficienti saranno i moltiplicatori de' termini precedenti concorrenti alla formazione di ciascun termine di questa serie con appendice. L'appendice poi si determinerà facilmente mediante il paragone del primo termine di questa serie trovata col corrispondente termine della serie data. Prendo l'esempio dalla precedente serie volgare 0, 1, 1, 2, 4 ec. per cui vale l'equazione $x^3-3x^2+x+1=0$, dalla di cui divisione per $x-1$ si ha $x^2-2x-1=0$. Quindi presi i due primi termini della serie 0, 1, si dovrà moltiplicare il primo per 1 e il secondo per 2, con che il terzo termine sarà +2, ma questo terzo termine 2 dovrebbe essere uguale al terzo termine 1 della serie data, e per renderlo eguale si deve diminuire di una unità, dunque l'appendice cercata è -1.

Finora ho supposto, che l'equazione, la di cui risoluzione dà il termine generale della serie con appendice abbia una radice uguale all'unità, ma quando ciò non accada, bisognerà ricercare in altra maniera il termine generale di queste serie. Per poterlo determinare fa mestiere osservare come si formino queste serie. Cominciamo dalle serie con appendice di primo ordine. Il primo termine della serie sia $=a$, la quantità che moltiplica il termine precedente sia $=t$, e l'appendice $=z$. La serie ricorrente, che con questa legge si genererà, sarà

a	at	at^2	at^3	$\dots$	at^{n-1}
	z	tz	zt^2		zt^{n-1}
		z	zt		zt^{n-2}
			z		zt^{n-3}
					$\vdots$
					zt^2
					zt
					z

le di cui colonne verticali somministrano i termini della serie. Le serie orizzontali somministrano altrettante serie ricorrenti di primo ordine, di cui ciascun termine nasce dal precedente moltiplicato in t . La prima serie comincia da a , e l'altre tutte da z . L'ultima colonna verticale somministra il termine generale delle serie ricorrenti con appendice di primo ordine. Ora questo termine generale risulta da due parti, cioè dal primo termine at^{n-1} , e dalla serie ricorrente di primo ordine zt^{n-1} , zt^{n-2} , zt^{n-3} , $\dots$, z , nella quale il numero de' termini è $= n-1$, e il primo termine comincia dalla supposizione di $n=2$. Ma la detta serie risulta $= zt^{n-1} - z$ con moltiplicarla per $t-1$: Dunque essendo $zt^{n-1} + zt^{n-2} + \dots + z$

$= \frac{zt^{n-1} - z}{t-1}$, il termine generale delle serie ricorrenti con appendice di primo

ordine sarà $at^{n-1} + \frac{zt^{n-1} - z}{t-1} = \frac{at^n + z - at \times t^{n-1} - z}{t-1}$. Si debba per esem-

pio trovare il termine generale della serie 2, 3, 6, 15, 42 ec., di cui ciascun termine nasce con diminuirsi di 3 il prodotto del termine precedente moltiplicato in 3, per lo che trovasi essere $a=2$, $t=3$, $z=-3$, e però sostituiti questi valori nella precedente formula del termine generale, si troverà

$2 \times 3^n - 5 \times 3^{n-1} + 3 = \frac{6 - 5 \times 3^{n-1} + 3}{2} = \frac{3^{n-1} + 3}{2}$, che è il cercato termine

generale della proposta serie; e la somma generale (pel num. 949) è

$$\sum_{i=1}^n \frac{3^{i-1} - \frac{1}{2} + 3^i}{2}$$

Veniamo alle serie ricorrenti con appendice di secondo ordine. Il primo termine della serie sia $=a$, il secondo $=b$, l'appendice $=x$: Sia $=t$ la quantità, che moltiplica l'ultimo termine, ed $=r$ la quantità, che moltiplica il penultimo, a fine di avere il termine seguente. Con questi dati si genererà la serie come segue, nella quale ogni colonna verticale forma un termine

$$\begin{array}{cccccc}
 a & b & at+bt & bt+at+bt^2 & at^2+2bt+at^2+bt^3 & \\
 x & xt & xt & xt+xt^2 & 2xt+xt^2 & \\
 & & z & zt & zt+zt^2 & \\
 & & & z & zt & \\
 & & & & z & \\
 & & & & & z
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{cccccc} a & b & at+bt & bt+at+bt^2 & at^2+2bt+at^2+bt^3 & \\ x & xt & xt & xt+xt^2 & 2xt+xt^2 & \\ & & z & zt & zt+zt^2 & \\ & & & z & zt & \\ & & & & z & \\ & & & & & z \end{array}} \right\} \text{ec.}$$

dove si offervi, che da ogni fila orizzontale risulta una serie ricorrente di secondo ordine: I primi due termini della prima fila sono a, b , ma delle altre susseguenti file i primi due termini sono z, xt . E poichè essendo $\Rightarrow$ il numero de' termini della prima fila, della seconda è $=n-1$, della terza $=n-2$, della quarta $=n-3$ ec., però laddove per avere il primo termine della prima serie bisogna fare $n=1$, per avere il primo termine della seconda fila si dovrà fare $n=2$, per avere il primo della terza bisognerà fare $n=3$ ec.

Siano K, H le due radici inequali dell'equazione $x^2-tx-t=0$, il termine generale della precedente prima fila orizzontale avrà questa forma AK^n+BH^n (giusta le cose dette), e le lettere A, B si determineranno mediante il paragone coi due primi termini della serie. Della seconda fila orizzontale il termine generale sarà $CK^{n-1}+DH^{n-1}$; della terza fila sarà $CK^{n-2}+DH^{n-2}$; della quarta $CK^{n-3}+DH^{n-3}$, e così in poi. Le indeterminate C, D si determineranno mediante i due primi termini z, xt comuni a ciascuna di queste serie. Quindi il termine generale delle serie ricorrenti con appendice di secondo ordine sarà

$$\begin{aligned}
 &AK^n + CK^{n-1} + CK^{n-2} + CK^{n-3} \dots + CK \\
 &BH^n + DH^{n-1} + DH^{n-2} + DH^{n-3} \dots + DH
 \end{aligned}$$

vale a dire sarà eguale al binomio AK^n+BH^n accresciuto della somma di due serie ricorrenti di primo ordine, delle quali, come di sopra ho detto, si ha il primo termine con fare $n=2$. Ma poc'anzi si è veduto, che $CK^{n-1}+CK^{n-2}+CK^{n-3}$ ec.

$$= \frac{CK^n - CK}{K-1}; \text{ e } DH^{n-1} + DH^{n-2} + DH^{n-3} \text{ ec.} = \frac{DH^n - DH}{H-1}. \text{ Dunque il ter-}$$

mine generale di una serie ricorrente con appendice di secondo ordine è

$$AK^n + \frac{CK^n - CK}{K-1} + BH^n + \frac{DH^n - DH}{H-1}, \text{ o sia, con fare la riduzione allo stesso denominatore,}$$

$$\frac{AK^n + 1 + \overline{C-A} \times K^n - CK}{K-1} + \frac{BH^n + 1 + \overline{D-B} \times H^n - DH}{H-1} \quad (\Omega)$$

Si debba per esempio trovare il termine, e la somma generale della serie 0, 1, 4, 14, 50 ec., rispetto alla quale il primo termine dato è $a=0$, il secondo $b=3$, l'appendice $z=-2$, e ogni termine si genera dai due precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato in $t=5$, e il penultimo in $t=-8$. L'equazione adunque, dalla di cui

cui risoluzione si ottiene il termine generale è $x^3 - 6x + 8 = 0$, le cui radici sono 4, e 2, e però trovasi essere $K=4$, $H=2$. Per avere i valori di A, B, C, D si prenda primieramente il binomio $AK^n + BH^n$, in cui si sostituiscano i valori trovati di K, H, e si faccia $n=1$, indi si paragoni al primo termine proposto a, e si avrà $(\Delta) 4A + 2B = a = 0$: Di nuovo si faccia $n=2$, e istituito il paragone col secondo termine proposto b; si avrà $(\Theta) 16A + 4B = b = 3$. Dall'equazione (Θ) si sottragga l'equazione (Δ) moltiplicata in 2, e ne verrà $8A = 3$, e però $A = \frac{3}{8}$. Pofcia dall'equazione (Δ) moltiplicata in 4 si sottragga l'equazione (Θ) , e si otterrà $4B = -3$, conseguentemente $B = -\frac{3}{4}$. Di poi si prenda il binomio $CK^{n-1} + DH^{n-1}$, in cui si sostituiscano i valori di K, H, e facendo primieramente $n=2$ si faccia il paragone con x, e si avrà $(\Lambda) 4C + 2D = x = -1$; in secondo luogo facendo $n=3$ si paragoni con x^2 , e ne verrà $(\Xi) 16C + 4D = -x^2 = -12$. Dall'equazione (Ξ) si sottragga l'equazione (Λ) moltiplicata in 2, e si avrà $8C = -8$, cioè $C = -1$, pofcia dall'equazione (Λ) moltiplicata in 4 si sottragga l'equazione (Ξ) , e ne verrà $4D = 4$, vale a dire $D=1$. Sostituendoli pertanto i ritrovati valori di A, B, C, D, K, H nel termine generale (Ω) , si avrà

$$\frac{\frac{3}{8} \times 4^{n-1} - \frac{11}{8} \times 4^n + 4}{3} - \frac{2}{4} \times 2^{n-1} + \frac{2}{4} \times 2^n - 2, \text{ cioè}$$

$$\frac{24 - 22 \times 4^{n-1}}{3} + \frac{4}{3} - 6 + 7 \times 2^{n-1} - \frac{6}{3}, \text{ e però } \frac{2}{3} \times 4^{n-1} + 2^{n-1} - \frac{2}{3}, \text{ che}$$

è il termine generale cercato della proposta serie ricorrente con appendice, dal quale (giusta il num. 949.) si deduce la somma generale, che è

$$\frac{\frac{8}{3} \times 4^{n-1} - \frac{2}{3}}{3} + 2^{n-1} - 1 - \frac{2 \times n - 1}{3}$$

Se le radici dell'equazione $xx - tx - t = 0$ faranno eguali, in tal caso il termine generale della prima fila orizzontale avrà questa forma $\overline{A+Bn} \times K^n$ (giusta il num. 953.), e i termini generali delle altre file orizzontali faranno, della seconda

$\overline{C+n-1} \times D \times K^{n-1}$; della terza $\overline{C+n-2} \times D \times K^{n-2}$; della quarta

$\overline{C+n-3} \times D \times K^{n-3}$ cc., conseguentemente il termine generale della serie con ap-

pendice avrà questa forma $\overline{A+Bn} \times K^n + \overline{C+n-1} \times D \times K^{n-1} +$

$\overline{C+n-2} \times D \times K^{n-2} \dots + \overline{C+1} \times K$, cioè a dire sarà uguale ad $\overline{A+Bn} \times K^n$

aumentata della somma della seguente serie ricorrente di secondo ordine $\overline{C+D} \times K$

$C+2DXK^3 \dots C+n-1XD\chi K^{n-1}$. Ma la somma di questa serie (pel num 954)

$$\text{ha questa forma } \frac{CK-C-D}{K-1} + \frac{D\chi^{n-1}}{K-1} \chi K^n \\ - \frac{CK^3+CK+DK}{K-1}. \text{ Dunque il termine generale far\`a}$$

$$A+Bn + \frac{CK-C-D}{K-1} + \frac{D\chi^{n-1}}{K-1} \chi K^n - \frac{CK^3+CK+DK}{K-1}$$

Sia data per esempio la serie 0, 0, 2, 10, 34, 98 ec., di cui ciascun termine si genera dai due precedenti, l'ultimo de' quali sia moltiplicato in 4, e il penultimo in -4, pi\`u l'appendice 2. In questa ipotesi far\`a $a=0$, $b=-2$, $z=2$, e l'equazione da risolversi $x^2-4x+4=0$, le di cui radici sono 2, 2, quindi far\`a  $K=2$ . Fatto al solito il paragone de' termini a fine di avere i valori di A, B, C, D, si trover\`a $A=\frac{1}{2}$, $B=-\frac{1}{2}$, $C=0$, $D=1$, i quali valori sostituire nel preceden-

$$\text{te termine generale lo cambieranno nel seguente } \frac{1}{2} - \frac{1}{2}n - 1 + n - 1 \chi 2^n + 2, \text{ cio\`e} \\ - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}n \chi 2^n + 2 = n - 3 \chi 2^{n-1} + 2$$

Quanto alle serie ricorrenti con appendice di terzo ordine esse si generano con moltiplicare l'ultimo termine per t , il penultimo per r , l'antepenultimo per v , indi aggiungervi l'appendice z . Formata essendosi in questo modo la serie si trover\`a, che tutte le file orizzontali formano altrettante serie ricorrenti volgari di terzo ordine, della prima delle quali essendo  $a, b, c$  i tre primi termini, i primi tre termini delle altre faranno  $az, bz, cz$ , ed essendo  $n$  il numero de' termini della prima, far\`a $n-1$ il numero de' termini della seconda, $n-2$ quei della terza ec., e per\`o per avere il primo termine della seconda serie bisogner\`a fare $n-2$, per avere il primo della terza si dovr\`a supporre  $n=3$  ec. L'equazione da risolversi far\`a $x^3-tx^2-rx-vx+z=0$. Se le tre radici di questa equazione saranno inequali, il termine generale della prima fila orizzontale avr\`a questa forma  $AK^n+BH^n+CI^n$ ; il termine generale della seconda fila orizzontale far\`a rappresentato da $DK^{n-1}+EH^{n-1}+FH^{n-1}$, quello della terza da $DK^{n-2}+EH^{n-2}+FI^{n-2}$, quello della quarta ec.; e per\`o il termine generale della serie ricorrente con appendice far\`a espresso da $AK^n+BH^n+CI^n$ pi\`u la somma delle tre seguenti serie geometriche

$$\begin{aligned} \text{I. } DK + DK^2 + DK^3 \dots + DK^{n-1} \\ \text{II. } EH + EH^2 + EH^3 \dots + EH^{n-1} \\ \text{III. } FI + FI^2 + FI^3 \dots + FI^{n-1} \end{aligned}$$

Se l'equazione avrà due radici uguali, e una ineguale, in tal caso il termine generale della prima fila orizzontale avrà questa forma $\overline{A+Bn} \times K^n + CH^n$ (supposte $\equiv K$ le due radici uguali, e l'ineguale $\equiv H$); della seconda fila orizzontale sarà

$\overline{D+En} \times K^{n-1} + FH^{n-1}$; della terza sarà $\overline{D+En} \times K^{n-2} + FH^{n-2}$, della quarta ec.: Quindi il termine generale di queste serie ricorrenti con appendice sarà rappresentato da $\overline{A+Bn} \times K^n + CH^n$ più la somma delle due seguenti serie, prima

$$\overline{D+E} \times K + \overline{D+2E} \times K^2 \dots + \overline{D+n-1} \times E \times K^{n-1}, \text{ seconda } FH + FH^2 + FH^3 \dots + FH^{n-1}.$$

Se poi l'equazione avrà tutte tre le radici $\equiv K$, il termine generale della prima fila orizzontale verrà rappresentato da $\overline{A+Bn+Cn^2} \times K^n$, quello della seconda da

$$\overline{D+n-1} \times E + \overline{n-1}^2 \times F \times K^{n-1}, \text{ quello della terza da}$$

$\overline{D+n-2} \times E + \overline{n-2} \times F \times K^{n-2}$, quello della quarta ec.: Conseguentemente il termine generale della serie ricorrente con appendice sarà espresso da

$\overline{A+Bn+Cn^2} \times K^n$ più la somma della seguente serie algebrico-geometrica

$$\overline{D+E+F} \times K + \overline{D+2E+4F} \times K^2 + \overline{D+4E+8F} \times K^3$$

$$\dots + \overline{D+n-1} \times E + \overline{n-1}^2 \times F \times K^{n-1}.$$

Le somme di queste serie si fanno già ritrovare giusta le cose dette di sopra. L'ordine fin'ora tenuto mostra abbastanza come debbasi regolare intorno alle serie ricorrenti con appendice degli altri ordini superiori.

956. Chi avrà presenti le cose dette di sopra non troverà menoma difficoltà a formarli immediatamente il termine di una serie generale, di cui si conosca la legge: Così delle serie formate colla legge della seguente

$$(A) \frac{1 \times 2}{2 \times 5}, \frac{3 \times 2^2}{5 \times 8}, \frac{5 \times 2^3}{8 \times 11}, \frac{7 \times 2^4}{11 \times 14}, \frac{9 \times 2^5}{14 \times 17} \text{ ec.}$$

il termine generale trovasi essere $T = \frac{c+d \times n-1 \times pm^{n-1}}{a+b \times n-1 \times a+bn}$, (e però della serie

$$(A) \text{ il termine generale è } T = \frac{1+2 \times n-1 \times 2 \times 2^{n-1}}{2+3 \times n-1 \times 2+3n}$$

de' termini della proposta serie si formano dalla rispettiva moltiplicazione de' termini delle due seguenti serie

$$\begin{array}{cccccc} (B) & 1, & 3, & 5, & 7, & 9, & 11 \text{ ec.} \\ (C) & 2, & 2^2, & 2^3, & 2^4, & 2^5, & 2^6 \text{ ec.} \end{array}$$

e della prima (B il termine generale è $c+d \times n-1$ (pel num. 928), della seconda (C) il termine generale è pm^{n-1} (pel num. 949); i denominatori poi risultano dai termini di due serie, delle quali la seconda comincia dal secondo termine della prima, l'una, e l'altra algebrica di primo ordine, di cui perciò la formola è

$a+b \times n-1 \times a+bn$ (giusta il num. 939). Delle serie di questa natura

$$(R) \frac{3}{4 \times 1 \times 2}, \frac{4}{8 \times 2 \times 3}, \frac{5}{16 \times 3 \times 4}, \frac{6}{32 \times 4 \times 5}, \frac{7}{64 \times 5 \times 6} \text{ ec.}$$

$$\frac{c+d \times n-1 \times m^n}{a+b \times n-1 \times a+bn}$$

il termine generale è $T = \frac{c}{a+b \times n-1 \times a+bn}$, (onde della serie (R) il termine

$$\text{generale è } T = \frac{3+1 \times n-1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+1 \times n-1 \times 1+n}$$

la moltiplicazione de' termini delle due seguenti serie

(D)

$$(D) \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2} \text{ ec.}$$

$$(E) \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64} \text{ ec.}$$

e della prima il termine generale è $\frac{e+e^x \overline{\chi^{n-1}}}{e}$ (pel num. 928.), della seconda (E) il termine generale è m^n : I denominatori poi risultano da queste due serie

$$\begin{array}{cccccc} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6 \text{ ec.} \\ 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & 7 \text{ ec.} \end{array}$$

per cui il termine generale si è $\frac{a+b \overline{\chi^{n-1}}}{a+b \overline{\chi^{n-1}}} \overline{\chi^{a+bn}}$ (pel num. 938.)
967. Delle serie di questa natura

$$(Q) \frac{1 \overline{\chi^2}}{3 \overline{\chi^5} \overline{\chi^7} \overline{\chi^3}}, \frac{7 \overline{\chi^2}}{5 \overline{\chi^7} \overline{\chi^9} \overline{\chi^3}}, \frac{17 \overline{\chi^2}}{7 \overline{\chi^9} \overline{\chi^{11}} \overline{\chi^3}}, \frac{31 \overline{\chi^2}}{9 \overline{\chi^{11}} \overline{\chi^{13}} \overline{\chi^3}} \text{ ec.}$$

$$\frac{e+d \overline{\chi^{n-1}}}{1} + \frac{e \overline{\chi^{n-1}} \overline{\chi^{n-2}}}{1 \quad 2} \overline{\chi^m}$$

il termine generale è $T = \frac{\overline{\chi^{a+b+b \overline{\chi^{n-2}}}}}{a+b+b \overline{\chi^{n-2}}} \overline{\chi^{a+b+b \overline{\chi^{n-1}}}} \overline{\chi^{a+b+bn}}$, (che per-
ciò della serie (Q) il termine generale è

$$T = \frac{\overline{\chi^{1+6 \overline{\chi^{n-1}}}}}{1} + \frac{4 \overline{\chi^{n-1}} \overline{\chi^{n-1}}}{1 \quad 2} \overline{\chi^2} \text{) , poichè la serie de' numerato-}$$

$$\frac{3+2+2 \overline{\chi^{n-2}} \overline{\chi^3} + 2+2 \overline{\chi^{n-1}} \overline{\chi^3} + 2+2n}{\text{ }},$$

ri risulta dalla moltiplicazione de' termini delle due seguenti serie

$$(F) \quad \left(\frac{2}{3}\right)^1 \quad \left(\frac{2}{3}\right)^7 \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{17} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{31} \text{ ec.}$$

e della serie (F), che è di secondo ordine il termine generale (pel num. 929.) è

$$e+dX^{\frac{n-1}{1}}+eX^{\frac{n-1}{1}\frac{n-2}{2}}, \text{ della serie (G) il termine generale è } m^n; \text{ i denomi-}$$

natori poi risultano da tre fattori, che formano tre serie di primo ordine, delle quali la terza comincia dal terzo termine della prima, e la seconda dal secondo termine della prima, di cui perciò la formola (pel num. 939.) è

$$a+b+bX^{\frac{n-2}{1}}Xa+b+bX^{\frac{n-1}{1}}Xa+b+bm.$$

958. Egualmente si regolerà per trovare il termine generale di una serie, dei cui termini i Numeratori risultano dalla moltiplicazione de' termini di due serie, una algebrica di terzo ordine, e l'altra geometrica di primo ordine, i denominatori poi si formano da quattro fattori, che costituiscono quattro serie algebriche di primo ordine, delle quali la quarta comincia dal quarto termine della prima, la terza dal terzo termine della prima, e la seconda dal secondo termine della prima: E così in poi procedendo ad altre serie più composte.

959. Delle serie, che osservano questa forma

$$(X) \quad \frac{2X^1}{1^1X^2}, \frac{12X^1}{2^1X^3}, \frac{36X^1}{3^1X^4}, \frac{80X^1}{4^1X^5}, \frac{150X^1}{5^1X^6} \text{ ec.}$$

$$\text{il termine generale è } e+dX^{\frac{n-1}{1}}+eX^{\frac{n-1}{1}\frac{n-2}{2}}+fX^{\frac{n-1}{1}\frac{n-2}{2}\frac{n-3}{3}}Xm^n;$$

$$a+bX^{\frac{n-1}{1}}+bX^{\frac{n-1}{1}\frac{n-2}{2}}Xp+qX^{n-1}+bX^{n-1}X^{n-2}$$

quindi della serie (X) il termine generale è

$$T = \frac{2+10X^{\frac{n-1}{1}}+14X^{\frac{n-1}{1}\frac{n-2}{2}}+6X^{\frac{n-1}{1}\frac{n-2}{2}\frac{n-3}{3}}X^5}{1+3X^{\frac{n-1}{1}}+2X^{\frac{n-1}{1}\frac{n-2}{2}}X4+5X^{\frac{n-1}{1}}+2X^{\frac{n-1}{1}\frac{n-2}{2}}}$$

poichè i numeratori dei termini di questa serie si formano dalle due seguenti serie

(H)

(H) 2, 12, 36, 80, 150

(L) 5, 5', 5'', 5''', 5'''' ec.

e della serie (H), che è algebrica di terzo ordine il termine generale (pel num.

930.) è $c+dX\frac{n-1}{1}+eX\frac{n-1}{1}\frac{Xn-2}{2}+fX\frac{n-1}{1}\frac{Xn-2}{2}\frac{Xn-3}{3}$, della serie (L) il

termine generale è m^n ; i denominatori poi costano di due fattori, che formano due serie algebriche di secondo ordine, delle quali la seconda comincia dal secondo termine della prima, de' quali perciò la formola (giusta il num. 945.) è

$$a+bX\frac{n-1}{1}+bX\frac{n-1}{1}\frac{Xn-2}{2}Xp+qX\frac{n-1}{1}+bX\frac{n-1}{1}\frac{Xn-2}{2}.$$

970. Della serie, i di cui termini procedano con questa legge, che i numeratori risultino dai termini di una serie algebrica di quinto ordine moltiplicati in una serie geometrica di primo ordine, e i denominatori costino di tre fattori costituenti tre serie algebriche di secondo ordine, si determinerà collo stesso metodo il termine generale; come pure si farà per qualunque altra serie più composta gradatamente.

971. Non basta il sapere formar tosto di una proposta serie analoga alle surserite, il termine generale, bisogna inoltre saperne ritrovare la somma generale: Niente però sarà più facile, qualora si sappia la forma della somma generale, che le compete. Ne esaminerò varie, che serviranno di norma per tutte le altre.

Le serie, che ricevono la somma generale di questa forma $\frac{LK^n}{A+Bn} - \frac{L}{A}$ si formano con questa legge: I prodotti dei termini di due serie, una algebrica, e l'altra geometrica, tutte due di primo ordine, formano i numeratori dei lei termini; e i denominatori risultano da due fattori costituenti due serie algebriche di primo ordine, delle quali la seconda comincia dal secondo termine della prima, e tali sono le serie del num. 966. Ciò poi colla evidentemente col dedursi dalla data formola $\frac{LK^n}{A+Bn} - \frac{L}{A}$ il termine generale, giusta il metodo del Padre Riccati, sostituendovi cioè $n-1$ in luogo di n , indi sottraendovi ciò che ne nasce. Istessamente operando

si trova, che la somma generale di questa forma $\frac{\overline{L+Mn}XK^n}{A+BX\frac{n-1}{1}XA+Bn} - \frac{L}{A-BXA}$

si riferisce ad una serie, che si forma così: I numeratori dei di lei termini risultano dal prodotto dei termini di due serie, una algebrica di secondo ordine, e l'altra geometrica di primo ordine; i denominatori poi costano di tre fattori, che costituiscono tre serie algebriche di primo ordine, delle quali la terza comincia dal terzo termine della prima, e la seconda dal secondo termine della prima, e tale è la serie del num. 957. Così le serie, i di cui termini hanno per numeratori i prodotti de' termini di due serie, una algebrica di terzo ordine, e l'altra geometrica di primo ordine, e per denominatori quattro fattori, che somministrano quattro serie algebriche

di primo ordine, delle quali la quarta comincia dal quarto termine della prima, la terza dal terzo termine della prima; e la seconda dal secondo termine della prima, ricevono la somma generale di questa forma

$$\frac{L+Mn+Nm^2 \chi K^n}{A+B \chi^{n-2} \chi A+B \chi^{n-1} \chi A+Bn} - \frac{L}{A-2B \chi A-B \chi A}, \text{ e così in seguito.}$$

972. Parimente le serie, che ricevono la somma generale di questa forma

$$\frac{L+Mn \chi K^n}{A+Bn+Bn^2} - \frac{L}{A} \text{ osservano questa legge: I numeratori de' loro termini sono i pro-}$$

dotti de' termini di due serie, una algebrica di terzo ordine, e l'altra geometrica di primo ordine; i denominatori poi risultano da due fattori di secondo grado, che somministrano due serie algebriche di secondo ordine, delle quali la seconda comincia dal secondo termine della prima. Così le serie, i di cui termini hanno per numeratori i prodotti de' termini di due serie, una algebrica di quinto ordine, e l'altra geometrica di primo ordine, e per denominatori tre fattori di secondo grado costituenti tre serie algebriche di secondo ordine, delle quali la terza comincia dal terzo termine della prima, e la seconda dal secondo termine della prima, ricevono la

somma generale di questa forma

$$\frac{L+Mn+Nm^2+On^3 \chi K^n}{A+B \chi^{n-1}+C \chi^{n-1} \chi A+Bn+Cn^2} - \frac{L}{n-B+C \chi A}, \text{ e così in poi.}$$

973. Sapendosi pertanto la forma, che deve avere la somma generale d'una proposta serie, della quale, relativamente alla legge con cui si forma, se ne fa già immediatamente esibire il termine generale, se ne determinerà la somma generale in questo modo: Si prenda la formola, la quale somministra la forma della somma generale, e mediante il paragonarla al termine generale, supponendo $n=1$, $n=2$ ec., si determinino le quantità L , M , N ec., giacchè il valore di K si ha dalla data serie, e i valori di A , B , C ec. del denominatore restano determinati dai valori del denominatore del termine generale, e questi ritrovati valori sostituiti nella detta formola ci forniranno la cercata somma generale.

975. Debbaasi per esempio ritrovare la somma generale della serie (R) del num. 965, quale so dovere aver questa forma $\frac{LK^n}{n+Bn} - \frac{L}{A}$. Prendo il termine generale della serie trovato allo stesso num. 966, che è

$$T = \frac{\frac{3 + 1 \times n - 1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + 1 \times n - 1 \times 1 + n}, \text{ e nella formola } \frac{LK^n}{A+Bn} = \frac{L}{A} \text{ sostituisco i cogniti}$$

valori di K, A, B , con che essa diventa $\frac{L \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+n} = \frac{L}{1}$, poscia per determinare il valore di L , paragono questa formola al termine generale, facendo nell'uno, e nell'altra $n=1$ (cambio i segni alla formola

$$\frac{L \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+n} = \frac{L}{1} \cosi \frac{L \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+n} + \frac{L}{1} \text{ a motivo, che è minore dell'unità il valore}$$

di $K = \frac{1}{2}$) con che ho $\frac{3}{8} = L \times \frac{\frac{1}{2} + 2}{2}$, cioè $\frac{3}{8} = L \times \frac{5}{4}$, e però $L = \frac{1}{2}$. Sostituendosi pertanto nella formola $\frac{LK^n}{A+Bn} = \frac{L}{A}$ i valori di L, K, A, B ,

$$\text{si avrà la cercata somma generale, che è } \frac{\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+n} = \frac{1}{2}.$$

Se si avesse voluto la somma generale, che ammettono tutte le serie analoghe alla proposta, sarebbe stato mestiere paragonare col termine generale indeterminato

$$T = \frac{\frac{c+d \times n - 1}{2} \times m^n}{a+b \times n - 1 \times a + b n} \text{ la formola } \frac{LK^n}{A+Bn} = \frac{L}{A}, \text{ dopo averci sostituiti i}$$

valori di K, A, B presi dal termine generale, con che diventa $\frac{Lm^n}{a+bn} = \frac{L}{a}$, cosi

$$\frac{c+d \times n - 1 \times m^n}{a+b \times n - 1 \times a + b n} = \frac{Lm^n}{a+bn} = \frac{L}{a}, \text{ che con fare } n=1 \text{ risulta}$$

$$cm = Lm \times c \times a - L \times c \times a + b, \text{ e però } L = \frac{cm}{c \times am - a - b}, \text{ il qual valore sostituito}$$

nel-

nella formola $\frac{Lm^n}{a+bn} - \frac{L}{a}$ dà $\frac{cm \times m^n}{e \times am - a - b \times a + bn} - \frac{cm}{e \times am - a - b} = S$

somma generale cercata.

Modo di sommare le serie, che nascono dalla successiva moltiplicazione, e divisione de' termini di serie algebriche.

975. Cominciamo dal modo di ritrovare il termine generale di una serie qualunque risultante dalla successiva moltiplicazione de' termini di una qualsivoglia serie algebrica, della quale provenuta serie ciascun termine sia moltiplicato ordinatamente ne' termini di un'altra serie algebrica. Cio si otterrà facilmente d'una maniera analoga a quella, che si è praticata al num. 966, purchè siano date le serie componenti. Ed ecco come. Prendo primieramente la serie (A) $2 \times 4, 2 \times 3 \times 6, 2 \times 3 \times 4 \times 8, 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 10$ ec., la quale risulta dalla successiva moltiplicazione de' termini della serie 2, 3, 4, 5, 6, 7 ec., e dal moltiplicarsi poscia i termini della nata serie pe' termini della serie 4, 6, 8, 10, 12, 14 ec., come segue

Serie componenti $\left\{ \begin{array}{l} 1, 2, \\ 11, 4, \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} 2 \times 3, \\ 6, \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \times 3 \times 4, \\ 8, \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \times 3 \times 4 \times 5, \\ 10, \end{array} \text{ ec.}$

Serie composta $2 \times 4, 2 \times 3 \times 6, 2 \times 3 \times 4 \times 8, 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 10$ ec.

Ora per avere il termine generale di questa serie composta, si offervi, che (pel num. 930.) essendo (mi servo delle espressioni generali delle serie, e de' termini generali per rappresentare tutte le serie analoghe, e i loro termini generali)

$a + b \times n - 1$ (la lettera a al solito rappresenta il primo termine della serie, e b la differenza) il termine generale della serie 2, 3, 4, 5, 6 ec., della serie I il ter-

mine generale sarà $a \times a + b \times a + 2b \times a + 3b \dots a + b \times n - 1$, parimente essendo $m + p \times n - 1$ (la lettera m denota il primo termine della serie, e p la differenza) il termine generale della serie II, sarà

(P) $\frac{m + p \times n - 1}{a \times a + b \times a + 2b \times a + 3b \dots a + b \times n - 1}$ il termine generale della serie (A), lo che si cercava.

976. Sia in secondo luogo la serie (B) $5 \times 13, 5 \times 14 \times 28, 5 \times 14 \times 29 \times 49, 5 \times 14 \times 29 \times 50 \times 76$ ec., la quale nasce dalla successiva moltiplicazione de' termini della serie 5, 14, 29, 50 ec., e in oltre dal moltiplicarsi i risultanti termini ne' termini di quell'altra serie 13, 28, 49, 76 ec., come segue

Serie componenti $\left\{ \begin{array}{l} \text{I.} \\ \text{II.} \end{array} \right. \begin{array}{l} 5, \\ 13, \end{array} \begin{array}{l} 5 \times 14, \\ 28, \end{array} \begin{array}{l} 5 \times 14 \times 29, \\ 49, \end{array} \begin{array}{l} 5 \times 14 \times 29 \times 50 \\ 76 \end{array} \text{ ec.}$

Serie composta $5 \times 13, 5 \times 14 \times 28, 5 \times 14 \times 29 \times 49, 5 \times 14 \times 19 \times 50 \times 76 \text{ ec.}$

Per avere il termine generale di queste serie rifletto, che essendo (pel num. 930.)

$a+b \times \frac{n-1}{1} + c \times \frac{n-1 \times n-2}{2}$ il termine generale della serie 5, 14, 29, 50 ec.,

il termine generale della serie I farà

$$a \times \frac{a+b}{1} \times \frac{a+2b+c}{2} \times \frac{a+3b+3c}{3} \dots \times \frac{a+b}{1} \times \frac{n-1}{1} + c \times \frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2};$$

della serie poi 13, 28, 49, 76 il termine generale è

$m+p \times \frac{n-1}{1} + q \times \frac{n-1 \times n-2}{2}$: Quindi della serie (B) il cercato termine generale trovasi essere (Q)

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(m+p \times \frac{n-1}{1} + q \times \frac{n-1 \times n-2}{2} \right) \times \\ \left(a \times \frac{a+b}{1} \times \frac{a+2b+c}{2} \times \frac{a+3b+3c}{3} \dots \times \frac{a+b}{1} \times \frac{n-1}{1} + c \times \frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2} \right) \end{array} \right\}$$

977. In terzo luogo sia la serie (C) $3 \times 15, 3 \times 16 \times 44, 3 \times 16 \times 45 \times 95, 3 \times 16 \times 45 \times 96 \times 174 \text{ ec.}$, la quale nasce dalla successiva moltiplicazione de' termini della serie 3, 16, 45, 96 ec., e in oltre dal moltiplicarsi i risultanti termini ne' termini di quest' altra serie 15, 44, 95, 174 ec., come segue

Serie componenti $\left\{ \begin{array}{l} \text{I.} \\ \text{II.} \end{array} \right. \begin{array}{l} 3, \\ 15, \end{array} \begin{array}{l} 3 \times 16, \\ 44, \end{array} \begin{array}{l} 3 \times 16 \times 45, \\ 95, \end{array} \begin{array}{l} 3 \times 16 \times 45 \times 96 \\ 174 \end{array} \text{ ec.}$

Serie composta $3 \times 15, 3 \times 16 \times 44, 3 \times 16 \times 45 \times 95, 3 \times 16 \times 45 \times 96 \times 174 \text{ ec.}$

di cui per determinare il termine generale osservo, che il termine generale della serie 3, 16, 45, 96 ec. è (pel num. 930.)

$a+b \times \frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2} + d \times \frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{3}$, conseguentemente il termine generale della serie I trovasi essere

$$\left\{ \begin{aligned} & a \overline{Xa+b} \overline{Xa+2b+c} \overline{Xa+3b+3c+d} \overline{Xa+4b+6c+4d} \dots \} \overline{Xa} \\ & \left\{ a+b \overline{X}^{\frac{n-1}{1}} + c \overline{X}^{\frac{n-1}{1} \overline{X}^{\frac{n-2}{2}}} + d \overline{X}^{\frac{n-1}{1} \overline{X}^{\frac{n-2}{2} \overline{X}^{\frac{n-3}{3}}}} \right\} \end{aligned} \right\}$$

della serie poi 15, 44, 95, 174 ec. il termine generale è

$$m + p \overline{X}^{\frac{n-1}{1}} + q \overline{X}^{\frac{n-1}{1} \overline{X}^{\frac{n-2}{2}}} + r \overline{X}^{\frac{n-1}{1} \overline{X}^{\frac{n-2}{2} \overline{X}^{\frac{n-3}{3}}}}$$

Per lo che il cercato termine generale della serie (C) è (R)

$$\left\{ \begin{aligned} & \left\{ m + p \overline{X}^{\frac{n-1}{1}} + q \overline{X}^{\frac{n-1}{1} \overline{X}^{\frac{n-2}{2}}} + r \overline{X}^{\frac{n-1}{1} \overline{X}^{\frac{n-2}{2} \overline{X}^{\frac{n-3}{3}}}} \right\} \overline{X} \\ & \left\{ \begin{aligned} & a \overline{Xa+b} \overline{Xa+2b+c} \overline{Xa+3b+3c+d} \dots \} \overline{X} \\ & \left\{ a+b \overline{X}^{\frac{n-1}{1}} + c \overline{X}^{\frac{n-1}{1} \overline{X}^{\frac{n-2}{2}}} + d \overline{X}^{\frac{n-1}{1} \overline{X}^{\frac{n-2}{2} \overline{X}^{\frac{n-3}{3}}}} \right\} \end{aligned} \right\} \end{aligned} \right\}$$

978. Continuando collo stesso metodo si troveranno i termini generali delle altre serie sempre più collo stesso ordine composte.

979. Restano adesso da trovarsi le somme generali di queste serie, per ottenerle le quali niente più si richiede, che scuoprire le forme, che debbono avere queste somme: Cominciamo pertanto dal considerare, che serie sia quella, che riceve la somma generale di questa forma

$S = A \overline{Xa} \overline{Xa+b} \overline{Xa+2b} \dots \overline{Xa+nb} - A \overline{Xa}$ (la lettera a rappresenta il primo termine della serie, e b la differenza, lo che si intenda sempre senza che lo debba ogni volta avvertire): In questa somma si sostituisca $n-1$ in luogo di n , e vi si sottragga ciò, che ne nasce, con che si avrà il termine generale della serie (giusta il num. 930), che è

$$T = A \overline{Xa} \overline{Xa+b} \overline{Xa+2b} \dots \overline{Xa+n-1} \overline{Xb} \overline{Xa+nb} -$$

$$A \overline{Xa} \overline{Xa+b} \overline{Xa+2b} \dots \overline{Xa+n-1} \overline{Xb}, \text{ cioè a dire}$$

$$T = A \overline{Xa+nb-1} \overline{Xa} \overline{Xa+b} \overline{Xa+2b} \dots \overline{Xa+n-1} \overline{Xb},$$

Ma questo termine generale riguarda una serie, i di cui termini risultanti dalla succelliva moltiplicazione de' termini di una serie algebrica di primo ordine sono moltiplicati ordinatamente ne' termini di un'altra serie pure algebrica di primo ordine.

dine, quale è la serie del num. 975. Dunque tutte le serie analoghe alla serie del num. 975. ricevono la somma generale della precedente forma.

980. Cerco in secondo luogo che serie sia quella, che riceve la somma generale della seguente forma. $S =$

$$\left\{ \begin{array}{l} (A \overline{X^a} \overline{X^{a+b}} \overline{X^{a+2b+c}} \dots) \overline{X} \\ \left(a + b \overline{X^{\frac{n-1}{1}}} + c \overline{X^{\frac{n-1}{1} \gamma \frac{n-2}{2}}} \overline{X^{a+nb+nc}} \overline{X^{\frac{n-1}{2}}} \right) \end{array} \right\} \rightarrow A \overline{X^a}$$

dalla quale, come ho fatto al num. 979, ricavo il corrispondente termine generale, che è $T =$

$$A \overline{X^{a+nb+nc}} \overline{X^{\frac{n-1}{2}}} \overline{X^a} \overline{X^{a+b}} \overline{X^{a+2b+c}} \dots \overline{X^{a+b}} \overline{X^{\frac{n-1}{1}}} \overline{X^{\frac{n-1}{1} \gamma \frac{n-2}{2}}}.$$

Ora questo è il termine generale di una serie, i di cui termini, risultanti dalla successiva moltiplicazione de' termini di una serie algebrica di secondo ordine, sono moltiplicati ordinatamente ne' termini di una serie pure algebrica di secondo ordine, quale è la serie del num. 976: Dunque tutte le serie analoghe alla serie del num. 976 ricevono la somma generale della precedente forma.

981. In terzo luogo esaminio che serie sia quella, che riceve la somma generale della seguente forma. $S =$

$$\left\{ \begin{array}{l} (A \overline{X^a} \overline{X^{a+b}} \overline{X^{a+2b+c}} \overline{X^{a+3b+3c+d}} \dots) \overline{X} \\ \left(a + b \overline{X^{\frac{n-1}{1}}} + c \overline{X^{\frac{n-1}{1} \gamma \frac{n-2}{2}}} + d \overline{X^{\frac{n-1}{1} \gamma \frac{n-2}{2} \gamma \frac{n-3}{3}}} \right) \overline{X} \\ \left[a + nb + nc \overline{X^{\frac{n-1}{2}}} + nd \overline{X^{\frac{n-1}{2} \gamma \frac{n-3}{3}}} \right] \end{array} \right\} \rightarrow A \overline{X^a}$$

e a tale effetto ne deduco il termine generale giusta il num. 930, e come ho fatto poc' anzi al num. 979, che trovo essere $T =$

$$\begin{aligned} & \left(A \overline{X^{a+nb+nc}} \overline{X^{\frac{n-1}{2}}} + nd \overline{X^{\frac{n-1}{2} \gamma \frac{n-3}{3}}} - 1 \right) \overline{X} \\ & (a \overline{X^a} \overline{X^{a+b}} \overline{X^{a+2b+c}} \overline{X^{a+3b+3c+d}} \dots) \overline{X} \\ & \left(a + b \overline{X^{\frac{n-1}{1}}} + c \overline{X^{\frac{n-1}{1} \gamma \frac{n-2}{2}}} + d \overline{X^{\frac{n-1}{1} \gamma \frac{n-2}{2} \gamma \frac{n-3}{3}}} \right) \end{aligned}$$

Ma questo è il termine generale di una serie, i di cui termini, risultanti dalla successiva moltiplicazione de' termini di una serie algebrica di terzo ordine, sono moltiplicati ordinatamente ne' termini di una serie pure algebrica di terzo ordine, quale è la serie del num. 977; dunque tutte le serie analoghe alla serie del num. 977 ricevono la somma generale della precedente forma.

982. Questi tre casi bastano per il cogere la legge, che osservano le forme delle somme generali a misura che le serie diventano più composte, e però a saper conoscere che forma debbesi dare alla somma generale di una qualunque proposta serie risultante dalla successiva moltiplicazione de' termini di una qualsivoglia serie algebrica.

983. Non solo poi si è trovata la forma, che deve avere la somma generale di queste serie, ma si è inoltre ottenuta la cercata somma, niente altro più richiedendosi, che determinare il valore dell'assunta indeterminata A , poichè i valori di a , b , c ec. già sono somministrati dalla serie. Per determinare il valore di A basta paragonare il fattore, in cui egli entra, del termine generale dedotto dalla somma, come vedesi fatto ai num. 979, 980, 981, col termine generale della serie algebrica, come fra poco l'esempio metterà sotto degli occhi. E qui debbesi avvertire una eccezione riguardante ciò, che ho detto ai num. 979, 980, 981, cioè che tutte le serie analoghe alle serie di questi numeri ricevono la somma generale della forma, che somministrano le formole ivi ritrovate; ed è, che se fatto il paragone indicato interviene a determinare il valore di A , si troverà per A un tal valore, che renda l'equazione in tutte le sue parti identica, la serie riceverà la cercata somma, che sarà somministrata dalla formola generale dopo avervi sostituito il valore di A ; ma se l'equazione non sarà in tutte le sue parti identica, la formola generale non darà la somma bramata.

984. Prendiamo l'esempio dalla serie (A) del num. 975. Si è ivi veduto, che il termine generale della serie II, i di cui termini moltiplicano ordinatamente i termini della serie I, onde ne nasce la serie (A), è $m + p \chi^{n-1}$, cioè, dati i suoi valori ad m , p , è $4 + 2\chi^{n-1}$, vale a dire $4 + 2n - 2$, e però (Δ) $2 + 2n$: Ora si paragoni questo termine generale al fattore $A \chi^{a+nb-1}$ del termine generale dedotto al num. 979, e per farne i debiti paragoni a parte per parte, si disponga il fattore $A \chi^{a+nb-1}$ così $A \chi^{a-1} + nbA$, che mediante la sostituzione de' valori di a , b (come si è detto la lettera a rappresenta il primo termine della serie 2, 3, 4, 5 ec., e b ne esprime la differenza) diventa $A + nA$. Si paragoni il primo termine di questa formola col primo termine della formola (Δ), e si avrà $A = 2$; e perchè sostituendosi questo ritrovato valore di A nel secondo termine nA , e fattone il paragone col secondo termine della formola (Δ), ne risulta l'equazione identica $2n = 2n$; però la serie (A) del num. 975 riceve la somma generale del num. 979, vale a dire la somma cercata è $2\chi^2 \chi^3 \chi^4 \dots \chi^{2+n} - 2\chi^2$.

985. Desumo il secondo esempio dalla serie (C) del num. 977. Il termine generale della serie II, i di cui termini moltiplicano ordinatamente i termini della serie I, onde ne nasce la serie (C), si è ivi trovato essere

$m + p \frac{x^{n-1}}{1} + q \frac{x^{n-1} x^{n-2}}{1 \cdot 2} + r \frac{x^{n-1} x^{n-2} x^{n-3}}{1 \cdot 2 \cdot 3}$, che ordino così

$m - p + q - r + p - \frac{3q}{2} + \frac{11r}{6} x^n + \frac{q}{2} + r x^{n+1} + \frac{rn^3}{6}$, che col sostituirsi i valori di m, p, q, r diventa $2 + 7n + 5n^2 + n^3$ (Θ): Si paragoni pertanto questo termine generale al fattore

$A \frac{x^{a+nb+nc}}{2} + n d \frac{x^{n-1} x^{n-2}}{2 \cdot 3} - 1$ del termine generale dedotto al num. 981. che ordino così

$A \frac{x^{a-1}}{1} + A \frac{x^b}{2} - \frac{c}{2} + \frac{2d}{6} x^n + A \frac{x^c}{2} - \frac{3d}{6} x^n + A \frac{x^{dn^3}}{6}$, che me-

diantela sostituzione de' valori di a, b, c, d trovasi essere $A x^2 + A x^{7n} + A x^{5n^2} + A n^3$. (Λ)

Uguagliandosi il primo termine di questa formola al primo termine della formola (Θ) si trova $A x^2 = 2$, e però $A = \frac{2}{2} = 1$; e perchè col sostituirsi questo valore di A nella formola (Λ) essa si trova in tutte le sue parti identica alla formola (Θ), quindi ne concludo, che la serie (C) del num. 977. riceve la somma generale del

num. 981., cioè a dire la somma cercata è $S = 3 \times 16 \times 45 \dots \times \frac{3 + 7n + 5n^2 + n^3 - 3}{2}$. 986. Le cose dette danno lume abbastanza per scuoprire le diverse forme, che devono avere le somme generali di altre serie più composte. Se si assumeranno ad arbitrio varie forme di somme generali, con dedurre secondo il metodo solito i termini generali, si verrà in cognizione delle qualità delle serie, che ricevono quelle tali somme. In questo modo si scorgerà la legge di quelle serie, la di cui somma generale si compone da due fattori, de' quali uno è una formola algebrica, che è termine generale di una serie dell'ordine indicato dal massimo esponente della formola, l'altro poi è una formola risultante dalla successiva moltiplicazione de' termini di una

serie algebrica fino al termine $\frac{n+1}{2}$. E così pure di quelle serie, delle quali la somma è una frazione, il di cui numeratore risulta dalla successiva moltiplicazione

de' termini di una serie algebrica fino al termine $\frac{n+1}{2}$, e il denominatore è una qualunque formola algebrica.

987. Per dire brevemente qualche cosa ancora di quelle serie, che ricevono per somma generale o una quantità costante, o una formola algebrica divisa per un'altra formola risultante dalla successiva moltiplicazione de' termini di una serie algebrica, la quale può esser sola, o moltiplicata in una qualunque formola algebrica; come pure di quelle serie, la di cui somma è una frazione avente tanto in numeratore, che in denominatore una formola, che risulti dalla successiva moltiplicazione de' termini di una serie algebrica, e queste formole poi o possono essere sole, o moltiplicate in altre formole algebriche, mi contenterò di due soli esempj, poichè la determinazione di queste somme non farà difficoltà a chi avrà presenti le dottrine esposte, e saprà applicarle al bisogno. Ometto di dire, come data una di

queste serie se ne possa tosto formare il di lei termine generale, poichè ciò non esige maggiori condizioni delle già date. Ora per determinare di queste serie la somma generale basta sapere la forma, che ella ammette, mentre mediante gli opportuni paragoni determinando i valori delle quantità, che entrano in questa tal formula indeterminata, verassi a trovare la cercata formula generale della somma. La forma poi delle somme generali delle serie è sempre relativa alla legge, colla quale esse si formano; quindi è, che basta sapere con che legge si formano le serie, che ricevono la somma generale di una data forma, per saperne ancora determinare questa somma. Per sapere secondo la legge della serie che forma riceva la di lei somma generale, bisogna scuoprirla tentando così: Si assuma una somma generale indeterminata, dalla quale (giusta il num. 930.) si deduca il termine generale, mediante il quale si scuoprirà la legge della serie, la quale ammetterà la somma generale della forma proposta, se pur n'è suscettibile. Collo stesso metodo dalla assunta somma generale indeterminata si passi ad un'altra più composta, e così in poi, e in questo modo si scuopriranno le forme delle somme generali, che ricevono le serie relativamente alle leggi, colle quali si formano, onde poi data una serie, e la legge, con cui si forma, se ne sappia immediatamente determinare la somma generale. Ma vediamo in pratica. Cercasi in primo luogo che serie sia quella, che riceve la somma generale di questa forma (A)

— M

$$a \times a+b \times a+2b+c \times a+3b+3c+d \dots \times a+\frac{n-1}{1} \times b \dots + \frac{n-1}{1.} \times \frac{n-2}{2.} \dots \times \frac{n-m}{m.} \times b$$

(la lettera m esprime l'ordine della serie). Per dedurre da questa somma il termine generale della serie vi si sostituisca $n-1$ in luogo di n (giusta il puno. 930.) indi vi si sottragga ciò, che ne nasce, e si avrà

M

$$n \times a+b \times a+2b+c \dots \times a+\frac{n-2}{1} \times b + \frac{n-2}{1.} \times \frac{n-2}{2.} \times c \dots + \frac{n-2}{1.} \times \frac{n-2}{2.} \times \frac{n-m-1}{3.} \dots \times b$$

— M

$$n \times a+b \times a+2b+c \dots \times a+\frac{n-1}{1} \times b + \frac{n-1}{1.} \times \frac{n-2}{2.} \times c \dots + \frac{n-1}{1.} \times \frac{n-2}{2.} \dots \times \frac{n-m}{m.} \times b$$

che con moltiplicarne il primo membro per $a + \frac{n-1}{1} \times b \dots + \frac{n-1}{1.} \times \frac{n-2}{2.} \dots \times \frac{n-m}{m.} \times b$ trovasi essere

— M

$$\frac{-M + Ma + Mb X^{\frac{n-1}{1}} \dots + Mb X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}} \dots X^{\frac{n-m}{m}}}}{a X^{a+b} X^{a+2b+c} \dots X^{a+b} X^{\frac{n-1}{1}} + c X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}} \dots + b X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}} \dots X^{\frac{n-m}{m}}}}$$

Ora di questo termine generale il numeratore è una serie algebrica di un qualunque ordine, e il denominatore si forma dalla successiva moltiplicazione de' termini di una serie algebrica di un qualunque ordine: Quindi tutte le serie, i di cui termini osservano questa legge, che abbiano per numeratori i termini di una serie algebrica di un qualunque ordine, e per denominatori i successivi prodotti de' termini di una serie algebrica di qualsivoglia ordine, ricevono la forma generale della precedente forma (A), e tale è la seguente serie

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{3 \times 14}, \frac{3}{3 \times 14 \times 36}, \frac{10}{3 \times 14 \times 36 \times 72}, \frac{25}{3 \times 14 \times 36 \times 72 \times 125} \text{ ec.}$$

il di cui termine generale è

$$\frac{1+2 X^{\frac{n-1}{1}} + 1 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}}}}{3 \times 14 \times 36 \dots X^{3+11} X^{\frac{n-1}{1}} + 11 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}}} + 3 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}} X^{\frac{n-3}{3}}}}$$

988. Cercasi in secondo luogo, che serie sia quella, la di cui somma generale è di questa forma

$$\frac{-M - N X^{\frac{n-1}{1}} - O X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}}} \text{ ec.}}{a X^{a+b} X^{a+2b+c} \dots X^{a+b} X^{\frac{n-1}{1}} + c X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}}}}$$

Se ne deduca al solito il termine generale operando come si è fatto poc'anzi, e si troverà

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} -M - N X^{\frac{n-1}{1}} - O X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}} + \\ M + N X^{\frac{n-2}{1}} + O X^{\frac{n-2}{1} \cdot \frac{n-3}{2}} X^a + b X^{\frac{n-1}{1}} + c X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}} \end{array} \right\}}{a X^{a+b} X^{a+2b+c} \dots X^{a+b} X^{\frac{n-1}{1}} + c X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}}}$$

il quale ha per numeratore il termine generale di una serie algebrica, il di cui ordine viene espresso dalla somma de' numeri indicanti gli ordini delle serie, delle quali sono termini generali il numeratore, e il denominatore della proposta somma generale; per denominatore poi egli ha, lo stesso denominatore della somma. E tale è la serie seguente

$$\frac{1}{5}, \frac{16}{5X^{12}}, \frac{81}{5X^{12}X^{21}}, \frac{256}{5X^{12}X^{21}X^{32}}, \frac{625}{5X^{12}X^{21}X^{32}X^{45}} \text{ ec.}$$

il di cui termine generale è

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} 1 + 15 X^{\frac{n-1}{1}} + 50 X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}} + 60 X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2} \cdot \frac{n-3}{3}} \\ + 24 X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2} \cdot \frac{n-3}{3} \cdot \frac{n-4}{4}} \end{array} \right\}}{5X^{12}X^{21}X^{32}X^{45}X^{60} \dots X^5 + 7 X^{\frac{n-1}{1}} + 2 X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}}}$$

989. *Vice versa* dato il termine generale si scorge quale esset debba la forma della somma, la quale avrà per denominatore lo stesso denominatore del termine generale, e per numeratore una formola algebrica, il di cui ordine verrà espresso dalla differenza degli ordini delle serie del numeratore, e denominatore del termine generale.

990. Egualmente si operi se il denominatore della proposta somma risultante dalla successiva moltiplicazione de' termini di una qualunque serie algebrica fosse moltiplicato in una formola algebrica.

991. Vediamo in terzo luogo che serie sia quella, la di cui somma generale ammette questa forma

$$\frac{M X^{a+b} X^{a+2b+c} \dots X^a + \frac{bn}{1} + \frac{cn}{1 \cdot 2} X^{n-1} + \dots + \frac{bn}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m} X^{n-m+1}}{b X^{b+k} \dots X^b + k X^{\frac{n-1}{1}} + p X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2}} + \dots + q X^{\frac{n-1}{1} \cdot \frac{n-2}{2} \cdot \frac{n-3}{3} \dots m}}$$

Sc

Se ne deduca al solito il termine generale, e si troverà essere

$$\left\{ M X \left\{ \begin{matrix} a+b \\ -g & -\frac{a}{2} \\ +k & +\frac{1}{2} \\ -p & +k \end{matrix} \right\} X^n + \frac{1}{2} c - \frac{1}{2} p \right\} n^3 \text{ ec. } \} X$$

$$\left\{ \frac{a X^{a+b} X^{a+2b+c} \dots X^{a+b} X^{\frac{n-1}{1}} + g X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}} \dots + b X^{\frac{n-1}{1} \dots X^{n-m}}}{6 X^g + k X^{g+2k+p} \dots X^{g+k} X^{\frac{n-1}{1}} + p X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}} \dots + q X^{\frac{n-1}{1} \dots X^{n-m}}}} \right\}$$

il quale ha per numeratore i termini di una serie algebrica successivamente moltiplicati, e per denominatore i termini di una serie parimente algebrica successivamente moltiplicati, e questa frazione è moltiplicata in una formola algebrica, che è la differenza dei termini generali delle due serie, che sono nel numeratore, e nel denominatore, quale differenza è in oltre moltiplicata in una quantità costante. Tale è la serie seguente

$$\frac{20 X^2}{6}, \frac{50 X^2 X^6}{6 X^{24}}, \frac{90 X^2 X^6 X^{12}}{6 X^{24} X^{60}}, \frac{140 X^2 X^6 X^{12} X^{20}}{6 X^{24} X^{60} X^{120}} \text{ ec.}$$

il di cui termine generale è

$$\left\{ 20 + 30 X^{\frac{n-1}{1}} + 10 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}}} \right\} X$$

$$\left\{ \frac{2 X^6 \dots X^2 + 4 X^{\frac{n-1}{1}} + 2 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}}}}{6 X^{24} X^6 + 18 X^{\frac{n-1}{1}} + 18 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}}} + 24 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}} X^{\frac{n-3}{3}}}} \right\}$$

Questi saggi possono bastare per sapere come s'abbia a procedere a serie più complicate, e scuoprire la forma, che ricevono le loro somme generali. Nelle precedenti somme generali ho ommessa la quantità costante, che vi si deve aggiungere, o sottrarre, la quale si troverà (giusta il num. 916.)

992. Ma veniamo ai due promessi esempi. Debba si trovare la somma della serie seguente $\frac{2}{4}, \frac{9}{4 \times 9}, \frac{116}{4 \times 9 \times 16}, \frac{635}{4 \times 9 \times 16 \times 25}$ ec. i di cui numeratori costituiscono una serie algebrica di quinto ordine, della quale il termine generale è

$$2 + 7 X^{\frac{n-1}{1}} + 100 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}}} + 312 X^{\frac{n-1}{1} X^{\frac{n-2}{2}} X^{\frac{n-3}{3}}}$$

+

+336X $\frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{3} \times \frac{n-4}{4}$ +120X $\frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{3} \times \frac{n-4}{4} \times \frac{n-5}{5}$, che
(giusta il num. 932.) ridurrò come segue:

$$\begin{array}{r} - 7 + 7n \\ - 312 + 572n - 312n^2 + 52n^3 \\ + 336 - 700n + 490n^2 - 140n^3 + 14n^4 \\ - 120 + 374n - 225n^2 + 85n^3 - 15n^4 + n^5 \end{array}$$

Somma. — $1 + 3n + 3n^2 - 3n^3 - n^4 + n^5$

I denominatori poi somministrano una serie di secondo ordine, il di cui termine generale è $4 + 5X\frac{n-1}{1} + 2X\frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2}$, vale a dire (giusta il num. 932.) $1 + 2n + n^2$, e però servendoci di queste espressioni il termine generale della proposta serie trovasi essere $\frac{-1 + 2n + 2n^2 - 2n^3 - n^4 + n^5}{4 \times 9 \times 16 \dots \times X(1 + 2n + n^2)}$. Ora la differenza degli ordini

delle serie del numeratore, e del denominatore essendo 3, però la somma generale deve avere per numeratore una formola algebrica di terzo ordine (giusta il num. 989.) e per denominatore lo stesso denominatore del termine generale! Onde ella avrà questa forma

$$\frac{-M - NX\frac{n-1}{1} - OX\frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2} - PX\frac{n-1}{1} \times \frac{n-2}{2} \times \frac{n-3}{3}}{4 \times 9 \times 16 \dots \times X(1 + 2n + n^2)}$$

Per abbreviare il calcolo si assuma essa così (Δ) $\frac{-M - Nn - On^2 - Pn^3}{4 \times 9 \dots \times X(1 + 2n + n^2)}$, dalla qua-

le secondo il solito si deduca il termine generale con porre $n-1$ in luogo di n , e sottrargliene ciò, che ne nasce; e per ridurlo tutto allo stesso denominatore si moltiplichi la seconda parte per $1 + 2n + n^2$, con che il numeratore di questo termine generale sarà

$$\begin{array}{r} + 2Mn + Mn^2 \\ - N - 2Nn + Nn^2 + Nn^3 \\ + O - 3On^2 + On^3 \\ - P + Pn + 2Pn^2 - 3Pn^3 - Pn^4 + Pn^5 \end{array}$$

Per

Per determinare i valori delle indeterminate M , N , O , P paragono i termini di questo numeratore coi termini del numeratore $-1 + 3n + 3n^2 - 3n^3 - n^4 + n^5$, cui deve essere identico. Paragonando il termine Pn^5 col termine n^5 trovo $P=1$; dal paragone di $On^4 - Pn^4$ con $-n^4$ si ha $O=0$; il paragone di $Nn^3 - 3Pn^3$ con $-3n^3$ dà $N=0$; finalmente con paragonare $Mn^2 + Nn^2 - 3On^2 + 2Pn^2$ al termine $3n^2$ si trova $M=1$. Ed ecco trovati i valori di M , N , O , P . Se questi valori sostituiti nel paragone degli altri due termini li renderanno identici, essi serviranno a determinare la somma cercata, ma qualora non li rendessero identici, la somma non si potrebbe avere sotto quella forma. Poichè adunque le rimanenti due equazioni $2Mn - 2Nn + Pn = 3n$; $-N + O - P = -1$ sono identiche, si avrà la somma cercata con sostituire i ritrovati valori nella formola (A), che diverrà

$$\frac{-1 - n^3}{4 \times 9 \dots \times 1 + 2n + n^2}$$
. Ma questa non è la giusta somma, e resta ancora a trovarsi la quantità, che vi si deve aggiugnere, o levare; però (giusta il num. 916.) si faccia $n=1$ tanto nella somma, come nel termine generale, e dalla somma si avrà $-\frac{1}{2}$; dal termine generale poi ne verrà $\frac{1}{2}$: dunque la quantità da aggiugersi è $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, conseguentemente la giusta somma della proposta serie è

$$1 - \frac{1 - n^3}{4 \times 9 \dots \times 1 + 2n + n^2}$$

 993. Prendo il secondo esempio dalla serie $\frac{4 \times 8}{16}$, $\frac{9 \times 8 \times 28}{16 \times 41}$, $\frac{16 \times 8 \times 28 \times 68}{10 \times 41 \times 86}$, $\frac{25 \times 8 \times 28 \times 68 \times 134}{16 \times 41 \times 86 \times 157}$ ec., i di cui numeratori si compongono da queste due serie 4, 9, 16, 25 ec.; 8, 28, 68, 134 ec. Onde il termine generale della proposta serie è

$$\left\{ 4 + 5 \times \frac{n-1}{1} + 2 \times \frac{n-1 \times n-2}{1. 2.} \right\} \times$$

$$\left\{ \frac{8 \times 28 \times 68 \dots \times 8 + 20 \times \frac{n-1}{1} + 20 \times \frac{n-1 \times n-2}{1. 2.} + 6 \times \frac{n-1 \times n-2 \times n-3}{1. 2. 3.} \right\}$$

$$\left\{ \frac{16 \times 41 \times 86 \dots \times 16 + 25 \times \frac{n-1}{1} + 20 \times \frac{n-1 \times n-2}{1. 2.} + 6 \times \frac{n-1 \times n-2 \times n-3}{1. 2. 3.} \right\}$$

o sia col farne la riduzione giusta il num. 932.

$$(A) \frac{8 \times 28 \times 68 \dots \times (2+n+4n^2+n^3)}{16 \times 41 \times 86 \dots \times (3+n+4n^2+n^3)}$$

Per vedere se la proposta serie ammette la somma generale, la di cui forma deve corrispondere a quella del num. 991. giusta le cose ivi dette, si metta $n+1$ in luogo di n nel termine generale della serie del numeratore, con che si avrà $8+12n+7n^2+n^3$, da cui si sottragga il termine generale della serie, che è in denominatore, e ne verrà $3+6n+3n^2$. Ora (giusta il num. 991.) questa formola dovrebbe essere la formola algebrica, che moltiplica il termine generale (A), che ivi è $1+2n+n^2$: Per lo che a determinare la quantità costante M , che deve moltiplicare tanto la somma, come il termine generale, si faccia $M \times (3+6n+3n^2) = 1+2n+n^2$, e facendo $n=1$, si avrà $M \times 12 = 4$, ed $M = \frac{1}{3}$. Dunque a tenore del num. 991. la forma, che deve avere la somma della data serie è

$$(B) \frac{1}{3} \times \frac{8 \times 28 \times 68 \dots \times (2+n+4n^2+n^3) \times (8+12n+7n^2+n^3)}{16 \times 41 \times 86 \dots \times (3+n+4n^2+n^3)}$$

Resta a trovarsi la quantità costante, che si deve aggiungere, o sottrarre da questa somma. Per determinarla faccio (giusta il num. 916.) $n=1$ tanto nel termine generale, come nella somma, indi di questi due valori prendo la differenza 8, di cui la somma supera il termine generale, e fattane la sottrazione dalla formola (B), si ha finalmente la cercata somma, che è

$$\frac{1}{3} \times \frac{8 \times 28 \times 68 \dots \times (2+n+4n^2+n^3) \times (8+12n+7n^2+n^3)}{16 \times 41 \times 86 \dots \times (3+n+4n^2+n^3)} - 8$$

993. Si osservi, che allora soltanto si potrà ottenere la detta somma generale, quando è la formola algebrica, che moltiplica il termine generale, e quella, che nasce dal sottrarsi l'uno dall'altro i termini generali delle serie del numeratore, e del denominatore sono le stesse, come nell'addotto esempio, in cui si ha

$$M \times (3+6n+3n^2) = 1+2n+n^2, \text{ cioè (con sostituirvi il ritrovato valore di } M)$$

$\frac{1}{3} \times (3+6n+3n^2) = 1+2n+n^2$, o sia $3+6n+3n^2 = 3+6n+3n^2$: Ma se non si darà questa eguaglianza non si potrà avere in questo modo la somma generale della serie: Come rispetto alla serie del num. 991, il di cui termine generale (essendone fatta la riduzione giusta il num. 932.) è

$$\frac{15n+5n^2 \times 2 \times 6 \dots \times (n+n^2)}{6 \times 24 \dots \times (-18+35n-15n^2+4n^3)}, \text{ si prenda la differenza dei due termi}$$

ni generali $n+n^2$, $-18+35n-15n^2+4n^3$, che è $-18+34n-14n^2+4n^3$ (affinchè

il termine, in cui la lettera n è elevata alla massima potenza, non risulti negativo, si deve sottrarre il termine generale, che è in numeratore dal termine generale, che è in denominatore, ma in questo caso si dovranno cambiare tutti i segni alla somma generale): Indi si faccia $MX = 18 + 34n - 14n^2 + 4n^3 = 15n + 5n^2$, con che si determini il valore di M , posto $n=1$, e si avrà $M = \frac{10}{6}$; ma poichè, qualunque sia il valore di M mai alla formola $-18 + 34n - 14n^2 + 4n^3$ può risultare simile la formola $15n + 5n^2$, però la detta serie non può ricevere la somma generale della presente forma.

ARTICOLO VI.

Dell' interpolazione delle serie.

995. **P**rima di parlare della maniera d'interpolare una data serie dirò brevemente come da una serie interrotta si possa passare a trovare il termine generale della serie continuata, e come dato il termine generale di una serie continuata si possa trovare il termine generale della stessa comunque interrotta.

996. Qui poi si osservi, che comunque s'interrompa una data serie d'ordine n , la serie interrotta sarà pure dell'ordine n , onde l'interrompere una serie non altera punto il di lei ordine.

997. Interrompere una serie non è altro, che di una data serie, la quale chiamasi serie continuata rispetto alla serie interrotta, prendere i termini, che distano ad eguali arbitrarj intervalli: Come se della seguente serie A si prendessero i ter-

(A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ec.

mini primo, quinto, nono, decimoterzo ec., ommettendone cioè continuamente tre, si avrà la serie interrotta (B) 1, 5, 9, 13 ec.

998. Osserviamo adesso a qual posto in una serie continuata corrisponda un dato termine della stessa comunque interrotta. Il numero eguale di termini, che continuamente si vanno ommettendo nella serie continuata per avere la serie interrotta, si dica $= \beta$: Ciò posto per avere il secondo termine della serie interrotta si dovrà prendere nella serie continuata quel termine, il di cui posto viene espresso da questo numero $1 + \beta + 1$, vale a dire il secondo termine della serie interrotta è il termine $(1 + \beta + 1)^{\text{esimo}}$ della serie continuata, o sia $(\beta + 2)^{\text{esimo}}$. Poichè per avere il terzo termine si deve ommettere un numero β di termini, però egli sarà il termine $(\beta + 2 + \beta + 1)^{\text{esimo}}$, cioè $(2\beta + 3)^{\text{esimo}}$ della serie continuata: E per la stessa ragione il quarto termine della serie interrotta sarà il termine $(3\beta + 4)^{\text{esimo}}$ della serie continuata ec. Conseguentemente chiamando $= m$ un qualunque termine della serie interrotta, il termine m^{esimo} della serie interrotta sarà il termine

$(m - 1)\beta + m)^{\text{esimo}}$ della serie continuata, il quale se si dirà $= \mu$, si avrà l'e-

quazione $m - 1\beta + m = \mu$: Per lo che dato il posto di un qualunque termine in una serie continuata, si potrà determinare mediante questa equazione che posto egli ottiene nella serie interrotta, purchè si sappia la legge, colla quale ella è interrotta, cioè si sappia il valore di β : Lo che torna lo stesso, che siccome si è trovato il valore di μ essendo cognito il valore di m , così all'opposto essendo cognito

Il valore di μ , si scuoprìrà il valore di m ; mentre l'equazione $\overline{m-1}X\beta + m = \mu$ è $m\beta - \beta + m = \mu$, cioè $mX\beta + 1 = \mu + \beta$, e però $m = \frac{\mu + \beta}{\beta + 1}$. Per esempio si vuol sapere, che termine sia nella precedente serie (A) il termine quarto della serie (B) (già si sa la legge della serie (B), cioè che $\beta = 3$). Si prenda la formola

$\overline{m-1}X\beta + m$, in cui si faccia $m = 4$, $\beta = 3$, ed essa risulterà $\overline{4-1}X3 + 4 = 13$. Dunque il termine quarto della serie (B) è il termine decimoterzo della serie (A): Che se si vorrà sapere che termine sia nella serie (B) il termine nono della serie (A), si prenda la formola $m = \frac{\mu + \beta}{\beta + 1}$, in cui si faccia $\mu = 9$, $\beta = 3$, con che essa

civerrà $m = \frac{9+1}{3+1}$. Dunque il termine nono della serie (A) è il termine terzo della serie (B).

999. Due Problemi faranno il soggetto di queste serie: Il primo riguarderà la maniera di ritrovare il termine generale di una serie interrotta, ogniqualevolta sia dato il termine generale della serie continuata: Il secondo servirà a passare dal termine generale dato di una serie interrotta al termine generale della serie continuata: Mentre avuti i termini generali di queste serie, se ne potranno poscia trovare le loro somme generali a norma delle cose dette nel precedente Articolo.

1000. Prob. 1. Dato il termine generale di una serie continuata si debba trovare il termine generale della serie interrotta di cui sia cognita la legge, colla quale è interrotta, vale a dire, sia cognito il valore di β .

1001. Rifol. Si sostituisca nel dato termine generale della serie continuata in luogo di x la formola $\overline{m-1}X\beta + m$, lo che cambierà il dato termine generale della serie continuata nel termine generale della serie interrotta. Sia dato per esempio il termine generale 3^n della serie (A) 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049 ec., dalla quale con omettere continuamente due termini si forma la serie interrotta (B) 3, 81, 2187, 59049 ec., e si voglia il termine generale di questa serie interrotta. Si ponga $\overline{m-1}X\beta + m$ in luogo di x nel dato termine generale 3^n , e si avrà $3^{\overline{m-1}X\beta + m}$, cioè (con sostituire il valore di $\beta = 2$) $3^{\overline{m-1} + 1}$, che è il termine generale cercato della serie (B). Iteffamente dato il termine generale

$3 + 2X\frac{\overline{n-1}}{1} + 4X\frac{\overline{n-1}X\overline{n-2}}{1 \cdot 2}$, o sia (giusta il num. 932.) (D) $5 - 4n + 2n^2$ della se-

rie (E) 3, 5, 11, 21, 35, 53, 75 ec., dalla quale con omettere continuamente quattro termini si forma la serie (F) 3, 53, 203 ec., debbasi trovare il termine generale di questa serie. Nel termine generale (D) si sostituisca $\overline{m-1}X\beta + m$ in luogo

di n , e si avrà $5 - 4X\overline{m-1}X\beta + m + 2X\overline{m-1}X\beta + m$, cioè con (sostituire il valore di $\beta = 4$) $5 - 4X\overline{m-4} + 2X\overline{m-4}$, che è il termine generale cercato della serie (F).

1002. Si offervi, che quando si cerca, che termine di una serie interrotta sia un dato termine della serie continuata, o *vice versa*, si suppone, che questo termine abbia luogo nell'una, e nell'altra serie.

1003. Prob. 2. Dato il termine generale di una serie interrotta, in cui perciò deve essere cognito il valore di β , cercasi il termine generale della serie continuata.

1004. Rifol. Questo problema si può risolvere tanto mediante la formola $\frac{\mu+\beta}{\beta+1}$, come mediante la formola $\overline{m-1} \times \beta + m$. Volendosi servire della formola

$\frac{\mu+\beta}{\beta+1}$ niente altro si dovrà fare, che nel termine generale dato della serie interrotta sostituire $\frac{\mu+\beta}{\beta+1}$ in luogo di n , e ciò, che ne verrà sarà il termine generale della

serie continuata. Prendo l'esempio dalla precedente serie (B) del num. 1001, il di cui termine generale si è trovato essere 3^{n-1} , o sia (mettendo n in luogo di m) 3^{m-1} : In questo termine generale si sostituisca $\frac{\mu+\beta}{\beta+1}$ in luogo di n , e si avrà

$3^{\frac{3\mu+3\beta}{\beta+1}-1}$, in cui si sostituisca il valore di $\beta=2$, si faccia la riduzione allo stesso denominatore, e si tolgano i termini, che si elidono, e si avrà 3^{μ} termine generale cercato della serie continuata (A) del num. 1001. Così essendo dato il termine generale della serie (F), che è $53-100n+50n^2$, si sostituisca $\frac{\mu+\beta}{\beta+1}$ in luogo di

n , e si avrà $53-100 \times \frac{\mu+\beta}{\beta+1} + 50 \times \left(\frac{\mu+\beta}{\beta+1}\right)^2$, o sia, sostituendo il valore di $\beta=4$,

farà $53-100 \times \frac{\mu+4}{5} + 50 \times \left(\frac{\mu+4}{5}\right)^2$, che è il termine generale cercato della serie continuata (E).

1005. Volendosi poi far uso della formola $\overline{m-1} \times \beta + m$ si opererà così: Si prenda indeterminatamente il termine generale, che corrisponde all'ordine della serie, il quale come si è detto al num. 995 è lo stesso tanto rispetto alla serie interrotta, come alla serie continuata, poscia vi si sostituisca $\overline{m-1} \times \beta + m$ in luogo di n , e con fare m eguale successivamente ad 1, 2, 3, 4 ec. si paragoni questo termine generale al primo, al secondo, al terzo ec. termine della serie interrotta, a fine di determinare le affunte quantità indeterminate nel supposto primo termine generale, determinate le quali, e in esso sostituite, si avrà lo che si cercava. Data per esempio la serie interrotta (F), si debba ritrovare il termine generale della serie continuata (E): Poichè la serie (F) è di secondo ordine, tale sarà pure la serie (E). Si supponga adunque, che il suo termine generale sia $a+bn+cn^2$, nel quale con sostituirsi $\overline{m-1} \times \beta + m$ in luogo di n , si avrà

$a + b \times m - 1 \times \beta + m + c \times m - 1 \times \beta + m$, che (pel num. 1001.) è il termine generale della serie (F). Si faccia pertanto in questo termine generale $m=1, =2, =3$, e i risultati si paragonino al primo, al secondo, al terzo termine della serie (F) dopo avervi sostituito il valore di $\beta=4$, con che si avranno le tre seguenti equazioni

$$\begin{aligned} \text{I. } a + b + c &= 3 \\ \text{II. } a + 6b + 3c &= 53 \\ \text{III. } a + 11b + 12c &= 203 \end{aligned}$$

Coni sottrarsi dalla seconda la prima, e dalla terza la seconda si avranno quest'altre due equazioni

$$\begin{aligned} \text{IV. } 5b + 3c &= 50 \\ \text{V. } 5b + 8c &= 150 \end{aligned}$$

Da quest'ultima si sottragga la IV, e si avrà $5c=100$, è però $c=2$. Si sostituisca questo valore di c nella IV, o nella V, con che si otterrà il valore di $b=-4$. Finalmente in una delle tre prime si sostituiscono i ritrovati valori di b, c ; e si avrà il valore di $a=5$. In luogo delle assunte indeterminare a, b, c nel supposto termine generale $a + bx + cx^2$ si pongano i loro ritrovati valori; e si avrà $5 - 4x + 2x^2$; che è il cercato termine generale della serie continuata (E).

1006. Veniamo adesso alla interpolazione delle serie. Interpolare una serie non vuol dir altro, che inferire, o sia frapporre a due qualsivogliano suoi termini un dato numero β di termini per modo, che fra loro osservino la legge della serie. Alle volte si vuol soltanto frapporre un certo numero di termini a due dati termini di una serie, alle volte essa si vuole interpolare tutta fino a un proposto termine: Alle volte degli interpolati fra due termini se ne vuole unicamente un tale. Dirò come si possa ottenere spedatamente in ciascuno di questi casi l'intento.

1007. Suppongo, che si abbia il termine generale della serie da interpolarsi, il quale data la serie si potrà sempre senza difficoltà formare, purché si abbiano presenti le cose dette nel precedente Articolo. Volendosi pertanto interpolare tutta una data serie (chiamo serie da interpolarsi la serie data, chiamo serie interpolata quella, che risulta dalla interpolazione) niente altro dovràsi fare, che trovare il termine generale, che deve corrispondere alla serie interpolata. Questo termine generale poi si troverà giusta il num. 1004, poichè in questo caso interpolare una serie egli è lo stesso, che passare da una serie interrotta a una serie continuata. Basterà adunque prendere il termine generale della proposta serie, comunque ella sia o algebrica, o geometrica, o algebrico-geometrica, e sostituirvi in luogo di n la formola $\frac{n+\beta}{\beta+1}$. Del

che possono bastare gli esempi dati al num. 1004.

1008. Volendosi interpolare un numero β di termini fra due dati termini della serie, de' quali il primo essendo m , l'altro sarà $m+\beta$ (la lettera m esprime il posto del termine, cioè il primo, il secondo, il terzo ec.), si dovrà primieramente ritrovare il termine generale della serie interpolata giusta il precedente numero 1007; ma poi per non avere a scorrere per tutti i termini precedenti della serie fino al

cer-

gercati, bisogna sapere che numero devonsi cominciare a sostituire nel termine generale in luogo di μ a fine di avere il primo degli interpolati, e così poi successivamente gli altri. Si osservi pertanto lo che si è detto al num. 998, cioè che se la lettera m esprimerà un qualunque termine della serie da interpolarsi, questo termine

nella serie interpolata sarà il $\overline{m-1} \times \beta + m$. Qualora adunque fra i due termini m , $m+1$ della serie si vorrà trovare un numero β di termini interpolati, bisognerà piùmicamente trovare nel modo poc'anzi detto il termine generale della serie interpolata, indi in luogo di μ sostituire i numeri $\overline{m-1} \times \beta + m+1$, $\overline{m-1} \times \beta + m+2$ ec.

fino al numero $\overline{m-1} \times \beta + m+\beta$, con che si otterranno i termini β interpolati.

1009. Se poi dei termini β interpolati si volesse solamente il primo, basterà so-

stituire nel provato termine generale il numero $\overline{m-1} \times \beta + m+p$. Debbanfi per esempio ritrovare i sei termini da interpolarsi tra l'undecimo, e il duodecimo termine della serie (H) 8, 729, 4096, 12167, 27000, 50553 ec., il di cui termine generale è

$$8+72x \frac{x-1}{1} + 2645x \frac{x-1}{1} \frac{x-2}{2} + 2058x \frac{x-1}{1} \frac{x-2}{2} \frac{x-3}{3}, \text{ cioè (con farne}$$

la riduzione giusta il num. 932.) (P) $-125 + 525x - 735x^2 + 343x^3$. Si sostituisca in questo termine generale (R) $\frac{\mu+\beta}{\beta+1}$ in luogo di x , e si avrà

$$-125 + 525 \left\{ \frac{\mu+\beta}{\beta+1} \right\} - 735 \left\{ \frac{\mu+\beta}{\beta+1} \right\}^2 + 343 \left\{ \frac{\mu+\beta}{\beta+1} \right\}^3, \text{ o sia (con sostituire}$$

$$\text{il valore di } \beta=6) (Q) -125 + 525 \left\{ \frac{\mu+6}{7} \right\} - 735 \left\{ \frac{\mu+6}{7} \right\}^2$$

$$+ 343 \left\{ \frac{\mu+6}{7} \right\}^3. \text{ Ma poichè i sei termini si devono interpolare tra l'undecimo, e}$$

il duodecimo della serie (H), dunque sarà $m=11$; quindi il valore di $\overline{m-1} \times \beta + m$ sarà (mediante la sostituzione dei valori di $m=11$, $\beta=6$) 71. E poichè per avere

il primo de' sei termini da interpolarsi si deve sostituire $\overline{m-1} \times \beta + m+1=72$ in luogo di μ nel termine generale (Q), fatta la sostituzione egli avrè -125

$$+ 525 \times \frac{78}{7} - 735 \left\{ \frac{78}{7} \right\}^2 + 343 \left\{ \frac{78}{7} \right\}^3 = 389017, \text{ che è il primo dei termi-}$$

ni da interpolarsi; il secondo mediante la sostituzione di $\overline{m-1} \times \beta + m+2=73$ in

$$\text{luogo di } \mu \text{ sarà } -125 + 525 \times \frac{79}{7} - 735 \left\{ \frac{79}{7} \right\}^2 + 343 \left\{ \frac{79}{7} \right\}^3 = 493039 \text{ ec..}$$

Nella stessa maniera si troveranno gli altri. Se dei sei termini da interpolarsi tra l'undecimo, e il duodecimo della serie (H) si volesse solamente il quinto, bisognereb-

be sostituire $\overline{m-1} \times \beta + m + p = 76$ (in cui $p=5$) in luogo di n nel termine generale (Q), con che si otterrebbe $-125 + 525 \times \frac{82}{7} - 735 \left\{ \frac{82}{7} \right\}^2 + 343 \left\{ \frac{82}{7} \right\}^3 = 456533$, che è il termine cercato.

2010. E qui si offervi, che ponendo $\overline{m-1} \times \beta + m + p$ in luogo di n nella formula $\frac{m+\beta}{\beta+1}$ a fine di avere il termine p^{esimo} degli interpolati, si ha

$$\frac{\overline{m-1} \times \beta + m + p + \beta}{\beta + 1}, \text{ cioè } \frac{m\beta + m + p}{\beta + 1}, \text{ vale a dire } m + \frac{p}{\beta + 1}.$$

Quindi ben si vede, che si può a dirittura far uso del termine generale della serie da interpolarsi per avere il termine interpolato p^{esimo} , niente altro richiedendosi, che sostituirvi

$m + \frac{p}{\beta + 1}$ in luogo di n . Si voglia per esempio il quarto termine dei sei da interpolarsi far il quinto, e il sesto termine della serie (H). Si prenda il termine generale (P) di questa serie, e vi si sostituisca $m + \frac{p}{\beta + 1}$ in luogo di n , con che esso diver-

$$\text{rà } -125 + 525 \times m + \frac{p}{\beta + 1} - 735 \left\{ m + \frac{p}{\beta + 1} \right\}^2 + 343 \left\{ m + \frac{p}{\beta + 1} \right\}^3, \text{ cioè}$$

$$(\text{perchè } m=5, p=4, \beta=6) -125 + 525 \times \frac{39}{7} - 735 \left\{ \frac{39}{7} \right\}^2 + 343 \left\{ \frac{39}{7} \right\}^3$$

= 39304, che è il quarto cercato termine dei sei da interpolarsi tra il quinto 27000, e il sesto termine 50653, della serie (H).

2011. Lo stesso si farà rispetto a qualunque altra serie sia essa algebrica, o geometrica, o algebrico-geometrica, bastando di avere il di lei termine generale, il quale giusta le cose dette nel precedente Articolo si fa formare ogni qual volta essendosi data la serie, si sappia la legge, che ella osserva,

AVVERTIMENTO.

I. Al num. 451. ho dato il modo di risolvere in numeri interi l'equazione $A = x^2 + B u^2$. Tale metodo serve in moltissimi casi anche per l'equazione $A = x^2 - B u^2$ (supposto che A, B sieno numeri primi tra loro): Come essendo proposta da risolvere in numeri interi l'equazione $69 = x^2 - 13 u^2$, si troveranno primieramente *vale* le seguenti equazioni condizionali relativamente alle formole del num. 451.

$$\begin{array}{rcl} 69 \times 12 & = & 29^2 - 13 \\ 12 \times 3 & = & 7^2 - 13 \\ 3 \times 1 & = & 4^2 - 13 \end{array}$$

Per lo che si trova essere $A' = 12$, $A'' = 3$, $A''' = 1$, $m = 29$, $m' = 7$, $m'' = 4$: Onde essendosi ottenuto $A'' = 1$, farà (pel num. 452.) $x'' = 1$, $u'' = 0$; e per mezzo poi di questi valori di x'' , u'' , e delle formole (R) del num. 451 si passerà ai valori di x' , u' , x , u , e finalmente di x , u , che trovansi essere

$$\begin{array}{rcl} x'' & = & 1 \\ x' & = & 4 \\ x & = & 5 \\ x & = & 11 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} u'' & = & 0 \\ u' & = & 1 \\ u & = & 1 \\ u & = & 2 \end{array}$$

E però l'equazione risolta farà $69 = 11^2 - 13 \times 2^2$

II. Ma non tutte le equazioni della forma $A = x^2 - B u^2$ si assoggettano a questo metodo, e tale fra le altre è la seguente $101 = x^2 - 13 u^2$: Quindi è, che fa mestiere ricorrere ad altri artifizj per poterle risolvere con numeri interi, qualora la loro natura lo permette. A tale oggetto è necessario permettere il seguente

III. Problema 1. Essendo dati tre numeri interi qualsivoglia a , b , c , de' quali i due b , c sieno primi fra loro, debbansi trovare due numeri interi y , z tali, che sussista l'equazione $a = by - cz$

IV. Risol. si divida per b la quantità $a + cz$, in cui si supponga successivamente $z = 0, 1, 2, 3$ ec. fino a $b - 1$, con che il numero delle divisioni da farsi viene ad essere $= b$, e tra queste divisioni una sola si farà senza residuo, ma tutte le altre lasceranno un residuo, e questi residui saranno tutti fra loro differenti, come per se stesso è evidente; onde è, che questi residui non potranno essere, che i numeri $0, 1, 2, 3, \dots, b - 1$. Si prenda pertanto per z quel numero della serie naturale, mediante la di cui sostituzione si è fatta la divisione senza residuo, e per y si prenda il quoziente di questa divisione: Onde se quel valore di z si dirà $= p$, e questo quoziente $= q$, si avrà l'equazione cercata $a = bq - cp$, o sia (ritenendo le stesse denominazioni y, z) $a = by - cz$.

V. Ho supposto che i numeri a, b, c sieno positivi, al quale stato si possono sempre ridurre o mediante la trasposizione de' termini, o con prendere l'una, o l'altra delle incognite, o tutte due, se così porta il bisogno, negative.

VI. Essendosi adunque trovata l'equazione $a = bq - cp$, nella quale i valori p, q soddisfanno al quesito, se di nuovo si prenerà l'equazione $a = by - cz$, dalla quale

si sottragga la precedente, si avrà $b\chi\overline{y-p}-c\chi\overline{z-q}\Rightarrow$, e però $\frac{y-p}{z-q}=\frac{c}{b}$, dalla quale (a motivo che b, c sono numeri primi fra loro) si deduce $y-p=mc$, cioè $y=p+mc$, e $z-q=mb$, vale a dire $z=q+mb$, ove la lettera m rappresenta un numero qualunque intero positivo, o negativo: Ed ecco, che essendosi trovati al num. IV. i due numeri, p, q corrispondenti a y, z , che soddisfano alla proposta equazione, si può per mezzo loro trovarne una infinità d'altri, e così dare infinite soluzioni al proposto problema.

VII. E siccome per m si può prendere un qualunque numero intero positivo, o negativo, si potrà sempre ottenere per y un numero positivo, o negativo minore di $\frac{c}{2}$, e per z un numero parimente positivo, o negativo minore di $\frac{b}{2}$.

VIII. Prob. 2. Essendo data l'equazione $(\Delta) A=z^2-Bu^2$, nella quale A, B siano numeri interi dati, e z, u siano le due incognite, che devono essere numeri interi, e in oltre i due numeri A, u devono essere primi tra loro, cercasi di trasformarla in un'altra, il di cui termine cognito sia $\equiv 1$.

IX. Risol. Poichè A, z, u sono numeri interi, e in oltre A, u sono primi tra loro, si può sempre trovare (pel num. IV.) due numeri m, y tali, che soddisfino all'equazione $z=mu-Ay$; lo che fatto si sostituisca nell'equazione (Δ) questo valore di z , con che essa si cambierà nella seguente $A=m^2-B\chi u^2-2Amuy+A^2y^2$, che divisa per A è $(\Theta) 1=\frac{m^2-B}{A}\chi u^2-2muy+A^2y^2$. Ora in questa equazione

la quantità $\frac{m^2-B}{A}\chi u^2$ deve essere un numero intero, poichè tutti gli altri termini dell'equazione sono (per Ipotesi) numeri interi: Ma A, u sono (per Ipotesi) numeri primi tra loro, dunque bisogna, che m^2-B sia divisibile per A . Questa quantità poi m^2-B non è altro che il secondo membro dell'equazione (Δ) , in cui si è fatto $z=mu, u=1$; e questo numero m può sempre essere preso (pel num. VII.) minore di $\frac{A}{2}$. Quindi acciò l'equazione (Δ) possa sussistere nell'Ipotesi del Problema bisogna, che con fare $u=1$, si possa trovare un numero tale positivo, o negativo, che supposto in luogo di z renda il secondo membro dell'equazione divisibile pel primo A , e questo numero sarà rappresentato da $m < \frac{A}{2}$. Che se non si potrà trovare questo numero, il problema proposto non ammetterà soluzione nella fatta Ipotesi: Se poi se ne troverà più d'uno, si otterranno altrettante trasformate. Rispetto pertanto all'equazione (Θ) si faccia $\frac{m^2-B}{A}=A'$, con che essa diverrà $A'u^2-2muy+A^2y^2\equiv 1$ (II).

X. Prob. 3. Si debba risolvere l'equazione (II) in modo, che u, y siano numeri interi.

XI. Risol. E' evidente, che i numeri interi da trovarsi per u, y debbono essere primi tra loro, altrimenti se avessero una comune misura, per essa pure elevata al quadrato dovrebbe essere divisibile il membro tutto cognito dell'equazione, conseguentemente non potrebbe essere uguale all'unità; e per la stessa ragione i numeri

A' ,

A', m, A non possono avere un comun divisore oltre l'unità. Ciò posto si divida l'equazione (II) per y^2 , indi si faccia $x = \frac{u}{y}$, mediante la quale sostituzione ef-

fa si cambierà in $A'x^2 - 2mx + A = \frac{1}{y^2}$. Dell'equazione poi $A'x^2 - 2mx + A = 0$ le

due radici sono $x = \frac{m \pm \sqrt{m^2 - AA'}}{A'}$. Ma essendo $AA' = m^2 - B$, vale a dire

$B = m^2 - AA'$, egli è $\sqrt{m^2 - AA'} = \sqrt{B}$, però le due radici della precedente equazione sono $x = \frac{m \pm \sqrt{B}}{A'}$. Queste radici poi non possono essere numeri interi, se il coefficiente del primo termine dell'equazione $A'x^2 - 2mx + A = 0$ non è l'unità; quindi da questa equazione bisogna dedurne le seguenti trasformate

$$(2) \quad \begin{aligned} A'' x^2 - 2m' x + A' &= 0 \\ A''' x^2 - 2m'' x + A'' &= 0 \\ A^{(4)} x^2 - 2m''' x + A''' &= 0 \\ &\text{ec.} \end{aligned}$$

fino all'equazione $A^{n+1} (x')^2 - 2m^n x' + A^n = 0$ (la lettera n disegna l'apice, non un esponente), nella quale sia $A^{n+1} = \pm 1$. Il segno superiore vale quando l'apice $n+1$ è impari, ma se egli è pari vale il segno inferiore.

XII. Devonsi ora trovare i valori di A', A'', A''' ec., m', m'', m''' ec. Per farlo con tutta facilità, osservo, che $x = \frac{m \pm \sqrt{B}}{A'}$. Essendo pertanto irrazionale questo valore di x , egli si otterrà giusta il num. 865 con ridurlo a frazione continua, la di cui ultima frazione equivalente sarà $= \frac{u}{y}$, cioè il numeratore di questa

frazione equivalente sarà $= u$, e il denominatore $= y$. Ritrovati poi che si siano costì i valori di u, y , si otterrà per ultimo il cercato valore di x mediante l'equazione $x = \frac{u}{y} = A'x$.

XIII. Ma prima di tutto diamo le formole generali esprimenti i numeratori, e i denominatori delle successive frazioni equivalenti di una data frazione continua. La frazione continua, che suppongo essere il valore di x sia la seguente

$$x = a + \frac{1}{a' + \frac{1}{a'' + \frac{1}{a''' + \frac{1}{a^{(4)} + \frac{1}{\text{ec.}}}}}}$$

le lettere N, N', N'' ec. esprimano i numeratori delle successive frazioni equivalenti, e D, D', D'' esprimano i denominatori, si avrà

$$\begin{array}{ll} N = a' & D = 1 \\ N' = N a' + 1 & D' = a' \\ N'' = N' a'' + N' & D'' = D' a'' + D' \\ N''' = N'' a''' + N'' & D''' = D'' a''' + D'' \\ N^{(4)} = N''' a^{(4)} + N''' & D^{(4)} = D''' a^{(4)} + D''' \\ \text{N. ec.} & \text{D. ec.} \end{array}$$

e però sarà $u = \pm N^*, y = \pm D^*$ (i segni ambigui sono arbitrari, purchè si prendano nello stesso tempo o tutti due i superiori, o tutti due gli inferiori). Si vede poi, che essendo $\frac{N}{D} = \frac{N^*}{D^*}$, deve essere $u = N^*, y = D^*$, perchè tanto u, y , come N^*, D^* sono numeri primi fra loro.

XIV. Queste formole, come è evidente, dipendono unicamente dai valori di a', a'', a''' ec., che sono i denominatori della frazione continua, e questi valori, o sia denominatori non sono altro, che le radici prossime

$x = \frac{m + \sqrt{B}}{A}, x' = \frac{m' + \sqrt{B}}{A'}, x'' = \frac{m'' + \sqrt{B}}{A''}$ ec. delle equazioni (Z): Si avranno pertanto questi valori di a', a'', a''' ec., e di A, A', A'' ec., m', m'', m''' ec. col le seguenti formole

$$\begin{array}{lll} A' = \frac{B - m^2}{A} & a' < \frac{m + \sqrt{B}}{A} & m' = A' a' - m \\ A'' = \frac{B - m'^2}{A'} & a'' < \frac{m' + \sqrt{B}}{A'} & m'' = A'' a'' - m' \\ A''' = \frac{B - m''^2}{A''} & a''' < \frac{m'' + \sqrt{B}}{A''} & m''' = A''' a''' - m'' \\ A^{(4)} = \frac{B - m'''^2}{A'''} & a^{(4)} < \frac{m''' + \sqrt{B}}{A'''} & m^{(4)} = A^{(4)} a^{(4)} - m''' \\ A^{(5)} = \text{ec.} & a^{(5)} < \text{ec.} & m^{(5)} = \text{ec.} \end{array}$$

Il segno $<$ dinota, che deve si prendere il numero intero, che è immediatamente prossimo minore. Queste serie poi devono continuare intanto, che due termini della stessa serie, come $A^*, A^{*+2}, m^*, m^{*+2}$ si trovino avere lo stesso valore, cioè $A^* = A^{*+2}, m^* = m^{*+2}$, poichè in allora tutti i termini seguenti della serie si troveranno gli stessi, che i precedenti.

XV. Ritrovati così i valori di a', a'', a''' ec., fino ad a^* si avrà tosto il valore di $\pm N^* = u$, e di $\pm D^* = y$, e poscia il valore di z mediante l'equazione $z = mu - Ay$, conseguentemente si avranno i cercati valori di z, u , che soddisfanno all'equazione $A = z^2 - Bu^2$. Veniamo all'esempio particolare.

XVI. Prob. Debboni ritrovare per z, u de' numeri razionali interi, che soddisfanno alla precedente equazione del num. II $101 = z^2 - 13u^2$.

XVII.

XVII. Risol. Rispetto a questa equazione è $A=101$, $B=13$. Si cominci pertanto a trovare un numero m tale, che, essendo minore di $\frac{A}{2} = \frac{101}{2}$, sia $\frac{m^2-B}{A}$, cioè $\frac{m^2-13}{101}$ un numero intero. Dopo alcuni tentativi si trova essere $m=35$, onde si ha $\frac{35^2-13}{101} = 12 = A'$. Ma acciò A' , che nasce dalla prima formola $A' = \frac{B-m^2}{A}$, sia positivo, bisogna prendere $A=-101$. Essendosi adunque trovati i valori di $m=35$, e di $A' = \frac{B-m^2}{A} = \frac{13-35^2}{-101} = 12$, se ne facciano le sostituzioni nelle formole del precedente num. XIV., e si avrà

I.	II.	III.
$A' = \frac{13-35^2}{-101} = 12$	$a' < \frac{35+\sqrt{13}}{12} = 3$	$m' = 3 \times 12 - 35 = 1$
$A'' = \frac{13-1^2}{12} = 1$	$a'' < \frac{1+\sqrt{13}}{1} = 4$	$m'' = 4 \times 1 - 1 = 3$
$A''' = \frac{13-3^2}{1} = 4$	$a''' < \frac{3+\sqrt{13}}{4} = 1$	$m''' = 1 \times 4 - 3 = 1$
$A^{(4)} = \frac{13-1^2}{4} = 3$	$a^{(4)} < \frac{1+\sqrt{13}}{3} = 1$	$m^{(4)} = 1 \times 3 - 1 = 2$
$A^{(5)} = \frac{13-2^2}{3} = 3$	$a^{(5)} < \frac{2+\sqrt{13}}{3} = 1$	$m^{(5)} = 1 \times 3 - 2 = 1$
$A^{(6)} = \frac{13-1^2}{3} = 4$	$a^{(6)} < \frac{1+\sqrt{13}}{3} = 1$	$m^{(6)} = 1 \times 4 - 1 = 3$
$A^{(7)} = \frac{13-3^2}{4} = 1$	$a^{(7)} < \frac{3+\sqrt{13}}{1} = 6$	$m^{(7)} = 6 \times 1 - 3 = 3$

Ora mi fermo qui perchè nella serie I. ho trovato due valori uguali all'unità, cioè $A^{(6)}=A'$, come pure nella serie III. $m^{(6)}=m'$; essendo adunque $A^{(6)}=A'^{+1}$, e però $n=5$, farà $a^5=a^{(6)}$. Si sono pertanto trovati i valori di $a'=3$, $a''=4$, $a'''=1$, $a^{(4)}=1$, $a^{(5)}=1$, $a^{(6)}=1$, $a^{(7)}=1$, conseguentemente la frazione continua, che dà il valore di x è

$$\begin{array}{r}
 x = 3 + 1 \\
 \quad \quad \quad \frac{4 + 1}{\quad \quad \quad \frac{1 + 1}{\quad \quad \quad \frac{1 + 1}{\quad \quad \quad \frac{1 + 1}{\quad \quad \quad \frac{1 + 1}{\quad \quad \quad \frac{1}{2}}}}}}
 \end{array}$$

e però le formole del num. XIII diventano

$$\begin{array}{ll}
 N = 3 & D = 1 \\
 N' = N a' + 1 = 13 & D' = a' = 4 \\
 N'' = N' a'' + N = 16 & D'' = D' a'' + D' = 9 \\
 N''' = N'' a''' + N' = 29 & D''' = D'' a''' + D'' = 9 \\
 N^{iv} = N''' a^{iv} + N'' = 45 & D^{iv} = D''' a^{iv} + D''' = 14 \\
 N^{v} = N^{iv} a^v + N''' = 74 & D^{v} = D^{iv} a^v + D^{iv} = 23
 \end{array}$$

Si ha adunque $u = N' = 13$, $y = D' = 4$. Quindi mediante questi valori di u , y , e l'equazione $x = mu - Ay$ si ha finalmente il valore di x , che è $x = 35 \times 74 - 101 \times 23 = 267$. Onde con sostituire questi ritrovati valori di x , u nella data equazione $101x^2 - 13u^2$ si ottiene la bramata soluzione, così $101 = \frac{267^2}{13 \times 74}$.

XVIII. Poichè la quantità $\sqrt{13}$ ha naturalmente doppio segno, siccome ella si è presa col segno $+$ nelle formole precedenti notate II, così essa si può prendere col segno $-$, nel qual modo somministrerà un'altra soluzione al problema proposto. Prendiamola adunque col segno $-$, e così avremo

I.	II.	III.
$A' = \frac{13-35}{-101} = 12$	$a' < \frac{35-\sqrt{13}}{12} = 2$	$m' = 2 \times 12 - 35 = -11$
$A'' = \frac{13-11}{12} = -9$	$a'' < \frac{-11-\sqrt{13}}{-9} = 1$	$m'' = 1 \times -9 + 11 = 2$
$A''' = \frac{13-2}{-9} = -1$	$a''' < \frac{2-\sqrt{13}}{-1} = 1$	$m''' = 1 \times -1 - 2 = -3$
$A^{iv} = \frac{13-3}{-1} = -4$	$a^{iv} < \frac{-3-\sqrt{13}}{-4} = 1$	$m^{iv} = 1 \times -4 + 3 = -1$
$A^v = \frac{13-1}{-4} = -3$	$a^v < \frac{-1-\sqrt{13}}{-3} = 1$	$m^v = 1 \times -3 + 1 = -2$
$A^{vi} = \frac{13-2}{-3} = -3$	$a^{vi} < \frac{-2-\sqrt{13}}{-3} = 1$	$m^{vi} = 1 \times -3 + 2 = -1$
$A^{vii} = \frac{13-1}{-3} = -4$	$a^{vii} < \frac{-1-\sqrt{13}}{-3} = 1$	$m^{vii} = 1 \times -4 + 1 = -3$
$A^{viii} = \frac{13-3}{-4} = -1$	$a^{viii} < \frac{-3-\sqrt{13}}{-1} = -6$	$m^{viii} = -1 \times 6 + 3 = -3$

Avendo trovato due termini della serie I. uguali, cioè $A'' = A^{viii} = -1$, e così pure due della serie III, cioè $m'' = m^{viii} = -3$, mi fermo qui. Essendo $A'' = A^{viii} = -1$ si trova essere $n = 7$; si offervi poi, che dei due termini della serie I., e III., ai quali corrispondono valori uguali, le uno ha per indice un numero pari, l'altro lo avrà impari, e *vice versa*. E poichè si sono trovati i valori di a' , a'' ec. fino ad $a^{viii} = a''$, si avranno i valori di $N'' = N''$, e di $D'' = D''$ mediante le formole del num. XIII, onde sarà $n = N'' = 34$, $y = D'' = 13$. Quindi si avrà per ultimo il valore di x con sostituire questi valori di n , y nell'equazione $x = nu - Ay$ così $x = 1190 - 1313 = -123$; e però l'equazione data $101 = x^2 - 13n^2$ trovata risolta così $101 = 15129 - 15028$.

XIX. Allorchè la radice x è negativa bisogna prendere i numeri u , m con segni contrari. Per mezzo delle due soluzioni trovare si potranno poi ottenere le altre infinite, che ammette il Problema. Questo metodo serve non solo per l'equazione $A = x^2 - Bu^2$, ma anche per l'equazione $A = x^2 + Bu^2$, ed egli ci è stato comunicato dal celebre, e non mai abbastanza lodato Sig. De la Grange ne' Tomi XXIII, e XXIV, dell'Accademia di Berlino.

XX. Si offervi rispetto alla quantità $\frac{a+cx}{b}$ del num. IV., che deve essere uguale a un numero intero, per esempio p ; onde sarà l'equazione $a+cx=bp$, e rispetto alla quantità $\frac{m^2-13}{A}$ del num. IX., che deve parimente essere un numero intero, per esempio A' , così che sia $m^2-13=AA'$, o sia $m^2=AA'+13$, per facilitare la maniera di ritrovare i numeri p , A' , si può far uso del metodo dato all'Art. IX. del Cap. III., applicando cioè nel primo caso il metodo alla quantità $a+cx$

$n+12$, e osservando quale fra i termini della serie, che ne nascerà, sia un multiplo di b , poichè in allora un fattore di questo termine sarà $\equiv b$, e l'altro $\equiv p$; nel secondo caso si dovrà applicare il metodo alla quantità $AA'+13$, in cui A' è l'incognita, e vedere quale fra i termini della serie, che ne verrà, sia un quadrato perfetto; mentre la di lui radice quadrata sarà $\equiv m$, che si cercava,

FINE DEL SECONDO TOMO.

ERRORI.

CORREZIONI.

Pag.	Lin.		
XII.	28	95	96
13.	4	doveodofi	dovendofi
24.	24	è — 1 $\times \sqrt{ab}$	— 1 $\times \sqrt{ab}$
29.	26	Prodotto totale $a^3bd^3 - 2a^2b^2d^4$	Prodotto totale $a^3bd^3 - 2a^2b^2d^4$
35.	3	giusta il num.	giusta 1 num.
42.	4 e seg.	I segni +, che sono nel fine di sono superflui	tutte le righe dalla 3 fino alla 13
50.	5 ult.	$a+b+c+d+e$	$a+b+c+d+e$
89.	13	adl	dal
—	20 e 21	$\frac{A^*B}{A^*} - B^* \times t - \frac{A^*D^*}{A^*} + D^* = 0$	$\frac{A^*B}{A^*} - B^* \times t - \frac{A^*D^*}{A^*} + D^* = 0;$
		quindi $t = \frac{A^*D^* - A^*B^*}{A^*B^* - A^*B^*}$. Isteff-	quindi $t = \frac{A^*D^* - A^*B^*}{A^*B^* - A^*B^*}$. Isteffa-
		mente fatto uguale $a + D^* = 0$;	mente fatto uguale a zero
		zero	
92.	3 ult.	conseguente	conseguentemente
100.	16	$x \pm \pm 13$	$x \pm \pm 14$
106.	8 ult.	$e y = -\frac{1}{2} b \pm \sqrt{a} + \frac{1}{4} bp$	$e y = -\frac{1}{2} b \pm \sqrt{a} + \frac{1}{4} b^2$
107.	ult.	ritrovati	ritrovati
147.	28	numeri	numero
154.	23	Aritmatica	Aritmetica
184.	13	sedondo	secondo
199.	19	m'è	m'è
209.	6	orizzontale	orizzontale
249.	3	darci	dargli
		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
280.	11	$\sqrt{\quad}$	$\sqrt{\quad}$
323.	21	chè è	che è
353.	12	IV.	IV. ec.
372.	18	da l. si ha	Da l. si ha
378.	11 ult.	$An + Bn^2 + Cn^3$	$An + Bn^2 + Cn^3$
407.	1	in principio della prima linea si legga	inequali
441.	22	premettere	premettere

Si troveranno di tratto in tratto altri piccoli errori simili ai già avvertiti, ma di niun peso; che però si è trascurato di notarli. Sono bensì scorsi in alcune copie varj errori inevitabili a motivo della maggiore, o minor pressione del torchio: per esempio farà in alcune copie poco sensibile l'impressione di alcuni apici, e di alcuni esponenti.

AD 1462492





we cinque. 5 mil.

